



3659.

~~2-3-27~~

MED 2566



73-3-29

~~36-3-A-n-17~~



Π Ι Ν Α  
THEATRI BOTANICI  
CASPARI BAVHINI

Basileenf. Archiatri & Professoris Ordin.

*sive*  
INDEX  
IN THEOPHRASTI DIOSCORIDIS  
PLINII ET BOTANICORVM  
*qui à Seculo scripserunt*  
OPERA:

PLANTARVM CIRCITER SEX MILLIVM  
AB IPSIS EXHIBITARVM NOMINA CVM  
earundem Synonymiis & differentiis

*Methodicè secundùm earum & genera & species proponens.*

OPVS XL. ANNORVM

Hactenus non editum summoperè expetitum & ad auctores  
intelligendos plurimùm faciens.

GALENVS I. de ANTID. V.

Medicus omnium STIRPIUM, si fieri potest, peritiam habeat consulor:  
sin minus, plurimarum saltè, quibus frequenter utimur.



M D C

XXIII.



BASILEAE HELVET. Sumptibus & typis Ludovici Regii.



STRENO NOBILISS. AMPLISSIMOQ.

DN. ADAMO Zorn

Reipubl. Argentoratensis P R E T O R I  
prudentis.

Ejusdemque Academiae

CANCELLARIO DIGNISSIMO

Vt &

DOMINIS

SCHOLARCHIS ASSESSORIB.

RECTORI

ACAD. MAGNIFICO

DOMINIS DECANIS OMNIVMQ

FACULTAT. PROFESS.

VIRIS

CLARISS.

REVEREND. CONSVLTISS.

EXCELLENTISS. DOCTISS.

DOMINIS SVIS HONOR.

H V N C

ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜ

OBSERV. ET AMOR.

MONVM. PVB.

CASPARVS BAVHINVS

Basil. ἀρχιαντ.

&

ILLVST. DVCIS WIRTENB.

Medicus

ΤΥΧΗ, ΚΑΙ ΠΟΝΟ.

offert.

\* 2

DEDICATIO.



PRINCIPIBUS tantum viris olim Medicinam facere licuisse, Aelianus auctor est, STREN. NOBILISS. AMPLISS. MAGNIF. CLARISS. REVEREND. CONSULTISS. EXCELLENTISS. DOCTISSIMI Q. VIRI. Etenim apud veteres, tam Hebræos, quam Ethnicos, non minus Ars universa, quam ejus non minimum fulcrum *γνώσις βοτανική*, in summo honore & existimatione fuit. Hebræi, ut DEVM TER OPT. MAX. *πάντων ὄντων δημιουργα* merito statuunt, ita etiam eidem, salutarem hancce scientiam, acceptam ferunt. Apud hos certe, Regum, quos Sol unquam aspexit, sapientissimus Salomo, ut in omni aliâ *πάντων φυσικῶν πτωχῶν* exercitatisimus; ita etiam hanc excoluisse facultatem, sacræ nobis attestantur paginæ, ut qui humilimas herbas, ac vastissimas arbores æquè *ἀξιοθεύτως* arbitratus fuerit, ut non solum à Cedro Libani, ad Hyssopum usque quæ è pariete emergit, Plantarum historiam scripserit, sed & earundem facultates, quibus quilibet affectus sanari possit, pluribus libris perstrinxerit, quos (ut refert Flavius) metu *ἐν δολωλατρίας*, è templo Hierosolymitano Ezechias sustulit. Ethnici hanc inventoribus exultoribusque diis dignam existimarunt. Modò enim inventor è ejus statuunt Apollinem, modò Æsculapium, ut & Chironem, filium Saturni & Phylliridis, ac si *φιλήτης παῖς* diceret; innuentes eum qui *βοτάνῃ* ritè velit, omnifariæ observationi experientiæque sese dedat necesse esse. Imò apud hos ne Reges quidem & Principes, indagationem, & peritiàm hujus Naturalis Philosophiæ partis, sibi indignam judicarunt. Multi enim horum, nominibus suis propriis, plantas à se inventas, insignire, adeoque posteritati, sui memoriam, singulis vicibus, quibus plantæ ipsi *ἐμάνυμοι* repullulant germinantque, ingeminare atque inculcare voluerunt. Ab Illyriorum enim rege Gentio, Gentiana; Lyfimachia, à Lyfimacho Macedonia; à Climeno, Climenon; Telephium, à Telepho Mysiæ, regibus denominata. Taceo unde Chironium, Heraclea, Achillea, Helenium, Arthemisia, aliæque his similes innumeræ nomina sua sortitæ sint. Alii, solâ inventione herbarum, celebrantur; Mithridati Ponti regi Scordium, Jubæ Mauritanorum Euphorbium, Echium & Anchusa Alcibiadi Atheniensium duci nominis immortalitatem pepererunt. Solâ hac speculatione, Attalus Pergami, & Evax Arabum reges, apud posteros fulgent: quippe de hoc legitur, quòd is, de simplicium medicamentorum (quæ propria

# D E D I C A T I O.

propriâ manu delinearit) facultatibus, ad Neronem plurima scripserit. Sane hi, quos commemoravi, viri illustres, haud alio fine, tantâ rem herbariam veneratione profecuti sunt, quàm quòd *Θία τῇ τέχνῃ* Medicinæ summum emolumentum hujus peritia afferat. Nam ut rectè Oribasius, *ἡ γνώσις τῶν ἀποτῶν φαρμάκων, καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς δυνάμεων, ὅπως ἀναγκαστικῶτα καὶ ἰσχυρῶς, ὡς μηδ' οἷον πῆναι χωρὶς ταύτης ἰατρικῆς ἐν βοτάναις εἶναι.* Heroum enim veterum Medicina, ut ingenuè fatetur Homeri scholiastes, ex solâ stirpium cognitione profecta est; *ἡ δὲ χάρις*, inquit, *ἰατρικὴ ἐν βοτάναις εἶναι.* Huic & ipse Homerus adstipulatur, ut pluribus aliis in locis, ita præsertim in eo, ubi Patroclus, vulnus Eurypylo ab Alexandro inflicto, curans, posteaquam cultro telum excidit, aquâq; tepidâ sanguinem abluit,

— *ὅππῃ δὲ ῥίζαν βάλε περὶ αὐτόν.*

Quid multa? imò & Esajas Ficu, jussu Jehovah, vulnus Ezechiae regis sanavit. Certè Galenus, Medicorum, post Hippocratem, *κερυφαῖον*, omnium Plantarum Medicus, si unquam fieri possit, cognitionem ut habeat consulit: ut quæ tam excellentibus facultatibus præditæ sint: quas omnes si perspectas haberem (ut Galenus de *πράσινῃ διὰ φαρμάκων* pronuntiavit) ne Æsculapio quidem medendo cederem. Et Ægyptus non aliam ob causam medendi peritiâ celebrata, quàm quòd naturaliter simplicium medicamentorum solum fertile habeat: ita ut idcirco veteres eidem, ut & eadem sibi ipsi, medicinæ peritiâ arrogaverint. Nam

*Αἰγυπτίῃ, τῇ πατρίδι. Φέρει ζῆνδωρον ἄρουρα  
φάρμακα, πλὴν μὲν ἰατρικὰ μεμιγμένα, πλὴν δὲ λυγρὰ.*

Verùm, cum quæ Terra, entium horum beneficentissima parens, sinu suo complectitur *φυτὰ*, ad infinitum penè numerum accedant, huic studio difficultatem maximam affingunt: adde quòd Auctorum de his dissensus, atque *ἀμετρία*, hancce *δυσκολίαν* auget exaggeratque: hæc, ne ab hac antæcensurâ humanoq; genere utilissimâ contemplatione quemquam absterreat, de *μεθόδῳ* plantarumq; *παρανομιῇ* cogitavimus; quæ ambo hunc in *ΠΙΝΑΚΑ* conjecimus.

Cui autem opus hoc, immenso labore, multis vigiliis, summoque studio concinnatum, offerrem, ut contra Aristarchorum Zoilorumq; virulentos morsus defenderetur, & tanquam Teucer ille sub Ajacis clypeo tutius prodiret, consideranti mihi, Vos VIRI STREN. NOBILISS. AMPLISS. CLARISS. REVER. CONSULTISS. EXCELLENTISS. DOCTISSIMIQ. hujusce mei fœtus Patronos Præsidesq; omnium æquissimos, eligere visum fuit: Vos inquam, in omni virtutum, scientiarumq; genere exercitatissimos,

# D E D I C A T I O.

in quibus, artes penè omnes sororio quasi vinculo contentæ, resplendescunt. Vos, qui omnium dexterrimè, summâ quâ polletis Prudentiâ, de literatis, literatorumq; lucubrationibus & vigiliis iudicium ferre scitis. Quin etiam, ob summam utriusque Academiæ, Argentinensis inquam & Basileensis, mutuam conjunctionem & confidentiam (quò ea porrò augeatur & deprædicetur: ) utpote, cùm ex vestro Ordine Academico, VIRIS PRÆCLARISSIMIS plurimis, supremam insulam, in omnibus Facultatibus, promeritam, in nostro potius, quàm aliarum Scholarum Lycæo, consequi placuerit: quorum non pauci, nunc ἐν μακαρίῃς cœlesti patriâ gaudent; non pauci vitali etiamnum aurâ fruuntur, remque literariam præclaris conatibus, tum vivâ voce, tum scriptis excellentissimis, magno literatorum emolumento exornare non desinunt, cui, ut impostero, quàm diutissimè invigilare possint, à DEO OPT. MAX. animitus precor: horum quoque plures VIRI CLARISSIMI me Diribitore, summæ suæ, in arte nostrâ, doctrinæ βεβαίον & honorem, impetrare voluerint. Adde, quòd multorum ex his humanitate ac benevolentia Opus hocce creverit, ut quibus, Plantis transmissis conatus meos promovere, placuerit. Dein, summè me movit διεγερτικῶν plurimorum in me collatorum recordatio; quippe qui nullis non temporibus, omnem movi lapidem, occasiones quærens, publicam quandam, erga beneficia accepta, gratitudinis statuam erigendi. Quoties enim, tam propriæ quàm alienæ valetudinis causâ Acidulas proficiscens, Urbem vestram transivi: Ecce toties beneficia beneficiis cumulastis, iisdemque me demulcere, Vobisque obstrictum, magis devincire non destitistis. Id quod à pluribus abhinc annis, plenissimè expertus sum: cùm sæpissimè, tum universim TOTVS SENATVS ACADEMICVS, tum specialiter ex hocce Aliqui splendidè me excepistis. Imò, nuper etiam, ante sesquiannum ferè, ab AMPLISS. REIPVB. Vestræ MAGISTRATV cùm aliis, tum nominatim vino honorario salutatus fui. Cæterùm, ut ob Privilegia nuper, in omnibus facultatibus Doctores promovendi, consecuta, vobis congauderem; gratulationis hujus arrhabo, liber hicce meuse esto. Accedit & illud non minimum, quòd prudenti consilio, Medicæ Facultatis commodo summo juvandi studio, Hortum Medicum splendidissimum instruxisse vos audiverim: quo igitur studiosis, in eo frequentando, animum adderem; aliòsque, ad hunc diligentius visitandum, alacriores excitarem, Plantarum μετ' ὅδ' ἡ καὶ αὐτανόμων αὐτοφυῆς hoc meum Vobis inscribere placuit. Favete igitur VIRI STREN. CLARISS. REVEREND. CONSVLTISS. EXCEL-

LEN-



# D E D I C A T I O.

**LENTISS. DOCTISS.** atque *σίσημα* hocce meum *βουλευτήριον*, plusquàm **SEX**  
**MILLE** Plantas continens, supra **QVADRAGINTA** annos meditatum, à tot  
 Tantisque Viris toties expetitum, excipite. Suscipite inquam eo quo offer-  
 tur animo, gratitudinis, loco beneficiorum acceptorum, *μνημόσυνον* statuen-  
 di studio, tutelæ Vestræ concretum: zephyroque benevolentia vestræ de-  
 mulcete. Valet, meque porro, singulari Vestræ humanitati commenda-  
 tum habete; & à me, quæcunque proficisci officia possunt promtissima, ex-  
 pectate: **BASILEÆ** ad d. **XV. KL. Februarj** Anni *τῷ Θεανθρώπῳ* **CIƆ. ƆƆ.**  
**CXXIII.** quod die (ut cum Augusto Cæsare loquar) *κλημακλήρα*, communem  
 seniorum omnium **TERTIVM & SEXAGESIMVM** evasimus. **DEVM**  
 autem oro, ut mihi quod superest temporis, id salvis nobis, in  
 statu Professionis meæ ad **SVI** gloriam & pro-  
 ximi utilitatem traducere liceat.



AD LE-

# AD LECTOREM BOTANICVM

## P R Æ F A T I O .



*V*M. ante annos quadraginta quinque, Galeni præceptoris scripta legeremus, singulari fato in hunc locum ipsius, qui 3. de Compositione medicamentorum 2. habetur, incidimus. Quiquís (inquit) auxiliorum undique copiam habere volet, omnis materiz Stirpium, Animalium & Metallorum, tum aliorum terrestrium corporum, quæ ad Medicinæ usum ducimus, expertus esto, ut ex eis & exacta & notha cognoscat. Deinde, in Commentario quem de Simplicium medicamentorum facultate prodidi, sese exerceat. Nisi enim hoc modo instructus ad præsentis operis præsidia veniat, verbotenus quidem medendi methodum sciet, opus verò nullum ipse dignum perficiet. Quæ sententia permoti, præter cæteras Medicinæ partes necessarias, ad Botanica, quæ auxilia medica subministrat, animum studiumque, convertimus: & ea quæ fieri potuit & studio & diligentia, non solum Botanographos, tanquam multos præceptores legendo & relegendo in hunc usque diem consulimus: verum etiam & vivos quoscunque in Germania, Gallia & Italia, per aliquot annos peregrinando, diversis in Academiis coram attentè audivimus, de Plantarum nominibus, viribus, studiose inquisivimus, & quod præcipuum erat, Plantas locis natalibus inspicendo, nullis laboribus, nullis molestiis, nullius sumptibus peperimus: cum, ut habet Galenus loco citato, Bonæ indolis juvenes, ut medicamentorum materiam cognoscant, ipsimet inspicere debent, non semel aut bis, sed frequenter: quoniam sensibilibus rerum cognitio sedula inspectione perficitur. Incitavit & Dioscoridis exemplum, qui ab ineunte juvenia, jugi desiderio cognoscenda materia allectus, per multas regiones peragravit. Hinc Galenus, ut videtur 1. de Antidot. 2. in Cyprum, ob metallica quedam navigavit: unde Cadmiæ, pompholygem, dypbryges, aliâque plurima in usum Pergamenium advexit, inprimis ingentem Chalcanti copiam, ut plenius comment. 3. in lib. de victus ratione habetur. In Palestinam, Opobalsami causa abiit: in Lemnum insulam secundo (ut 9. Simplic. habetur) navigavit, ut Sigilli vel terræ Lemniæ natales inspiceret. Verum & ipsas plantas, quæ fieri potuit genio & ingenio lectas exsiccavimus, reservavimus (ut in præsens Herbarum supra millia quatuor, præter fructus, semina, ligna & aromatica, penes nos habeamus) cum Authoribus contulimus. Nec his contenti, sed ad ulteriorem cognitionem, pluris Medicinæ studiosos, Galliam & Italiam adeuntes, rogavimus, ut omni generis etiam vulgarissimas (imò ipsa Gramina & Trifolia) plantas collectas transmitterent, quod liberaliter ab ipsis factum, quorum nomina peculiari Catalogo (cum nunc Doctores sint) notata post Præfationem invenies. Insuper hinc inde literis ad diversos Viros clarissimos, tam Doctores, quam Pharmacopæos, Germaniæ, Galliæ, Italiæ, Angliæ, Belgii, Dantiæ & Cretæ in Græciâ, sollicitare non destitimus, nec etiamnum desistimus, ut plantas vel transmittant, vel de illis suam sententiam, & quidem in bonum publicum, exponant, quod à multis liberaliter factum, cujus nomine gratias immensas habemus, & ut porro faciant, quàm officiosissimè rogamus, ipsorum in scriptis nostris honorificam mentionem facturum. Benignum est (ut scit Plinius in epistola ad Vespasianum) & plenam ingenui pudoris, sateri per quos profecimus. Et cum ab annis supra triginta, utrique studio tam Anatomico quam Botanico persequerimur, & nihil eorum quæ Studiosis utile fore existimavimus, intentatum reliquerimus, ipsos non solum bis, secundum Scholæ nostræ Medicæ statuta, sed singulis vernalibus, æstivis & autumnalibus mensibus, aliquoties ad plana, montosa, palustriaque, ad Herbarum inspectionem & cognitionem deduximus: nam (ut Dioscorides habet) cui in animo est harum peritiam assequi, necesse est cum prima germinatione solo emergentibus, adultis & senescentibus, adesse: nam qui pullulantibus herbæ dumtaxat adstiterit, adultam cognoscere non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quare qui sæpius ad visendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maximè consequetur. Insuper in excursionibus nostris, diversæ auctorum nomina, Studiosis ad codicillos dictavimus: imò & domi postmodum, in ipsis Auctoribus & nostro Horto sicco (quod etiamnum petentibus contingit) ostendimus: in nostris in Dioscoridem, & de Plantis in officinis usitatis prælectionibus æstivo tempore habitis, ad calamus dictavimus. Nec his contenti, autè annos viginti sex Phytopinacis partem primam, in qua circiter bis mille quingenta plantæ, methodicè secundum genera & species, habita potissimum ratione formæ externæ, distributæ habentur, cum uno alterove Synonymo exhibuimus: centum & sexaginta plantas, prius non descriptas, cum nonnullis figuris

gura addidimus. Dein Matthiolum, tum Tabernæ montanum, utrumque emaculatum, multis novarum plantarum descriptionibus, iconibus, Synonymiis & notis auctum, publici juris fecimus. Animadversiones quinque etiam in Historiam universalem Lugduni editam, easque, succinctas dedimus & circiter quadringentas plantas, in eo opere, in terræ postas ostendimus, idque, non cavillandi studio, sed ut studiosos admoneremus, ne in eisdem scopulis errorum impingerent. Et quia præter omnium expectationem, THEATRI nostri BOTANICI editio differtur, ante biennium, Theatri nostri Prodromus, qui circiter sexcentas plantas à me primum partim in Phytopince, partim in Matthiolo, partim tunc solum descriptas, at tanquam meas repetitas, una cum pluribus signis plantæ novæ, exhibet, lucem aspexit. Tandem deficientibus dudum Phytopinacis exemplaribus, nunc PINACEM hunc producimus, qui non solum Phytopinacem editum supra millenarium auctum continet, sed & alteram partem hactenus non editam: imò etiam omnium Botanicorum nomina & differentias exhibet. Et ne quicquam desiderandum videretur, descriptiones quoque Indicarum utriusque, magna illa volumina simul cusa: ut & alios plures in eisdem exterarum regionum navigationes separatim editas: atque, etiam Ranzvosii, Bellonii, aliorumque, quorum in his meminimus Itinerariis, immenso studio, summo labore diligenter perlegimus, hoc solo sine, quo ea, quæ memorabilia de Plantis earundemque, Nominibus continerent, huic operi inferere: nusquam quidem ea methodo, qua in Theatro nostro usuri sumus: quo labore studiosi in excursionibus Herbarum inquirendarum causa, uti poterunt: & qui apud nos vivunt, Catalogum nostrum, plantarum circa Basileam nascentium, ante annum edidit, qui loca natalia ostendit, adjungere poterunt, donec Theatrum nostrum prodeat, cuius duos priores libros, quos ad prælum paratos habemus, brevi expectabunt. Interim omnes huius studii cultores & affectus, amantes rogamus, ut si forte animadverberint, me (quod non dubito, sed ultro fateor) lapsum esse, vel forte in eandem plantam repetivisse, huius studii immensitatem cogitent, ita ut ferè Oceano simile dici possit: nam, quemadmodum DEI in Oceano miracula inperscrutabilia sunt: sic & Botanicum studium infinitum est, cum in dies nove Plantæ inveniantur & ex utraque India ad nos afferantur: eosdem officiosissime rogamus, ut ubi nos lapsi animadverberint, amice & candidè moneant (Zoilum non curo) moniti, ipsi gratias agemus, errores nostri agnoscent & emendabimus: imò, si quid erroris, etiam non moniti, in dictu nostro animadverberimus, ultro fatebimur, imitaturi Diclatorem nostrum Hippocratem, qui (ut Celsi verbis utar) à Sutoris se deceptum esse, memoriæ prodidit, more scilicet magnorum virorum & fiduciam magnarum rerum habentium: nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magno ingenio, multa quæ nihilominus habebunt, convenit etiam simplex veritatis confessio, præcipueque in eo ministerio, quod utilitatis causa posteris traditur, ne qui decipiantur eadem ratione qua quis ante deceptus est. Nam ut rectissime

Galenus, χαλεπὴν ἀδυστοχὴν οὐκ, μὲ διαψέδων ἐν πολλοῖς, τὰ μὲν δὲ αὐτοῦ οὐκ, τὰ δὲ

καὶ κερύοντα, τὸ δὲ ἀμειλίγεον χεῖρα. His in rem tuam, LECTOR

CANDIDE, utere. Vale & vive, ut possit vivas,

& auctori faveas.





Ad  
CASPARVM BAVHINVM

*Trizampale.*

**C**VI potius neclant benevolentia ferra Napæ,  
BAVHIN E, quam tibi, cedo?  
Mille etenim herbarum, plantarum nomina  
Collecta faste uno doces. (nullo

Tot grates debent, quod habent ridenda plantas  
Herbæq; prata & frutices.

Cui potius volas Junonia lilia, Cui nam  
Milesias spargant rosas?

Floreat & viget nomen, BAVHIN E, perenne  
Tibi, dum rosa & flores erunt.

Affrictosq; Tibi ad cippum post fata Napæ  
Fundant odores perperim.

GEORGIUS REMVS I. C.  
Noricus.

~~~~~

**L**ITTORA tot Ponti, tot campos visere & Hortos  
Desine, tot Sylvas, tot prata, totq; rupes,  
Hæc loca quot Stirpes, totus quos proferat Orbis,  
BAVHIN E scriptis confice in Eiconicis.

PASCHALIS LE COQ MED. apud  
Pictavienses Decanus & Senior.

**D**E plantis Graii scripserunt atque Latnii,  
Scriptis Arabs, Teuto, Gallus, Iber, Italus.  
De plantis quicquid scribunt Graii atque Latini,  
Quicquid Arabs, Teuto, Gallus, Iber, Italus:  
Omne hos unus habes, BAVHIN E, labore paratum  
Peravigili, ingenio dispositumq; tuo.  
Imò alius non visa, velut te Lynce, patefuit;  
Humanis deinceps usibus utilia.  
Ergò velut nomen planta una uniusve libellus  
Istorum studiis obtinuit celebre:

Sic quoque Plantarum præsens opus, immortale  
Dignum est Authori nomen habere sui:  
Herbarumq; Tibi, BAVHIN E, scientia laudem  
Debeat, an Phæbo, lis erit hæc Medicis.

SIGISMUNDVS SCHNITZERVS  
Med. Bambergensis.

**Q**UID non BAVHINVS præstat? nam subleuat  
egross;

Describit Plantas; mortua membra secat.

Incitit Herophilas, Vesalius atque Galenus  
Se jactitent; noster præstitit auctor eos.

Illi parva docent magnis inclusa libellis;  
Hic docet in parvis, magna suspenda, libris.

Qui BAVHINVM igitur non suspicit, atq; miratur  
In plantæ crebrum calcæve molle gerit.

LAURENTIVS HOFMANNVS HALLÆ-  
SAXO Phil. Med. & Chæurg. D.

**A**RTIS dictator Medica clarissimus hic est  
Nostra cui haud similem secta tulere virum.  
BAVHINVS scriptis toto celebratus in orbe

Perfectu, cujus nomen ubique sacrum.

Quem supet Ausonius, Gallus veneratur, Iberus  
Miratur, Teuto calica ad astra vehit.

Solo hoc Sole viget Plantarum notio vera  
Et Microcosmi, quæ est historia ampla, pater.

Vt meritò hic artis dicatur Apollo & Apelles  
Tam clarè illustrat quæ latuere prius.

Vivat BAVHINVS decus immortale medentum;  
Perpetuò felix floreat & vigeat.

JOANNES CAROLVS Rosenberg.  
Argentini. Med. & Ph.D.



NOME

# NOMINA AUTHORUM

quorum opera usi sumus.

**A**DAMUS Lonicerus: is herbarium Eucharium Röslin sui in officio Francofurti antecessoris, Germanicè scriptum quartò auxit, & postremò anno 1569. prodit: postmodum remoto Eucharium nomine, suum præfixit, & cum figuris 833. circiter, anno 1582. dedit. Francofurti.

**A**DAMI Zaluzanii methodi herbariæ libri tres. Francofurti 1604. 4.

**A**DRIANI Junii Medici, phallus ex fungorum genere in Holandia: Delphis 1564. 4. cum figura.

**A**DRIANI Spigelii Patavini Professoris, Ilagoges in rem herbariam libri duo. Patavii 1606. 4.

**ADVERSARIORUM** opus à Petro Pena & Matthia de Lobel, Londini anno 1570. editum, additis circiter 284. figuris: postmodum anno 1576. Antuerpiæ novus titulus præfixus, epistola ad Reginam omissa: cui operi Lobelius Observationes suas cum novis figuris junxit.

**Æ**GIDIJ Everhardi Antuerpiani, de herba pancea sive Nicotiana commentariolus, ejus vires proponens: ejusdem de usu radicis Mechoachæ. Antuerpiæ 1587. 16.

**Æ**MILII Macri Veronensis poësis de Herbarum virtutibus, cum obscuriorum succincta expositione Georgij Pistorii Viltingani Medici. Basilicæ cum figuris 52. ex Crescentio. 1581. 8.

**A**LEXANDRI Petronii, de victu Romanorum & valetudine conservanda libri 5. Romæ 1592. 4.

**A**LOYSIUS Anguillara horti Patavini tertius in ordine præfectus, de plantis suam sententiam diversis communicavit: opusculum in partes 14. divisum, opera Johannis Marinelli Italicè prodit (additis duabus figuris Chamæleontis & Sedi arboreascentis) Venetiis 1561. in 8.

**A**LOYSIUS Mundella Medicus Brixienfis, horti Patavini secundus in ordine præfectus, Epistolarum librum unum (in quo 36. epistolæ) & Annotationes in Examen simplicium Brasavolæ scripsit: cum Epistolis Manardi simul cusa, Lugduni 1556. in fol.

**A**MATI Lusitani in libros quinque Dioscoridis enarrationes, additis diversarum linguarum

nominibus. Argentinx 1554. in 4.

**ANDREAS** Bellunensis notis in Avicennam.

**ANDREAS** Cæsalpinus Aretinus, in Acad. Pisana Professor, de plantis lib. 16. scripsit, nullis figuris additis: prodit Florentiæ 1583. Ejusdem appendix ad hos libros, Romæ 1603. in 4.

**ANDREÆ** Lacunæ, commentaria in Dioscoridem cum figuris Hispanica lingua coniecta. Salmant. 1552. fol.

Ejusdem annotationes in Dioscoridem, in quibus Ruellii versio castigatur. Lugduni 1554. 16.

**ANDREÆ** Theveti Cosmographia, Gallicè edita cum figuris aliquot plantarum & animalium.

Ejusdem singularitates Gallix, Antarticiæ sive Americæ, cum 11. figuris plantarum, Gallicè: Lutetia 1557. 4.

**ANGELUS** Palea & Bartholomæus ab Urbe veterum Ordinis minorum observantiæ provinciarum Romanæ, annotationes in Antidotarium Medicum. Venetiis 1543. fol.

**ANTONII** Mizaldi de Sena opusculum. Lutetia 1574. 8.

Ejusdem hortorum secreta: item de Arborum insitione & dendranatome. Ibid. 1575. 8.

**ANTONII** Musæ Brasavoli Ferrariensis, examen omnium simplicium quorum in officinis usus est. Lugduni 1556. 16.

**ANTONII** Palini annotationes & emendationes in versionem Dioscoridis à Matthiolo propositam: Italicè. Bergomi 1591. 4.

**APULEIUS** Platonius de Herbarum virtutibus, addita demonstratione herbarum singulorum signorum Zodiaci, nec non & stellarum errantium. Lutetia 1528. in fol.

**ATHENÆI** Deipnosophistarum lib. 15. Græcolatin. cum Dalechampii interpretatione. 1597. in fol.

**AUGUSTINI** Galli Pressani de Agricultura, Italicè. Venetiis 1569. 4.

**BARTHOLOMÆI** Carrichterii liber, ostendens sub quo signo Zodiaci & in quo gradu plantæ sitæ sint, & quando colligendæ, Germanicè. Argent. 1589. 8.

**BARTHOLOMÆI** Marantæ Venusini, mo-

thodus cognoscendorum simplicium lib. 3. Venetiis 1559. in 4.

Ejusdem de Theriaca & Mithridatio lib. duo à Camerario Latine reddit. Francofort. 1576. 8.

**BASILII** Besleri fasciculus rariorum animalium, lapidum, maritimorum & fructuum, cum iconibus fructuum 54. maritimarum plantarum 12. &c. In fig. oblonga, Norinbergæ.

Ejusdem Horti Eystettensis descriptio cum figuris 1083. Norinbergæ. 1613.

**BENEDICTI** Aretii descriptio montium Stocchorum & Nefsi in Bernatum ditione, & stirpium in eis nascentium: cum Cordo impressa.

**BERNHARDI** Deslenii Cronenburgii Medici Colonienfis lib. 10. de composit. medicam. cum ingredientium explicatione. Francof. 1555. in fol.

**BERNHARDI** Paludani Medic. Eufufani, notæ ad Linscottii historiam Indicam, additæ Operibus Indicis.

**BOTANICUM** Francofurtianum: sunt icones Eucharii Ræslin cum folis nominibus.

**CAROLUS** Clusius, Dodonzi historiam vernacula lingua conscriptam, Gallicam fecit, & corollarium de aromatibus addidit, cum figuris quæ separatim in octavo prodire anno 1560. in fol.

Idem Garziz ab Horto dialogos de aromatibus & simplicibus Lusitanicè conscriptos, in Epitomen contraxit, Latinos fecit, annotatiunculis & figuris plantarum 30. illustravit. Antuerpiæ anno 1574. 8. cujus editio quinta auctior, additis 36. figuris cum ejusdem exoticis 1605. in folio prodit.

Idem Nicolai Monardis de medicamentis Indiarum Occidentalis, ex Hispanico transulit, notis & figuris 9. illustravit: Anno 1574. 8. cujus editio quarta cum exoticis excusa est.

Ejusdem Monardis lib. tertius ab eodem Latine redditus, Antuerpiæ 1583. in 8. cufus.

Idem Christophori Acosta historiam ex Hispanico Latinam fecit, in epitomen contraxit, Scholiis illustravit, & anno 1582. edidit: tertio vero additis sex figuris cum exoticis anno 1605. in fol. prodit.

Lucem de plantis per Hispaniam observatis, lib. duos scripsit, figuris 230. additis. Antuerpiæ anno 1606. in 8.

Idem de Simplicibus per Pannoniam & Au-

striam observatis libros quatuor conscripsit, figuris 353. addidit. Antuerpiæ 1583. in 8. Verum tam Hispanica quàm Pannonica historia aliis juncta in folio, anno 1601. excusa fuit.

Idem Historiam plantarum rariorum cum appendice & auctario, additis figuris 1135. anno 1601. Antuerpiæ publicè juris fecit.

Idem exoticorum libros decem scripsit, quorum sex priores variam materiam circa animalia & plantas cura iconibus plantarum 194. continent. Item Garziz lib. 2. Ch. Acosta lib. 1. Nic. Monardis lib. unum, qui prius separatim prodire. Item Nicol. Monardi lib. 3. de lapide Bezoar & Scorzonera, de Ferro & Nive, Anno 1605. in fol.

Ejusdem curæ posteriores post mortem editæ, additis 27. figuris, & libello Gregorii de Regio de Pipere Indico. His additamentum (unica figura adposita) jungitur. Antuerpiæ 1611. fol.

**CAROLI** Stephani domus rustica Gallicè scripta, 1554. in 4.

Ejusdem de re hortensili bellus, Lugduni 1536. in 8.

Ejusdem Seminarium sive plantarum earum arborum quæ post hortos conscribi solent, Lugd. 1537. 8.

**CASPARUS** Bauhinus in Phytopince 2460. plantarum nomina cum aliquot Synonymiis exhibuit, & 164. descriptiones novarum plantarum, octoque figuras adposuit: Basileæ 1596. in 4.

Idem P. Andrea Matthioli opera omnia, in Germania prius non cusa, emaculata dedit, additis 330. figuris & 50. novis ab ipso primùm descriptis, cum Synonymiis. Francofurti 1598. fol.

Idem Animadversiones in Historiam generalem Lugduni cufam, in quibus circiter 400. figuras in illo opere bis terve positas & repetitas esse ostendit. Francofurti 1600. in 4.

Idem Jacobi Theodori Tabernæmontani historiam Germanicam correxit, maxima parte auctior: figuras novas plures addidit: nonnullas descriptis & parti primæ Synonymias adposuit. Francofurti 1613. in fol.

Ejusdem Prodromus sui Theatri Botanici, in quo circiter sexcentæ plantæ ab ipso primùm descriptæ, additis 140. novis figuris, Francofurti 1620. in 4. editus est.

Ejusdem catalogus plantarum circa Basileam spontè

sponte nascentium, cum earundem Synonymiis & locis natalibus. Basileæ 1622. in 8.

CASPARI Pilleterii Middelburgensis Medici, plantarum synonymia alphabetico ordine proposita. Middelburgi 1610. 8.

CASPARI Schwenckfeldii catalogus stirpiū & fossilium Silesiæ. Lipsiæ 1601. 4.

CASTORIS Durantis Medici Romani, herbarium novum cum figuris plantarum quæ in tota Europa, India Orientali & Occidentali nascuntur Italicè, viribus Latinis versibus expressus: Ordinem alphabeticum observavit, & plantarum figuras 879. adposuit. Romæ 1585. folio.

CECHINI Martinelli discursus de Amomo & Calamo aromatico, Italicè. Venetiis 1604. 4. Ejusdem discursus examen, auctore incerto, cum utriusque figura. Mantuæ 1605. 4.

CHRISTOPHORI Acoftæ Africani Medici & Chirurgi historia eorum medicamentorum & Simplicium rariorum, quæ ex India Orientali in Europam adferuntur, Hispanicè primum, dein Italicè edita, additis 43. figuris. Venetiis 1585. in 4. hanc in Epitomen contraxit, Clusius Latinam fecit.

CHRISTOPHORI Encelii de re metallica lib. 3. & de Ulva quercina. Francofurti 1557. 8.

CLAVDII Galeni de facultatibus simplicium lib. 1. & alimentorum lib. 3. & de compos. medic. in Operibus ipsius.

CLAVDII Rochardi pharmacopœi Trecensis, tractatus de Absinthiiis, cum Jo. Bauhini tractatū editus.

CONRADI Gesneri historia plantarum & vires, ex Dioscoride, Ægineta, Theophr. Plinio & recentioribus Græcis juxta elementorum ordinem. Venetiis 1541. 16.

Ejusdem Catalogus plantarum quadrilinguis: Tiguri 1542. in 4.

Ejusdem de Lunariis & noctu lucentibus, cum figuris quinque & montis Fracti sive Pilati Lucernarum descriptione. Ibid. 1552. 4.

Ejusdem de hortis Germaniæ liber, cum appendice & Corollario ad Cordi historiam in quo figuræ quinque: cum Cordi operibus, Argentiniæ 1561. fol.

Ejusdem de fossilibus, lapidibus & gemmis, cum maritimarum plantarum octo figuris, Tiguri 1565. 8.

Ejusdem Epistolæ medicinales per Casp. Wol-

fium editæ: addita de Aconito primo asseveratione cum tribus figuris. Tiguri 1577. 4.

Ejusdem de Scirpium collectione, per Wolfiū edit. Tiguri 1587. 8.

CONSTANTINI Cæsaris de agricultura libri 20. opera Jo. Alexandri Brasiciani editi Græcè: Basileæ 1539. 8. Idem à Jano Cornaro Latine redditus: Basileæ 1540. 8.

CRISPINI Passæi junioris horti floridi partes duæ, florum, fructuum herbarumque icones 325. cum brevib. descriptionibus secundum quatuor anni tempora. Arnheimii 1614. 8. forma oblonga.

DAVIDIS Kyberi lexicon rei herbariæ trilingue: item tabulæ collectionum per 12. menses Conradi Gesneri. Argentiniæ 1553. 8.

EMANUELIS Swertii florilegium, in quo præter figuras plurimas etiam 47. plantæ ex India utraque allatæ, hæcenusque non descriptæ adduntur. Francofurti 1612. folio.

EUANGELISTÆ Quadramii Eremitæ, Theol. D. & Ducis Ferrariensis Simplicistæ tractatus de Theriaca & Mithridatio: Ferrariæ ann. 1597. in 4.

EUCHARII Rœslin Medici Francofordiani herbarii aliquoties Germanicè cufum, prius sub Jo. Cübæ antecessoris sui, dein suo, tandem Ada. Loniceri nomine.

EURICII Cordi Simefusi Medici Botanologicum per Dialogum propositum, Coloniae 1534. 8.

FABII Columnæ phytobasanos cum fig. 34. Neapoli 1592.

Ejusdem de minus cognitis plantis partes duæ, quarum prima figuras 161. Romæ anno 1606. altera pars cum figur. 44. Ibidem 1616. cusa est.

FERRANTIS Imperati Neapolitani pharmacopœi historia naturalis lib. 28. cum figuris lapidum, corallorum, spongiarum &c. plantarum verò & fructuum 33. Neapoli 1599. folio.

FRANCISCI Alexandri Verceilensis Medici Apollo, de compositione medicamentorum, radiis duodecim constans. Venetiis 1565. fol.

FRANCISCUS Lopez de Gomara historia Indiarum generalis.

GABRIELIS Alphonsi de Herera, opus de Agricultura Hispanicè scriptum, per Mambrianum de Fabriano Italicè redditum, cum figuris 74. parvis. Venetiis 1557. 4.

**GARZIÆ** ab Horto proregis Indiæ Medici, de aromatibus & simplicibus medicamentis apud Indos nascentium historia ordine Alphabetico, per Dialogos lingua Lusitanica conscripta, à Clusio in epitomen contracta & Latine facta.

**GONSALVI** Ferdinandi Oviedi Indiæ Occidentalis historia generalis, à Dureto in Gallicum translata.

**GREGORII** de Regio, Capuccini, de Capiscolio libellus, curis posterioribus Clusii additus.

**GULIELMI** Turneri Angli, plantarum historia, Anglice scripta, cum paucis figuris. Londini, folio.

**HERMOLAI** Barbari in Dioscoridem Collariorum libri quinque. Coloniae 1530. fol.

Ejusdem in C. Plinii naturalis historiae libros castigationes. Basileae 1534. 4.

**HIERONYMI** Benzonis Mediolanensis, novi orbis historia, per Urbanum Calvatonem Latine reddita. Genevae 1600. 8.

**HIERONYMI** Brunsvicensis apodixis Germanica, Brunfelsii herbario addita. Argentinae 1531. fol.

**HIERONYMI** Cardani de varietate rerum lib. 17. Basileae 1581. 8.

**HIERONYMI** Fracastorii opera, 1590. Lugduni. 8.

**HIERONYMI** Tragi historia (quæ sæpius Germanice Argentinae in folio prodit) per Davidem Kyberum Latine reddita, cum iconibus 567. licet ad 800. describantur. Argentinae 1552. in 4.

Ejusdem editio Germanica à Melchiorre Sebizio & Nicolao Agerio emaculata. 1595. fol.

**HISTORIA** Generalis plantarum libris 18. per Joannem Molinæum collecta: Lugduni anno 1587. excusa, in qua figuræ 1686. proponuntur, verum circiter 400. bis terve repetuntur.

**HONORII** Belli Vicentini, Medici Cretensis epistolæ de plantis ad Clusium, cujus operibus additæ: nonnullas ad nos dedit, quæ necdum editæ.

**JACOBUS** Antonius Cortusius patricius Patavinus & horti Patavini V. præfectus, à Matth. Dodonæo & aliis frequenter citatur ob plantas ipsis communicatas, à quo & ego Patavii accepi: nil edidit nisi Catalogum horti Patavini, cum ejusdem areis, Italice. Venetiis 1591. 8.

**JACOBI** Theodori Tabernæmontani histo-

ria Germanica tribus partibus edita cum figuris. 2087. Francofurti 1588. fol.

Idem emaculatus auctus & plantarum descriptionibus & figuris ac medicamentis plurimis, à C. Bauhino anno 1613. fol.

Ejusdem icones cum nudo nomine Latino & Germanico. Francofurti 1590. in longa forma prodire.

**JANUS** Cornarus Germanus, Dioscoridem transtulit & singulis capitibus Emblemata addidit. Basileae 1557. folio.

**INDIÆ** Occidentalis partes decem cum additamento ad partem nonam, in folio.

**INDIÆ** Orientalis historiae partes decem, in folio.

**JOACHIMUS** Camerarius Matthioli historiam Germanicam per Hantichium primum versam, & cum Matthioli figuris cussam, rursus emaculavit, novis iconibus 123. & notis auxit.

Idem Matthioli epitomen dedit cum figuris 1003. Francofurti. 1586. 4.

Idem hortum Medicum & Philosophicum scripsit: figuris 56 addidit. Francofurti 1588.

**JOSEPHI** Acostræ historia Indiæ, addita tomis Indicis, à Clusio Latinitate donata.

**JO. CUBÆ** hortus sanitatis Germanice cum figuris scripti 350. Augusta 1486. fol.

**JO. Baptista** Portæ Neapolitani, Villæ libri 12. Francofurti 1592. 4.

Ejusdem Phytognomonica 1591. Franc. 8.

**JOHANNES** Bauhinus p. m. frater meus scripsit libellum de Plantis à Divis denominatis. Basileae 1591. 8.

Idem de Absinthii generibus. Montisbelgardii 1593. 8.

Idem de plâcis circa Balneum Bollenfense nascentibus catalogum scripsit, pomorum fig. 60. & pyrorum 40 additis: editus cum Historia de Balneo Bollenfensi. Montisbelgardi 1598. 4.

**JO. Bruyerinus** Campegius Lugdunensis, de recibaria lib. 22. Francofurti 1622. 8.

**JOANNIS** Costæ de universali stirpium natura libri duo. Taurini 1578. 4.

Ejusdem annotationes in Mesuem, cum operibus Mesuei. Venetiis 1570. fol.

**JO. du Choul** montium Lugdunensis agri præfectus, Lugdunensem Pilati montem descripsit, duabus parvis figuris additis: cum Gesneri libello de Lunariis prodit. 4.

JOAN-



**JOANNIS** Dantzii Astenfis, tabulæ Simpli-  
cium quæ apud Dioscorident, Galenum & Plin-  
ium facultates continent : & de Simplicium me-  
dicamentorum facultatibus, dialogi quatuor. Ba-  
sileæ. 1543. fol.

**JO. FRAGOSUS** Hispaniarum regis Medi-  
cus & Chirurgus, aromatum, fructuum & simpli-  
cium aliquot ex utraque India in Europam dela-  
torum historiam Hispanicè scripsit, Israel Spa-  
chius Med. Argentinenfis edidit. Argentinæ 1610. 8.

**JO. FRANCVS** hortum Lusitiæ sive Cata-  
logum plantarum in Lusitania nascentium, additis  
Latinis & Germanicis nominibus scripsit. Budis-  
linæ 1594. 4.

**JO. Gerardi** historia plantarum Anglica cum  
figuris ipsius Tabernæ montani : nonnullis etiam  
Lobellii : & insuper 16. novis additis. Londini  
1597. folio.

**JO. Hugonis** Linscori itinerarium ac naviga-  
tio in Orientalem sive Lusitanorum Indiam, cum  
Bernhardi Paludani annotationibus. Hagæ comi-  
tis 1599. fol. jungitur etiam Historiæ Indicis.

**JO. Leonis** Africae descriptio.

**JO. Leri** Burgundus historiam Brasilianam  
Gallicè primum, deinde Latinè dedit. Genevæ  
1594. 8. etiam cum Hist. Indicis edita.

**JO. Manardi** Med. Ferrariensis, epistolarum Me-  
dicinalium lib. 20. cum annotationibus in Jo. Me-  
sue simplicia medicamenta, & primum quæ à Me-  
sue omissa sunt. Lugduni 1556. in fol. & etiam  
cum Mesueo.

**JO. Pona** Pharmacopœus Veronensis, simpli-  
cium in monte Baldo nascentium Catalogum scri-  
psit, & nonnullarum descriptiones cum figuris 16.  
addidit. Clusius suæ historiæ rariorum junxit.

**Idem** auctorem dedit & nonnullarum planta-  
rum, ab Honorio Belli in Creta observatarum, de-  
scriptiones cum figuris 38. addidit. Basileæ 1608. 4.

**Idem** auctus, cum aliis pluribus exoticis, ex No-  
bilissimi Nicolai Côtareni Senatoris Veneti hor-  
to instructissimo acceptis, figuris 91. additis, à fi-  
lio Francisco Pona Med. Doctore, in linguam Ita-  
licam translatus. Venetiis 1617. 4.

**JO. Robini** Botanici Regii hortus Henrici IV.  
Regis Galliarum & Navarrae, cum figuris 214. Lute-  
tiæ 1608. folio.

**JO. Roderici** Castellalbi Lusitani, index Dio-  
scoridis, sive in Dioscoridis historiales campos  
regemata. Antuerpiæ 1536. fol.

**JO. Ruellii** de natura stirpium libri tres, Basi-  
leæ 1537. fol. Eiusdem Dioscoridis versio.

**JO. Scurmus** Lovanientis professor de rosa  
Hiericunthica libellum scripsit. Lovanii 1608. 8.

**JO. Thalii** Medici Northulani, Sylva Harcyni-  
ca, sive Catalogus plantarum in montibus & locis  
vicinis spontè nascentium, cum plurimarum de-  
scriptionibus cum Camerarii orto, novem figu-  
ris additis, editus Francofurti 1588. 4.

**JO. Theodori** de Bry florilegii partes tres.  
1612. 1614. & 1618. folio.

**JULII** Cæsaris Scaligeri animadversiones in  
Theophrasti libros sex de causis plantarum. Gene-  
væ 1566. fol. Eiusdem in libros de historia plan-  
tarum 8.

**Eiusdem** in libros duos de plantis Aristotelis in-  
scriptos, commentarii. Genevæ 1566. folio.

**Eiusdem** de Subtilitate lib. 15. Francofurti 1576. 8.

**LAURENTII** Phrisii Synonyma, sive expli-  
catio nominum medicamentorum in officinis u-  
sitorum, Germanicè. Argentinæ 1535. fol.

**LEONHARDI** Fuchsi historia Latina cum  
56. figuris. Basileæ 1542. fol.

**Eiusdem** icones scortum editæ. Basileæ 1549. 8.

**Eiusdem** de compositis. Medicamentorum lib.  
4. Lugduni 1556. 16.

**LEONHARDI** Rauwolfii Medici Augusti-  
ni peregrinatio in Orientem, in qua plurimæ plan-  
tæ describuntur, & figuræ 42. apponuntur. Lau-  
gæ 1583. 4. Icones hæc etiam in Appendice Histo-  
riæ Lugdunensis habentur.

**LEVINI** Lemnii de plantis sacris, Lugduni  
1595. 8. cum Fr. Valesii sacra Philosophia.

**L. Junii** Moderati Columellæ de re rustica lib.  
12. & de Arboribus liber unus. Lugduni 1541. 8.

**LUDOVICI** Jungermanni D. Catalogus plan-  
tarum circa Alostium nascentium, à Casparo Hof-  
manno Professore recensitus. Alostii 1615. 4.

**LUDOVICI** Romani navigatio in Orientem  
lib. 7. Archangelo Madrignano interprete: cum a-  
liis qui novum orbem describere. Basileæ 1555. fol.

**MARCELLI** Virgilii Florentini Secretarii  
Dioscoridis interpretatio, cum ejusdem Comen-  
tariis. Coloniz 1529. fol.

**MARCI** Catonis de re rustica liber. Lugduni  
1541. 8.

**MARCI** Terentii Varronis de re rustica libri  
tres. Ibid. (sici 1597. 8.

**MARTINI** Mylii hortus philosophicus. Gor-  
MAT-

**MATTHÆI** Sylvatici opus Pandectarum. Venetiis 1499. fol.

**MATTHIÆ** de Lobel plantarum seu Stirpium historia, additis figuris 1476. cum Adversariorum volumine (prius tamen edito) adnexo. Antuerpiæ 1576. fol.

Ejusdem Icones seorsim cusæ, 2116. numero. Antuerpiæ 1581. in longa forma.

Ejusdem Adversariorum pars altera, cum rariorum simplicium Appendice, additis 39. figuris. Londini 1605. in fol.

Ejusdem Rondefletii pharmacia restituta, prioris libro addita.

Ejusdem de Balsamo libellus & Zingibere, cū 5. figuris. Londini 1598. 4. qui Advers. parti alteræ etiam jungitur.

**MAXIMILIANI** Transylvani de Moluccis epistola, cum novi orbis scriptoribus edita.

**MELCHIORIS** Guilandini quarti horti Patavini præfeti, Theon sive Apologia adversus Matthiolum. Patavii 1558. 4.

Ejusdem aliquot epistolæ de Stirpibus, ibid.

Ejusdem Papyrus sive commentarius in trita C. Plinii de papyro capita. Venetiis 1572. 4.

Ejusdem conjectanea Synonymica plantarum, cum Horti Patavini catalogo sub annum 1591. Jo. Schencki opera edita. Francofurti 1600. 8.

**MONACHI** in Mesuem, vide Angelus Palea.

**NICANDRI** Theriaca & Alexipharmaca, cum incerti authoris Græcis Scholiis. Venetiis 1523. 4. Ejusdem editio Græcolatina cum Goræzi Scholiis. Lutetiæ 1557. 4.

**NICOLAI** Clavenæ Bellunenensis pharmacopœi, de Absinthio umbellifero, cū ejus figura, & de Scorfonera Italica, Venetiis 1610. 4.

**NICOLAI** Lonicensi de Plinii & aliorum erroribus & ejusdem quædam de herbis & fruticibus. Basileæ 1529. 4.

**NICOLAI** Maronzi Medici Veronensis, de Amomo commentarius, cum Jo. Ponzæ montis Baldi descriptione editus.

**NICOLAI** Monardis Hispanensis medici, de simplicibus medicamentis ex Occidentali India delatis, lib. 2. Hispanicè scripti, à Clusio Latinè redditi, notis illustrati. Antuerpiæ 1574. 8. & editio quarta Clusii exoticis cum fig. 17. addita.

Ejusdem libri tres de Bezoar lapide, de Scorzonera, de ferro & nive. Ibidem.

Ejusdem libellus de Rosâ & Citriis Latinè scriptus, cum Clusii exoticis editus.

**NICOLAI** Winckleri Medici Hallensis chronica herbarum, florum, feminum, fructuum, radicum, succorum, animalium, &c. quo tempore singula legenda. Augustæ 1571. 4.

**OTTHONIS** Brunfelsii historia Latina tribus tomis prodiit: primus anno 1530. alter 1531. & tertius posthumus, anno 1536. Argentinæ, cum figuris 238. at sedecim bis politæ sunt: summatim cum & sine figuris 288. describuntur.

Idem & Germanicè scripsit, in folio cum iisdem figuris & in 4. parvis figuris additis. Argentinæ 1539.

**PALLADII** Rutilii de re rustica lib. 14. Lugduni 1541. 8.

**PAYLVS** Renealmus Blazensis, specimen historiarum plantarum cum figuris 43. typis æneis expressis, edidit. Lutetiæ 1611. 4.

**PEDACIUS** Dioscorides Anazarbus de materia medica, & quidem editio Marcelli Virgilii, Goupilii, Assulani, Joannis Ruellii, Jani Cornarii, Jo. Antonii Sarrazeni.

**PEDACI** Dioscoridis libri sex Ruellio interprete, cum parvis iconibus 350. additis cuilibet capiti hujus secundæ editionis annotationibus compendiaris ab H.B.P. medico: item & triginta icones stirpium nondum delineatarum à Jac. Dalechampio. Lugduni 1552. 8.

**PETRI** Andreæ Matthioli commentaria Italica cum magnis figuris 1568. Venetiis: ejusdem Italica, cum parvis figuris, 1563.

Ejusdem editio Germanica Camerariana.

Ejusdem editio à C. Bauhino emaculata.

Ejusdem epitome anno 1571. edita.

Ejusdem epitome à Camerario correctæ.

Ejusdem Epistolæ cum Commentariis Francofurti editæ, cum Apologia in Amatium Lusitanum.

**PETRI** Bellonii Observationum libri tres à C. Clusio latinitate donati, additis plantarum figuris 10. Antuerpiæ 1589. 8.

Ejusdem de neglecta stirpium cultura, eodem ex Gallico vertente. ibidem: & simul cum libris exoticorum Clusii editi.

Ejusdem de arboribus coniferis, resiniferis & sempiterna fronde virentibus, cum earundem iconibus octo. Parisiis 1553. 4.

Ejusdem de medicato funere & medicamentis, ca-

tis, cadaveris servandi vim habentibus. Ibidem.

**PETRI** Crescenii Bononiensis de agriculturæ paribus, plantarum & animalium natura & utilitate lib. 12. ante annos ducentos scripti. Basileæ 1548. cum paucis figuris.

**PETRI** Pawii horti publici Academiæ Lugdunobatavæ præsidis, ichnographia, descriptio, usus, & stirpium quas habet nomina. Leidæ 1603. in 8.

**PETRUS** Pena, vide Adversaria.

**PHILIPPUS** Pigafetta regni Congiani historiam scripsit, quæ cum Indicis historiis edita.

**POMPEIUS** Spreccchis, Antabsinthium Clavenæ, cum figura Absinthii umbelliferi. Venetiis 1611. 4.

**PROSPER** ALPINUS, sextus horti Patavini præfectus, de Balsamo dialogum, ejus figura addita, scripsit. Venetiis 1591. 4.

Ejusdem de plantis Ægypti liber, cum figuris 46. & cum Medicina Ægyptiorum. Venetiis 1592. 4.

Ejusdem de Rhapontico, cum ejusdem figura. Patavii 1612. 4.

**Q.** Apollinaris liber experimentorum Germanicè scriptus editus cum 141. figuris. Argentinæ 1589. 8.

**REMBERTI** Dodonæi Stirpium historia Belgicè scripta, & à Clusio Gallicè reddita (vide Clusium) cum iconibus, quæ seorsim duobus tomis in octavo prodire. Antverpiæ 1553. & 1559. Icones numero 840. cum annotationibus.

Ejusdem frugum historia, anno 1552. Latine, Antverpiæ cusa & recusa in 8.

Ejusdem florum & purgantium historia seor-

sim cum novis figuris edita, in 8. Eadem simul juncta in libros triginta divisa. Antverpiæ anno 1583. in folio, cum 1305. figuris. Hæc historia de novo recusa Belgicè, cum ejusdem annotationibus prolixis, additis adhuc 36. novis figuris anno 1608. Latine similiter ab autore emaculata paucis mutatis, & figuris quæ in Belgica editione habentur, cum descriptione additis, anno 1616. prodiiit.

**SIMONIS** Januensis Clavis sanationis obturiora vocabula ordine Alphabetico exponens. Venetiis 1486. fol. cum Sylvatico recusa.

**TARQUINIUS** Ocyori Dortmundani, de viginti radicibus adversus pestem probatis, cum eandem plantarum figuris, Germanicè cum Q. Apollinaris libello.

**THEOPHRASTI** Græci de historia & de causis plantarum, editio Græca Veneta 1552. 8. Basileensis, 1541. 4. & Gazæ versio Lugduni 1552. 8. cum Joannis Jordani correctione.

**THOBIAE** Roelsii Medici Medioburgensis epistola ad Clusium: cum historia Clusii edita.

**THOMAS** Hariot insulam Virginicam descripsit: Clusius Latine reddidit, est prima pars Ind. Occidentalis.

**VALERII** Cordi in Dioscoridem annotationes.

Ejusdem lib. 4. de stirpium historia, cum figuris 272. ex Trago & aliquot novis à Gesnero additis.

Ejusdem Sylva observationum, quæ omnia simul, Gesnero curante, Argentinæ 1561. in fol. edita.

Ejusdem dispensatorium sæpius recusum.



# NOMINA EORUM QUI PLANTAS

VEL SEMINA COMMUNICAVUNT.

**A**clatius Medicus Alsterodamensis.  
Angelus Busti dictus Vidua, Medicus  
Venetus.

Arnoldus Gillenius, Ducis Megapolitani Medicus.

Basilius Beslerus, Pharmacop. Norinberg.

Bernhardus Paludanus, Medicus Enchusanus.

Casparus Bartolinus, Hassinæ Medicinæ Professor.

Casparus Hoffmannus, Altorfii Medicinæ Professor.

Casparus Weckerlinus, Medic. Argent.

David Vasmarus, Lubecensis medicus.

Daniel Loritius, Ducis Wirtenberg. Med.

Everhardus Vorstius, Lugd. Batavorum Medicinæ Professor.

Fabius Columna, I C. Lynceus.

Ferrandes Imperatus, Pharmacop. Neapolitan.

Franciscus Pona, Medicus Veronensis.

Fridericus Meyer, Argentin. p.m.

Fridericus Monavius Med. D.

Georgius Fueren, Medicus Hassnienfis.

Georgius Rumbaum, Med. Uratislav.

Georgius Spörlinus Basil. Med. Candid.

Gregorius de Regio Capuccinus.

Henricus Heyl, Medicus Dantiscan.

Hermannus Hagius, Medicus Arnheim.

Hieronymus Vücherus, Med. Norinberg.

Honorius Belli Vicentinus, Medic. Cretensis.

Jacobus Albinus, Medicus Hamburg.

Jacobus Antonius Cortusius, quintus Patavini horti præfectus.

Jacobus Cargillus, Medicus in Scotia.

Jacobus Guillelmi Hooft Amstelredam.

Jacobus Hagenbachius, Medicus Basil.

Jacobus Zuingerus p. m. Medicus Basil.

Joachimus Burserus, Medicus Annæbergensis.

Joan. ab Alen, pharmacop. Bremensis.

Joan. Anatolius Privæus Medicus Vesuntinus.

Joan. Backmeisterus Professor Rostochienfis.

Joan. Bauhinus frater p. m. Archiater Wirtenbergicus.

Joan. Fleisserus Uratisl. Medicus.

Joan. Francus senior, Medicus Camicentis.

Joan. Carolus Rosenberger, Poliater Wormat.

Joan. Henricus Cherlerus p.m. Med. Basil.

Jo. Henricus Richinerus p.m. Med. Basil.

Joan. Dortmannus, Pharmacop. Gröningensis.

Joan. Rudolpheus Saltzman, Medicus Norinbergenf.

Joan. Pona, Pharmacop. Veronensis.

Joan. Prevotius, Med. Professor & horti Patavini septimus præfectus.

Joann. Rudolphus Saltzman, Poliater & Medic. professor Argentinæ.

Joan. Sigfridus, Helmstadi Medic. Professor.

Joan. Terentius ex societ. Jesu, qui ex India plantas misit.

Joan. Michael Wolffhardus, Med. Rotebur.

Laurent. Rosenau, Pharmacop. Lineburgensis.

Laurentius Scholtzius senior p.m. Med. Uratislav.

Leonhard. Doldius p.m. Medicus Norinberg.

Lucas Justus Basil. Ducis Bipont. Medicus.

Ludovicus Fürer, Senator Northusanus.

Ludovicus Jungermannus, Professor Gieslanus.

Matthias de Lobel p.m. Botanographus.

Matthæus Lister, Londinensis Medicus.

Nicolans Agerius, Physices Profess. Argent.

Nicolaus Contarenius, Senator Venetus.

Olaus Worm, Doctor & Professor Hassinæ.

Paschalis le Coq, Pictaviensis Med. & Profess.

Philip. Steph. Sprenger p.m. Pharmacop. Heidelb.

Prosper Alpinus, Profef. & horti Patavini sextus præfectus.

Samuel Sæntler, Ducis Brunsvic. Medicus.

Thomas Platerus Basil. D. & Professor.

Vespasianus Robinus, qui Lutetiæ hortum exoticis plantis instructissimum habet, & a quo plura expectamus.

**EX**

# EXPLICATIO NOMINUM

*Authorum citatorum.*

**A** COSTA Christophorus.  
 Aduar. Aquarius.  
 Ad. Adversaria Penz.  
 Aegin. Aegineta.  
 Aet. Actius.  
 Agric. Georgius Agricola.  
 Aldroan. Ulysses Aldroandus.  
 Alp. Alpi. Alpin. Alpinus.  
 Ama. Amatus.  
 Ang. Anguillara.  
 Apul. Apuleius.  
 Arist. Aristoteles.  
 Athenz. Athenæus.  
 Avic. Avicen. Avicenna.  
 Barbosa Odoardus.  
 Belli Honorius Belli.  
 Bellon. Bellonius.  
 Bell. obs. Belloni observationes.  
 Bell. cult. de cultura neglecta.  
 Benz. Hieronymus Benzoe.  
 Bot. Franc. Botanologicum Francofordianum.  
 Bras. Brassav. Brassavolus.  
 Bry. du Bry. Florilegium de Bry.  
 Brunf. Brunfelsius in folio.  
 Brunf. 4. editione in 4.  
 Brunf. ico. quoad iconem.  
 Brunf. def. quoad descriptionem.  
 Busbeq. Augerius Busbequius.  
 Cadamust. Aloysius Cadamustus.  
 Cæs. Cæsalpinus.  
 Cam. Camer. Camerarius in horto.  
 Cam. ep. & hor. Camerarius in epitome Matthioli & duo horto.  
 Cam. ad Matth. Camerarius in Matthiolo à se emaculato.  
 Cam. fig. hort. Camerarius in figuris horto suo additis.  
 Caræ Augustinus.  
 Carda. Cardanus de variet. rerum.  
 Car. Carolus Stephanus.  
 Cast. Castor Durante.  
 Castap. in Appendice.  
 Cast. ico. secundum iconem, non descriptionem.

Cast. def. Secundum descriptionem, non iconem idem apud alios intelligas.  
 Car. Altorff. Catalogus Altorfensis.  
 Cato. Marcus Cato.  
 Cels. Cornelius Celsus.  
 du Choul. Johannes du Choul.  
 Cieca. Petrus de Cieca.  
 Claven. Clavenna pharimacopœus.  
 Cl. h. Clusius historia rariorum.  
 Clus. hist. def. ico. historia rarior: descriptione, vel iconem.  
 Clus. pan. historia Pannonica.  
 Clus. hisp. historia Hispanica.  
 Clus. ex. exot. historia exoticarum.  
 Clus. ap. appendice ad historiam rariorum: ap. alt. auct. appendicis alterius auctario.  
 Clus. cur. post. in curis posterioribus.  
 Clus. in corol. in corollario ad Dodonzi editionem Gallicam.  
 Clus. in Garz. in Mon. Clusius notis suis in Garziam, in Monardem.  
 Cod. Cæs. Codex Cæsarius à Dodonæo sæpe citatus.  
 Col. & Colum. ubi in frugum historia occurrit, Columella intelligas.  
 Col. Colum. Fabius Columna.  
 Contarenius Nicolaus.  
 Cord. in Dios. Cordus notis in Dioscoridem.  
 Cord. hist. in sua plantarum historia.  
 Cord. obs. in sylva observationum.  
 Cord. schol. Cordi scholiastes qui Æmilium censetur.  
 Cord. in disp. in dispensatorio.  
 Corn. Janus Cornarus.  
 Cortesius Ferdinandus.  
 Cortusius Jacob. Antonius.  
 Cost. in Mes. Costæus in Mesuem.  
 Costin. Nicolaus Costinus.  
 Dal. Dalechampius.  
 Dal. in Plin. notis ad Plinium.  
 Dalech. in Dios. figuris additis ad Dioscoridem Ruellianum. (ta.  
 Dalech. Lugd. in historia universali Lugduni editione.  
 Diosc. Dioscorides.

# EXPLICATIO NOMINUM

|                                                                                               |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dod. Dodonæus editiōne Latine in folio.                                                       | Ind.or. Ind.Orientalis historia.                                       |
| Dod.gal. Dodonæus in editiōne gallica Clusii.                                                 | Josephus Acosta in hist.Indiæ.                                         |
| Dod.ut. Dodonæus in utraq; tam Gallica quàm Latina editiōne.                                  | Lac.Lacuna. And.Lacuna.                                                |
| Dod.ed.belg. editiōne Belgica & postrema.                                                     | Lang. Johannes Langius.                                                |
| Dod.fl. in historia florum in octavo cusa.                                                    | Lem. Levinus Lemnius.                                                  |
| Durantes Castor.                                                                              | Leon. Nicolaus Leonicensus.                                            |
| Durems Claudius.                                                                              | Lerius in descript.Brasiliæ.                                           |
| Encelius Christophorus.                                                                       | Linsc. Linscot. Linscotus in histor.Indiæ orientalis.                  |
| Eyft.Eyftet. hortus Eystettensis.                                                             | Lob. Lobelius in Observat.                                             |
| Eric. & Val.Cord. Ericius & Valerius Cordus, pater & filius.                                  | Lob.ob. Idem.                                                          |
| Fallop. Gabriel Fallopius.                                                                    | Lob.ad.par.alt. in Adversariorum parte altera.                         |
| Fabric. Georgius.                                                                             | Lob.Belg. editiōne lingua Belgica.                                     |
| Frag. Fragosus.                                                                               | Lob.ico. in Iconibus separatim editis.                                 |
| Fracast. Fracastorius.                                                                        | Lob.pharm.Rond. pharmacia Rondeletii restituta.                        |
| Franc. Francus in horto Lusatiæ.                                                              | Lon. Adamus Lonicerus.                                                 |
| Fuch. Fuchsius in historia Latina in folio.                                                   | Lud.Rom. Ludovicus Romanus.                                            |
| Fuch.ico. in iconibus seorsim editis.                                                         | Lugd. Historia generalis Lugduni cusa.                                 |
| Fuch.comp. de compositione medicamentorum.                                                    | Manard. Johan.Manardus.                                                |
| Gal. Galenus.                                                                                 | Marcel. Marcellus Virgilius.                                           |
| Gaza in versione Theophrasti.                                                                 | Marogna. Nicolaus Maronæus Veronensis.                                 |
| Car. Garzias ab Orto.                                                                         | Matth.Matt. Matthioli.                                                 |
| Ger. Johannes Gerardus Anglus.                                                                | Matth.comp.Matthioli compendium in 4.                                  |
| Ges.h.hort. Gesnerus in libro de hortis Germaniæ: hor.ap. in appendice hujus libri de hortis. | Matth.Ital. Matthioli editio lingua Italica cum magnis figuris, folio. |
| Ges.lun. libello de herbis noctu lucentibus.                                                  | Matth.ico. si iconem perpendas.                                        |
| Ges.fra. in descriptione montis fracti.                                                       | Mycon. Mycomus hic à Lugdun.citatur.                                   |
| Ges.col. in libello de collectione stirpium.                                                  | Myrepf. Nicolaus Myrepsius.                                            |
| Ges.fos. de fossilibus.                                                                       | Monach.Mesl. Monachi in Mesuem.                                        |
| Ges.cat. in plantarum Catalogo quadrilingui.                                                  | Monard. Nicol.Monardes.                                                |
| Ges.ad Cord. in corollario historiæ Cordi addito.                                             | Mund.Mundel. Aloysius Mundella.                                        |
| Gen.in epist. in epistolis suis.                                                              | Nicander in Theriacis & Alexipharmacis.                                |
| Gomara Franciscus.                                                                            | Ovied. Ferdinandus Oviedus.                                            |
| Guil. Guilandinus in Theone.                                                                  | Oribasf. Oribasius Græcus.                                             |
| Guil.pap. in commentario in Plinii capita de Papyro.                                          | Pallad. Palladius.                                                     |
| Hariot in descriptione insulæ Virgineæ.                                                       | Palud. Bernhardus Paludanus notis in Linscotum.                        |
| Hermol. Hermolaus Barbarus in corol. ad Dioscorid.                                            | Pandect. Pandectarius.                                                 |
| Hipp. Hippocrates.                                                                            | Pena. Petrus Pena in Adversariis.                                      |
| Hon. Belli Honorius Belli in epistolis ad Clusium.                                            | Phytopin. Phytopinax C.Bauhini.                                        |
| Inper. Ferrandes Imperatus in sua hist.naturali.                                              | Pigafet. Pigafetta in descript. regni Congiani.                        |
| Ind.occ. Indiæ Occidentalis historia.                                                         | Plin. Plinius.                                                         |
|                                                                                               | Pon. Johannes Ponz edit. Latina.                                       |
|                                                                                               | Pon.Ital. editiōne Italica montis Baldi.                               |
|                                                                                               | Portæ. Jo.Baptista Porrus in sua villa.                                |
|                                                                                               | Prod. Prodromus C.Bauhini.                                             |
|                                                                                               | Quad. Evangelista Quadramius.                                          |
|                                                                                               | Rauw. Leonhardus Rauwolfius.                                           |

Reg.

# AUTHORUM CITATORUM.

Reg. Gregorius de Regio Capuccinus.  
 Richer. Richerius de Belleval, Botanicus Mont-  
 pelienſis.  
 Röſ. Eucharis Rösſlin.  
 Rob. Joan. Robinus.  
 Rondel. Rondeletius in ſua praxi.  
 Ruel. Joan. Ruellius.  
 Scalig. Scaliger in ſubtilitatibus.  
 Scalig. in Ariſt. in Ariſtotelem de plantis.  
 Schwenck. Caſparus Schwenckfeldius.  
 Serap. Serapio Arabs.  
 Sethi. Simeon Sethi Græcus.

Solinand. Solinander in conſiliis.  
 Stad. Stadius in Braſiliæ deſcriptione.  
 Sw. S. Swert. Swertius.  
 Tab. Taber. Tabernæmontanus. edit. folio.  
 Tab. ico. in iconibus ſeparatim cuſis.  
 Th. Thal. Johannes Thalius.  
 Thevet. Andreas Thevetus.  
 Tovar. Simon Tovar, Hiſpalenſis Medicus.  
 Trag. Hieronymus Tragus.  
 Tur. Guilielmus Turnerus.  
 Valerand. Valerandus Donreus Pharmacopœus.  
 Vercell. Franciſcus Vercellenſis.



\*\*\* 3



A D A V T H O R E M

HERMANNYS van der Haghen BELGA  
Illust. Principis Auriaci & Reipub. Arne-  
mientis in Geldria Med.ord.



*AVHINE* Aonidum decus immortale sororum,  
Quas æterna tui laudes monumenta merentur  
Ingenii, tum quanta tuis, quæ nuper in auras  
Doctorum manibus passim vulgata teruntur,

Gratia debetur cæptis, non prenderit acri  
Mente, aut facundo quis digno expresserit ore.  
Non si Thebanus veniat redvivus ab Orco  
Maximus aut vates Itale telluris alumnus,  
Atque his Mæonides socium se adjunxerit ipse,  
Tam dotes animi variæ, tam multa relucet  
Omnibus in scriptis virtus, præstantia tanta,  
Non modò ut æquales Medicorum scita sequuti,  
Seu vivam licuit vocem exaudire docentis,  
Seu scriptos oculis tantum evoluisse labores,  
Dicere nil dubitent, se terq; quaterq; beatos:  
Verùm etiam seri post secula longa nepotes,  
Egregias memori solventi tibi pectore grates.

Quis genera herbarum seclis ignota priorum  
Et fruticum plura & florum quis prodidit unus?  
Quæ dum sollicito nemorosos lumine saltus,  
Dum sylvas, montesq; feros vallesq; reduclas  
Scrutaris, monstrante DEO, & tua Vota juvante,  
Eruis atque oculis pulchrè spectanda dedisti:  
Gallia quicquid habet, quicquid Germania, quicquid  
Hesperie latis virgulti finibus extat,  
Marte tuo doctis viva sub imagine chartis  
Cernere cuique licet descriptum clare BOHINE.

*Præ*



*Prætereo quæ missa tibi non ob via nostris  
Multa locis libri conclusis fasce sub uno.*

*Ergo Dioscorides ne tanta præmia laudis  
Prima ferat, ne Matthiolus sibi proxima poscat,  
Efficiis, unus habes & prima & deinde secunda.  
Magnanimi sileant, qui vix dum singula Reges  
hævenere, suos fastus & nomina ponant.*

*Quid memorem innumeros, cum morbis ægra traherent  
Corpora, vicina tua quos solertia morti  
Eripuit, miserisque dedit producere vitam.  
Ut Dis non falsò raptos è faucibus atris  
Arte tua sibi sexcentos periisse quærat.*

*Nec minor incisus humani ob corporis artus  
Gloria percrebuit: qua dexteritate nec ulli  
Præcorum, nostri nec cuiquam cesseris ævi.*

*Multa Tibi forsân videor dixisse BOHNE  
Vix tamen hæc fuerint fastigia summa tuarum  
Virtutum Ingenii: at prohibet pudor addere plura.*



# DE VUTILITATE HVIVS OPERIS

ANDREÆ LIBAVII D. & P. L.

Carmen.



*V* I causas vires propria & discrimina rerum,  
Primi exercitii exposuere suū.  
Inventis seros magnis iuvare nepotes  
Et cura populū consuluere bona.

Scilicet his ducibus cadentibus optima ceptum est

Discerni & membris utiliora sequi.

Quin etiam si quid natum foret intus acerbi,

Sive parum cautus esset oborta lues:

Querere praesidium morbumq; evellere membris

Hinc soliti, poterant se reparare sibi.

Idq; viā facili. Nam nomine cognita quaeque

Forma anipius solita se exhibuere diu.

Improbior donec successit patribus atas

Contemtrixq; boni Gens, populusq; ferrox.

Hinc rabieq; furens & martia castra secutus

Rerum confudit noticiam atque notas.

Artibus hinc subtrac̃ta fides, viresq; negata

Esse sub his, primi quas docuere senes.

Postera gens igitur finxit nova nomina, resq;

Speculatas alio protulit inde sono.

Tu quoque livor iners multum mutare solebas

Atque peregrinis fingere verba notū.

Scilicet ut raperes soli tibi turpiter usum

Natura, medica noticiamq; rei.

Sed tandem superavit amor studiumq; iuvandi:

Et cessit rabies invidiosa bono.

Miliaq; in summam collecta vocabula, quae res

Signentur passim spe meliore monent.

Quicumque ergo vagis erras autoribus, atque

Ambiguū traheris per dubitanda viis.

Huc propera: menti curas demiturus inanes:

Hic Ariadnai fila laboris habes.

Magnus paeonii Heros B A V H I N V S in ausis,

Errantes certo dirigit orbe pedes.

Ille laborifer praclarus in agmine Phœbi

Herbarum titulos ut bona legit apis.

Inq; unum congestis opus, quod discere promptè

Posui, quas habeat qualibet herba notas.

Utitor hoc igitur gratum, tantūque laborem

Declarā studio, non periisse, tuo.



LIBER



# LIBER PRIMVS.

## SECTIO PRIMA.

### DE GRAMINIBUS.



**GRAMEN** à gradiendo, quòd geniculatù ramulù serpat: vel, à gignendi fecunditate, cum crebrò à se radices novas spargat, dictum est. Graciv ἀγρανισ, ἄγραν τὸν ἀγρὺν, quòd in agris proveniat: *ma*, herba, Theophrasto, quòd omnium herbarum frequentissima sit.

Genera quatuor Dioscorides & Plinius fecere: posteriores plures differentias agnoscere. Verum tantum in hù Natura lusum, ut prater varietates, à priscis & recentioribus propositas, longè plures enumeraturi simus, cum in hanc classẽ Bromi, Phœnicis, Lolii & Avenasterilis species (nam & ipsa Graminei generis sunt) resulerimus: de quibus ordine, à Gramine canino, cum rjui in Germania Officinis usus sit, initio factò.

### GRAMEN CANINVM.

*Caninum* vocamus ad imitationem Plinii, cui *Canaria*, quasi à canibus inventa, quã fastidium deducunt, vomitum cum pituita rejicientes: hinc *Cynagrostis* aliis: & à foliorum primò prodeuntium forma, quibusdã *Dens Canis* dicitur.

I. Gramen caninum arvense, sive Gramen Dioscor.

Gramen, Ruel. Dod. Cord. in Dioscor. Cast.

Gramen Dioscoridis, Gesner. hort.

Gramen canarium medicatum, Ad. Lob.

Gramen caninum, Tab. Ger.

Gramen vulgare, Lugd.

Graminis fortè Diosc. species maior, Thal.

II. Gramen caninum vineale: primum in Prodromo.

III. & IV. Gramen caninum longius radicatum majus, & minus.

Gramen canarium longius radicatum latiore panicula, majus & minus, Lob. adv. part. alt.

V. Gramen canin. supinum paniculatum folio varians.

Graminis i. Dioscor. species minima, Thal.

VI. Gramen caninum supinum paniculatum dulce: 2. in Prod.

Graminis dulcis nomine, D. Lobelius misit.

VII. Gramen caninum supinum minus.

Gramen caninum supinum, Lob. ico. Ger.

Gramen caninum supinum, 2. Tab.

IX. Gramen caninũ maritimum spicatũ.

Gramen geniculatum caninum marinum, Lob. ico.

Gramen caninum tertium, Tab.

Gramen caninum marinum, Ger.

IX. Gramen caninum marit. spicat. foliaceũ.

Gram. can. longius radicatum marit. 2. Lob. ico.

Gramen caninum marinum alterum, Ger.

X. Gramen can. marit. spicâ echinatâ, quod Gramen caninum maritimum asperum, vel 3. in Prod.

Gramen caninum medicatum marinum spicâ echinatâ, C. Bauhini, Lob. ad. part. alt.

XI. Gram. canin. marit. spicatum: 4. in Prod.

XII. Gram. murorû radice repete: 5. in Prod.

GRAMEN NODOSVM,  
à radicis forma.

I. Gramen nodosum avenaceâ paniculâ.

an Aegilops bulbi genus, Plin. l. 19. c. 5.

Gramen, vel avenæ syl. genus, Ges. col.

Gramen bulbosum nodosum, Ad. Lob. Lugd.

cui & Gramen nodosum, sub alia figura.

Gramen tuberosum, siue nodosum, Cam.

Gramen bulbosum, Tab.

Gramen caninum nodosum, Ger.

Agrostos alterum genus, Dod.

II. Gram. gemmeu seu nodosum secundû.

Perlato vulgò, & Oryza syl. Cæf.

an Coix Myconi, Lugd.

III. Gramen nodosum spicâ parvâ, siue nodosum tertium: 6. in Prod.

IV. Gram. bulbosum aquaticum: 7. in Prod.

V. Gramen bulbosum ex Alepo: 8. in Prod.

GRAMEN TREMVIVM.

I. Gramen tremulum maximum.

an Phalaris altera, Cæf.

Gram. amourettes maiore paniculâ candicante, Clus. cur. post.

Colore panicularû variat, est rufescentis, est albi coloris.

II. Gramen tremulum majus.

Lolium 10. & Aegilops Plinij, Trag.

Aegilops, Ges. hort. Lon.

Graminis 1. genus, Dalech. in Diosc. Ama.

Phalaris pratensis minor, Ad. Lob. ico.

Amourettes tremblantes, Clus. hist.

Phalaris pratensis, Ger.

Gramen polyanthos, Lugd.

Gramen leporinum & tremulum, Tab.

Gram. loliaceum 10. Tragi, Thal.

Variat paniculæ colore viridi, spadiceo.

III. Gram. tremulû min<sup>o</sup> paniculâ magnâ.

Phalaris parva, Cæf.

Gramen amourett. alterum, Clus. cur. post.

Hoc aliquâdo in cacumine tres aut quatuor

ramulos exiles fundit, semenque triangulum habet.

IV. Gramen tremul. minus pan. parvâ: 9. in Prod. Idem dicemus cum Graminis specie parva Thalij, si nostrum folia pilosa haberet.

V. Gram. paniculis elegantissimis, siue *ipæ* majus.

Gramen amourettes, quasi amatorium, Clus.

Gramen paniculosum phalaroides, Lob.

Gramen pratense sextum, Dod.

Gramen filiceum seu polyanthos 2. Lugd.

Gramen paniculatum sativum, Tab.

Gramen paniculatum, Ger.

VI. Gram. minimum paniculis elegantiss.

Gramen minimum Dalech. Lugd.

GRAMEN PANICVLATVM.

*Gramen pratense paniculatum.*

I. Gramen pratense paniculatum molle.

Gramen lanatum Dalechampij, Lugd.

Gramen paniculû molle, Lob. adv. par. alt.

II. Gramen prat. paniculû majus, latiore folio: *nô* Theoph.

Gramen vulgò cognitum, Trag. ico.

Gramin. 2. genus Dalech. in Diosc.

Gramen prat. majus vulgatus, Ad.

Gramen prat. vulgatus, Lob. Lugd.

Gramen pratense primum, Dod.

Gramen, Lon. commune, Thal.

Gramen alterum & vulgare, Tab.

Gramen pratense, Ger.

an per Chulem Garzias hoc gramen intellexit? Clus. not. ad Garz.

III. Gramen pratense paniculatum majus angustiore folio: 10. in Prod.

Variat paniculâ & glumis longioribus.

IV. Gramen Vngaricum Busbequij in Itinerario Constantinopolitano.

V. Gramen pratense paniculatum medium.

Gramen minus, Ad. Lob. ico. Tab.

Gramen pratense secundum, Dod.

Gramen pratense minus, Ger.

Variat latiore & angustiore folio.

VI. Gramen pratense paniculatum minus.

Gramen paniculatum minus, Tab.

Gramen minimum album & rubrum, Ger.

Variat hoc paniculâ & culmis purpurascens & albis.

VII. Gram. paniculâ multiplici. in Prod.  
Majus & minus reperitur Mōspessuli, &  
Gramen minus duriusculum nominatur.

*Gramen paniculatum arvense.*

I. Gramen arvense paniculâ crispâ.

Gramen, Matth. Lugd.

Gramen minimū Xerampelinum, Ad. Lob. ico.  
Lugd.

Gramen bulbosum Dalech. Lugd.

II. Gramen paniculâ pendulâ aureâ.

Gramen aureum Dalech. Lugd.

III. Gramen segetū altiss. paniculâ sparsâ.  
Gram. segetū panicul. speciosâ latiore, Lob. ico.

Gramen segetale, Tab. Ger.

an Gram. caule geniculato, Thal.

IV. Gramē segetum paniculâ arundinaceâ.

Gramen loliaceum 8. Tragi, Thal.

Gramen equinum, fortē Gesneri, Cam.

Agrorum venti spica, Lob. ico.

Gramen pratense 3. Dod.

Gramen harundinaceum arvense, Tab.

Gramen harundinaceum, Ger.

Variat paniculâ flavescente & spadiceâ.

*Gramen paniculatum montanum  
& sylvestre.*

I. Gram. montanum paniculâ spadiceâ de-  
licatiore: 12. in Prod.

II. Gram. paniculatum odoratū 13. in Prod.

III. Gram. paniculatum folio variegato.

Gramen fulcatum, Ad. Lob. ico.

Gramen striatum, Lon. Ger.

Gramen pictum, Cam. Tab.

Variat in colore foliorum.

IV. Gram. sylvat. panic. altiss. 14. in Prod.

*Gramen paniculat. aquaticum.*

I. Gram. palustre paniculatum altissimum.

Gramen aquatic. harundin. paniculat. Tab.

Gramen majus aquaticum, Ger.

II. Gramen palustre paniculâ speciosâ: 15.  
in Prod.

III. Gram. palust. panic. minus: 16. in Prod.

IV. Gramen aquatic. paniculat. latifolium.

Lolij nonum genus, Trag.

Gramen majus aquaticum, Lob. ico.

Graminis arundinacei alia species, Thal.

Gramen harundin. paniculatum, Tab. Ger.

GRAMEN SPICATVM

*Gramen spicatum aquaticum.*

I. Gramen aquatic. fluitans multiplici spica.

Αρρωτίς ποταμίου.

Gramen anatum, Trag.

Gramen aquis innatans, Lob. ico.

Gramen fluviatile, Tab. Ger.

II. Gramen aquat. geniculatum spicatum.

Gramen aquatic. spicatum, Lob. ico.

Gramen fluviatile album, Tab.

Gramen fluviatile spicatum, Ger.

III. Gramen mariti. fluitans cornutum: 17.  
in Prod.

*Gramen cristatum & spicatum pratense.*

I. Gramen pratense cristatum, sive Gramen  
spicâ cristatâ læve.

Gramen cristatum C. Bauhini, Lob. ad part. 2.  
18. in Prod.

Variat florum colore, communiter ex pallido  
flavescentes, aliquando punicei coloris sunt.

II. Gram. spicâ cristatâ subhirsutâ: 19. in Prod.

III. Gramen pratense spicâ flavescente.

Gramen anthoxanthum, Lugd.

IV. Gram. pratense spicâ purpureâ ex vtri-  
culo prodeunte, vel Gramen folio spicam am-  
plexante.

Gramen pratense Dalech. Lugd.

V. Gramen spicatum folio aspero.

Gramen spicatum, Dalech. Lugd.

Variat folio nonnunquam articulato, & flo-  
ribus, qui apud nos pallidē lutei, in pratis mon-  
tium frigidorum subrubei sunt.

VI. Gram. caryophyllatæ folijs spicâ divulsâ.

Gramen spicatum folijs Vetoniceæ, Lob. ico.

Graminis loliacej octavi 4. species, Thal.

Gramen nigrum, Lugd.

Gramen caryophylleum, Tab.

Reperitur majus in pratis humidis, minus in  
ficcis.

VII. Gram. caryophyllatæ folijs spica squa-  
mata.

Graminis loliacei 8. alia perpusilla species, Thal.

Hujus figuram priori junxit Lobel. in icon.

*Gramen spicatum montanum & ne-  
merosum.*

I. Gram. spicatum angustifol. monta: 20.  
in Prod.

II. Gram. *tylatic. angustifol. spicâ albâ* : 21. in Prod.

III. Gramen caryophyllatum, nemorosum spicâ multiplici: 22. in Prod.

IV. Gram. caryophyllatum montâum spicâ variâ: 23. in Prod.

V. Gramen caryophyllatum alpinum. Gramen alpinum Rabinum, Gef. hort. Gram. Rabinum, Ad. (vel Ravium montan.) Tab.

#### GRAMEN TYPHOIDES.

*Αγρως Τυφουδης.*

I. Gram. typhoid. maximum spicâ longiff: 25. in Prod.

an Stelephuros Theophrasti, Ang.

II. Gramen typhoides molle.

Gramen alopecuroides, Lob. ico.

Gramen alopecurinum 1. Tab.

Gramen alopecuroides minus, Ger.

III. Gramen typhoides asperum primum.

Gramen typhoid. asperum majus, fortè Thalij.

Gramen typhinum 1. Tab.

Gramen typhinum majus, Ger.

IV. Gramen typhoides asperum alterum.

Gramen typhinum, Lob. Lugd.

Gramen pratense 7. Dod.

Gramen typhinum 2. Tab.

Gramen typhinum minus, Ger.

V. Gramen typhoid. spicâ angustiore.

Gramen alopecuroides minus alterum, Lob. ico.

Gramen alopecurinum 2. Tab.

Gramen alopecurinum minus, Ger.

Variat spicâ longiore & brevior.

VI. Gramen typhoides culmo reclinato.

Gramen alopecuroides minus, Lob. ico.

Gramen alopecurinum 3. Tab.

Gramen alopecurinum majus, Ger.

VII. Gramen typhoides spicâ multiplici.

Calamagrostis prima, Trago descrip.

Gramen typhinum 3. Tab.

Cyperus typhinus, Ger.

#### GRAMEN PHALAROIDES.

I. Gramen phalaroides majus, siue Italicum.

Gramen phalaroides 2. Lob. ico.

Gramen phalaroides, Tab.

Gramen alopecuroides majus, Ger.

II. Gramen phalaroid. minus, siue Hispani: 26. in Prod.

III. Gramen phalaroides spicâ molli, siue Germanicum: 27. in Prod.

#### GRAMEN ALOPECUROIDES.

I. Gramen Alopecuroides spicâ rotundiores

*Αλοεινους Theoph.*

Alopecuros Theoph. Ang.

Cauda vulpis Monspelienf. speciosior, Ad.

Alopecuros, Dod. Lugd. Tab. Cam. Ger.

Alopecuros altera, Lob. ico.

Cauda vulpina, Cæf.

Variat: Creticum enim spicâ est maiore & ad tactum delicatior.

II. Gra. Alopecuros minor spicâ longiore.

Alopecuros longâ spicâ, Tur.

Cauda vulpina Monspel. Ad. Lob. ico.

Alopecuros maior, Tab.

Variat magnitudine & spicarum longitudine, quæ in altera longior, in altera brevior & rotundior.

III. Gram. Alopecuros major spicâ longiore.

Iuncus marinus gramineus folijs Schœnanthi,

Ad. Lob. ico. Lugd.

Schœnanthum adulterinum, Tab. Ger.

IV. Gramen Alopecuroides Anglobritann. maximum.

V. Gramen Alopecuroides Africum.

Vtriusq; iconem D. Lobelius ad me misit, & in Illustrat. plantarum descripturum monuit.

VI. Gramen Alopecuroides spicâ asperâ,

Gramen echinatum Dalech. Lugd.

#### GRAMEN TOMENTOSUM.

I. Gramen tomentosum spicatum.

Gram. tomentosum, Alopecuros vera Theoph. & Plinij, Lugd.

Gramen spartheum 2. & Schœnanthinû, Tab.

Iuncus marinus gramineus, Ger. tit.

II. Gram. pratens. tomentos. paniculâ sparsâ.

Gnaphalium Diosc. Trag.

Typha Diosc. Ang.

Iuricus bombycinus, Ad. Lob. ico.

Gramen eriophorum, Dod.

Linum pratense, Gef. col. Lon.

Gnaphalium Tragi, Lugd.

Pseudolinum, Cast. ico.

Gramen junceum lanigerum, Thal.

Gram. tomentosum, & Linagrostis, Tab.

Gramen tomentarium, Ger.

Non-

**Nonnunquam contractis pediculis tanquam pappus conspicitur.**

**III.** Gramen tomentosum alpinum & minus: 28. in Prod. ex Rhætia D. Burserus attulit.

# GRAMEN SPARTEVM.

*Αἰσχυρῶν* Theoph. Spartium Plinio.

**I.** Gram. sparteum 1. paniculâ comosâ.

Spartum Plinij, Clus. Lob. Lugd.

Spartum herba, Dod.

Spartum Plinii 1. Tab. Ger.

Iuncus Ibericus sive Hispan. Dalech. in Pliniū.

**II.** Gram. spart. 2. panicula brevi folliculo inclusâ.

Spartum herba alterum, Clus. hist.

Spartum alterum Plinij, Lob. Lugd. Tab. Ger.

Spartum herbæ alia species, Dod.

**III.** Gramen sparteum spicatum folijs mucronatis longioribus, vel spicâ fecalinâ.

Spartum tertium, Clus. Lugd.

Spartum herba 3. maritimum, Clus. hist.

Spartum nostras, Lob.

Spartum 5. & Plinianum 3. Tab.

Spartum Anglicanum, Ger.

**IV.** Gramen sparteum spicatum folijs mucronatis brevioribus.

Gramen sparteum 1. Tab.

Spartum Anglicum 2. Ger. tit.

**V.** Gramen sparteum spicatum latifolium.

Spartum nostras alterum, Lob. ico.

Spartum 6. vel Plinianum 4. Tab.

Spartum herba 4. Batavicum, Clus. hist.

**VI.** Gramen sparteum juncifolium.

Spartum nostras parvum, Lob. ico.

Spartum 7. vel Plinianum 5. Tab.

**VII.** Gramen sparteum Basileense capillaceo folio: 29. in Prod.

**VIII.** Gramen sparteum minus, vel Hollandicum: 30. in Prod.

**IX.** Gram. sparteum Monspeliacum capillaceo folio minimum: 31. in Prod.

**X.** Gram. sparteum fetas equinas referens: 32. in Prod.

Ex Iava Insula allatum: cujus videretur mentio facta in Clusij curis posterioribus, sub herbâ, Sparto Hispanico, non abssimili.

**XI.** Gramen sparteum pennatum.

Spartum Austriacum, Clus. pan.

Gram. 9. vel junceum, Dod.

Gram. pinnatum Dalech. Lugd.

Variat iuba colore: est flavo, & etiam cādido.

**XII.** Gram. spart. variegatū: sub 33. in Prod. Sparti nomine D. Jungermannus misit.

# GRAMEN IUNCEVM ET SPICATVM.

**I.** Gram. foliolis jūceis oblōgis, radice alba. Gramen junceum Dalech. Lugd.

**II.** Gramen foliolis junceis brevibus majus radice nigrâ: 34. in Prod.

**III.** Gram. foliolis junceis brevibus minus. Exile gramen durius, Lob.

Gramen exile, Lugd.

Gramen minus duriusculum, Tab. Ger.

**IV.** Gramen exile Nicæum: de quo paucis Busbequius in suo Itinerario.

**V.** Gramen foliolis junceis radice jubatâ.

Gramen exile durius Norvegicum aut Danicum, Lob. ad par. 2.

**VI.** Gramen palustre junceum racemoso semine: 35. in Prod.

**VII.** Gramen junceum polystachion.

Gramen junceum 2. vel iunceum aquat. majus, Tab.

Gramen junceum aquatic. Ger.

**VIII.** Gramen junceum folio articulo sylvaticum.

Gram. junceum 1. vel sylvaticum nemorosum, Tab.

Gramen junceum sylvaticum, Ger.

**IX.** Gramen junceū folio articulo aquaticum.

Gramen aquat. alterum, Lob. ico.

Arundo minima, Lugd.

Gramen junceum polycarpon, Thal.

Gramen aquaticum, Tab. Ger.

Habetur majus & minus Thalia monenter: in maiore, post senescium, caulis novus palmaris excrefcit, cui non amplius capitula corymbacea insident, sed utriculi viciales paleacei in capillameta fissi, modo virides, modo purpurascētes: rarissimē cum corymbis utriculi repēriuntur.

**X.** Gramen junceum folijs & spicâ junci.

Gramen junceum maritimum, Lob. ico. Ger.

Gramen junceum tertium, Tab.

**XI.** Gramen junceum folijs & spica junci minus.

Gramen junceum marinum densē stipatum, Lob. ico.

*Gram. junceum* 5. vel *aquaticum minus*, Tab.  
*Gram. junceum marinum*, Ger.

XII. *Gramen junceum montanum capite squamoso*: 36. in Prod.

XIII. *Gram. junceum minimum capitulo squamoso*: 37. in Prod.

XIV. *Gramen junceum minim. alterum* 38. in Prod.

XV. *Gram. junceum minimum mariti*. 39. in Prod.

XVI. *Gramen junceum spicatum seu trigloch.*

*Calamagrostis* 2. Trag. ico.

*Calamagrostis* 4. Lugd.

*Carex minus*, Lon.

*Gramen mixtum ex Iunco & Gramine*, Thal.

*Gramen marin. spicatum alterum majus*, Cam.

*Gramen marinum spicatum*, Ger.

*Gramen trigloch. Dalech.* Lugd.

*Gramen junceum* 4. vel *spicatum*, Tab.

XVII. *Gramen spicatum alterum.*

*Gramen marinum spicatum*, Lob. ico.

*Gramini montano spicato simile in maritimis Flandriae*, Clus. pan.

*Gramen aquat. spicatum*, Tab. Ger.

#### GRAMEN CYPEROIDES.

*Spicatum & paniculatum*

I. *Gramen cyperoides latifolium spicâ rufa*: sive *caule triangulo*.

*Graminis* 4. genus, Trag.

*Gram. cyperoides*, Lob. Lugd. Cam. Tab. Ger.

*Gramen triangulum*, Lugd.

*Carex Tragi*, Lugd.

II. *Gramen cyperoides latifolium spicâ spadiceo viridi*, majus: 40. in Prod.

III. *Gramen cyperoides angustifolium spicâ spadiceo viridi minus*: 41. in Prod.

IV. *Gram. cyperoid. angustifol. spicis longis erectis*.

*Gramen palustre majus*, Lob. ico.

V. *Gram. cyperoides spicâ pedulâ brevior.*  
*Pseudocyperus*, Gef. hor. Lob. ico. Dod.

*Pseudocyperus* *ελληνικος*, Thal.

*Gramen aquaticum*, Lugd.

Majus & minus habetur.

VI. *Gramen cyperoides spicâ pendulâ longiore & angustiore*: 42. in Prod.

VII. *Gram. cyperoid. paniculâ sparsâ majus*,

*Gram. cyperoid. aquat. vulgatus*, Lob. ico. Ger.  
*Gramen cyperinum majus*, Tab.

Variat paniculâ, in altera compactiore & brevior, in altera magis expansa & longiore.

IX. *Gramen cyperoid. palust. majus spicâ compactâ*.

*Gramen palustre cyperoides*, Lob. ico. Ger.

*Gramen junceum triquetrum*, Thal.

*Gram. cyperinum palustre*, Tab.

IX. *Gram. cyperoides spicis minoribus*, minus compactis: 43. in Prod.

X. *Gram. cyper. palustre majus spicâ divisâ*.

*Gramen cyper. parvum aquatic.* Lob. ico. Ger.

*Gramen cyperinum palustre minus*, Tab.

XI. *Gramen cyperoides minus paniculâ sparsâ subflavescente*.

*Iuncus exiguus pratensis*, Lugd.

*Calamagrostis* 3. Trag. ico. Lugd.

*Carex minus*, Lon.

*Gramen marinum spicatum minus*, Cam.

*Gramen cyperoides minimum paniculâ subflavâ* C. Bauhini, Lobelio ad. par. 2.

XII. *Gramen cyperoides minus*, paniculâ sparsâ nigricante.

*Gramen cyperoides minimum nigricante paniculâ*, Lob. ad. par. 2.

XIII. *Gramen cyperoides miliaceum*.

*Cyperus graminea*, Ad. Lob. ico. Lugd.

*Iuncus latus*, Lugd.

*Pseudocyperus* *πολύκαρπος*, Thal.

XIV. *Gramen cyperoides maritimum*.

*Iuncus maritimus*, Ad. Lob. ico. Tab.

*Iuncus marinus alius* Penæ, Lugd.

*Gramen maritimum*, Eidem.

#### GRAMEN ARUNDINACEVM.

I. *Gramen arundinaceum spicâ multiplici*.

*Καλαμάρκτος* Dioscoridis.

*Calamagrostis* fortè *Babylonicum*, Ad.

*Calamagrostis*, Lob. Lugd.

*Gramen arundinaceum*, Lugd.

*Gramen arundinaceum majus*, Tab. Ger.

Variat ratione loci: nam quæ in arenosis, spicâ est crassior: quæ in montosis, dumetis humidis, spicâ est tenuior.

II. *Gramen arundinaceum spicatum*.

*Gramen harundinaceum minus*, Tab. Ger.

III. *Gramen arundinaceum paniculâ molli spadiceâ maius*.

*Gram.*



Gramen tomentosum Lob.ico.

Gram. loliacei 8. alia species, Thal.

IV. Gramen arundinaceum panicula molli spadicea minus.

Graminis loliacei octavi tertia species, Thal.

V. Gramen arundinaceum ramosum, plumosum album : 44. in Prod.

VI. Gram. arundinaceum enode maj. montanum.

Scirpi primum genus, Trag.

Iuncus sylvestris, Lon.ico.

Iuncus lychnanthes maior, Thal.

Gramen harundin. montanum, Tab.

VII. Gramen arundinaceum enode minus sylvaticum.

Scirpi alterum genus, Trag.

Iuncus lychnanthes tenuis major, Thal.

VIII. Gram. arundin. maritimum acutifolium.

Oxyagrostis maritima Dalech. Lugd.

#### GRAMEN NEMOROSVM

*Gramen nemorosum glabrum.*

I. Gramen nemorosum paniculis albis capillaceo folio : 45. in Prod. ●

II. Gramen nemorosum spica subnigra recurva.

Gramen cyperinum nemorosum, Tab. Ger.

III. Gramen nemorosum spica rufescente molli.

Gramen nemorosum 1. Tab.

Gramen sylvaticum, Ger.

IV. Gramen nemorosum spicis parvis asperis.

Gramen sylvaticum 3. Tab.

Gramen sylvaticum minus, Ger.

Variat latiore folio in dumetis, & angustiore in pratis.

V. Gramen nemorosum caliculis paleaceis.

Holostium, Marth.

Holostium Matthioli, Lob.ico. Lugd.

Gramen epigonatocaulon, Thal.

Gramen junceum 6. vel bufonium, Tab.

Gramen junceum, Ger.

Duplex est repens : & erectum.

VI. Gram. holost. alpinum minimum : 46. in Prod.

*Gramen nemorosum hirsutum.*

I. Gramen hirsutum latifolium majus.

Gramen hirsutum nemorosum, Lob.ico. Ger.

Gramen sylvaticum 4. sive pilosum, Tab.

II. Gramen hirsutum latifolium minus.

Magnitudine potissimum differt : datur & hujus majus & minus.

III. Gramen hirsutum capitulis Psyllii.

Cyperella Cordi & Pseudocyperi species pumila, Ges. hor.

Gram. exile hirsutum cyperoides, Lob.ico.

Gramen cyperinum pilosum, Tab.

Gramen nemorum Dalechampi, Lugd.

Gramen exile hirsutum, Ger.

Variat foliis latioribus & angustioribus.

IV. Gramen hirsutum capitulo globofo.

Combretrum Plinij, Ang.

Herba Luziola vulgo, Cæf.

Gramen lucidum, Tab.

Gramen palustre echinatum, Ger. icon.

V. Gram. hirsut. angustif. majus : 47. in Prod.

VI. Gram. hirsut. angustifolium minus paniculis albis.

Gramen Leucanthemum Dalech. Lugd.

#### GRAMEN ECHINATVM & aculeatum.

I. Gramen spica subrotunda echinata : vel Gramen echinato capitulo.

Gram. echinatum tribuloides, Colum.

II. Gram. spica plana echinata : 49. in Prod.

III. Gram. album capitulis aculeatis Italicum.

Gramen aculeatum, Matth. Cast. Lugd.

IV. Gramen palust. aculeatum vel minus, Germanicum.

Gram. palustre echinatum, Lob.ico.

Gramen aculeatum, Lugd.

Variat spicis longioribus, rotundioribus, sæpe in eadem planta.

V. Gram. palustre aculeatum Italicum vel majus.

#### GRAMEN DACTYLOIDES, sive Ischæmum.

I. Gramen dactylon Aegyptiacum.

Nejemelmali, sive Gramen crucis, Aegyptiis, Alpino.

II. Gram. dactylon folio arundinaceo majus : aculeatum forè Plinii.

Gramen, Ang. Clus. Cæf.

Gramen vulgare Dalech. Lugd.

Gramen canarium alterum, Lob.

**Variat** nam Gallicum foliis est nonnihil villosis: Germanicum verò; foliis est glabris & cauliculis minus erectis.

**III.** Gramen dactylon folio arundinaceo minus cum appendice.

Gramen vulgare Dalechampi, Lugd.  
Fortè cum secundo idem.

**IV.** Gramen dactylon folio latiore.  
Sanguinaria Nevenaræ, Trag.  
Canaria Plinij, & Galli crus Apuleji, Ang.  
Coronopus, Leoniceo.  
Ischæmon, Ges. cat. Clus. hist. Tab.  
Ischæmon vulgare, Ad. I. ob. Ger.  
Ischæmon Plinij, Clus. hist. quoad iconem.  
Gramen ischæmon Plinij, Lugd.

**Variat** spicis, plerumq; quinis & senis: rarè quaternis: rarissimè ternis.

**V.** Gram. dactylon angustifol. spicis villosis.  
Ischæmon secundum, Tab.

Spicis tribus, 6. 7. & 10. variat.

**VI.** Gramen dactylon scoparium.  
Gramen scoparium ischæmi paniculis Gallicum, Lob. ad par. 2.

**VII.** Gramen dactylon aquaticum.  
Gramen aquaticum geniculatum, Tab. Ger.

**IIIX.** Gramen dactylon esculentum.  
Gramen mannæ, Matth. Cast.  
Gramen aculeatum, Sanguinaria, Capriola, Leon. Ruel. Ama.

Fruentum, Germ. Schrad. Oryzæ species, Cord. in Diosc.  
Gramen album seu hirsutum, Ges. hor.  
Manna cælestis Germanis, Eidem.  
Gramen Mannæ esculentum, Ad Lob. Ger.  
Gramen Mannæ primum, Dod. Tab.  
Gramen aculeatum i. Plinij, Thal.  
Graminis genus quod in Germ. feritur, Cæf.  
Gram. Mannæ prius Matth. & prius Dod. Lugd.

#### GRAMEN PANICEVM.

**I.** Gramen panicum spicâ divisâ.  
Panicum syl. Matth. Ad. Cast. Cam. Lugd. Tab. Ger.

Panicum Herbariorum sylvestre, Lob.  
Gramen Mannæ alterum, Dod. Lugd.  
Milium sylvest. & supinum, Clus. hist.  
Panicastræ species, Cæf.  
an Milium sylvestre Ischæmum, Ang.

Spica subinde singularis, non raro multi-

plex, eaq; modo herbacei, modò atrorubentis coloris est.

**II** Gram. panicum spicâ aristas longis armatâ.  
Panicum effigie gramen aristas circumvallatum, Lobico.

Gramen panicum Ger. secundum, Tab.

**III.** Gramen panicum spicâ simplici: ἀνὰ πέντε.

Lolium sextum, Miliaria herba Plinii, Trag.  
Panicum effigie gramen simplici spicâ, Lobico.  
Panicastræ, Cæf.  
Panicum sylvestre aliud, Dalech. Herba alba seu talsè Plinii, Lugd.

Gramen panicum primum, Tab.  
Gram. cyperoides spicatum, Gerico.

**Variat:** aliquando enim spica oblonga: aliquando brevi & rotunda.

**IV.** Gramen panicum spicâ asperâ.  
Lolium 7. Phalaris syl. Diosc. Trag.

Gramen geniculatum, Tab. Ger.

**Variat:** Monspelii palmo minus: apud nos erectum & cubitale.

**V.** Gramen panicum spicis nigris.  
Panicum effigie gramen 3. Lob.

Gramen panicum, 3. Tab.

Gramen panicum parvum, Ger.

#### GRAMEN MILIACEVM.

**I.** Gram. sylvaticum paniculâ miliacè sparsâ.  
Gram. miliaceum, Lobico. Cam. Tab. Ger.  
Gramen pratense 4. Dod.

**II.** Gram. mont. panicula miliacè sparsâ: 50 in Prod.

**III.** Gramen arundinaceum paniculâ miliacè: 51. in Prod.

#### GRAMEN SORGHINVM.

**I.** Gramen Sorghi paniculâ erectum.  
Gramen sorghi effigie, Lobico.  
Gramen sorghinum, Tab. Ger.  
Gramen pratense 5. Dod.

**II.** Gramen arundinaceum Sorghi paniculâ sparsâ: 52. in Prod.

#### GRAMEN SPICA TRITICEA & Secalina.

**I.** Gramen latifolium spicâ triticeâ latiore compactâ: 53. in Prod.

**Variat** latiore & angustiore folio.

**II.** Gram.

II. Gram. latifol. spicâ triticeâ divulsâ: 54. in Prod.

III. Gramen angustifol. spicâ triticeâ compactâ: 55. in Prod.

IV. Gram. angustifolium spicâ tritici mucosâ simili.

Gramen frumentarium segetaleve, triticeum, sive triticea spicâ, C. Bauhini, Lob. ad. par. 2. 56. in Prod.

V. Gramen spicâ secalinâ: 57. in prod.

GRAMEN SPICA BRIZAE.

I. Gramen spicâ brizæ majus: 58. in Prod.

II. Gramen spicâ brizæ minus: 59. in Prod.

III. Gram. spicâ geminâ millepedæ simile. Gramen dystachyphoron, Colum.

GRAMEN HORDEACEVM.

I. Gramen hordeaceum montanum sive majus.

Graminis loliacei 3. genus majus, Thal.

II. Gram. hordeaceum minus & vulgare.

Lolium tertium, Trago.

Holcus Plinij, Aristida alij, Ang.

Hordeum murinum, Tur. & Cæf.

Hordeum spontaneum spurium, Lob.

Hordeum sive triticum murinum, Dod.

Hordeum spurium, Tab. Ger.

Graminis loliacei 3. genus, Thal.

Gramen hordeaceum, Lugd.

III. Gramen hordeo disticho simile.

Gramen hordeaceum pumilum, Clus. cur. post.

GRAMEN LOLIACEVM.

I. Gramen loliaceum spicâ longiore.

Αλφα Diof. Arist. Theoph. Gal. Orib. Aegin. Aët.

Ζισάνιον Constan. Zinzania Arabum.

Lolium & Aera, Plinio.

Lolium, Ruel. Matth. Gæf. cat. Ama. Cord. in

Diof. Tur. Dod. Cæf. Cast. Lugd. Tab.

Lolium & triticum temulentum, Ad. Lob.

Lolium verum, Ges. hor.

Lolium album, Ger.

Frumentum satuum, Lon.

Variat: communiter aristas habet, sed sine aristis quoq; Bononiæ observatum.

II. Gramen loliaceum latifolium spicâ angustiore: 60. in Prod.

III. Gram. loliac. angustiore folio & spicâ. φάρμακον Diofcoridi, à feminis colore phœniceo.

Herba Phœnicea Græcis, hordeum murinum nostris, Plin.

Lolium quartum, Trago.

Phœnix, Matth. Tur. Lacun. Dod. (cui & Lolium murinum.) Cast. Ang. Cord. Lon. Cæf. Lugd.

Hordeum murinum, Guil. Lob. Tab.

Graminis loliacei 4. genus Tragi, Thal.

Lolium rubrum, Ger.

IV. Gram. loliace. minus spicâ simplici: 61. in Prod.

V. Gramen loliaceum minus supinum multiplici spicâ: 62. in Prod.

VI. Gramen loliaceum supinum.

Gramen phalaroides exile supinum humi sparsum Danicû, Lob. ad. par. 2. à quo accepimus.

VII. Gramen maritimum paniculâ loliaceâ: 63. in Prod.

GRAMEN FESTVCAE, SEV

Aegilops & Bromos herba.

I. Festuca graminea glumis hirsutis.

Lolium 2. Trag. at 1. iconc.

Aegilops & Festuca, Dod. gal. Gæf. hort.

Bromos, Lac. altera, Ger.

Bromos sterilis altera, Lob. Lugd.

Lolium, Lon.

Festuca altera, Dod.

Gramen murorum Dalech. Lugd.

Festuca graminea, Thal.

Phœnicis altera species, Eid.

Syphonium, Bromos herba, Tab.

Variat spicis, quæ aliquando quasi in fasciculum comprehensæ, & Phœnix altera est Thalij: aliquando dispersis: sic aliquando glabris, aliquando hirsutis: & propriè Secales vitium est.

II. Festuca gramin. glumis vacuis: 64. in Prod.

Variat: aliquando aristis oblongis incurvis armata Monfpeffuli reperitur.

III. Festuca graminea effusâ jubâ: 66. in Prod.

IV. Festuca graminea nemoral. latifolia mollis.

Festuca quarta, Thal.

V. Festuca junceo folio: 66. in Prod.

an Festuca nemoralis quinta & tenuifolia, Thal.

VI. Festuca junceo folio spicâ geminâ: 67. in Prod.

VII. Festuca avenacea sterilis elatior.

*Ἀρῦμος* Diosc. *ἀλῖς*. *Ἀρῦμος* *νία*, ad differentiam avenæ.

Festugago, Gazæ.

Lolij primum genus, Trag. def.

Aegilops prima, Matth. altera, in comp.

Aegilops, Lac. vera, Gesf. hort.

Bromos & avena herba, Dod. gal.

Festuca & avena Græca, Lon.

Avena sterilis, Ad. Thal.

Bromos sterilis, Lob. ico. Ger.

Bromos herba, Dod. Lugd.

Avena Græca, Cæf.

Aegilops 1. & Avena sativa, Tab.

IX. Festuca avenacea sterilis humilior.

Lolij quintum genus, Trag.

Bromos herba graminei generis, Thal.

IX. Festuca graminea arvensis minor.

Festuca sexta, Thallio.

X. Festuca pratensis lanuginosa: 68. in Prod.

XI. Festuca dumetorum: 69. in Prod.

XII. Festuca dumetorum folijs angustissimis pilosis: 70. in Prod.

XIII. Festuca vtricularis lanugine flavescētib.

*Ἀνθα* Diosc. Theoph. (ubi Gaza Avenam vertit,) Gal. Oribas. Aegin.

Hordeum festuca, seu Aegilops, Plinio.

Aegilops Bromoides Belgarum, Lob.

Festuca prior, Dod.

Avenæ tertium genus syl. Cæf.

Avena sylvest. seu nigra, Thal.

Aegilops Dodonæi, inter Aegilopē & Bromum media, Lugd.

Aegilops sexta, Bromoides 2. Tab.

XIV. Festuca altera capitulis duris.

Aegilops, Ang. Matth. comp. Ad. Dod.

Aegilops secunda, Matth. Lug.

Festuca five Aegilops Narbonensis, Lob.

Triticum sylvest. in Sicilia, Cæf.

Frumentum syl. Cast. ap.

Aegilops Lobelij & Penæ, Lugd.

Aegilops peregrina, Tab.

Festuca Italica, Ger.

Spica communiter ex duobus aut tribus capitulis duris composita est: nonnunquam ex pluribus compacta, spicam triunciale obtinet.

XV. Festuca longissimis aristis glumis vacuis spadiceæ coloris.

Aegilops 4. Bromoides 1. Tab.

Aegilops Bromoides, Ger.

# GRAMEN AVENACEVM.

I. Gram. montanum avenaceum spicatum.

Gram. montan. spicatum. Clus. pan.

Gram. sylvaticum secundum, Tab.

Gram. marinum spicatum alterum, Ger.

II. Gram. mont. avenaceum locustis rubris: 71. in Prod.

Variat caule, lævi in montosis: in dumetis humidis, folijs cauleq; subasperis.

III. Gram. avenaceum locustis rarioribus.

Gram. avenaceum rariore grano Danicum, Lob. ad. par. 2. à quo accepimus.

IV. Gramen avenaceum capillaceum minoribus glumis.

Gramen Anglo-Britannicum avenaceum, Danico nemorali simile: Hoc nomine à D. Lobelio accepimus.

Gramen nemorale avenaceum alterum ex fusco xerampelinum & lucidum Danicum, Eid. ad. par. 2. cuius etiam varietatem notat.

V. Gramē avenac. montanū lanuginosum.

Gramen monta. avenæ semine, Clus. pan.

Gramen avenaceum, Tab.

Hordeum distichon, Ger. ico.

VI. Gramen avenaceum lanuginosum glumis rarioribus: 72. in Prod.

VII. Gram. avenac. lanuginosū ramosum. Gramen glumosum Dalech. Lugd.

IX. Gramen glumis varijs: 73. in Prod.

IX. Gramini affinis planta ad gutturis inflammationes utilis.

Planta in planis nascens graminismodo, Petri de Osma in epist. ad Monardem. sed quid?



## SECTIO SECVNDA.

JUNCVS, NARDVS, CYPERVVS,  
Sparganium, Vva marina & Equisetum.

## DE IUNCO.

**I**UNCVS à jungendo, Græcis *χῆνος*, à loris & funibus dicitur. Dioscorides, in odoratum & inodorum divisisse videtur. Nam l. 1. de Iunco odorato, quem simpliciter *χῆνον* per excellentiam nominavit: at l. 4. c. 52. de inodoro egit: hunc duplicem fecit, unum levem, alterum acutum: hunc sterilem, & alterum semine nigro & crassiore calamo, & tertium *ὀλόχῆνον* prioribus carnosiore. Sic Theoph. 4. hist. 13. tria sunt genera, *ὀξύκαις ἀκαρπες*, acutus & sterilis, qui mas: *κάρπιμος*, frugifer, quem *μελάγχρανον*, atriferum vocitat: tertium *ὀλόχῆνον* dicitur: at de odorato 9. hist. 7. egit. Plinius l. 21. c. 18. quinq; fecit, 1. Mariscon appellatum, 2. marinum, oxyſchænum, & huius tria genera: acutum, sterilem, quem marem & oxygm: alterum semen ferentis, quem Melancreanin vocant, & fructuosior: magis tertium, qui Holoschænos nominatur. Quare Iuncus alius est odoratus, inodorus alter, vel alius locis aridis, alius aquis provenit: hic, vel in aquis dulcibus, vel maritimis. Rursum utriusq; generis alij *ἀπὸ ζῆτος ἐν ἀκρῇ*, in mucronem pungentem desinunt, alij in fastigium obtusius: & sic alius *λεῖος*, levius: alius *τραχύς*, asper: alius fastigio acutius, alius obtusius. Iuncus levius & in fastigio acutus, alius est oxyſchænos, alius holoschænos. Oxyſchænos alter mas, *ἀκαρπες*, nullo semine facundus: alter femina, *μελάγχρανος*, nigrum semen ferens: sic ad facundum, clavatus: petrosus verò, ad lapides referendus est.

## I. Iuncus odoratus sive aromaticus.

*χῆνος ἄδύσμος ἢ ἰσῆμος ἢ ἡύδης*, Hipp.  
*ἀρωματικὸς ἢ μυρρίνης*, Græcis posteriorib.  
*χῆνος*, Diosc. & Galeno.

Iuncus odoratus, Plinio, Hermol. Ruel. Matth.  
Tur. Lac. Ad. Lob. Clus. in Garz. Cæs. Cast. Lugd.  
Iuncus rotundus, Celso.

Iuncus rotundus odoratus, Marcell. Ama.  
Com.

Schœnus & Iuncus odor. teres ac rotund. Cord.  
Schœnanthum, Mesuæo, Lon. (cui & Cypereus rotundus.) Tab. (& funcus aromaticus.)  
Cam. (& Iuncus floridus sive aromaticus) Acoræ.

Squinanthum, Varroni, Ang. Guil. & Officinis, quasi *χῆνος ἄνθος*, iunci flos.

Adhar & Adhir, Arabib. Sachbar, Arabiæ incolis.

Palea de Mecha & Pastus camelorum, vulgo.

## IUNCVS ACUTVS.

I. Iunc. acut. capitulis sorghi: *ὀξύκαις* Diosc.  
Iuncus acutus, Ang. Cord. in Diosc. Cast. acuto cacumine, Gesf. cat.

Iuncus maritimus primus, Ad.

Iuncus rotundus alter, Cæs.

Huc referri potest

Vlva palustris & inusitatum Caricis genus, cuius folia peracuta crura & pedes sauciant: par. 6. Ind. occid. exp. ed. in Floridam.

II. Iuncus acut. marit. capitulis rotundis.

Iuncus acuminatus, Ama.

Iuncus acutus maritimus alter, Ad.

Holoschænos maior, Lugd.

III. Iuncus acut. marit. caule triangulo: i. in Prod.

an Iuncus exiguus maritimus, Cæs.

IV. Iuncus acutus paniculâ sparsâ.

Iuncus tertius, Dod. gal. acutus, Dod. Cast.

Iuncus acutus vulgar. Lob. ico.

Iuncus oxyſchænos Dodonæi, Lugd.

## IVNCVS LÆVIS

*inæquis.*

## I. Iuncus seu Scirpus Indicus.

Iuncus Indicus porofus, Cluf. cur. post.  
an ex hoc Iunco parantur tapetia in Guinea:  
Linf. par. 2. Ind. or. c. 4. & ex hoc Scirpove viri-  
di, portulas, floreæ, fragula & pileos in Gui-  
nea puellæ conficiunt: par. 6. Ind. or. c. 7. &  
apud Bantanos, pilæ luforiæ: par. 5. Ind. or. fig-  
vndecima.

II. Iuncus maximus, five Scirpus maior:  
quâvis veteres Scirpum à Iunco diffinxisse vi-  
deantur.

Marifcus Plinij.

Iuncus palustris major, Trag. Tab.

Iuncus grandis Holofchænos, Gef. cat. Dod.

Scirpus, Iunci tertia species, Lac.

Iuncus tertius holofchænos, Ang. Cast.

Iuncus & Scirpus, Lon.

Iuncus aquaticus maximus, Ad. Lob. ico. Ger.

Iuncus lævis aquaticus maximus, Thal.

Iuncus rotundus 3. Cæf.

Iuncus lævis, Ger. ico.

Holofchænos Theophrasti, Lugd.

## III. Iuncus five Scirpus medius.

Iuncus fylvaticus, Tab.

Iuncus aquaticus maximus, Ger. ico.

## IV. Iuncus lævis paniculâ sparsâ major.

Iuncus vulgaris alter, Trag.

Iuncus oxyfchænos, Ang.

Iuncus lævis (feu lenis,) Cord. in Diofc. Dod.

Lugd. five Oxyfchænos vulgo.

Iunc. læv. vulgat. Ad. Thal. paniculâ sparsâ,  
Lob. ico.

## V. Iuncus lævis alter.

Iunci lævis aliud genus, Lugd.

Ex hoc, medulla prorsus nivea ad lucerna-  
rum lumina extrahitur.

## VI. Iuncus lævis paniculâ sparsâ minor.

VII. Iuncus lævis paniculâ non sparsâ.

Iuncus, Matth. Lac. Cast.

Iuncus lævis, Lugd.

Iuncus lævis glomerato flore, Lob. ico.

Iuncus palustris minor, Tab.

an Iuncus rotundus primus, Cæf.

VIII. Iuncus exiguus montanus mucro-  
ne carens: 2. in Prod.

an Iuncus lychnanthemus tenuis, Thal.

IX. Iuncellus inutilis: 3. in Prod.

Chamæfchænos, Gef.

Huc referendus est

Iuncellus omnium minimus, Ad.

## IVNCVS ACVMINE REFLEXO.

## I. Iuncus acumine reflexo maior.

Iuncus lævis, Gef. cat. Tab.

Iuncus melancranis, & Iuncus oxyfchænos sæ-  
mina, Lugd.

an Iuncus lychnanth. tenuis major, Thal.

## II. Iuncus acumine reflexo alter: 4. in Prod.

III. Iuncus acum. reflexo min. vel trifidus:  
5. in Prod.

## IVNCVS CAPITVLIS.

Equifeti.

## I. Iuncus capitulis equifeti maior.

Iuncus aquat. min. capitulis equifeti, Lob.

Iuncus clavatus, Dalech. Lugd.

Iuncus alius fecundus, Eid.

Variat fciapis latoribus & triplo ægustiorib\*.

II. Iuncellus capitulis equifeti minor & flui-  
tans: 6. in Prod.

## IVNCVS CAPITVLO LANV.

ginoso & bombycino.

I. Iuncus capitulo lanuginoso: five Schœ-  
nolaguros. 7. in Prod.

II. Iuncus alpinus bombycinus: 8. in Prod.

## IVNCVS FLORIDVS.

## I. Iuncus floridus maior.

Calamagrostis 2. Trag. prima, Lugd.

Sparganium, Dod. gal.

Iuncus floridus, Matth. Cast. Lugd.

Gladiolus palustris, Cord. hist.

Gladiolus aquaticus, Gef. cat. Dod.

Carex alterum, Lon.

Iuncus cyperoides floridus paludofus, Lob.

Iuncus cyperoides paludofus, Eyst.

Iuncus cyperinus floridus, Tab.

Butomos Theoph. Cæf.

Quibusdam Butomos Theoph. 1. hist. 8. & 4.  
hist. 9. 11. 12. alijs Gladiolus Eiusdem 1. hist. 8. &  
16. Item 4. hist. 9. 10. 11. nonnullis Spargani-  
um Diofcorid. 1. 4. c. 21. Flos colore est in pur-  
pura diluto: at Tragus candido notat.

II. Iuncus floridus minor: 9. in Prod.

NAR.

## NARDVS.

**NARDVS** Diof. l. 1. forte à Naardo vrbe Syriacæ, Euphrati contermina: alijs  $\nu\alpha\rho\delta\omicron\varsigma\acute{\alpha}\chi\upsilon\varsigma$ , quam inter aromata Dioscorides: inter odorata ad vnguenta, Theoph. 9. hist. 7. recensuit. Genera Dioscorides plura fecit, & cap. 6. differentias multas, loco natali solum differentes, proposuit, omnibus in uno monte nascentibus: ut Syriacam, Occidentem versus Syriam respiciente: Indicam, Orientem versus ad Iudæam vergente: hac duplex, una in monte, altera ad radicem montis, non procul à praterfluente Gange, quæ Gangitica, quæq; omnes simul adferuntur: addit & Samphariticam: de reliquis speciebus infra l. 4. agemus. Plinius de Nardo & ejus differentijs l. & cap. 12. verba fecit.

I. Nardus Indica, quæ spica, Spica nardi, & Spica Indica Officinis.

Nardus, Ruel. Cord. in Diof. Gef. cat. Lac. Tur. Lob.

Nardus Indica, Matth. Cord. hist. Lon. Cast.

Lugd. Tab. Ger.

Spica Nardi, Ang. (cui Nardus Gangitis Diof.)

Mundel. Amat. (& Indica spica.) Ad. Lob. ico.

Acoft. Cæf. (qui ex Algarum genere esse statuit), Lugd.

Spicæ nardus, quam frumenti more ad duarum

vel ternarum spithamarum altitudinem excrescere scribunt: in 4. part. hist. Ind. Orient. c. 39.

Hæc à Syriacæ & Gangetica, tantum natalibus differre videtur.

II. Nardus spuria Narbonensis.

Nardus Gangitis spuria Narbonæ, quæ Gangitidi Dioscoridis prorsus quadrare videtur, Ad. Lob. ico.

Nardus spuria Narbonensis, Lugd.

Nardus Narbonensis, Ger. adulterina, Tab.

## CYPERVS ET EIVS

## Species.

**Κύπερος** aut Κύπρις, à radice effigie, quæ pyxidulam aut vasculum pusillum imitatur, nomen accepisse videtur.

Genera duo Dioscorides l. 1. recensuit: alterum radice rotundâ, quod Officinarum Cyperus est: alterum Gingiberis effigie, quod in Officinis Curcuma dicitur. Theoph. 4. hist. 11. Cyperum (Gladiolum Gaza verius) radice inæquali esse scribit, partim crassa carnosâq; partim gracili & furculosa. Plin. l. 21. c. 18. Cyperum radicem olivæ nigrae similem tribuit, & cum oblonga sit, Cyperidem vocari.

Cyperus alius amarus, alius dulcis est: amarus, vel odoratus, vel inodorus: uterq; vel rotundus, vel longus: dulcis verò vel angustifolius, vel latifolius est.

## CYPERVS ROTVNDVS

Odoratus.

Κύπερος σπρόγγυλος.

I. Cyperus rotundus Orient. major.

Cyperus rotund. Hodueg. Ægyptijs, Alpino.

Cyperus Diof. major rotundus, Ad.

Cyperus rot. Oriët. maj. vel Babylonicus, Rauw.

Cyperus major Syriacus, Cam. in Matth.

Cypero rotundo similis, Cæf.

II. Cyperus rotundus Orientalis minor.

Cyperus rotundus minor, Ad.

Cyperus minor Creticus, Cam. ad Matth.

Orientalis cortice est fusco; Creticus verò nigro.

III. Cyperus rotundus vulgaris.

Cyperus, Trag. Lob. ob. cui & luncus quadrat. Celsi.

luncus angulosus & triangularis, Plinio.

Cyperi prima species, Ama.

Cyperus rotundus, Cord. in Diof. Gef. hor.

Ded. Lob. ico. Lon. Tab. Ger.

Cyperus alter radice olivari, Cæf.

IV. *Cyperus rotundus minimus* Hispanic.  
*Cyperus rotundus pumilus*, Clus. cur. post.

CYPERVS ROTVNDVS  
 inodorus.

I. *Cyperus rotundus inodorus* ex Florida.  
 Radix S. Helenæ, Monar. Clus. exot.  
 Pater noster S. Helenæ, Cast.  
 Pater nost. vel radix S. Helenæ Monardi, Lugd.  
 Galangæ similis radix ex Florida, Frag.

II. *Cyperus rotundus inodorus* Anglicus.  
*Cyperus rot. inod. littoreus*, Lob. Lugd.  
*Pseudocyperus*, cujus herbam Noccum in He-  
 turia vocant, Cæf.

III. *Cyperus rotundus inodorus* Germæicus.  
*Cyperus aquatic. septentrionalis*, Lob.  
*Cyperus aquaticus*, Lugd.  
*Cyperus rotundus*, nigras inodoras radices  
 habens, Cam.

CYPERVS LONGVS ODORATVS.

I. *Cyperus odor. radice longâ*: sive *Cype-  
 rus Officin.*

*Cyperus radice gracili & furculosa*, Theoph.  
*Cyperida*, Plinio.  
*Cyperus*, Matth. (qui & longum & rotundum  
 vulgarem vna fig. exprimit, ut & Lugd.) Ang.  
 Fuch. Tur. Lac. Ges. cat. (cuj & luncus angu-  
 losus) Cast..  
*Cyperus Romanus*, sive longus, Cord. in Diosc.  
*Cyperus longus habitior*, Ad.  
*Cyperus long. odoratior*, Lob. Lugd.  
*Cyperus longus*, Cord. Ges. hor. Dod. Cam.  
 Tab. Ger.  
*Cyperus secunda species*, Ama.  
*Cyperus primus & major*, Cæf.  
 Galanga syl. longa, Germanis.

II. *Cyperus longus odor* Peruanus.  
 Radix contra yerua, id est, venenis adversans,  
 Monardi.  
 Radix contra venena, Lugdun.

CYPERVS LONGVS INODORVS.

I. *Cyperus longus inodorus* Peruanus.  
 Drakena radix, Clus. ex. Lugd.  
 Bezoardica radix, Tab.

II. *Cyperus longus inodorus* Orientalis.  
 Radix Drakenæ affinis, Clus. ex.

III. Radix contra venenatas sagittas.

Tarvpara radix in Guiena cujus succo vulnera-  
 ti sanantur: par. 8. Ind. Occid.

IV. *Cyperus longus inodorus* Germanicus.  
*Cyperus long. inodor. syl.* Lob. ico.

V. *Cyperus long. inodor. sylvaticus*, vel  
 montanus: hic in Prodomo describitur.

CYPERVS ESCULENTVS.

I. *Cyperus rot. esculentus angustifolius.*  
*χρονόριον*, Ges. hor.

Trasi, Matth. Cast. Cæf. Lugd. Frag.  
 Herba radice magnitudine avellanæ, Cord. ob.  
 luncus avellana, Ama.

Trasi Veronensium, Ad. Lob.  
 Dulcichinum, Ges. hor. Guil. Dod.  
 Holoconitis Hippocratis, Fabric.  
*Cyperus dulcis*, Theoph. Cam. Tab.  
*Cyperus esculentus*, Ger.

Malinathalla (quasi valdè regerminans) The-  
 ophraſti, Aegyptiorum, & Anthaliū Plinij,  
 Dalech. in Plin. Cæf. Colum.

Margaritæ Aegyptiæ, Autori libri Aristotelis,  
 de plantis, Dalech. in Plin.

Trasi folio cyperi, Clus. in Garz.  
 Habaziz, Portæ.

Habel afsis Tripolitanis, sive Granum alzelem  
 Arabum, Rauwolf.

Plantam hanc nec caulem, nec florem, nec  
 semen producere, sed sola radicum propagatio-  
 ne conservari, Gesnerus l. de hor. & Pona in suo  
 Baldo, affirmant. Contrâ, Matth. Dodonæus  
 Lob. Columna, cum flore pingunt: & Cæfal-  
 pinus, caules, folia, & semen Cyperi, & Fra-  
 gosus flores spicatos aliquantum flavos, tribuit.

II. *Cyperus rotund. esculent. latifolius.*  
 Caceras, Garziæ: addit Clus. in notis, an *Μα-  
 ναβάλλα* Theophrasti.  
 Caceras in Goa, Frag.





## SPARGANIVM.

**Σ** *Παργάνιον ἀπὸ τῶν σπαργάνων, fasciolis, quòd folijs eius latis & vitilium modo lentis, pro fascijs nutritices usantur: cujus Dioscorides l. 4. meminit: Βύτομος Theoph. 4. hist. 8. enimas & femina, & hac sterilis.*

## I. Sparganium ramosum.

Sparganium, Trag. Matth. Ang. Tur. Cord. in  
Diof. Gef. cat. Lac. Cæf. Cast. Cam. Tab.  
(cui & Gladiolus palustris.) Ger. Eyft.

Butomos Theoph. Ang.

Butomon, Ruel. Dod. gal. Ges. cat.

Platanaria, Dod. Thal.

Sparganium & Butomos Theoph. Lob.

Carex, Lon.

Phleas femina, Lugd.

Calamagrostis secunda, Eidem.

## II. Sparganium non ramosum.

Sparganium alterum, Lob. Cæf. Lug. Tab.

Platanaria altera, Dod.

Sparganium latifolium, Ger.

III. Sparganium minimum, in Prodomo  
descriptum, à Dom. Furero missum.

## POLYGONVM BACCIFERVM

sive Vva maritima.

## I. Polygonum bacciferum scandens.

Caucon & Ephedra, Plinio.

Ephedra sive Anabasis, Bellonio & Dod.

Ephedra Plinij fortè, Rauwolf.

## II. Polygonum bacciferum maritimū majus, sive Vva maritima major.

Polygonum quartum Plinij majus, Clus. hist.

Tragos, sive Vva marina major, Lob.

Vva marina, Dod. quoad icon.

Polygonum marinum s. sive cocciferum s. Tab.

## III. Polygonum bacciferū maritimū minus.

Tragos, Ruel. Tragium, Ges. hor.

Equisetum quartum, Matth. Lugd.

Croton Nicandri, Ang.

Equiseti facie recemosa planta, Ad.

Vva marina Monspel. Lob. Tab.

Polygonum quartum Plinij minus, Androface

fortè Bellonij, Clus. hist.

Polygonum marinum secundum, Tab.

Tragus, sive Scorpius maritimus Dalech. Lugd.

Tragum, Vva marina, Cam.

Vva marina quarta, vel minor, Ger.

an Osteocollon, Hieroclis & Absyrtij, Lugd.

## EQUISETVM.

**Ι** *ἵππυς Dioscoridi l. 4. c. 46. sive Cauda equina, quòd folia setis equinis respondeant. Hinc Plinio l. 26. c. 13. Equisetum, Hippuris à Græcis dicta, est pilus terra, equina seta similis; cui l. 18. c. 28. Equisetis, & Equisetis dicitur.*

*Genera duo Dioscoridi, alterum vicinos arborum caudices scandens: alterum caule cubito majore, & comis brevioribus &c. Plinius & tertium agnovit, quod pini folijs assimilavit.*

I. Equisetum palustre linariæ scopariæ folio: s. in Prod.

## II. Equisetum palustre longioribus setis.

Hippuris major, Brunf. Dod.

Equisetum s. Matth. Lac. Ang. Cast. Lugd. qui

etiam sub Equiseti primi Asparago Dodon.

pinxit.

Caucon Plinij, Ang.

Equisetum majus, Dod. gal. Lob. ob. Ger.

Hippuris, Ama. Ad. Lob. ico.

Equisetum 2. & Hippuris 1. Diof. Tab.

## III. Equisetum palustre brevioribus setis.

Equisetum palustre, Lob. ico.

## IV. Equisetum palustre brevioribus folijs

polypermon: *πολύπερον βάλαν.*

Polygonum femina, Dioscoridi.

Polygoni tertium genus, quod Oreon, Plin.

Polygonum femina, Matth. Eric. Cord. Ges.

cat. & hort. Dod. Ama. Ang. Lac. Cast. Lugd. Tab.  
 Sanguinalis fœmina, Cord. in Diosc.  
 Limnopoce, Cord. hist.  
 Polygonū fœmina semine vidua, Ad. Lob. ico.  
 Polygonon fœmineum, Thal.  
 Equisetum tertium, Cæf.  
 Cauda equina fœmina, Ger.

Hoc communiter sine semine reperitur, aliquando ad singulas articulorum commissuras dena & plura semina (hinc polyspermon) adnascuntur.

V. Equisetum pal. minus, polystachion: 2. in Prod.

VI. Equisetum palustre tenuissimis & longissimis setis: 3. in Prod.

VII. Equisetum sylvaticū tenuissimis setis. Hippuris minor altera, Trag.  
 Equisetum sylvaticum, Tab. Ger.

IX. Equisetum pratense longissimis setis. Equisetum alterum, Matth. Lac. Cæf. Lugd.  
 Hippuris altera, Trag. Ama.  
 Hippuris & Equisetum, Ges. cat.  
 Equisetum, Fuch. ico. Cord. in Diosc.  
 Equisetum longius, Dod. gal. (figurā transpositā.) Fuch.  
 Hippuris major, Thal. prima, Lon.  
 Hippuris fontalis & Equisetum 2. Diosc. Lob.  
 Hippuris minor, Lob. ico. figurā 2.  
 Equisetum palustre majus, Tab. palustre, Ger.

IX. Equisetum arvense longioribus setis.

Hippuris minor, Trag. Dod. Thal.

Hippuris altera, Ges. cat.

Equisetum, Er. Cordo, minus, Fuch. figurā transpositā: minus vel 3. & 4. Lon.

Polygonon fœmina, Fuch. ico.

Equisetum alterum, Cord. in Diosc. Lob. ico.

Hippuris arvensis major, Tab.

Equisetum fegetale, Ger.

X. Equisetum folijs nudum non ramosum sive junceum, ἵππυρις ἀφυλλος.

Hippuris major, Trag. major altera, Lon.

Sanguinali fœminæ similis, Cordo in Diosc.

Polygonum fœmineum ἀφυλλόναυλος, Thal.

Equisetum junceum, Tragi. Lugd.

Hippuris sine folijs & nuda, Tab.

Equisetum nudum, Ger.

XI. Equisetum folijs nudum ramosum.

Equisetum 3. Matth. Lugd.

Hippuris minor, Lob. ico. & Dodon. sed utriusque ad primam figuram.

XII. Equisetum nudum minus variegatum Basileense.

an Hippuris lacustris, folijs mansu arenosis, Gesf. coll. quod in Prod. 4. est.

XIII. Equisetum fetidum sub aqua repens. 5. in Prod.

Equisetū pini folijs simile apud Plinium: & Hippuris minima à Diosc. nō descripta, Dal. in Plin.  
 Equiseti quintum genus minimum, Lugd.

## SECTIO TERTIA.

### DE ARVNDINE, PAPYRO, ET Typha.

#### ARVND O.

**ARVND O** (quæ Græcis κάλαμος, παρὰ τὸ καλῶς ἀμᾶσθαι, ut vult Etymologus) in odoratam & inodoram dividitur. Odoratam sive Aromaticam, Diosc. l. 1. c. 17. at inodoram c. 115. proposuit, & genera quinq. agnovit.

Ἐσσημύνατος, ὄζυλον, συριγγίας, δόναξ & φραγγίτις: solida, fœmina, fistulis dicata, crassa & sepiaria. Verum Theoph. 4. hist. 12. duo summa genera, τὸν αὐλητικόν, καὶ τὸν ἰτέρον, tibialem & reliquā constituit, & inde in plures species subdividit. At Plinius l. 16. c. 36. multo plures differentias agnovit: quare l. 24. c. 11. viginti novem genera se demonstrasse monet, ubi & odoratam mentio fit.

ARVN-

## ARVND OODORATA

## I. Calamus Aromaticus Indicus.

Κάλαμος, & Κάλαμος αρωματικός, Hipp. & Gal.

Κάλαμος ἰνδικός, Theoph.

Κάλαμος αρωματικός, Diosc. Orib. Aegin. Aëcio.

Κάλαμος ἰνδικός, Dionysio de situ Orbis.

Calamus Arabicus, Plutarch. Alexádrinus, Cel.

Calamus odoratus, Plin. Hermol. Ruel.

Calamus aromaticus, Manardo.

Calam. aromaticus, Cord. in Diosc. Fuch. comp.

Guil. pap. Garz. Lob. ob. Clus. ad Garz. Acoft.

Cæf. & in 4. parte Ind. Orient. fig. 29. & Diringo Malays, & Deringo, par. 3. Ind. Or. 39.

Diringuo, 4. parte Ind. Orient. fig. 20.

## II. Calamus aromaticus Syriacus.

Calamus aromaticus à Syriaco divers. Guil. pap.

Calamus odorat. Libani, Lob. ico. Cam. ad Matth.

Solius Calami figuram proponunt, qualem à Doct. Paludano, anno i. 579. ex Ægypto allatum, Patavij accepimus, qui i. in Prod.

III. Calamum odoratum Matthiolus pingit, & ex eo Lacuna, Lonicerus, Acofta, Durantes, Lugd. hist. Tabernæm. & Gerard. Calamum aromaticum nominantes, quæ scititium suspicamur.

## ARVND INODORA.

## I. Arundo vulgaris sive φραγμίτης Diosc.

Κάλαμος φραγμίτης, Theoph.

Harundinis quintum genus, Trag.

Harundo phragmitis, Ruell. Corn. Dod.

Arundo aut Calamus, Tur. Ges. Lon.

Harundo vallis, Ama.

Harundo vallatoria, Dod. gal. Lob. Lugd. Thal. Ger.

Arundo palustris, Matth. Lugd. Tab.

Calamus vulgaris, Cord. in Diosc.

Canna secunda, quæ femina Diosc. Ang.

Calamus sive harundo alia gracilis, Cæf.

II. Arundo sativa, quæ σάραξ Dioscor. & Theoph.

Arundo, Matth. Lac. Cast. Amnica, Ruel.

Arundo domestica, Matth. Lugd. Tab.

Arundo cypria, Dod. gal. Ama. Ger.

Canna quarta, quæ Donax, Ang.

Arundo magna, Ges. hor. Italica major, Cam.

Arundo donax sive cypria, Dod.

Arundo donax sativa, Lob.

Calamus, sive harundo crassa, Cæf.

III. Arundo Anglica folijs in summitate dissectis: 2. in Prod.

## IV. Arundo scriptoria atrorubens.

Κάλαμος στυργίτης, Diosc. Στύργη, Theoph.

Syringias fistularis arundo 3. Dod. gal.

Canna tertia, Calamus scriptoria, Ang.

Harundo fistularis, Ama.

Fistula vel Syringa, Lob. ico.

Canna fistularis, Tab. Ger.

Sic in China ex Arundinibus pennæ scriptoriæ fiunt (an ex hac?) in quas penicilla more pictorum nostratium indunt: in hist. Ind. Orient. par. 2. c. 26.

V. Arundo sarcta maxima atrorubens, quæ Principes pro scipionibus vtuntur.

Κάλαμος σάραξ, Dioscoridi.

Κάλαμος σάραξ, Theophrasto.

Canna Indica, aliquibus Papyrus, Matth. Ital.

Canna prima species Diosc. Ang.

Arundo Indica & septima, Dod. gal.

Arundo Indica, cum teres sit, Papyrus antiquorum non rectè statuitur, Guiland. pap.

Iuncus, papyri Ægyptiæ genus, Ama.

Nastos vel sarcta, Lob. ico. tertia, Tab.

Nastos Clusij, Ger.

VI. Arundo sarcta geniculata sive sagittalis.

Nastos & arundo prima, Dod. gal.

Nastos sive sarcta altera toxica, Lob. ico.

Arundo sarcta seu Nastos i. Tab.

Calamus sagittalis, Ger.

In Bali Insula, gestant Cannas sagittivomas, ex quibus teretes exilesq; sagittulas ex Arundine fabrefactas (an ex prædicta arundine?) in apice verò intoxicatas, efflant: in hist. Ind. Orient. part. 3. c. 39.

## VII. Arundo sarcta flava.

Σαρκίτης καὶ σάραξ, Theophrasto.

Arundo femina & secunda, Dod. gal.

Nastos, seu sarcta, sive toxica gracilis & plicatilis, Lob. ico.

Nastos secunda, Tab.

Arundo sarcta, Ger.

IX. Arundo repens vel Chamæcalamus.

Arundo humilis, Ges. hor.

Arundo tertia in maritimis, Cæf.

Arundo epigeios, Lugd.

## ARUNDO INDICA.

I. Arundo arbor: in qua humor lacteus gignitur, qui Tabaxir, Avic. & Arabibus dicitur. Mambu Indorum, in ejus arundinibus Tabaxir five Saccar Mambu, Garzæ. Mambu five arbor Tabaxir, Lugd. Frag. Spodium aut Tabaxir Persianorum, Acoft. Spodium, Cast. Frag.

Hi duo secuti errore Gerardi Cremonensis, qui in Rhafi Tabaxir Arabum per Spodium reddit: cum *Sacchar* five Spodium, sit Tutia Arabum, cujus in externis remedijs solum usus est. Tabaxir verò in Arabum compositionibus, intra corpus fumatur.

Est autè Tabaxir (vt habetur in 4. part. Ind. Orient. c. 14.) medulla arundinis Mambu five Bambus, & vocatur Saccar Mambu id est, Saccharum de Mambu, quod propter insignem vim medicamentosam magni sit, & ab Arabibus, Persis, & Aethiopibus, qui illud Tabaxir vocant, avidè coëmitur. Harundo Indica, Clus. exot. Bambus five Iunc. Indic<sup>9</sup> 4. p. Ind. or. c. 14. fig. 12. Bambu, Manibu, ex qua Tabaxir, part. 4. Ind. Orient. cap. 3.

Cana Tabaxir & Arundo, quâ Indi Bambus vocant, Idem.

Sunt arundines aspectu gratissimæ, præalæ, nigra, rotundæ, crassæ, ita ut utraq; manu vix junctim includas, imò femoris crassitie. Crescunt sponte in Norsingæ Regno ad litus, & universo littore Malabar, præcipuè juxta Choromandel. Indi ex ijs domos suas ædificant, ut in Terenatè, quas induunt, & singulari industria intorquent: part. 5. Ind. Orient. Sic in Pegu etiam, & stramine teguntur: par. 7. Ind. Or. c. 35. & 37. & in civitate Bantam, cuncta ædium subleia ex his arundinibus assularim dissecitis constant: 3. part. Ind. Orient. c. 22. Imò ad lecticas Pallankynsdietas vulgò, uruntur, in quibus mulieres per publicum deferunt. Sic & naviculas, duobus viris capiendis aptas faciunt: par. 2. Ind. Or. 17. & par. 4. c. 14. Hac adversarij, quem vitâ omnino exuere nolunt, dorsum contundunt: par. 2. Ind. Orient. c. 32.

Arundines in Indiæ Occident. sylvis (an eadem cum priore?) non raro nascuntur, crassitudine et vis humani, quæ ad obtoneræ, ut singulæ santes vno ictu gladij secantur: aridæ ve-

rò tanta duritie, vt fissis illis, & in modum Chirurgicorum scalprorū efformatis, sagittas suas ita arment Barbari in Brasilia, vt vno ictu feras humi fundant, &c. in Ind. Occident. hist. part. 3. c. 12.

Cannæ seu arundines editissimæ nascuntur, quarum quodlibet interseptum mensuræ Hispanicæ capax est: hæ structuris ædium etiam adhibentur: in hist. Ind. Occident. l. 4. c. 30.

Cannarum Hierosolymitanarum nomen quoq; occurrit in hist. Ind. Orient. part. 4. c. 6.

## II. Arundo Saccharifera.

Arundo octava, vel saccharata, Dod. gal. Harundo ex quo Saccharum, Cord. in hist.

Arundo Saccharata, Dalech. in Diof.

Sacchari canna, Gef. hor.

Arundo saccharina Indica, Ad. Lob. ico. Lugd. Canna mellea, Cæs.

Arundo & calamus saccharinus, Tab.

Calamus Indicus, par. 6. Ind. Or. c. 19.

Calamus Indicus Saccharites, & Canna Saccharina, in hist. Ind. Orient. par. 4. 5. & 6. c. 38.

& hist. Occid. Ind. part. 3. 4. 8. & 9.

De Sacchari differentijs, & conficiendi modo, in nostris in Matthiolum notis, & lib. de compositione Medicam. egimus: Vide & Munsteri cosmograph. l. 2. c. 91.

## III. Arundo Indica versicolor.

Canna de Bengala Lusitanis: in Regno Bengala crescunt Arundines versicolores; medulla plenæ, crassitie arundinibus Hispanicis similes, paulo tamen tenuiores: virides adhuc, lentæ insectantur, ad stanni modum, aut instar Salicis, foris punctis versicoloribus notatæ sunt, haud secus ac si arte ita pictæ forent. Vtuntur ijs in Lusitania mulieres vetulæ pro scipionibus, quibus gressus titubantes sustinent, quarum varia genera apud Doct. Paludanum videre est: in hist. Ind. Orient. part. 2. c. 18.

## IV. Arundo Indica versicolor flexilis.

Rota vocant in Bengala, aliud genus ejusdem arundinis, quod gracilius & succinctius est, viminis ad modum flexile, ex quo Calathi & alia muka pulcherrima conficiuntur: ex hist. Ind. Orient. part. 2: cap. 18.

## V. Arundo Indica punicea mollis.

Arundo vel Scirpi potius genus puniceæ coloris & mollis, quam pruritus conkortant, arcti pro

preservo adaptant: nascitur in Regno Congiano, & in regno Bengala ad Gangen fluvium, hist. Ind. Orient. part. 1. c. 5.

VI. Arundo Indica volubilis.

Arundo Indica in Insula Sumatra, variè se circa arbores vinciens, centum, ducentarum, imò trecentarum, & plurium Orgyarum longitudine, ita vt vix ejus origo finisue deprehendi possit, circulis vasarijs cõficiendis, valde accommoda: ad Clusij curas posteriore.

VII. Arundo Indica fluitans.

Trombas sive arundineta fluctuantia in Bali Insula: in hist. Or. Ind. part. 3. c. 2. & 40. & part. 4. fig. 10. pingitur.

Arundines longæ seu Algæ in salo fluctuantes, par. 5. Ind. Or.

II X. Tubuli arundinacei ad Asthma.

Refert Monardis, & ex eo Lugd. hist. ex Hispaniola adferri tubulos cannarum, qui extrinse-

cus & intrinsecus, gummi illiti sunt, quod Tabaci succum esse putant. Addit Clus. incolae Virginæ frequenter vti tubulis quibusdam ex argilla factis, ad Tabaci fumum hauriendum: quales apud Anglos in frequenti usu.

IX. Arundo Indica latifolia.

Canna Indica, Gesl. hor. Clus. hisp. (cui & flos cancri nonnullis,) Cam. Cæs. rubra, Eyst.

Arundo Indica florida, Ad. Lob. & Canacorus quorundam.

Papyrus, Cast.

Gladiolus Indicus, Cam. ad Matth.

Arundo seu Canna Indica, Lugd.

Arundo Indica latifolia sive florida, Tab.

Harundo florida, Ger.

X. Arundo Indica latifolia, flore luteo punctato: quæ 3. in Prod.

Canna Indica lutea rubris maculis punctata, vel flore croceo guttato, Eyst.

## PAPYRVS ET QVÆ pro Papyro usurpantur.

**C**VM Papyrus in Aegypto res sit cognata Arundini, secundum Plin. l. 24. c. 11. imò & Calami chartis serviant, eodem, lib. 16. c. 36. autore: idcirco papyrum, & ea qua in novo Orbe Papyri vicem præbent, subjiciamus.

L. Papyrus Nilotica sive Aegyptiaca.

Papyrus, Diosc. & Theophrasto.

Papyrus, Plinio & Alpino.

Papyrus Aegyptia sive Biblus Aegyptia Eustathio, Guil. pap.

II. Papyrus Syriaca vel Siciliana.

Sari, Theophrasto.

Biblos secunda, Eustachio.

Papyri altera species, quæ Paperus in Sicilia, Guiland.

Papyrus, Cæs. Nilotica, Ad. Tab. Ger.

Papyrus Aegyptia, Penæ, Lugd.

Cum in novo Orbe diversarum arborum folijs & corticibus pro papyro vtatur, hæc nominaretur libet, siquid ad arbores pertineant.

L. Palmeta humilia, Scalig. Lugd.

II. Guaiabara in Insula Hispaniola, ex Oviedo, Lugd.

III. Copey, ibidem apud eundem.

IV. Tal, in provincia Mangi, Lugd.

V. Lantor, palmæ Indicæ genus, cujus folia

virii longitudinem æquant: hist. Ind. Orient. part. 4. c. 3. & 6. & pingitur fig. 15.

VI. Ficus Indicæ folijs & Turcæ vtuntur, hist. Ind. Orient. part. 6. c. 38.

VII. Palmæ, nuces Indicæ Cocos signentis, arboris substantiam plicabilem usurpant: hist. Ind. Orient. par. 4. c. 12.

VIII. Arboris folijs sex brachiorum longis, cujus folio extenso, tres, quatuorve viri, in itinere operiuntur, vt pluvias non metuant: ex Nicolai Costini itinerario, Lugd. histor. refert.

IX. Papyrus ex Iava, est liber arboris tenuissimæ membranæ instar, vt ex Clusij notis, Lugd. hist. proponit.

Papyrifera arbor libro tenuissimæ membranæ instar candido, Clus. exot. l. 1. c. 4.

an Pannus è libro arboris quæ in Insula Tidoræ fœminæ pudenda tegunt, Pigafetta.

X. Arboris liber subpunicæ coloris, Clus. l. cit. qui & Filorum tenuissim: ex arboris

C 2.

corrice



*Genera duo fecit Dioscorides: at Theoph. 8. hist. 4. plura ratione regionum, qua ex locis cognomina sortita sunt: quæ etiam colore & specie, & proprietate inter se differunt: quem Plinius l. 18. c. 7 sequitur. Sic in Lyma Ind. Occident. una Triticis spica, duplo plus Hispanicis spicis fundit: in hist. Ind. Occident. part. 9. additamento.*

I. *Triticum hybernum aristis carens.*  
Triticum, Brunf. 4. Gef. hor. Cord. hist. Dod.  
Tab. five Robus, Colum. Dod. gal.  
Tritici primum genus, Trag. Fuch. Lon.  
Siligo spica mutica, Lob.  
Triticum spica mutica, Lugd. Ger.  
Triticum aristis carens, Cæf.  
Siligo veterum videtur, quam Plinius Tritici delicias vocavit.

II. *Triticum rufum grano maximo.*

Far five Adoreum veterum, Lugd.

III. *Triticum rufum hexastichon.*

Tritici rufi genus aliud, Lugd.

IV. *Triticum spicâ multiplici.*

Triticum ramosum Plinii, spicâ ramosâ, Cæf.

Tritici quinta species, & Gran del graspo, id est, frumentum racemosum, Ang.

Triticum multiplici spica, Lob. ico. Ger.

Ble qui truche, Lugd.

Triticum thyphinum multiplici spicâ, Tab.

Triticum racemosum, Portæ.

Spicis modo paucioribus, modo pluribus, ita ut Matthiolus 24. spicas viderit.

V. *Triticum semine oblongo.*

Long gran Matiscônensium, ad *spisæ* Thraciam

Galenî accedere videtur, Lugd.

Huic congener Frumentû Scourgeon, Ruellij.

VI. *Tritici aristis longioribus spicâ cæruleâ.*

Triticum Loca vocatum alterum, Lob. ico.

Tragus frumenti genus spicâ cæruleâ, Lugd.

Triticum nigrum peregrinum 2. Tab.

Triticum lividum, Ger.

VII. *Triticum aristis longioribus spicâ albâ.*

an Far Gallicum five barbarum genus, Ruel.

Robus five Triticum, in Insularis Gallo-belgis

Loca vocatum, Lob. ico.

Triticum thyphinum, Ger. quartum, Tab.

IX. *Triticum thyphinû multiplici folliculo.*

Typha inter frumentacea, Theoph. Typha, Ga-

leno: Typhæ, Plinio.

IX. *Triticum thyphinum simplici folliculo.*

Tritici tertium genus, Trag. Fuch. Lon.

Triticum, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Typha cerealis, Dod. gal.

Typha Dodonæi, & Typha Fuchij, Lugd.

Triticum aristis circumvallatum, Lob. Ger.

Triticum aristis munitum, Cæf.

X. *Triticum thyphinum simplici folliculo*

Hispanicum.

Triticum thyphinum, Dodon. Lugd.

Triticum aristis circumvallatum, Lobel.

XI. *Triticum sylvestre Creticum.*

Agriostari, id est, Triticum sylvestre grano minore tritico sativo, in Creta frequentiss: Honor.

Belli epist. 5. ad Clusum.

Agriostari, five Frumentum syl. Creticum, Pon.

in Bald: Ital.

## ZEAEIVSQVE SPECIES.

**Z** E A, Ζέα, & Ζέα, quibusdam idem cum ὄλυρα: alijs frumenti peculiaris species, qua Latini *Semen* est: nam & Plinio Zea, *Semen* dicitur l. 18. c. 8.

Duûm generum est Dioscoridi l. 2. c. 111. ἀπλὴ & δικοκκος.

I. Zea Briza dicta, vel Monococos Germâica.

Zea ἀπλὴ, quod simplicis grani sit, Diosc.

Spelta prima, Trag. ico: secunda, Eid. descript.

Zea, Ang.

Zea simplex, Matth. Lac. Cord. in Diosc.

Zea alterum genus, Fuch.

Frumentum locale, Ruell.

Siligo, & Zea alterum genus, Tur.

Briza, Dod. gal. Ad. Lugd. monococcus, Lob.

Ger.

Monococcon, frumentû barbatum, Far venni-

culum rubrum, Col. Zea, Mnesithei fortè, Dod.

Spelta vulgò, Cæf.

Zea species prima, Cast.

Zea monococcus, Tab. minor & monococ-

cos, Lugd.

## II. Zea dicoccos vel major.

Zeia dicoccos, (quoddam grana bina juncta habeat),

Zea Diofco.

Zea, Theoph. & Galeno.

Zea, Brunf. Cord. in Diofco. Lon. Ger.

Spelta prima, Trag. defcri. fecunda, Eid. ico.

Zea dicoccos, Matth.

Zea altera, Matth. Lac. Caft.

Zea primum genus, Fuch. Tur.

Zea, Romanis veteribus Semen, nunc Spelta, Dod. gal.

Zea, vulgò Spelta, Far antiquis: Ador posterioribus, & Semen Adoreum, Dod.

Typha, Ang.

Far primum, Cæf.

Zea major seu dicoccos, Lugd.

Zea ador, Tab.

## III. Zea Amylea, vel Zeopyrum Amyleum.

an Far. halicaftrū trimetrefte cognominatū, Col.

Triticum fecundum, Trag. Fuch. Lon.

Olyra, Dod. gal. Lugd.

Triticum trimetrefte, Cord.

Amylæum frumentum & Far halicaftrū, Dod.

Frumentum vel Triticum Amylæum, Tab.

Triticum amyaleum, Ger.

## IV. Zeopyrum feu Triticofpeltum, quoddam

naturam habeat Ζάρις ἢ πυρρ.

Zeopyrum ἢ πυρρ, Galeno.

Speltæ species tertia, Trag.

Hordeum alterum, Ang.

Zeopyron, Dod. Ad. Lob. Lugd. Tab.

Hordeum glabrum, Cord. hift. hexastichon, hodie hordeum fine tunica, Cord. in Diofco.

Hordeum nudum, Gef. hor. Ger. mundum, Cæf.

Hordeum πυρρ, Cam.

## V. Zeocryton feu Oryza Germanica.

Oryza Germanica, Trag. (cuj & Tragum ce-reale, & candidum far,) Dod. cui & Far Gallicū, & frumenti barbati genus Ruellij videntur,

Olyra, Ad.

Far, Zeufcher Reif/ Caft.

Typha Theophrasti, Tab.

an Far Clufianum, Lugd.

Spelta in Regno Congiano, omnium frumentorum, quæ habent, viliffimum, quo porcos alunt: in hift. Ind. Orient. part. 1. lib. 2. c. 1.

Siligine abundat ex fe Cambaie Regnum: hift.

Ind. Orient. part. 1. lib. 2. c. 1. & Chinæ tellus

feraciffima eft Siliginis, ibid. c. 25. & Japonen-

sifterra siligine m fert, ibid. c. 28.

Siliginis Turcicæ, quæ Milie Abraïn dicitur, pro-

montoriū Viride perfelix: Ind. Or. part. 3. c. 40.

## HORDEVM EIVSQUE SPECIES.

**H**ORDEVM, Κε. ἡ δὲ τοῦ Ἰσχυροῦ, quoddam co reperso & in vsum recepto, glandibus spre-tis, à brutis homines diftincti sunt: antiquiffimum enim in cibū hordeum, ficuti Athenien-iffimū vīcu, Menandro auctore, apparet, & gladiatorum cognomine. (ut Plin. l. 15. c. 7. loquitur,) qui Hordearj vocabantur: nunc studiosos, idiotas fic appellare folent.

Vnius Diofcorid. l. 2. c. 108. meminit: at Theoph. 3. hift. 4. Hordeum aliud rotundius minusq̃, aliud oblongius majusq̃: item aliud candidum, aliud ad purpuram accedens. Hoc, ut & Triticum, in India Occid. femine ex Hispania delato, fecundius & uberius enafcitur, ut habetur in hift. Ind. Occid. part. 9. c. 31.

## I. Hordeum polyftichum hybernū.

Hordeū, Brunf. Matth. Lac. Gef. hor. Lob. Dod.

Lon. Caft. Cæf. Ger.

Hordeum majus, Trag.

Hordeum polyftichum, Fuch. Tur. Dod. gal.

(cui & Hordeum Cantherinum,) Lug. Tab.

Hordeum primum, Ang.

Hordeum fecundum hyemale, Cord. in Diofco.

Polyftichū dicitur quia in multos verfus spi-

catur: eft enim differētia in fpicarū forma, magnitudine & granorū numero: quoddam binos, quoddā ternos, quaternos, quinos, cumq̃ plurimū fenos verfus habet: fic aliud rotundius & minus, aliud oblongū & majus, aliud candidius, aliud nigrius.

## II. Hordeum polyftichum vernū.

Hordeum fenis verfibis, Matth. Cam.

Hordeum Septentrioni notiffimum πολυῖχον,

Lob. obl.

Hor-



*Hordeum polystichon* vernum, Lob. ico.  
*Hordeum polystichum æstivum*, & *Hordeum*  
*trimestre polystichum*, Tab.

III. *Hordeum distichon*: quod spicâ binos  
 ordines habeat, Plinio.

*Hordeum distichon* Galaticum, Columellæ.

*Hordeum Cantherinum*, Ruellio.

*Hordeum minus*, Trag.

*Hordeum distichum*, Fuch. Tur. Dod. Cord.

in Diosc. Lob. Lugd. Tab. cui & æstivum & tri-  
 mestre minus.

*Hordeum binis versibus*, Matth. Cam.

*Hordei alterum genus*, Cæf.

IV. *Hordeum Causticum*.

Orzada ex Hispania nova, Monardi, Cæf.

*Hordeolum* Monardis, Lugd.

Cevadilla, id est, *Hordeolum*, Monardi & Frag.

*Causticum* est, solū ppter similitudinē huc relatu.

## SECALE SIVE ROGGA

*eiusq; species.*

**S**ECALÉ, monense Plinio l. 18. c. 16. etiam Farrago appellatur: nonnullis Rogga: & duplex est, rationis tempore & magnitudine distinctum.

I. *Secale latifolium*, in Prod. descriptum.

II. *Secale hybernium vel majus*.

Siligo, Brunf. Lon. veterum & secale, Trag.

*Secale*, Matth. Dod. gal. (quibusdam Farrago, non tamen est vera Farrago, quæ nil aliud est quam *Hordeum*,) Fuch. Lob. Tab. Ger.

*Secale* & *Farrago* Plinij, Lugd. Cæf.

Olyra, Cord. in Diosc.

*Rogga* sive *secale* Plinij, Dod.

*Tipha cerealis* & *Tipha* Theophrasti, Portæ.

III. *Secale vernum vel minus*.

Siligo æstiva, Trag.

*Secale alterum*, Lugd.

*Rogga* sive *secale æstivum*, Dodi.

Illud lætius, hoc gracilius, culmis paucioribus, spicâ breviorē & tenuiorē.

IV. *Secale luxurians*.

Clavi siliginis, Lon.

*Secalis mater*, Thal. tit. de Gramine.

An Plin. l. 18. c. 17. de hoc intelligendus, dum

scribit: Inter vitia segetum & luxuria est, cum

onerata fertilitate procumbunt: alij volunt

Plinium intelligere id, quod Theophrast. 8. hist.

*ουλαμασιν*, insanam foliorum luxuriam, vocavit.

V. *Secale affinis peregrina*.

Nuchani, Garzie.

*Secales peregrinum genus*, Lugd.

## AVENA EIVSQUE SPECIES.

**A**VENA, Βρώμος Dioscoridi l. 2. c. 116. forsitan à Βρώμα, quod cilum significat: nam ut autor est Plin. l. 18. c. 17. Germæa populi huius pulste virunt. Theoph. 4. hist. 6. ex Zea Avenam fieri scribit: at Plin. l. c. Avenam primū frumētis vitium esse, & Hordeū in eam degenerare, refert.

I. *Avena vulgaris seu alba*.

*Avena*, Brunf. Matth. Fuch. Dod. Tur. Ama.

Lac. Lon. Ad. Cæf. Tab. Lugd.

*Avena sativa* & prima, Trag.

*Avena vesca*, Ad. Lob. Ger.

*Avena frumentum*, Cord. in Diosc.

*Avenæ prima species*, Ang.

*Avena mitior & sativa*, Cæf.

II. *Avena nigra*.

*Avena altera*, Ang.

*Bromos*, Ama.

*Avena sylvestrior nigra*, Cæf.

III. *Avena nuda*.

*Avena nuda*, Ad. Lob. Dod. Tab. Ger.

## VSTILAGO.

**V**STILAGO, frugū, præsertim spicatarum, maximè *Avena* & *Secales*, morbus est. Theoph. 8. hist. 10. de frugum vitij agent, scribit, quadā cōmunia esse omnibus seminibus, ut epurū Gr. id est, Rubigo, sicut Gaza vertit: quadam verò propria quibusdam, ut Tabitudo radicis, Cetri & Erucarum infestatio. Sic & 3. causar. 27. Rubiginis, & Plin. l. 18. c. 17. meminere.

I. *Vstila-*

I. *Vstilago secales.*  
*Vstilago*, Trag. Dod. (cui *Avenæ* ac *Tritici* propriè morbus) Lon. Lob. Lugd. (cui præsertim *Avenæ* pestis est.)  
*Vstilago secalina*, Tab.  
 II. *Vstilago hordei.*

*Vstilago polystichi*, & *Vstilago hordei dysichi*, Lob. ico.  
*Vstilago hordeacea*, Tab.  
 III. *Vstilago Avenæ*: & Lob. ico.  
*Vstilago Avenacea*, Tab.

## ORYZA.

**O**RYZA *Dioscoridi* l. 2. c. 117. *Ὠρύζην Theoph.* 4. hist. s. *Oryza* *Plin.* l. 18. c. 7. ex qua *Psisanam* fieri scribit. Per *Psisanam* aliqui intelligunt *Oryzam*, qua vulgò cortice nudata venalis habetur.

I. *Oryza Italica*, ad differentiam Germanicæ, de qua inter Zeas.  
*Oryza*, Brunf. Matth. Ang. Tur. Cord. in Diosc. Lac. Dod. Lob. Lon. Cæs. Cast. Cam. Tab.  
*Oryza peregrina*, Trago.  
*Oryzam*, frumentacearum generi, Diosc. inter legumina, Galenus recenset, Lugd.  
*Hordeum Galaticum Columellæ*, Hærmolaus, Ruel. Amat. & Tab. censuere.

II. *Oryza Indiæ Orientali* peculiaris.  
*Oryzæ* peculiare genus, Regina Patensis, Hollandis obtulit, ut habetur in Ind. Or. par. 8. sed quid? *Oryzam* ex India originem traxisse, & per univærsam ferè orbem disseminatam esse, in 6. part. Ind. Orient. scribitur. Hæc præcipua omnium Indiæ Orientalis locorum annona est, part. 3. Ind. Orient. c. 39. Hinc Indis loco panis est, ex ea placentas parantibus; ex

qua in China potum faciunt, quem in Peru Aquam vocant: in Iaponia vinum, quod Iavenses Aracle nominant: & in Pegu, Aquam extrahunt, quæ cum aqua vitæ certat: part. 7. Ind. Orient. c. 36.

Distingunt in *Oryzam* optimam, quâ Girasol, & in viliozem, quam Chambasol Indi vocant. Linscot. par. 2. Ind. Or. c. 37. & par. 4. c. 6. In summa, *Oryzæ* usus, universis præ nationibus, non minus quàm frumentum familiaris est: ut de China, Iaponia, Philippinis, & maxima Indiæ Orientalis parte fileam, etiam per Africam & Aethiopicam univærsam, Indiamq; Occidentalem, cibus vîtatissimus est. Sic & Europæi, qui panes ex frumento habent, *Oryza*, obsonij vice, cum lacte aut aqua decoctâ, utuntur.

## FRUMENTVM INDICVM.

**E**TSI in Canaria frumenti varia genera habeantur: attamen possissimè apud Indos quadruplex est: Primum, Milium Indicum: secundum Mays, quod *Triticum* ipsorum est: tertium, quod Manigette indigetant: quartum est *Oryza*, quæ in Regno Congiano Mazza di Manipo, id est, semen Lusitanicum, at Malaicensis Bras appellant: & tres posteriores species delineata in 6. parte historia India Orientalis figura 14. proponuntur.

I. Frumentum Indicum seu Milium Indicum. Milium hoc spicas habet oblongas, ex granulis colore semen Cannabis æmulanubus, compositas, formâ nonnihil oblongis, utriculis sive folliculis aristis æquæ longis inclusis instar Displaci herbæ, quod trium mensium spacio succrescit: dein abscinditur, in terram mensis spacio deponitur, ut Solis calore probè exiccetur

& percoquantur: tandem spicæ à culmis refecantur, in fasciculos collectæ domum deportantur, stramine operiendis, vel muniendis ædificijs, destinato. Hoc frumenti genus optimum est, quod fractum & comminutū, candidissimum apparet, ex quo facili labore panis pinfitur, cum admodum molle sit, & attritu statim, malum. conficiendis panibus aptam, præbeat. Et hoc fru-

huc frumenti genus, semper habuerunt, etiam ante Lusitanorum adventum: hist. Ind. Orient. part. 6. cap. 30.

An semen, quod Congiani Lucum vocant, cannabis grana, nisi quod paulo sit majus, refertur, quod molâ manuaria, subactum & pistum, panem præbet candidum, tritico non inferiori, hist. Ind. Orient. part. 1. l. 2. cap. 1.

An Arundinis genus granum ferens, nostro Secali aut frumento simile, quod decoctum esui est aptum: Insulæ Virgineæ historia.

II. Frumentum Indicum grano avellanæ magnitudine.

Folia habet angusta & tenuia, sed in tantam altitudinem, quemadmodum tertium, non exurgit: ex ramis frumentum illud instar nucum avellanarum dependet, quod aristas habet cum Tritico sive Mays convenientes, colore rubicundo: grana cute tenella involuta, putaminibus includuntur, & peculiaribus quasi loculis, ad modum granorum in malo Punico, ab invicem distincta: seminatur in agris, quemadmodum frumentum verum, potissimum in Africa, & quidem in peculiari quodam loco, qui nomen etiam suum inde obtinuit: & Aethiopes

Manigette; Batavis, Grain dicitur: part. 6. Ind. Or. cap. 38.

III. Frumentum Indicum Mays dictum.

An Triticum Bastrianum Plin. l. 18. c. 7.

Frumentum Arabicum, quod Mays nominant, in hist. Ind. Orient. part. 8.

Frumentum ex Guinea, ibid.

Triticum Indicum sive Mays, quod Lusitani apud Nigritas primo seminarunt: in hist. Ind. Orient. part. 6. c. 31.

Pagatowr, Virgineæ indigenis.

Avati fructus, ex quo Brasiliiani potum Kaawy coquunt: Stad. par. 3. Amer. c. 17.

Milium amplum, Triticum Sarracenicum, barbaris Avati, quod idem cum Indorum Mays, & Triticum Peruanum, Lerio part. 3. Amer. c. 8.

Milium Abrayn, id est, Siligo Turcica in Baly. par. 3. Ind. Or. c. 40.

Frumentum Asiaticum: par. 7. Ind. Occid.

Milium Brasilianum: par. 3. Amer.

Milium in florida: par. 6. Ind. Occid.

Differentia notanda, cum duo genera, ad sex vel septem pedes, tertium ad decem in Virgi-

nea excresecat. Sic alterum crassius & rotundius, ut quod è Lucanistollitur: alterum subtilius & aridius, quod Morochen appellant.

Granum hoc magni proventus est (bis enim Martio & Iunio ferunt: part. 2. Ind. Occid.) cum in Peru ex vno grano 600. gignantur: at in Virginea mille & quinquaginta, & interdum bina millia reddat. Siquidem spica vel vna, vel binæ, ternæ, vel quaternæ, & singulæ spicæ quinquies, sexies, & septies centena grana in Virginea contineant: apud Americanos, singuli culmi tribus quatuorve spicis onusti adsunt, quarum singulæ, grana centum & amplius pendunt. Sic grana alba, rubra, flava, cærulea, in Virginea sunt.

Frugum omnium communissimum Indiæ Occidentalis locis, in Peru, nova Hispania, Guatimala, Chile, & universa terra firma, in Insulis vero non item: sic & in Indiæ Orientalis aliquibus. Hoc Indi communiter cum primo commiscunt: & ex hoc solo panem Arepas nominatum, & potum Chicha (potus subacidulus Cici dictus: par. 9. Ind. Occid. addit.) Indis vocatum; ut fortissimum, quod in Peru Sora dicitur.

An hæc herba quæ in Brasilia aliquando senes virilia contingunt, cujus folia duorum digitorum latitudine, paulam incurva, in longitudinem excresecant, veluti calamus qui spicam Milij sive Tritici Sarracenicæ contegit: Lerio in Brasil. cap. 7.

Hactenus ex hist. Indica: subjiciamus recentiorum nomina.

Turcicum frumentum, Trag. (cui & Typhamagna) Fuch.

Frumentum Indicum, Matth. Lon.

Milium Indicum Plinianum, Ruell. Gef. Ad. Lob. cui & Mays Occidentalium.

Milium Indicum, Dod. (cui & frumentum Asiaticum,) Tur. Lac. Gef. cat.

Frumenti octava species Turcicū dictum, Ang. Triticum Bastrianum sive Indicum, Cord. hist. Gef. hor.

Frumentum Turcicum, Dod. Gef. hor. (cui & Panicum peregrinum rectius,) Tab. Ger.

Triticum Indicum Fuchsij & Matth. Lugd.

Maizum, Monardj.

Maiz, triticum Indicum potius, quam frumentum Turcicum dicendum, cum non ex Asia,

D

sed in-

sed India primum sit astatum, Cam.

Maiz Indorum, Panicum Indicum, Cæs.

Mays, quod nulla specie cum Milio, quod Plinius ex India in Italiam importari scribit, convenit, Joseph. Acofta hist. Ind. l. 4. c. 16.

Variat apud nos floris colore, purpureo, rubeo, luteo, aliquando pro ratione fructus futuri: granorum in colore quatuor præcipue genera: habetur enim grans rufescentibus, nigricantibus, crocantibus, & subalbicantibus.

IV. Frumentum Ind. Mays dictū alterum.

Milium Indicum magnum aliud, Lob. ico.

Milium Indicum, Cast.

Frumentum Indicum, Tab.

Frumentum Asiaticum, Ger.

Hoc cum spicarum colore variet, idcirco Tabernæmontanus spicas sedecim, Gerardus ve-

rd 12. pingit: quæ colore sunt vel simplici, vel mixto: simplici, albo, luteo, aureo, violaceo spadiceo, nigro: mixtis colorib', albo, spadiceo: & cæruleo: cæruleo, albo, nigro, partimq; punctis spadiceis mixto: albo, violaceo, luteo cum punctis spadiceis: rubro, nigro & spadiceo: luteo albo, aliquando cæruleo & violaceo, aliquando luteo & albo, violaceis & cæruleis punctis asperis: rubro & spadiceo: aureo & albo: cæruleo, luteo, albo, & punctis cæruleis asperis: deniq; cæruleo, luteo, violaceo & albo.

V. Frumentum Indicum Mays dictum minus. Hujus Tabern. meminit, quod prioris altitudinem tantum mediam attingat, cujus spicæ non ad culmorum latera, sed floribus succedant, colore albo, rubeo, spadiceo, luteo, atrorubente, & aliquando mixto.

## MILIVM EIVSQUE SPECIES.

**M**ILIVM, à miliari summa Festo, quasmillesimum granum seras, Κέχυρος Dioscorid. lib. 2 cap. 119. & Theoph. 8. hist. 3. à numerosissimis & minutis granis siccum, quæ Κέχυραμίδες vocantur. Hippocrati secundum Galenum πάσπαλος. Milium, Plin. lib. 18. c. 7.

I. Milium semine luteo vel albo.

Milium, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Tur. Dod.

Cord in Diosc. Lac. Lon. Lob. Cast. Tab. Lugd.

Milium Dioscoridis, Theophrasti & Plin. Cæs.

Milium vulgare, Gef. hor. Ad. commune, Ang.

Milium aureum & album, Cam.

II. Milium semine nigro.

Milij nigri species apud Oribasium, Ang.

Milium semine nigro & latiore juba, Lob. obs.

Milij alterum genus è colore nigro deterius, Cæs.

Milium jubâ subinde coloris nigricantis, Dod.

Milium nigrum, Tab. Cam. Ger.

Hoc quod in Argovia Bernatū frequenter fitur, à vulgato differt folijs latioribus, caule non adeo alto, jubâ sparsâ & minore, semine aliquantū majore & rotundiore, & ad pulres conficiendas altero longè vtiliore.

III. Milium Sabæum.

Millo, trumentum in Guinea parvum, Milij forma, sed dulcius, ex quo panem & vinum conficiunt in Regno Sabo: ad Clus. curas post.

IV. Milium arundinaceum subrotundo semine, Sorgo nominatum.

Milium quod ex India in Italiam inventum nigro colore, Plinio.

Panicum Dioscoridis & Plinij, Trag.

Milium Indicum, Matth. Fuch. ico. ( cui & Sarracenicum, ) Gef. hor. Cord. hist. Guiland.

Lugd. Cast. def.

Milium Indicum Plinij, Ang. Cam.

Milium aliud, Ama.

Panicum Indicum, Gef. hor.

Sorghij, Fuch. Dod. gal. ( cui Panici species videtur, ) Lon.

Sorgum, Gef. hor. Tab. ( cui & Panicum locale, ) Ger.

Sorgo, Melica Italicorum, Lob. Sorgo Insubrum, Bellonio.

Melica sive Sorgum, Dod.

Melica, fortè à Meline: Sagina alijs à saginando, Calamagrostis Dioscoridis ex hoc genere videtur, Cæs.

Variat seminis colore, quod aliàs rufum, aliàs plenius nigricat: habetur & album & luteum, quod

Sorgum fructu rubro & fr. albo, Eyft.

V. Milium arundinaceum plano alboq; semine.

Sorgo simile granum, Hareomen Arabum, Bellonio.

Dora, Rauvvolfio.

Milium Aethiopicum, Portæ.

an Mi-

an Milium album in Regno Congi, quod Maz- hist. Ind. Orient. part. prim. libro secundo,  
zadi Congo, id est, semon Congianum vocant, | cap. primo.

## PANICVM EIVSQVE

## species.

**E**λμος & μέλιη Dioscoridis lib. 2. cap. 120. Theoph. 8. hist. cap. 1. 3. 7. & 10. μέλιος. Ελ-  
μος, forsan ab ελῶν involuo. Plin. lib. 18. cap. 7. Panicum, à paniculis quibus semen inest.  
Mel frugum Diosc. eidem lib. 22. cap. 25. μέλιον, quasi melleum quidpiam.

I. Panicū Germanicū, sive paniculā minore  
Miliū agreste sive exiguum, Trag.  
Panicum, Fuch. Tur. Dod. Cord. Gef. hor.  
Lon. Lob. Cæf. Cam. Tab. Ger.

Variat paniculis albis, flavis & purpureis: se-  
men album, luteum, rufescens: Dioscorides  
frumentaceis, Gal. leguminibus jungit.

II. Panicū Italicum, sive paniculā majore.  
Panicum Marullo, Hermolao, Ruellio, Mat-  
thiolo, cui & domesticum: Anguil. Cæf. Portæ.  
Panicum fatium, Lugdunensi.  
Panicum vulgare, Clus. hist.  
Panicum aliud Indicum, panicula villosa, Lob.

Panici Indici spica, Dodon.  
Panicum Indicum, Tab. Ger.

III. Panicum Indicū spica obtusa cærulea.  
Panicū cæruleum Insc. Ad. Lob. ico. Cam. Tab.  
Panicum Indicū Dod. Ger. sive peregrinū, Lug.  
Panicum Americanum, Clus. hist.

Panicula est subcærulea, in calidioribus regi-  
onibus magis satūra.

IV. Panicum Indicum spicā longissimā.  
Panici Americani spica grandis vel sesquipedā-  
lis, Clus. hist.  
Panicum Aethiopicum ex Guinea, Clus. hist.  
ap. ad l. 6.

## DE SESAMO ET ERYSIMO

## Cereali.

**C**um Dioscorides & Theophrastus Sesamum inter fruges retulerint: & Plin. l. 18. c. 10. fru-  
menta astuta dixerit, Sesama, milium, panicum: sic & Erysimum in Asia & Græcia, Se-  
samo simile ascerat: & Theophrastus 2. caus. plant. 17. semina hæc, milium, sesamum, erysimum  
inter fruges reposuerit: & 6. caus. plant. 19. Sesama & Erysimum sicca cibo idonea, non vero vi-  
ridia scripserit, de utroq. nunc.

Sesamum & Sesama similiter Dioscoridis l. 2. c. 121. Theoph. pluribus locis σήσαμον, alijs ση-  
σάμον dicitur. Duplex Theophrastus agnovisse videtur, dum 8. hist. 5. inquit, Et Sesami genus  
quoddam candidum dicitur.

## SESAMVM VETERVM.

Sesamum, Matth. Ang. Tur. Lob. Dod. Cast.  
Tab. Portæ.  
Sesamum verum, Cord. in Diosc. Gef. hor.  
Lugd. Cam.  
Sesama, Cæfalp.  
Sempsem, Alpino.

Semen ex Alexandria, Creta, Sicilia affertur.

## ERYSIMVM

Theophrasti folio hederaceo, τραχύφυλλον ἢ πυ-  
γύφυλλον, hircio-triticum & fagi-triticum, quod  
legineam glandē forma triquetra & colore sor-

dido quodāmodo referat, licet multo minus sit.  
Ocymum veterum, Trago.  
Frumentum Sarracenicum, Matth. Lug. Cast.  
Tragotrophon & Fagotriticum, Dod. gal.  
Erysimi alterum genus Theophrasti, Cord. in  
Diosc.

Frumenti genus folio hederaceo, Eid.  
Formetone, Ang. (cui Ocymū est Varronis) Cæf.  
Frumentum vaccinum, Lonic.  
Erysimum Theophrasti, Lobel.  
Fegopyrron, Dodonæo.  
Ocymum cæreale, Clus. pan. Tab.

Tragopyron, Gerard.

Polygonum hederaceum, Col.

Sarracenicum dicitur, quia ex Africa primum

delatum credatur: nam veteribus vel non cognitum, vel non usitatum, vel neglectum, Dodonæus asserit.

## PHALARIS.

**P**HALARIS Plin. l. 27. cap. 12. *φάλαρις* Dioscoridi l. 3. cap. 159. an *Melia altera* Theophrasti.

I. Phalaris major semine albo.

Phalaris Dioscoridis, Trag. ico.

Phalaris, Matth. Ang. Tur. Dod. Cord. Gef.

hor. (cui & Canariense semen,) Lon. Lob. Cæ-

salp. Cast. Cam. Lugd. Tab. Ger.

Phalaris herba, Gef. cat.

Milium alterum Theoph. Dalech. in Plin.

II. Phalaris major semine nigro.

Cuneno, Melitensium incolis.

Gratum hoc in Melita frequens, Canarijs insulis familiare, Malsiliæ notum, nigrum, oblongum, milio simile, quo Canarios passeris præcipue nutriunt: ex grano aliquando à Dalechambio fato, Phalaris prodijt.

## SECTIO QUINTA.

### ASPHODELVS, PHALANGIUM.

**A**SPHODELVS sine *Hastula Regia*, quod regis sceptri effigiem, dum floret, referat. *Ἀσφοδελῦν* unius Discor. lib. 2. c. 199. meminit, cuius florem *ἀνθερίων* appellant: & Theophrasti. 1. hist. 10. & 7. eiusd. 11. & 12. qui 1. hist. 7. *ἀνθερίων*, pro tota planta usurpat. *Asphodelum* aliquos *Heroin* appellasse, Dionysium marem ac faminam fecisse, & aliquos *Halymon* Hesiodi existimasse, Plin. l. 22. c. 12. scribit. Sicl. 21. c. 17. testatur, Theoph. & ferè *Gracos* & *Pythagoram*, caulem *Anthericon*, radicem verò, qua ex octuaginta simul acervatis bulbis constat, *Asphodelum* nominasse: cuius genera duos faciunt: quod etiam lib. & cap. 22. ostendit.

I. *Asphodelus albus ramosus mas.*

*Asphodelus primus*, Ang. Clus. hist.

*Asphodelus major*, Clus. hisp. albus, Eyft.

*Asphodelus ramosus*, Lob. ico. Ger.

*Asphodelus caule rãso maritimo* & *mas*, Cæf.

Hic sæpè radicibus ducentis, aut pluribus ab vno capite dependentibus reperitur.

II. *Asphodelus albus non ramosus.*

*Asphodelus*, Marcell. Ruell. Matth. Ama. Gef.

cat. Lon. Cast. verus, Cord. in Dioscorid.

*Asphodelus mas*, Dod. gal.

*Asphodelus alter*, Ang. Clus. hist.

*Hastula regia*, Trag. lat. Lon. Lac. Gef. hor. Lugd.

*Asphodelus albus*, Gef. hor. ap. Clus. hisp.

Dod. Tab. Cam. major, albus, Lob.

*Asphodelus caule simplici*, Cæf.

*Asphodelus non ramosus*, Ger.

III. *Asphodelus autumnalis.*

*Asphodelus autumnalis* five *major*, Cam.

IV. *Asphodelus purpurascens folijs maculatis.*

*Asphodelus flore incarnato pallido*, Dod. gal.

*Asphodelus flore suave rubente*, Lob. ico.

*Asphodelus flore rubente*, Tab. Ger.

V. *Asphodelus luteus & flore & radice.*

*Asphodelus flore melino*, Matth. ico.

*Asphodelus luteus*, Gef. hor. Dod. Cæf. Lugd.

*Asphodel. luteus minor*, Lob. (& *Erizambac Arabum*,) Tab. Lugd.

*Iphyon* Theoph. videtur, Ang.

*Asphodelus fœmina* five *luteus*, Cam. epit.

*Hasta.*

*Haftula regia minor, & Asphodel. minor, Cast.*  
*Asphodelus luteo flore & radice, Cam. Ger.*  
*Meminerè Tabern. & Gerar. Asphodeli lutei,*  
*qui albo, radicibus & floribus sit æmilis, sed folijs*  
*brevioribus, cauleq; latis folijs cincto, quem*  
*Asphodelum luteum nominant.*

*VI. Asphodelus albus minimus.*

*Asphodelus minimus, Clus. hist.*

*VII. Asphodelus folijs fistulosus.*

*Asphodelus tertius aliquibus maritimus, Gesf.*  
*hort. ap.*

*Asphodelus minor, Clus. Dod. Lugd. Cam.*

*Phalangium Cretæ Salonenfis, Lob. Lug. Ger.*

*Phalangij alterum genus, Cæs.*

*Phalangium Narbonense, Tab.*

*IX. Pseudoasphodelus palustris Anglicus.*

*Asphodelus luteus palustris, Dod. Tab.*

*Asphodelus palustris, Lugd.*

*Asphod. minim. luteus acori fol. palust. Lob.*

*Pseudoasphodelus primus vel major, Clus. hist.*

*IX. Pseudoasphodelus palustris Scoticus.*

*Asphodelus minimus Noruegicus luteus palustris*  
*Scoticus & Lancastrienfis, Lob. aduersf.*  
*parte secunda.*

*Asphodelus Lancastræ, Gerar.*

*X. Pseudoasphodelus alpinus.*

*Pseudoasphodelus pumilio folijs Iridis, Clus.*  
*pan. vel secundus, Eid. hist.*

## PHALANGIVM EIVSQVE

### Species.

**Φ**αλαγγίς Diofc. l. 3. c. 122. meminit: sic dictum Galeno, & simpl. facult. quòd demorsus à  
*Phalangijs auxiliatur, cui Φαλαγγίτης, & Plin. l. 27. c. 12. Phalangites, à quibusdam*  
*Phalangium, ab alijs Lencanthemum vocatum.*

*I. Phalangium magno flore.*

*Phalangium, Matth. Cast. majus, Gesf. hor.*

*Phalangium Matthioli, Lugd. Tab.*

*Phalangium Allobrogicum majus, Clus. hist. ap.*  
*2: Eyft.*

*Phalangium Dalechampij, Lugd.*

*Lilium polyrhizon Myconi, Lugd.*

*II. Phalangium parvo flore non ramosum.*

*Phalangites quorundam, Cord. in Diofc.*

*Liliago, Cord. hist. eius Scholiafti, Asphodelus*  
*Germanicus.*

*Liliago Cordi, Asphodeli fyl. species, Thal.*

*Phalangium non ramosum, Lob. Dod. Tab.*

*Phalangio Allobrogico congener, vel Phalan-*  
*gium montanum, Clus. cur. post.*

*Est majus folio lōgiore, & latiore, femine ma-*  
*jore: est alterum in quo omnia minora, & folia*  
*angustiora, in monte VVasserfall: cujus radices*  
 *sæpè pro Rusci veri radicibus, magno errore*  
*dividuntur.*

*III. Phalangium parvo flore ramosum.*

*Moly alterum Plinij, Dod. gal.*

*Moly Plinij, Dod.*

*Phalangites nostrum Gesf. hor.*

*Phalangites sive Phalangium herba, Gesf. hor.*

*Phalang. ramosum, Lob. Dod. Lugd. Tab.*

*Ger. Eyft.*

*Phalangium, Asphodelus parvus dici posset,*

*Cæs.*

*Phalangium majus, Cam.*



## SECTIO SEXTA.

## XYRIS, IRIS, ACORVS, GALANGA,

ZINZIBER, ZEDOARIA, COSTVS, CYRCYMA ET CRO-  
CVS INDICVS.

## XYRIS.

**ΞΥΡΙΣ** ob folij similitudinem, quasi rasorium cultum dicitur, de qua Diosc. l. 4. cap. 22.  
**Ἰρις** ægyptia, Iris sylvestris Theophrasto: Plin. l. 21. c. 20. Iris sylvestris, à quibusdam Xy-  
 rin vocata. Spatula fætida, tum ob folij figuram gladiolum referentis, tam quod gravem odo-  
 rem exhalet, vulgò dicitur.

I. Gladiolus fætidus.

Xyris five Iris sylvest. Dioscoridi.

Sparganium five Xiphidion, Offic. spatula fætida, Ruell. Ama.

Spatula fætida, Trag. (cui & Gladiolus Itali-  
cus.) Fuch. Lon. Gef. hor. Ang. Cæs. Tab. Dod.Xyris, Matth. Lac. Tur. Cord. Cornaro, Lob.  
Cast. Cam. & Ger.

Xyris vel Iris agria Theo. Dod. gal. Ad. Lob. ico.

Xyris Matthioli &amp; Lobeli, Lugd.

Cum Matthioli & Lobeli figura, radice for-  
ma differant, idcirco in historia Lugdunen-  
sibus figuræ positæ: dum enim adhuc juvenca  
est, radicem habet fibrosam seu capillarem: vbi  
verò adolevit, crassa est. Flos communiter ob-  
soletè purpureus: aliquando saturata purpura  
aridet, rariùs rubet.

II. Gladiolus fætidus maritimus.

Xyris maritima, quam fluctus in littora, cum alijs  
purgamentis rejiciunt, Lugd.

## IRIS ET EIVS DIFFERENTIÆ.

**IRIS**, sive Diosc. l. 1. c. 1. à celestis arcus similitudine nomen accepit. Species complures esse,  
 colore floris differentes, idem ostendit, nempe candido pallente, luteo, (alij nigros legunt,) pur-  
 pureo, cæruleo, seu cyaneo. Quamcolorum diversitatem non in uno flore reperiri, videtur Dio-  
 scorides, (vbi aliqui credunt,) voluisse: siquidem de Illyrica maximè loquitur, quam Brasia vo-  
 las in Illyrico plerumq. candidis, aliàs pallidis, nonnunquam luteis & etiam purpureis conspexit.  
 Theoph. 6. caus. 13. Iris odorata est, & à gratiæ palati nomen accepit, qua in Illyride (6. caus. 28.)  
 melior quàm in Macedonia: in Thracia verò, loci, frigidioribus odore penitus caret. Gaza Iri-  
 dis vocem Consecratrixem vertit. Plin. l. 21. c. 7. Iris diversis color (specie flores, sicut & arcus  
 celestis, unde & nomē: laudatissima in Illyrico; proxima in Macedonia, que longissima, can-  
 didans, & exilis: tertium locū habet Africana, qua amplissima & gustū amarissima. Illyrica  
 quoq. duūm generū: Raphanitis, à similitudine, (fortè Astragalites Gal. & Acrij,) qua & meli-  
 or: Rhizoceros subrepta: nō improbatur & Psidica.

Recentiores multas differentias agnoscunt: quare dividemus in eam, qua radice est genicula-  
 ta, & eam qua radice est bulbosa: hæc enim & foliorum latitudine angustius, floriq. colore, &  
 ratione loci natalis variant.

## IRIS LATIFOLIA.

I. Iris vulgaris Germanica five sylvestris.

Iris, Brunf. Gef. cat. sylvestris, Matth. Lac.  
Cord. hist. Cast. Lugd. Tab. sylvest. prima, Advers.

Iris syl. major, Marth. ep. Gef. hor.

Iris Germanica, Fuch. cærulea, Dod.

Gladiolus cæruleus major, Trag.

Iris latifolia major vulgaris, Clus. hist.

Iris biflora, Ger. ico.

Hæc est quam in testorum culminibus, vi-  
nea-



nearum materijs & muris plantare confue-  
runt, quæ in hortos translata, cultura speciosi-  
or redditur.

## II. Iris hortensis latifolia.

Iris Germanica, Trag. domestica, Matth. Lac.  
Cast. Lugd.

Iris, Tur. Ang. Dod. Cord. in Diosc. Lon. Tab.

Iris communis, Gef. hor. vulgaris, Lob. Ger.

Iris nostra sativa, Cord. hist.

Iris, Hyacinthus Virgilij Columellæ & Palladij,  
Ang. Cam.

Iris major cærulea, vel purpurea, Cam.

Iris latifolia vulgaris cærulea, Eyst.

## III. Iris hortensis pallidè cærulea.

Iris cuius flores aquæ cyaneum colorem refe-  
runt, Dod.

Iris dilutè cærulea involucri albo, Tab.

Iris Chalcedonica, Ger. ico.

Iris latifolia maior obsoleta, Clus. hist.

## IV. Iris hortensis alba Germanica.

Iris albo flore, Gef. hor. alba, Tab. Ger.

Iris vulgaris candidis floribus, Lob. ico, Lugd.

Iris candida, Dod. sub Iride altera.

## V. Iris alba Florentina.

an Iris Africana Dioscoridis?

Iris sativa floribus nivei coloris, Matth.

Iris Florentina seu fœmina, Gef. hor.

Iris Florentina, Ireos officin. Dod. gal. Lon. Ad.  
Tab. Ger.

Iris Illyrica, Cord. in Diosc.

Iris flore ex toto candido, Cæsalp.

Iris major alba, Illyrica vulgo vel potius Flo-  
rentina, Cam.

Iris latifolia major alba, Clus. hist.

Hæc Florentina à Germanica differt, quod  
huius radix siccata, non secus ac vulgaris cæru-  
leæ, corrugatur: illius verò non, quæ etiam ra-  
dice minore est: in officinis nostris Illyrica ha-  
betur, quæ Venetijs adfertur, quæ rufescit,  
minùs nitida est, at odore est suaviore.

## VI. Iris Illyrica.

Iris Illyrica, Eyst. quæ à Florentina aliquan-  
tum differt, quod huius flos candidissimus sit,  
cùm Illyrica sit coloris dilutè cærulei pallefcen-  
tis & odore remissiore.

## IRIS LATIFOLIA PERE- grina major.

I. Iris Sufiana flore maximo ex albo ni-

gricante.

Iris Sufiana, Clus. pan.

Iris Chalcedonica variegata, Lob. Tab.

Iridi luræ variegatæ in Lug. hist. jungitur.

Iris Camerarij, Ger. ico.

Iris latifolia major prima, Clus. hist.

Iris Chalcedonica latifolia, Eyst.

Iris Pharaonis, vel nigra Cretica quibusdam.

## II. Iris Asiatica cærulea polyanthos.

Iris Asiatica cærulea, Clus. pan. five latifolia  
major 2. Eid. hist.

Iris Dalmatica major, Lob. ico. Lugd. Tab.  
Ger. ico.

## III. Iris Asiatica purpurea.

Iris Asiatica purpurea vel 3. Clus. pan.

Iris latifolia major 5. Eid. hist.

## Huc referantur

Iris latifolia violaceo colore major, &

Iris latifolia major variegata, Eyst.

## IV. Iris peregrina subrubens inodora.

Iris major latifolia sexta, Clus. hist.

## V. Iris peregrina odore oxyacathæ.

Iris major latifolia 24. Clus. hist.

## VI. Iris Dalmatica major.

Iris Dalmatica major, Clus. hisp. vt Lob. Tab.  
Ger. quoad descript. & Chalcedonica 2. Tab.  
icon.

Iris major latifolia 3. Clus. hist.

an Iris Lusitanica verna, Lob.

## VII. Iris Byzantina purpureocærulea.

Iris major latifolia 18. Clus. hist.

## IX. Iris Damascena polyanthos.

Iris major latifolia 4. five Damascena, Clus.  
hist.

## IRIS LATIFOLIA GERMA- nica & Pannonica.

I. Iris latifolia Germanica odore suavi.

Iris major latifolia 7. Clus. hist.

II. Iris latifolia Germanica odore Sambuci.

Iris major latifolia 8. Clus. hist.

III. Iris latifolia Germanica ochroleucos.

Iris major latifolia 18. Clus. hist.

IV. Iris latifolia Germanica candido pur-  
purea.

Iris major latifolia 21. Clus. hist.

V. Iris latifolia odore oxyacanthæ:

Iris exotica, Camer. vel Iris 5. Clus. pan.

Iris major latifolia 14. Clus. hist.

VI. Iris latifolia Pannonica colore multiplici.  
Iris va.

*Iris varia caulifera*, vel *Iris* 4. Cluf. pan.

*Iris major latifolia* 15. Cluf. hift.

*Iris Pannonica* 4. Clufij, Tab.

*Iris lutea variegata*, Ger. icon.

VII. *Iris latifolia alba viridis*.

*Iris major latifolia* 16. Cluf. hift.

IX. *Iris latifolia caule aphylo*.

*Iris* 7. & *Iris caulifera purpurea* 1. & 2. Cluf. pan.

*Iris major latifolia* 25. & 26. Cluf. hift.

Variat: in illa, folia circa caulem minus, in hac, magis purpurascunt.

IX. *Iris latifolia candida*, purpureis uens distincta.

*Iris major latifolia* 27. Cluf. hift.

*Iris Portugalica*, Eyflet.

#### IRIS LATIFOLIA

Belgica.

I. *Iris latifolia Belgica* odore Sambuci.

*Iris Lustitanica verna*, Lob. quoad icon.

*Iris latifolia major* 9. Cluf. hift.

II *Iris latifolia Belgica uersicolor* odore Sambuci.

*Iris major latifolia*, Cluf. hift. def. Eyflet.

III. *Iris latifolia Belgica* odore Sambuci altera.

*Iris latifolia major* 11. Cluf. hift.

IV. *Iris latifolia Belgica variegata*.

*Iris major latifolia* 12. Cluf. hift.

V. *Iris latif. Belgica cærulea uersicolor*.

*Iris major latifolia* 13. Cluf. hift.

VI. *Iris latifolia ex albo pallescens striata*.

*Iris major latifolia* 17. Cluf. hift.

VII. *Iris latifolia humilior purpurea*.

*Iris maior latifolia* 19. Cluf. hift.

IX. *Iris latifolia humilior uersicolor*.

*Iris maior latifolia* 20. Cluf. hift.

#### IRIS BIFLORA.

I. *Iris biflora flore minore*, odore lilij conuallij.

an *Raphanitis* Plinij: & *Astragalites* Aetio.

*Iris biflora*, Cluf. hisp. Lugd.

*Iris biflora Lustitanica*, Lob. Dod.

*Iris latifolia major* 22. Cluf. hift.

II. *Iridi bifloræ affinis flore majore*.

*Iris Illyrica*, uel *Iris* 6. Cluf. pan.

*Iris major latifolia* 23. Cluf. hift.

an *Iris Byzantina*, Camerarij, huic similis?

III. *Iridi bifloræ affinis minor*.

*Iris Dalmatica minor*, Cluf. hisp. Lob. Lugd.

*Iris latifolia major* 18. Cluf. hift. quoad icon.

#### IRIS LATIFOLIA

Lutea.

I. *Iris lutea satua*.

*Iris satua floribus aureis*, Matth.

II. *Iris lutea variegata* Lobelij.

*Iris lutea variegata*, Lob. Lugd.

III. *Iris lutea variegata Camerarij*.

*Iris variegata à luteo & purpureo*, Cam.

Duplicem habet, aliam folijs languidis, aliam crenatis.

#### Hinc referenda.

*Iris Pannonica* variegata, Eyflet.

Flos ex purpura flauescit, & lineis purpurascens, tibus distinguitur.

IV. *Iris media longissimis folijs lutea*.

*Iris Tripolitana media inter latifolias & angustifolias*, Cluf. hift.

#### IRIS ANGVSTIFOLIA.

I. *Iris pratensis angustifolia folio foetido*.

*Iris angustifolia media*, Cluf. hisp.

*Iris angustifolia major*, sive prima, Cluf. hift.

*Iris folijs angustis prima* Clufij, Eyflet.

II. *Iris pratensis angustifolia nō foetida altior*.

*Iris angustifolia media*, sive *Iris angustifolia*

*Pannonica uario flore*, & *Iridis vndecimæ species prior*, Cluf. pan.

*Iris syluestris Byzantina peramœna*, Lob. ico.

& Ger.

*Iris vndecima* Clufij, Camer.

*Iris tenuifolia*, Thal.

*Iris angustifolia altera*, Cluf. hift.

*Iris pratensis major*, Eyflet.

III. *Iris pratensis angustifolia humilior*.

*Xiphion*, seu *Gladiolus cæruleus minor*, Trag.

*Iris tenuifolia*, Cord. hift. Ges. hor.

*Iris minor* seu *tenuifolia*, Dod.

*Pseudoacorus cæruleus* Tragi, Lugd.

*Iridis vndecimæ altera species*, Cluf. pan.

*Iridis angustifoliæ secundæ species altera*, Eid.

hift.

*Xyris minor*, Camer.

IV. *Iris angustifolia maritima major*.

*Iris maritima Narbonensis*, Aduerf.

*Iris syl.*

*Iris syl. maritima Narbonensis*, Lob. ico.  
*Iris angustifolia media*, vel eius prima species,  
 Clus. hisp.

*Iris syl. altera Penæ*, Lugd.

*Iris maritima*, Camer.

*Iris angustifolia* 3. Clus. hist. at r. quoad icon.

V. *Iris angustifolia maritima minor*.

*Iridis angustifoliæ mediæ altera species*, Clus. hisp.

*Iris angustifolia quarta*, Clus. hist.

VI. *Iris angustifolia hortensis versicolor*.

*Iridis angustifoliæ tertia species*, Clus. hisp.

*Iris angustifolia quinta*, Clus. hist.

VII. *Iris angustifolia candida lineis rubentibus notata*.

*Iris candidis floribus angustifolia*, Lob. ad par. 2.

IX. *Iris angustifolia bicolor*.

*Iris flore cæruleo obsoleto cinereoué polyflora*, Lob.

*Iris flore cæruleo polyanthos*, Lugd.

IX. *Iris angustifolia prunū redolens minor*.  
*An Rhizotomos Plinij*.

*Iridis Illyricæ nomine ostensa*, Hermolao.

*Iris perpusilla syl. angustifolia*, Lob. obs.

*Chamæiris angustifolia*, Eid. ico. minor, Tab. Eyflet.

*Chamæiris*, Dod. & Lugd. odoratissima, Cam.

*Iris angustifolia humilior*, Clus. hisp.

*Iris angustifolia minor*, vel 12. Eid. pan.

*Iris peregrina*, Illyrica vulgo, Cæs.

*Chamæiris* vel *Iris humilis*, Cam. in Matth.

*Chamæiris tenuifolia*, Ger.

*Iridis angustifoliæ sextæ species altera*, Clus. hist.

X. *Iris angustifolia prunū redolens major*.

*Iris sylvestris minor*, Matth. Cast.

*Iris syl. altera*, Gef. hor. Lugd.

*Chamæiris angustifolia*, Taber. Ger.

*Iridis angustifoliæ sextæ species prima*, Clus. hist.

*Chamæiris odore carens*, Camer.

#### CHAMÆIRIS.

I *Chamæiris major saturatè purpurea biflora*.

*Chamæiris latifolia biflora*, Eyflet.

II. *Chamæiris variegata*.

*Iris perpusilla latifolia*, Lob. obs.

*Iridis perpusilla latifoliæ varietas*, Eid. ico.

*Iridi humili latifoliæ similis*, Clus. hisp.

*Chamæiris seu alia perpusilla Iris latifolia*, Lugd.

*Iris syl. minor latifolia*, Tab.

*Iris violacea*, Ger. ico.

*Chamæiridis latifoliæ genus 1. cum icone Chamæiridis niucæ Lobelij*, Clus. hist.

Flos ex cæruleo dilutus aut candidus, aut pallens, aut purpureus, aut violaceus: huc pertinet

*Chamæiris cæruleo & violaceo colore*, Eyflet.

III. *Chamæiris flore saturo violaceo*.

*Chamæiris latifolia Pannonica major*, vel *Iris octava*, Clus. pan.

*Chamæiris latifolia major*, addida figura *Chamæiridis latifoliæ flore rubello Lobelij*, Clus. hist.

Flos hujus aliquando purpureus, aliquando eleganter cæruleus est.

IV. *Chamæiris minor flore purpureo*.

*Iris minor*, Dodon.

*Iris violacea parva*, Lob. ico.

*Chamæiris latifolia minor purpurea*, vel *Iridis 9. species prima*, Clus. pan.

*Chamæiris latifolia minor prima*, Clus. hist.

Flos saturationis purpuræ, odoratus: interdum dilutus & inodorus.

V. *Chamæiris minor flore purpureocæruleo*, *Chamæiris latifolia minor cærulea*, vel *Iridis 9. species altera*, Clus. pan.

*Chamæiris latifolia minor 2. Clus. hist.*

VI. *Chamæiris minor flore rubello*.

*Chamæiris latifolia flore rubello*, Lob.

*Chamæiris latifolia minor rubescens*, vel *Iridis 9. species tertia*, Clus. pan.

*Chamæiris latifolia minor tertia*, Clus. hist.

Floris colore variat, purpureo, cæruleo, rubefcente, pallido, albo & vario: est flore odoro & inodoro.

VII. *Chamæiris minor flore variè picto*.

*Chamæiris latifolia minor septima*, Clus. hist.

IX. *Chamæiris flore purpureo flavescere*.

*Chamæiris latifolia minor octava*, Clus. hist.

Eyflet.

Huc referri debet

*Chamæiris flavo & purpurascente flore*, Eyflet.

IX. *Chamæiris flore pallido & albo*.

*Chamæiris latifolia minor*, vel *Iridis 9. species*, Clus. hist.

cies 4. Clus. pan.

Chamæiris latifolia minor 4. Eid. hist.

Huc similis est

Chamæiris latifolia minima, Eyf.

X. Chamæiris minor flore variegato.

Chamæiris latifolia minor varia, vel Iridis 9.

species 5. Clus. pan.

Chamæiris latifolia minor 5. Eid. hist.

XI. Chamæiris flore luteo, vel candido.

Iris minor lutea, Dodon.

Chamæiris lutea altera, Lob. ico.

Chamæiris nivea, aut candida, Eidem.

Huc pertinet

Chamæiris flore argenteo & flore candido, Eyf.

XII. Chamæiris flore obsoleto pallido.

Chamæiris latifolia minor sexta, Clus. hist.

XIII. Chamæiris flore pallide luteo.

Chamæiris latifolia minor nona, Clus. hist.

XIV. Chamæiris minor flore purpureo.

Chamæiris latifolia minor 10. Clus. hist. Eyf.

XV. Chamæiris candicans venis varijs distincta.

Chamæiris latifolia minor vndecima, Clus. hist.

XVI. Chamæiris saxatilis Gallica.

Iris perpusilla saxatilis latifolia acaulos ferme, Adver. & Lob. ico.

Iris pusilla sylvestris, Cæsal.

Iris perpusilla & saxatilis, Lugd.

an Iris *ænaular*, Camer.

Variat: altera flore est purpureo & radice odorata: altera flore pallido, radice inodora.

XVII. Chamæiris latifolia saxatilis Lusitanica.

Iris humilis latifolia, Clus. hisp.

Iridis aliud genus humilius, Eid. hist.

## ACORVS.

**A**\*ΚΟΡΟΣ, quia τὰς κόρας, id est, pupillis sive aciei oculorum caliginose medeatur, dicitur, de quo Dioscorid. l. 1. c. 2. Meminit Plin. l. 25 c. 13. Acori Iridis folijs, radicibus nigris: quare cum & Dioscoridis & nostra, sit radicibus albicansibus, candidaq; commendetur, de hac Plinius intelligendus non est.

I. Acorus verus, sive Calam. aromat. Officinarum.

Acorus, perperam Calamus aromaticus officinarum, Manardo, Trag. Matth. Cord. Gef. Ad. Lob.

Calamus aromaticus vulgo, Amato, Mundellæ, Cæsal.

Acorum, Lon. Cam. Tab. Ger. Eyf.

Acorum legitimum, Clus. hisp. verum, Lugd.

Calamus noster, Iridis species, Ang.

II. Acorus adulterinus.

Iris in maritimis nascens, à Theophrasto & Plinio improbata.

Acorus, Brunf. Cord. hist. Lac. Cæf.

Acorus falsa, Cord. in Diosc. Gef. hor. vulgo, Cæf.

Acorum adulterinū, Trag. falsum, Matth. Cast. Gladiolus luteus lilijs, Er. Cord. luteus, Fuch. ico. Lon.

Acorum officinarum, Fuch.

Acorus nostras, Ruel. palustris, Ad. Lob.

Acorus luteus falsus, Lugd.

Gladiolus aut Acorus falsus, Tur.

Gladiolus aquaticus, Ama.

Iris lutea, Dod. gal. Cord. hist.

Iris palustris lutea, Tab. Ger.

Iris agrestis, Gef. cat.

Pseudoiris, Dod. palustris, Eyf.

Butomon, Clus. hist.

III. Acorus adulterinus Aquitanicus.

Acorus Aquitanicus, Ad.

China spuria, Acori effigie, Lob. ico.

## GALANGA.

**C**VM Galanga, quibusdam Acori, nonnullis Iridis species videatur, & minor à recensioribus Græcis Cyperus Babylonica nominetur, huc omnium optime referri posse cen sumus, Græcis recentioribus γάλαγγα, Arabibus Galingian dicitur.

I. Galan-

**I. Galanga major**, Matth. Cord. hist. Ad.  
 Lon. Lob. Cæf. Lugd. Tab.  
 Galanga crassa, Ama.  
 Galangam, Schoenanthi radicem, volunt Monachi in Mesuem.  
 Acorus veterum, Iconiceno & Brassau.  
 Acorus seu Galanga major, Fuch. comp. Corn.  
 Galanga crassior, Costæo.  
 Lancuaz Iavanensibus apud quos crescit, Linsc. par. 4. Ind. Or. c. 39. & tab. 18.  
 Iridis genus, Clusio in Acoftam.  
 Galangam Garzias ab Orto & Acofta proponunt: quos secuti sunt Durantes & Lugdun.  
 Historia: an eadem sit cum nostra Galanga ma-

jore, Clusius dubitat.

**II. Galanga, & Galanga minor officinarum.**  
 Galanga, Ruel. Brassav. Mund. Gels. cat. Officin. Cæf.  
 Galanga minor, Matth. Cord. hist. Fuch. comp. Corn. (cui & Cyperus Babylonica,) Ad. Lon.  
 Lob. Acoftæ. Lugd. Tab. Ger. Linsc. part. 4. Ind. Or. cap. 39.  
 Galanga Indica, Ama.  
 Galanga tenuis, Costæo.  
 Lavandou Chinenfibus, apud quos nascitur, Linsc. l. c.  
 An Dioscorid. l. 2. c. 189. per Piperis radicem intellexit?

## ZINZIBER EJVSQVE Species.

**ZINZIBER**, cum folia Iridis & siliquam aliquatenus Xyridi similem habeat, de eo hic *Agendum: quod Diosc. l. 2. c. 190. Ζιγγιβερις; Galeno & Orisbasio Ζιγγιβρις dicitur: Plin. l. 12. c. 7. Zimpiberi, & Zingiberi habet.*

### I. Zingiber.

Zingiber & Zingiber, Herbarijs.  
 Zingiber, cypero cognata herba, Cordo.  
 Acofta pingit latissimis folijs, cum tamen ei Lacrymæ lobi folia tribuat, vt & Monardes: at Adversaria, arundinaceis folijs, & rectius Lobelius in suo de Balsamo libello: hæc fecere, vt dubius essem, diversa ne forent. Accedit, quod Autor. 6. part. hist. Ind. Orient. c. 38. scribat, primò tenuioris arundinis speciem præ se ferre: & mox subiungit, crescere etiam velut Gladiolus: sic Swertius in suo Florilegio, folijs & flore Iridis pingit,  
 Zinziber flore albo facie Iridis nominans.  
 Radices conditæ ex India Or. adferuntur, Mo-

narde monente; in nova Hispania & in Cuba copiose provenit, vt Ioseph. Acoft. l. 3. c. 23. scrib.

Reperiuntur apud Aromatarios, radices albæ & rubentes: hæ rubricæ, illæ sæpe cretâ infectæ, quò à teredinibus, cui candidiores & molliores magis obnoxia, præservetur: hæ Zingiberis albi, illæ rubri nomine, ab Amato donantur.

### II. Zingiber fuscum.

Zingiber intus fuscum, Cord. hist.  
 Mechin & Zingiber fuscum Officinis, Ad.  
 Zingiber fuscum, Lugd.

### III. Zingiberi affinis cortice squamato.

Mechini rara varietas, Ad. Lob. ico.  
 Mechinum Penæ, vel Mechinum rarius, Lugd.  
 Doronicum Arabum, Ponæ.

## ZEDOARIA EJVSQVE Species.

**ZEDOARIA** subiungitur, quia folijs & Zingiberis, sed maioribus, longioribus, & latioribus, vt & radice, & in Calecut Zingiber sylvestre dicitur, Garzias auctore: à Iavanensibus, apud quos in Sundi copiose provenit, Canior nuncupatur. 4. part. Ind. Or. c. 7. Sunt qui veterum Arnabo, & Zarnabum, & Zarnabet Arabum esse velint: recentioribus Græcis, Zaidæga, quam duplicem faciunt, longam & rotundam. Costus Syriacus Dioscoridis videtur.

### I. Zedoaria longa.

Zedoaria & Veterum Arnabi altera species

longa radice, Cord. hist.

E 2

Zedoa-

Zedoaria radice longa, Clus. in coroll.  
 Zedoaria Officin. Zerumbeth sive Zurumbeth,  
 Avicennæ & Serapionis, Dod.  
 Zedoaria, seu Costus Arabicus, Ang.  
 Zadura, vel Zaduar, Ges. cat. Ruel. Fuch. comp.  
 Zedoaria vulgaris, Guil.  
 Zedoaria Officin. Lob. vulgè appellata, Cæs.  
 Zedoaria Arab. Zurumbeth, aroma Zingiberi  
 simile, Græcis prætermisum, Ama.  
 Zedoaria, aliquibus Costi species Diosc. Frag.  
 11. Zedoaria rotunda.  
 Zurumbethum, Cord. hist.  
 Zedoaria Arabum, Guil.  
 Zedoaria quæ rotunda est, Clus. in coroll.  
 Zedoaria loripes, Costæo in Mesuem.  
 Zerûbeth & Zedoaria rotunda, Ang. Fuch. com.  
 Zedoaria rotunda, quæ Avicennæ Antora, Lon.  
 Zerumbeth Serapionis, Lob.  
 Zerumbeth, Iavanensibus Canior, Linsc. par. 4.

Ind. Or. fig. 26.

Hæc à priori alia ratione non differt, quam  
 forma, & ejusdem radices partes esse dicimus,  
 quemadmodum Lobelius, & hist. Lugd. figura  
 proponunt: quare utraq; indifferenter vti pos-  
 sumus, Conditur etiam Saccharo, & Zingiberi  
 præfertur.

III. Zedoaria tuberosa nigricans.  
 Zerumbeth Serapionis, Clus. in Garz. Lob.  
 (quod cum rotunda junxit,) & Lugd.  
 Zadura & Zedoaria, Cast.

IV. Zedoaria Geiduar dicta.  
 Geiduar Avicennæ, Garziæ & Lugd.  
 Gedwar, Clus. in exot. austario.  
 Zedoaria vera Garziæ, Cæs.  
 Sambaya Malays, Geiduar Chinenfibus, part.  
 4. Ind. Or. c. 8.

Hanc Veronà à Iohanne Ponæ insigni Phar-  
 macopœo accepimus.

## COSTVS EIVSQVE Species.

**C**ostus sequitur, cum eius species una Zingiberi similis sit, & initio Zingiberis sylvestris no-  
 mine vendiderint, Adversar. autoribus momentibus.

Tōu Kōu species tres Diosc. l. 1. c. 15. proposuit: Arabicum, qui albus est: Indicum, qui niger  
 & levis: Syriacum, qui gravis buxi colore. At Plin. lib. & cap. 12. duo fecit genera: nigrum, &  
 quod melius, candidans. Theoph. 9. hist. 7. Costum solum nominat, & quidem inter ea, quæ ad  
 unguenta apta sunt. Officina, in dulcem & amarum dividunt, cum tamen Galeno omnis Co-  
 stus amarus sit: at Alimariu, Arabes secutus, Costi dulcis meminit. Verum hæc radix cum re-  
 cens est, nullius amaritudinis particeps est, candidiorq; persistit: cum autem vetustate corrumpi  
 incipit, amaritudinem & nigredinem contrahit.

I. Costus Arabicus Dioscoridis.  
 Costus albus seu Arabicus, Cord. hist.  
 Costus verus, Valerando.  
 Zingiberis effigie Costus Arabicus & Syriacus:  
 non tamen genuinus costus est, Ad.  
 Costi quoddam genus, Zingiberis radicibus si-  
 mile, Clus. in Garz.  
 Costus Arabicus, Cam. in Matth.  
 Costus Arab. & Syriacus, Lugd.  
 Cyperi Indi potius, quam Costi species, Co-  
 stæo in Mæ. At Paludanus notis in 4. par. In-  
 diæ Or. c. 39. Syriacum ab Arabico distinguit,  
 quatuor sibi esse genera scribens, Indicum  
 nummum, Arabicum & Syriacum, cum genere

quarto alio, quod Zingiberi simile sit.

II. Costus Iridem redolens.  
 Costus Garziæ, Acoftæ Fragoso.  
 Costus Indicus, Ama. Clus. in Garz. Tab. Lug.  
 Costus facie radices centaurij majoris, Lob.  
 Costus Lusitanicus, Cam. in Matth.  
 Costus Indicus, Malays Puchō dictus, quo no-  
 mine pingitur in 4. par. hist. Ind. Or. tab. 20.

III. Costus corticosus.  
 Costus Moluccensis corticosus rugosus, Ad.  
 Lob. ico. Lugd. historia sub vno titulo & hunc,  
 & sequentes 4. & 5. posuit.

IV. Costus lignosus.  
 Cost. Moluccis lignosus fervidior, Ad. Lob. ico.  
 Costus

**Costus Moluccanus, Tab.**

V. **Costus effigie radice Solani furiosi, Ad. Lob. ico.**

**Costus alter peregrinus, Tab.**

VI. **Costus amarus Officinarum, seu Helenium Comagenium Dioscoridis.**

**Helenij Comagenij radix, Cord. in Diosco.**

**Costus Comagenius adulterinus officin. Lob. ico.**

**Costus officinarum amarus, Lon. Cast. Tab.**

**Costus officin. adulterinus, Lugd.**

VII. **Costus dulcis officin. centauro magno cognatus.**

**Costus dulcis officin. Lon. sed adulterin. Tab.**

**Costi Pharmacopolarum species major, Cam.**

in Matth. lit. D.

**Costus dulcis, Cast.**

IX. **Costus adulterinus infidus.**

**Costus alter litera B. notatus, Cam. in Matth.**

IX. **Costus Officinarum ingratus, sive Thapsiæ species.**

**Costi vice sæpè venditur & alia radix, per transversum in taleolas secta, crassitudine plerumque manum implens, foris fusca, intus candidans, cortice crasso, substantia rara, gustu acri admodum, & nauseosam salivam ciens, & quasi strangulans; & cum teritur, rancidam pinguedinem olens. Quare non Costus, sed Thapsiæ majoris, montis Gargani radix est, quæ non sine periculo intra corpus sumitur.**

## C V R C V M A.

**Κυπρίς Ινδική Dioscoridi: Indica herba, qua Cyperis vocatur, Zingiberis effigie, Plin. lib. 21. cap. 18.**

I. **Cyperi genus ex India, Matth. Fuch. comp.**

**Cyperus Indicus Diosc. & Curcuma officin.**

**Cord. hist. Clus. corol. Lon. Lob. Cæsal. Tab.**

**Cyperi tertia species, vel Indus, Ama.**

**Curcuma longa & rotunda, Cord. hist.**

**Cyperis Indica, Gél. cat.**

**Cyperus altera, radicè lutea, Cast.**

**Terra merita, Ruel. Ad. Lob. ico. Lugd.**

**Duplex est, radice cõmuniter longa, aliquando rotunda: hæc multò acrior existit, & cum Zingibere sæpè adfertur.**

II. **Crocum Indicum proposuit Garzias, folijs milij maioribus: & Acosta, folijs Orchidis Serapiæ dictæ maioribus latioribusque.**

**Crocus Indici, Acostæ nomine, cum ejusdem fi-**

**gura, in Lugd. hist. proponitur.**

**Radix Zinziberis facie intus flava, Malaice, Cunhet. Linscot. par. 3. Ind. Or. c. 14.**

**Crocus Indicus, Lusitanis Saffran da Terra, planta lilio albo similis, Linsc. par. 4. Ind. Or. c. 3. & 7. cuius figura tab. 13. exhibetur: cui & Curcuma, cap. 8.**

III. **Ganti radix ac Zinziber ex China, qua Indi corpora sua fucant: par. 4. Ind. Orient. cap. 8.**

IV. **Tomon pute, radix Galangæ seu Curcumæ similis est, albicat, & ad illinenda corpora facit. l. c.**

V. **Caxumba, in Bantam Floers, quo in cibus condiendis & vestibis gossypinis tingendis utuntur; par. 4. Ind. Or. 7.**





# LIBER SECVNDVS.

## DE BVLBOSIS.

### SECTIO PRIMA.

#### IRIS BVLBOSA: IRIS TVBEROSA: SISTRINCHIVM: GLADIOLVS ET HYACINTHVS.

##### IRIS BVLBOSA LATIFOLIA.

I. Iris bulbosa latifolia acaulos odora.  
Iris bulbosa latifolia, Clus. hisp. Dod. Lug. Cam.  
Iris bulbosa latifolia purpurea, Swert.  
Hyacinthus poetarum latifolius, Lob.  
Flos vel purpureus, vel cæruleus: interdum  
laſtei coloris.

##### II. Iris bulbosa latifolia caule donata.

Hæc variat floris colore, cæruleo, atropur-  
purante: est & cærulea lineis violaceis, vel pur-  
pureis, sic & cinerea violaceis strijs distincta,  
quas Svertius pinxit, nomine  
Iridis Anglicæ majoris bulbosæ latifoliæ: quæ  
Iris bulb. Anglicæ fl. cæruleo &  
Iris Anglicana major, flore violaceo, Eyft.  
Iridis bulbosæ latifoliæ flore atropurpurante.  
Iridis majoris Francicæ cæruleæ lineis violaceis  
crassioribus ornata, quæ etiam variat.

##### III. Iris bulbosa latifolia candida.

Iris bulbosa Anglicana major fl. candido, Eyft.  
Iris bulb. Anglic. latifolia flore albo, Svert.

##### IV. Iris bulbosa folijs cepaceis maculatis flore purpureo inodoro.

Iris bulbosa, Dodon. Ger.  
Iris bulbosa angustifolia fl. purpureo, Clus. hisp.  
Iris bulbosa violaceo flore, Clus. hist.  
Hyacinthus flore Iridis Theocriti & Poëtarum,  
Lob.

Hyacinthus poeticus Lobelij, Lugd.

Est & flore violaceo, interdum elegantissi-  
mi, interdum dilutioris coloris: est & atroru-  
bens in summo albo: niveo flore in Pyræncis:

aliquando macula flava albo flori adspersitur,  
Clusio in append. altera monente, qui in cu-  
ris posterioribus longè majorem varietatem re-  
cenſet, cùm etiam rubro & purpurascente flo-  
re reperitur.

Huc referendæ quatuor species ex Swertio.

Iris bulbosa flore cæruleo, quæ Iris bulbosa an-  
gustifolia cærulea, Eyſtettensi.

Iris bulbosa flore atropurpurascente.

Iris bulbosa flore albo.

Iris bulbosa flore cinericeo.

##### IRIS BVLBOSA ANGUSTIFOLIA vericolor.

I. Iris bulbosa angustifolia tricolor odore  
coriandri.

Iris bulbosa angustifolia flore vario, Clus. hisp.  
Lugd.

Iris bulbosa Lusitanica, Dodon.

Hyacinthus Poëtarum Hispanicus, Lob.

Iris bulbosa flore vario, Cam. Ger.

Iris bulbosa 3. sive vericolor, Clus. hist.

Variat flore latiore & radice brevi binis  
plerumq; floribus: altera flore angustiore ra-  
dice oblonga: vtraq; dilutioris aut saturatoris  
coloris.

##### II. Iris bulbosa angustifolia tricolor.

Iris bulbosa varicolor, Clus. hist. qui sub clasſe  
secunda species quinq; floris colore variantes  
proponit.

1. Trium foliorum inclinatorum labra flava  
sunt, maculâ aureâ magnâ in labro reflexo in-  
signita, ad quam venæ purpurascentes excur-  
runt;



tent: at trium incumbentium dorsum & alæ pallent, latera candicant: tria erecta albicant, venis subcæruleis saturatoribus vel dilutionibus distincta.

2. tria inflexa pallent labro flavâ maculâ notato, internè quibusdam venulis purpurascens distincta: tria ligulam tegentia albicant, vel Ochri colore sunt: tria surrecta exalbida, nervo flavo excurrente.

3. flore est latiore, brevior, ternis folijs inflexis latis, & propendente labro, aureâ maculâ insignito, & alio orbe cincto, per oras crispo, cærulei coloris, nervo extrinsecus virente, intrinsecus pallente, venis purpureis in latera excurrentibus: at tria gibba purpurea sunt, gibbo albicante, alis cæruleis: tria erecta ex cæruleo purpurascunt.

4. tria reflexa flava sunt, maculâ aureâ in labro, à qua venæ dilutius purpurascens sparguntur: folia incumbentia exalbida, nervo pallido diuisa: tria surrecta inferius cæruleo purpurascens venis distincta, superne candicant.

5. terna inflexa lactei coloris, aureâ maculâ labro impressâ: folia incumbentia & terna erecta alba, & circa vngues subcærulea.

III. Iris bulbosa versicolor *πολύχρωμος*, Clus. hist.

Variat binis, ternis, quaternis floribus.

#### IRIS BULBOSA LV- tea inodora.

I. Iris bulbosa lutea inodora major.

Iris bulbosa angustifolia luteo flore, Clus. hisp. Lugd. Eyflet.

Iris bulbosa 3. luteo flore, Dod. 4. five lutea, Clus. hist.

Hyacinthus poetarum luteus, Lob. Lugd.

Lirium mas, aut Lirium verum Dodonæi, Lug.

Iris bulbosa lutea, Tab. Cam. Svert.

Iris bulbosa flore pallido, Ger.

Invenitur latiore aliquantulum, saturatiore & magis rutilante aureo colore, radice item brevior & crassior, vaginula sanguineo colore infecta: alia dilutioris flavi coloris, vaginula sanguineo colore carente: & aliæ adhuc differentia occurrunt, Clusio notante.

Huc pertinet

Iris bulbosa pallido colore five, luteo pallescente, Eyflet.

Iris bulbosa lutea mixta, Eiusdem.

Iridis bulbosæ luteæ varietates quatuor, Lobelius in advers. parte altera recenset.

II. Iris bulbosa lutea inodora minor.

Iris Mauritanica, Clus. cur. post.

#### IRIS BULBOSA LV- tea versicolor.

I. Iris bulbosa lutea versicolor major & elatior. Iridis bulbosæ versicoloris, vel flavivariæ classis tertiæ prima, Clus. hist.

Iris bulbosa lutea varia, Lob. ad. par. 2.

II. Iris bulbosa lutea versicolor latif. elatior. Iris bulbosa flava varia septima, Clus. hist.

III. Iris bulbosa lutea versicolor latiflora humilior quadruplex.

Iris bulbosa flavivariæ classis tertiæ 2. 3. 4. & 8. Clus. hist.

Primæ, terna folia inflexa flava sunt maculâ aureâ insignita, purpureis venis internè distincta: folia gibba purpurascunt: hæc 2. est Clusio.

Alterius folia reflexa flava sunt cum aureâ maculâ, & qua parte gibbosis integuntur venis obsoletè purpureis distincta: tria surrecta ex cæruleo purpurascunt, nervo flavo per longum excurrente: tria incumbentia obsoleta, quibus flammei quid permixtum est: hæc 3. Clusio.

Tertiæ, folia inflexa pallida, aureâ maculâ insignita, quæ camerato folio integuntur, venis purpurascensibus distinguuntur, folia gibba purpurascunt, tria erecta cærulea sunt: hæc 4. est Clusio.

Quartæ, folia recurva flava sunt aureâ maculâ notata, internè purpurascensibus radijs distincta: folia gibba purpureocærulea, gibbo ex purpura flavescens: folia erecta, cærulei purpuræ permixti coloris: hæc 8. est Clusio.

IV. Iris bulbosa lutea versicolor angustiflora elatior, quæ duplex est.

Iris bulbosa varia classis tertiæ 5. & 6. Clus. hist.

Primæ, folia reflexa flavescunt, maculâ aureâ labro insignita, at incumbentia candicant, nervo eminentiore *αχρυσίνω*: folia erecta exalbida infernè subcæruleis venis distincta. Altera media est inter 2. & 3.

Huc referatur

Iris bulbosa angustifolia lutea mixta, quæ flore est pallidè flavescens, venulis purpureis disseminatis, Eyflet.

V. Iris

V. Iris bulbosa lutea versicolor angustiflora humilior triplex.

Iris bulbosa flavovaria, clasisis tertiæ 9. 10. & 11. Clus. hist.

Primæ folia reflexa labris sunt longioribus & pallidioribus, oris purpurascens, macula aurea longiore insignita, incumbentibus internè purpurascens: nervo carnei coloris externè ex viridi pallescentibus: & folia gibba purpurea, gibbo dilutior: folijs surrectis purpura saturatiore nitentibus.

Alterius folia reflexa labro sunt pallescente, flavo macula in radios desinente infecta: parte angustiore foris virescente, internè venis viridibus prædita: folia bifida, exalbida, gibbus pallescens: folia erecta alba, nervo circa vnguem pallescente.

Tertiæ folia inflexa alba, flavo macula insignita, incumbens purpurascens: tria erecta purpurei sive violacei coloris sunt.

VI. Iris bulbosa lutea versicolor, inter latifloram & angustifloram media.

Iris bulbosa flavovaria 12. Clus. hist.

IRIS BULBOSA CÆRULEA:  
cæruleo varia: violacea alba.

I. Iris bulbosa angustifolia cærulea tilia odore.

Iris bulbosa 5. sive cærulea, Clus. hist.

II. Iris bulbosa cærulea minor.

Iris Hispanica cæruleo purpurea, Swert.

III. Iris bulbosa cæruleo purpurascens vario flore.

Iris bulbosa versicoloris 13. genus, Clus. hist.

IV. Iris bulbosa cæruleo violacea.

Iris bulbosa flore cæruleo & purpureo, Eystet.

Huc pertinent ex horto Eystettenæ

Iris bulbosa variegata.

Iris bulbosa mixta.

Illi flor purpuroviolaceus, medio luteus: huic è cæruleo albicans, aureus & ex albo pallescens.

V. Iris bulbosa angustifolia violacea.

Iris bulbosa violacea Pyreneæ, Lob. ad. part. 2.

Iris Anglicana violaceo flore, Eystet.

Huc refertur

Iris bulbosa angustifolia fl. albo, Eyst.

Refert Clusius in altera appendice, se à Ioachimo Venerio admonitum, se in Pyrenæis Iridis bulbosæ varia genera observasse, & viginti sex generum descriptionem fecisse, at Iridem quæ flauum aut rubrum florem haberet, in illis montibus non reperisse: sed inter multas myriades, eam quæ cæruleum sive violaceum florem gerit, vnicam plantam reperisse, quæ florem prorsus niveum haberet.

IRISTUBEROSA

Iris tuberosa folio anguloso.

Hermodactylus verus, Matth. Lugd. Tab.

Iris tuberosa, Dod. gal. Lugd. Lob. Eyst.

Iris bulbosa præcox, Clus. hist.

Lonchitis major, Cast.

Lonchitis prior Diosc. Aldroando.

Satyrion, Cæs.

Iris tuberosa obscure viridi colore, Swert.

## SISTRINCHIUM.

**Σ**ισυρίγγιον Theoph. l. 7. hist. 13. hoc peculiare habet, ut una radix, primo augeatur hyeme, tum incune vere, quod in imo excreverit, contrahatur, supremumq. crescat, quod manditur. Sic quoq. Plin. l. 19. c. 5. sifynrichio hoc mirum, imas eius radices crescere hyeme, verno autem tempore minui & contrahi, tum deinde bulbam pinguescere: Non solum sullo pabulo bulbosa atq. carnosæ radices aptisædo, sed planta huius, formæ rostrata, rostro sullo similis nominis (ut rectè doctissimus Fab. Columna) causa fuit.

I. Sifynrichium majus flore lutea macula notato.

Sifynrichion maius vel primum, Nofelha Hispanis, quasi nucula auellana, Clus. hisp.

Sifynrichium majus, Dod. flore cæruleo, Scwe.

Hyacinthus Pœticus Hispanicus gemino gladioli reticulato bulbo, Lob. obs.

Sifynrichium Cordi & Clusij, Lob. ico.

Sifynrichium, bulbi esculenti genus, Lugd.

Flos coloris est cærul. luteis macul. aspersis.

II. Sify-

II. *Sisyrinchium flore alba macula notato.*  
*Sisyrinch. Mauritanicum, Clus. in app. 1. & cur.*  
 post.

Flos purpureæ dilucioris alba macula insignitus.

III. *Sisyrinchium medium.*

*Sisyrinchium minus, Dod. Clus. hisp. Lugd. Svvert. Eyst.*

*Sisyrinchion Theoph. & parva Nofelha, Lob.*

IV. *Sisyrinchium minus latifolium.*

*Sisyrinchium alterum latifolium, Colum.*

V. *Sisyrinchium minus angustifolium flore majore variegato.*

*Sisyrinchium Asprensium angustif. alterum, Colum.*

VI. *Sisyrinchium minus angustifolium.*

*Sisyrinchium Theoph. Colum.*

VII. *Sisyrinchium Persianum.*

Flos *Perficus Sisyrinchio* congener, Clus. hist.

## GLADIOLVS.

**G** *LADIOLVS, à foliorum forma, Dioscoridi l. 4. c. 20. Ἰκθὺς & φάρμακον dicitur. & Gaza apud Theoph. 7. hist. 11. & 12. Ensem vertit. Plin. l. 25. c. 11. & 26. c. 8. Xiphion & Phasion nominat.*

I. *Gladiolus maximus Indicus.*

*Gladiolus maximus promontorii Bonæ spei flore rubro incarnato, Svve.*

II. *Gladiolus major Byzantinus.*

*Gladiolus Byzantinus atropurpureus, Svve.*

III. *Gladiolus floribus vno versu dispositis major.*

*Victorialis fœmina, vel Gladiolus syl. Cord. hist.*

*Victorialis rotunda & Gladiolus verus, Gef. hor.*

*Victorialis herba, Lon. rotunda, Eyst.*

*Gladiolus, Dod. Narbonensis, Lob.*

*Xiphion minus, Clus. hist. pan. & rar.*

*Gladiolus nostras, Cam. Germanicus, Tab.*

Variat magnitudine, quibusdam locis major ac procerior: alijs minor & humilior: floris colore purpurorubente, aliquando candicante, qui

*Gladiolus flore albo, Lob. adv. par. 2. & Svve.*

*Gladiolus Narbon. fl. incarnato & fl. purpureo, Eystet.*

*Gladiolus carnei coloris, Svvert.*

*Gladiolus Hispanicus flore albo, Eystet.*

Sic in Narbonensi & Germanico, flores ad vnam caulis partem digesti.

IV. *Gladiolus vtrinq; floridus.*

*Gladiolus, Matth. Dod. gal. (cui & Gladiolus segetalis, & Lingua cervinâ Apuleij) Gef. col. Ang. Lac. Cast. Cæs. Lugd. peregrinus, Cam.*

*Xiphion, Diosc. Gef. ap.*

*Gladiolus vtrinq; floriferus, Dod.*

*Gladiolus Italicus binis florum ordinibus cinctus, Lob.*

*Gladiolus Italicus, Tab.*

*Glad. purpuroviolaceus, Svve.*

Variat flore rubro & incarnato, qui

*Gladiolus Italicus fl. rubro, Eyst.*

V. *Gladiolus angusto gramineo folio: in Prod. descript.*

VI. *Gladiolus floribus vno versu dispositis minor.*

*Gladiolus minimus, Lob. adv. par. 2.*

VII. *Gladiolus palustris.*

*Gladiolus lacustis aut stagnalis Dortmanni, Clus. cur. post.*

## HYACINTHVS ET EIVS

### Species.

**Y** *AKINΘOZ unus est Dioscoridi l. 4. c. 63. at Theoph. 6. hist. 7. duplex, sativus & sylvestris: & vs Plin. l. 21. c. 11. Hyacinthum fabula duplex comitatur, luctum præferens eius quem Appollo dilexerat (Hyacinthum vocatum) aut ex Aiæti crnore editi, ita discurrunt*

*ibus venis, ut Græcarum litterarum figura A. I. inscripta legatur. Duplex Veteres meminere, alter Poëticus, alter Medicus est: illum, aliqui fabulosum vel Poticæum: hunc, historicum seu Medicum vocant: rursus alius Græcorum, alius Latinorum est, Græcorum esse Hemerocalida Diosc. sive Lilium rubrum Plinij, Latinorum, eisdem radice tuberosa, censent, Medicorum verò ab utroq. variat, de quo in præsens.*

## HYACINTHVS COMOSVS.

## I. Hyacinthus comosus major purpureus.

Hyacinthus, Dioscoridi.

Bulbine prima, Plinij.

Hyacinthus quartus & major, & Hyacinthus rubens Virgilij, Trag.

Hyacinthus, Ruel. Matth. Cord. in Diosc. Gef. cat. Port. Cast.

Hyacinthus maximus, Tur. major, Lugd. Tab.

Hyacinthus primus, Ama. Fuch. Gef. hor.

Hyacinthus cæruleus maximus, Fuch. fol.

Hyacinthus cæruleus major mas, Fuch. ico.

Hyacinth. sylvestris, Cord. hist.

Pancratium, Gef. hor. Lac.

Bulbus, Ang.

Bulbi esculenti genus, Dod. gal. Lugd.

Bulbi sylvest. primum genus, quem Pothos Theophrasti, suspicatur, Cæf.

Hyacinthus magnus, & Bulbus Vomitorius, Lon.

Hyacinthus primus Matthioli, Clus. hist.

Hyacinthus Neotericorum sive comosus spurius tertius, Dod.

Hyacinthus comosus major, Lob. Cam. Lugd.

Hyacinthus comosus, Ger. spurius, Eyf.

Variat: alter præcox, latiore folio, coma crassiore, majoreq; bulbo: alter serotinus, angustiore folio, coma tenuiore, laxiore tamen & elegantiore, minoreq; bulbo: Hinc apud Camer. Hyacinthus comosus major sive serotinus & minor sive præcox, & flore communiter purpureo, vel cæruleo purpureo (rarius albo) qui Hyacinthus comosus purpureus, Sver.

## II. Hyacinthus comosus albus Belgicus.

Hyacinthus comosus albus, Lob. Lugd. albo flore, Clus. hist.

Hyacinthus comosus leucanthemos, Cam.

## III. Hyacinth. comosus albus Byzantinus.

Hyacinthus comosus Byzantinus, Clus. pan. & hist. Eyf.

Flores initio cædicantes, cum marcescunt fusci:

vel exterius subfusco obsoleto colore, intus albicantes, ad fundum capillis nigricantibus.

## IV. Hyacinthus comosus Hispanicus.

Hyacinthus comosus major Hispanico semine natus, Clus. pan. & hist.

## V. Hyacinthus paniculâ cæruleâ.

Hyacinthus Sannesius comâ panniculosâ, Colu.

Hyacinthus comosus ramosus nondum descriptus purpureo-laceus, du Bry.

## HYACINTHVS RACEMOSVS.

## I. Hyacinthus racemosus cæruleus major.

Hyacinth. botryoides cæruleus amœnus, Lob. ico.

Hyacinth. botryoides cæruleus major, Tab. Ger.

Hyacinthus botryodes cæruleus, Clus. pan.

Hyacinthus botryoides odoratus, Cam.

Hyacinthus botryoides major, Eyf. ret.

Hyacinthus botryoides major Hispanicus, Sver.

## II. Hyacinthus racemosus larif. speciosior.

Hyacinthus botryodes cæruleus, vel 3. genus, Clus. pan. vel purpureus 3. Eid. hist.

Hyacinthus botryoides incarnatus, Tab. Eyf.

Hyacinth. botryoides cæruleus amœnus, Ger. ico.

Flos dilutioris purpuræ etiam in cæruleum tendens.

## III. Hyacinthus racemosus albus.

Dipcadi candidis floribus, Lob. Lugd.

Hyacinthus botryodes lacteus, Clus. pan. Tab. Ger. albo flore, Clus. hist. Eyf.

Variat floris colore lacteo, niveo, cui dilutissima purpura perfusa: est & tertius floribus ex cæruleo virecentibus: Svertzizine carneo, albo & cæruleo botryoides nomine pingit.

## IV. Hyacinthus uvâ ramosâ major.

Hyacinthus ramosus botryoides cæruleus, Casp. Bauhini: in florilegio du Bry.

## V. Hyacinthus uvâ ramosâ minor.

Hyacinth. botryodes ramosus, Clus. pan. vel 3.

ava

et racemosa, Eidem hist.

VI. *Hyacinthus racemosus cæruleus minor latifolius.*

*Bulbina* Plinij videtur.

*Bulbi* esculenti genus minus, Dodonæo gal. Lugd.

*Hyacinthus cæruleus major*, Fuch. Tur. Lug. femina, Fuch. ico.

*Hyacinthus* 2. Fuchij, Gef. hort.

*Hyacinthus minor*, Lon.

*Hyacinthus botryodes primus & major*, Clus. pan, & hist.

*Hyacinthus botryoides cæruleus*, Eyf.

VII. *Hyacinthus racemosus cæruleus minor juncifolius.*

*Hyacinthus primus*, vel *Hyacinth. vernus* exiguus, Trag.

*Allium caninum* exiguum, Eidem.

*Hyacinth.* Cord. in Diosc. minor, Eid. obs.

*Hyacinth. neotericorum primus*, Dod. flor.

*Hyacinth. racemosus*, Dod.

*Hyacinth. comosus minor*, Lob. obs. Lugd.

*Hyacinthus botryoides vulgaris*, Lob. ico.

*Hyacinth. botryoid. 1. & minor*, Clus. hist.

*Hyacinthus botryoides odoratus*, Cam.

*Hyacinthus botryoides cæruleus*, Ger.

*Hyacinthus cæruleus minor*, vel sextus, Tab.

*Pancreatium alterum* Dodonæi, Gef. cat.

*Bulbine flore cæruleo*, Gef. hor. minor, Eid. col.

*Bulbus sylvest. & Bulbus coronarius* Theoph. Caf.

Variat floribus colore cæruleo, aliis saturato, aliis dilute exalbido, dilute purpurascens; odore apud nos est pruni: at *Tragus* inodorum affert.

IX. *Hyacinthus racemosus moschatus.*

*Bulbus vomitorius*, Marth. Cast. Lugd.

*Muscari*, Clus. Turcarum, Cam.

*Dipeadi Chalcedonicum & Italarum*, Lob. Lugd.

*Hyacinthus spurius recentiorum alter*, Dod.

*Hyacinth. botryoides Chalcedonicus muschatus*, & *Hyacinthus purpureus mag. peregrin.* Tab.

*Hyacinthus neotericorum alter*, Lugd.

*Muscari obsoletiore flore*, Clus. hist.

*Muscari majus obsoletum albo flore*, Eyf.

Flos initio interdum purpurascens, aut viridis:

dein ex purpura vires, aut cum viriditate albicans: nonnunquam subcæruleus: aliquando initio nigricans, sive saturate purpurascens, dein pallidus, vel flavescent; vel ab initio pallidus, postea flauus, postremo pallescens, nigricans, aut pullus; hic & niveo, & egregie rubente, & carneo reperitur; hinc quatuor figuræ apud Svvertium; & in hort. Eyf.

*Muscari flore obsoleto albo & obsoleto nigro.*

IX. *Hyacinthus racemosus moschatus luteus.*

*Dipeadi flauum*, sive *Muscari Constantinopolitanum*, sive *Chalcedonicum*, Lob. ico.

*Muscari flavo colore*, Clus. hist. flauum, Ger. luteo flore, Eyf.

*Muscari Turcarum flore luteo*, Cam.

*Hyacinthus botryoides Chalcedonicus luteus*, Tab.

Nonnunquam flore dilute purpureo, aliquando cæruleo virescente reperitur; ex viridi flavescente, Clus. in ap. alt. notavit.

X. *Hyacinthus racemosus luteus præcox.* *Tipeadi lutei* varietas, sive *Muscari luteum præcox*, Lob. ad part. 2.

Flores initio subcærulei, postea aurei.

#### HYACINTHUS OB- longo flore.

I. *Hyacinthus oblongo flore cæruleus major.*

*Hyacinthus*, Dod. gal. Lugd.

*Hyacinthus Anglicus*, Ad. Ger. Eyf. & Belgicus, Lob.

*Hyacinthus non scriptus*, *Hyacinth. Dioscoridis*, Dod. Lugd.

*Hyacinthus Belgicus non scriptus*, Cam.

*Hyacinth. Hispanicus*, Clus. hist. addit Svvert. flore cæruleo & albo.

Variat floribus colore ut plurimum cæruleo, cæstose: aliquando amethystino vel violæ, nigra dilutam purpuram refert: aliquando carneo, hinc

*Hyacinthus Anglicus colore amethystino: & aliis colore violaceo*, Eyf. &

*Hyacinth. Angl. flore incarnato*, &

*Hyacinth. Ang. cinericeus*: Item

*Hyacinthus Hispanicus flore violaceo, & flore incarnato*, Eyf.

qui Hyacinthus carnei coloris, Svver. item floribus albicantibus, aut candidis, sive niveis, qui

**Hyacinthus Belgicus candidus, Lob.**

**Hyacinth. non scriptus flore candido, Dod.**

**Hyacinthus albus Angliæ, Tab. Ger.**

**Hyacinthus Hispanicus flore albo, Svve.**

**II. Hyacinthus oblongo flore fusco.**

**Hyacinthus Mauritanicus, Clus. hist. ap. 1. & cur. post.**

**Hyacinthus Mauritanicus Clusij, cui flores vicini plures obsoleti, & fusci, Lob. ad. part. 2.**

**III. Hyacinthus obsoleto flore.**

**Hyacinthus obsoletior Hispanicus, Clus. pan.**

**obsoleti coloris Hispanicus serotinus, Eid. hist.**

**Hyacinthus Hispanicus obsoleto flore, Cam.**

**Hyacinth. obsoletior Hispanicus semine compo-  
cesso Pancratij Monspel. maritimi, Lob. ad.  
par. 2.**

**Hyacinthus serotinus maximus, Eyst.**

Variat floribus colore ex purpureo pallido & virescente mixto: sic ex albo cinerei, & ex albicante virescente, Clus. ap. alt.

**Hyacinthus obsoletus Clusij, flore obsoleto viridi, Svve.**

Sic eorum color valde obsoletè spadiceus est, qualis plerumq; ceruis esse solet.

**IV. Hyacinthus obsoleto flore alter.**

**Hyacinthus serotinus obsoleto colore, Eyst.**

**V. Hyacinthus serotinus albicans.**

**Hyacinthus serotinus facie Orientalis, Eyst.**

**VI. Hyacinthus oblongo flore flavo viridi.**

**Hyacinthus obsoletus Aethiopicus, Clus. cur. post.**

**VII. Hyacinthus oblongo flavo flore.**

Hic cum tertio convenit, nisi quod minor, & flos ex sex foliis luteis, aliquando candicantibus compositus est, in cuius medio staminula bina pallida conspiciuntur: in Gallia Narbonensi in summitate pontis Gari perueritur.

**VIII. Hyacinthus oblongo cæruleo flore minor.**

**Hyacinth. minor Hispan. Clus. hist. ap. 2. & cur. post.**

Variat flore cæruleo, albo, interdum mixto, dilutè suaviterq; rubente, (qui Hyacinthus flore rubro ex Lusitania, Lob. ad. par. 2.) venis saturationibus per foliolorum externorum longitudinem excurrentibus.

**IX. Hyacinth. florib. campanulæ vno vel fu dispositis.**

**Hyacinthus totus albus, Campanilla, Lob. ad. par. 2. ex Lusitania.**

**X. Hyacinth. floribus campanulæ vtrinque dispositis.**

**Hyacinthus Neapolitanus, Swer.**

**HYACINTHVS ORIENTALIS.**

**I. Hyacinthus Orientalis caule maculato.**

**Hyacinth. Dioscorid. & Theoph. Ang.**

**Hyacinth. Orient. Matth. Ges. hor. Dod. (cui & minor) Cast. Lugd. Clus. hist. Rauw. cæruleus, Tab. Ger. Eyst.**

**Hyacinth. Orientalis Græcus, Ad. Lob. Lugd.**

**Hyacinthus Constantinopolitanus, Cam.**

**Hyacinthus, Cæs.**

**II. Hyacinthus Orientalis purpureus.**

**Hyacinth. Orient. purpurorubens, Lob. ico. flore purpureo, Cam.**

Variat flore purpureo, purpurorubente: & Swertius

**Hyacinthum Orient. serotin. flore purpureo pingit.**

**III. Hyacinthus Orientalis exalbidus,**

Flores antequam aperiantur albi, aperti oras tantum albas habent, reliqua parte carnei sunt, senescentes toti nivei fiunt, Clus. hist.

Est & alter floribus ex cinereo albis, folijs paulo angustioribus & crassioribus, qui Hyacinthus orient. fl. cinereo albus, Eyst.

**IV. Hyacinthus Orientalis albus primus.**

**Hyacinth. orient. albus, Lob. ico. niveus, Clus. hist. Eyst.**

**Hyacinthus Constantinopolitanus albe flore, Cam.**

Flore albicæte & flore albo, Svverio, qui etiam Hyacinthum facie Orientalis, flore cæruleo & flore albo, &

**Hyacinth. Germanicum flore albo, pingit.**

Flores intus nivei, foris albi, folijs tribus externis ad *ἀχρόλινον* colorem accedentibus: aliquando argentei coloris, qui

**Hyacinthus orient. argenteo colore, Eyst.**

**V. Hyacinthus Orientalis albus alter.**

**Hyacinthus brumalis orientalis Gemmæ, Lug. albus, Lob.**

**VI. Hyacinthus orientalis maximus.**

**Hyacinthus orientalis alter, Matth. Lugd.**

**Hyacin-**

*Hyacinthus Orient. major*, Dod. polyanthos, Ad. Lob. Tab. Lugd.

*Hyacinthus Orientalis polyanthos*, Cluf. hist. Ger.

*Hyacinth. orient. præcox multiflorus cæruleus*, Syver.

*Hyacinthus Orient. major, flore cæruleo vel violaceo*, Eyfl.

Flores sæpe 40. producti.

VII. *Hyacinthus præcox albus*.

*Hyacinthus præcox flore albo* Caccini, Cluf. cur. post.

IX. *Hyacinthus Orientalis latifolius*.

*Hyacinthus Orient. πολυανθ. alter*, Cluf. hist.

IX. *Hyacinthus orientalis variegatus phœniceis caliculis subtus rubentibus: vel floribus antèrius albescentibus, aversâ parte purpurascens*.

*Hyacinthus Orientalis variegatus &*

*Hyacinthus Orientalis mixtus*, Eyfl.

X. *Hyacinthus maximus polyanthos*.

*Hyacinth. Iacobæus altus multis floribus* Italicus, Syver.

XI. *Hyacinthus Orientalis ramofus*.

*Hyacinth. Orientalis πολυανθ. alter*, Cluf. hist.

XII. *Hyacinthus Orient. florum folijs reflexis & variegatis*.

*Hyacinth. orient. reflexis folijs, colore violaceo*, &

*Hyacinth. orient. viol. colore albis lineis*, Eyfl.

Flores purpurviolacei, lineis albicantibus dorsalibus distincti: vel lætè purpurei & ianthini, virgulis obscurioribus signati.

XIII. *Hyacinthus orientalis, caule folioso*.

*Hyacinthus Asiaticus πολυανθ. caule*, Cluf. cur. post.

*Hyacinthus caule folioso*, Syver.

XIV. *Hyacinthus Arabicus, Camerarij, quid?*

XV. *Hyacinthus exoticus flore phalangij*.

*Hyacinth. circa Alepum Ayr dictus, Rauvvollf.*

*Hyacinthus Tripolitanus, Cam. ad. Marth.*

### *Hyacinthus orientalis serotinus.*

I. *Hyacinthus Orientalis serotinus*.

*Hyacinth. orient. serotinus mixtus*, Eyfl.

Florum apices albescent, qua pediculis adherent, rubescunt.

II. *Hyacinth. orient. serotinus floribus erectiscandidis, vel cæruleis*.

*Hyacinth. orientalis serotin. erectis candidis floribus &*

*Hyacinth. orient. serot. erectis cæruleis floribus*, Eyfl.

III. *Hyacinth. orient. serotinus striatus*.

*Hyacinth. minim. serotinus facie Orientalis hyacinthi*, Lob. ad. par. 2. ap.

an *Hyacinth. serotinus minimus cæruleus*, Cluf. hist. ap. 2.

Flos ex cæruleo dilutus, senis venis cæruleis striatus.

### *Hyacinthus orientalis flore pleno.*

I. *Hyacinthus orientalis flore duplici*.

*Hyacinthus fl. duplici ex albo virecente*, Cluf. cur. post.

*Hyacinthus orient. pleno flore subviridi*, Syver.

*Hyacinthus orient. fl. duplici*, Eyfl.

Flores gerit infitos duplices: ex albo virecentes, vel cæruleos, ad pediculum parum virentes.

II. *Hyacinthus orient. fl. cæruleo pleno: & Eyfl.*

III. *Hyacinthus orient. albus multiplici flore*.

*Hyacinthus candidissimus pleno flore*, Eyfl.

### HYACINTHVS STELLARIS.

I. *Hyacinthus stellaris bifolius Germanicus*.

*Narcissus Martius*, Brunf.

*Narciss. cæruleus & Hyacinthus alius*, Trag.

*Hyacinth. cæruleus minor mas*, Fuch. ico.

*Hyacinth. albicans seu femina*, Fuch. Tur. Lug.

*Hyacinthi Germanici liliflori minor species*, Lob. ob.

*Satyrion trifolium*, Dod. gal.

*Bulbus syl. quidam bifolius*, Gef. hor. &

*Hyacinthus seu, Bulbus syl. Eid. col.*

*Bulbus vomitorius*, Lon.

an *Hyacinthus bifolius Theoph. Lob. ico.*

Flore est cæruleo, in alijs colore magis saturo, alijs magis diluto, rarius ad carneum vergente, suaviter rubente: est etiam exalbido, & veluti cinereo, subcæruleo flore: sunt qui & flavos notarunt.

**II. Hyacinthus stellaris trifolius.**

Satyrium erychronium, Dod. gal.

Hyacinth. cæruleus minor, Tur. minor semina, Fuch. ico.

Hyacinth. cæruleus mas minor, Fuch. Lugd.

Hyacinthus Fuchsj, Dod. medius, Lon.

Hyacinth. Germanicus liliflorus stellaris, vel flos Martius stellaris Germanicus, Lob.

Hyacinth. stellaris, Clus. hist. flore cæruleo, Cam. Eyst.

Hyacinthi alterum genus, Cæs.

Priore per omnia maior &amp; triphyllus, qui tamen volet, eundem dicat.

**III. Hyacinthus stellaris albus.**

Narcissus candidus, Trag.

Hyacinthus niveus, Fuch.

Hyacinth. diphyllus Fuchsj floribus candidis &amp; purpureis, Cord. obs.

Hyacinthus stellaris albicans serotinus, Lob. Lugd.

Hyacinthus albicans Botanicorum, Lob. ad par. 2.

Hyacinthus stellaris flore albo, Cam.

Bulbus vomitorius albo flore, Lon.

**IV. Hyacinthus stellatus cæruleus staminibus ex viridi luteis.**

Hyacinthus stellatus Italicus, Eyst.

**V. Hyacinthus stellaris purpureus.**

Hyacinth. stellaris maior, Lob. ad par. 2.

**VI. Hyacinthus stellaris spicatus cinereus.**

Hyacinthus stellaris cineracei coloris, Clus. hist. &amp;

Hyacinthus stellatus æstivus, Eid. cur. post.

Hyacinth. stellatus Byzant. sive exoticus Sommeri, latè depressâ spicâ fastigiatus, Lob. ad par. 2.

an Hyacinthus stellaris cinereus ex Gallacia, Eid.

**VII. Hyacinthus stellaris cæruleus amœnus.**

Hyacinth. stellaris Byzantinus alter elegantissimus serotinus bullatus, Lob. ad par. 2.

Hyacinthus latifolius Dalechampij, Lugdun. icon.

Hyacinthus peregrinus pluribus caulibus præditus, cæruleo violaceus, Sv. ert.

Variat magnitudine &amp; floris colore amœno cæruleo, dilutè cæruleo, quandoq; ex cæ-

ruleo purpurascente, vel violaceo : rarissimè albo.

**IX. Hyacinth. stellaris obsoletè cæruleus, vel major.**

Hyacinthus stellatus Byzantinus, Clus. hist. &amp; Eyst.

Hyacinthus stellatus Byzant. tenuifolius præcox, Lob. ad par. 2.

Huc referendus

Hyacinth. Byzantinus flore cæruleo lacteo, Sv. ert.

**IX. Hyacinthus stellaris cæruleus Aristatus.**

Hyacinthus stellatus Porati, Clus. cur. post.

**X. Hyacinth. stellaris saturè cæruleus.**

Hyacinthus Hispanic. stellato flore, Clus. cur. post.

**XI. Hyacinthus stellaris æstivus cæruleo purpurascens maior.**

Hyacinthus stellatus æstivus, Clus. hist. ap. altera.

Flores sunt subcærulei dilutiores : sic albi, staminibus purpurascensibus.

**XII. Hyacinthus stellaris æstivus minor flosculis alternatim sgris.**

Hyacinthus stellatus æstivus minor, Clus. in auct. ap. alt. &amp; cur. post.

**XIII. Hyacinthus stellaris folijs & radice lilij.**

Hyacinthus stellaris lilifolius, Lob. Lug. Ger.

Hyacinthus liliceus, vel septimus, Tab.

Hyacinth. stellat. *λεπιδόφυλλον*, Clus. hist. & ap. alt. eiusdemq; auctario & cur. post.

Hyacinthus lilifolius flore cæruleo pallido, Sv. ert.

Flores intensè cærulei, sive violacei, rarius nivei.

**XIV. Hyacinthus stellaris autumnalis maior.**

Hyacinthus autumnalis maior, Ad. Clus. hisp. &amp; hist. Lob. Dod. Lugd. (cui &amp; Typhium Theophrasti) Ger.

Hyacinthus stellatus autumnalis angustifolius maior, Eyst.

Aliquando cauliculis est ramosis, &amp; Sv. ertius, exhibet

Hyacinthum autumnalem albo flore.

Hyacinthum flore purpureo pallido.



## Digitized by Google

Bulbus sanatus ex Oriente, Cæf.  
 Cùm Dodonæus in florum hiftoria fictiam  
 figuram pofuerit, idcirco eandem figuram sub  
 nomine  
 Eriophori bulbi cōmentitij, pofuere Lob. Lug.  
 at Cæf.  
 Bulbi eriophori, & Tab. sub Eriophori bulbi  
 altera icone.  
 Ipfe verò Dodonæus edit. poftrema, vtramq;  
 figuram habet; alteram, titulo Bulbi eriophori  
 icon ab amico miffa; alteram, Bulbi eriophori  
 Viennæ nati effigies.

III. Bulbus eriophorus minor.  
 Hyacinthis obfoleto Aethiopico, fubjecit Cluf.  
 cur. poft.

IV. Bulbus marinus crinitus, *τριχάδης*, in  
 hift. Lugd. proponitur, quod fit, ignoramus.

V. Tigridis flos, Dod. Lob. Lugd. Tab.  
 Ocelo Xochiel, id eft, flos Tigridis, novæ Hifpan.  
 five Mexiocanæ Provinciæ, in hift. Mexiocana.

Radicem habet porraceam, folia gladioli, flos  
 ruber egregie, circa medium tamen albus, &  
 inftar pellis Tigridis maculatus: huius veram  
 figuram in Florilegio I. du Bry videre eft.

## SECTIO SECUNDA.

### NARCISSVS: LEVCOIVM: LILIONAR- CISSVS SIVE TYLIPA.

#### NARCISSVS ET EIVS

##### Species.

**N**ΑΡΚΙΣΣΟΣ & λευκίον Dioscoridi l. 4. c. 161. & Theoph. 6. hift. 6. & 7. eiusdem 12. di-  
 citur, non à Narcisso adolescente nimium feipsum adamante, ut Poëta fabulantur, sed  
 à vi stupefaciendi, quam *ναρκωσις* Græci vocant: seu ut Plinius, à narce, quam vim Narcisso  
 inesse l. 21. c. 19. testatur: hinc Plutarcho in Symposio, quasi nervos hebetans & torpidas gravi-  
 tates efficiens, dicitur.

Vnius Theophrastus meminit: at Dioscorides in flore differentiam notat, qui albus sit, in-  
 tus croceus, in quibusdam purpureus, ita ut alius sit *πορφύρεος*, alius *κροκώδης*, Et Plinio l. 21.  
 c. 5. Narcissus aliter flore candido, calyce purpureo: aliter calyce herbaceo; per calycem intelligens  
 quod in floris medio est, nullius Græci auctoris exemplo: & seq. c. 19. Narcissum unum purpu-  
 reo flore, & alterum, herbaceum dixit.

NARCISSVS PORRACEO FOLIO,  
 angusto calyce, latifolius simplex,  
 vno flore.

I. Narcissus maximus pallidus folijs inca-  
 nis.

Narciss. omn. maximus pallid. ad Cluf. cur.  
 poft.

II. Narcissus maximus fl. cæruleo albican-  
 te fimbriâ croco aureâ.

Narcissus maximus mediopurpureus, aut cæ-  
 ruleus latifolius Hispanicus, Eyll.

III. Narciss. albus magno odore flore cir-

culo pallido.

Narcissus 13. medioluteus Poëticus, Tab.

Narcissus mediopurpureus, Ger. ico.

Narcissus latifolius 7. Cluf. hift.

IV. Narcissus niveus odoratus circulo ru-  
 bello.

Narcissus serotinus montanus, Cluf. pan.

Narciss. latifolius 6. Cluf. hift.

V. Narcissus albus circulo purpureo.

Narciss. purpureus, Gef. hor.

Narciss. mediopurpureus, Dod. Lugd. Cluf.  
 par. Eyll.

Nar-

**Narcissus Poeticus mediopurpureus**, Lob.

**Narcissus**, Cast. primus circulo rubeo, Cæs.

**Narcissus** 14. & Poeticus 5. Tab.

**Narciss.** mediopurpureus præcox, Ger.

**Narciss.** latifolius alter, Clus. hist.

Vnum fert florē, raro binos: & huic similem, circulo tamen rubro, in Pannonicis Clusius proponit,

**Narcissum** ferotinum montanum vocans.

**Narciss.** medio rubeus communis, Svve.

V I. **Narciss.** alb. circulo croceo vel luteo.

**Narciss.** Veterum, Trag. candidus, Lon.

**Narciss.** primus, Dod. gal. Cæs.

**Narciss.** italicus flore candido, & **Narcissis** alb. Ges. hor.

**Anemone limonia** Theoph. **Narciss.** cognata, Eid.

**Narciss.** Poet. mediocroceus, Lob.

**Narciss.** Poet. medioluteus Dodonæi, Lugd.

**Narcissus** 10. roseoluteus major, Tab.

**Narciss.** medio purpureus præcox, Ger. ico.

**Narcissus** ferotinus, Svver.

Hic à priori potissimum circuli colore differt, & **Narcissus** Dioscoridis videtur.

Hujus generis tres reperiuntur, forma, colore, aut odore nequaquam, & magnitudine parum, sed florendi tempore, differentes: maiores, medij, præcoces: & serius prodeuntes, minores sunt.

VII. **Narcissus** albus circulo croceo minor.

**Narciss.** minor ferotinus mediocroceus, Lob. ico.

**Narciss.** 16. ferotinus, Tab. minor, ferotinus, Ger.

VIII. **Narcissus** flore cæruleo, Clus. pan.

**Narciss.** cæruleus, solo floris colore à **Narcisso** medio croceo differens, Lob. ad. par. 2.

#### NARCISSVS EXOTICVS.

I. **Narcissus** Indicus totus ruber.

**Narciss.** latifolius octavus, qui & Indicus rubro flore, vel Iacobæus, Clus. hist.

**Narciss.** Indicus rubro flore, Lob. ad. par. 2.

**Narciss.** Ind. flore sanguineo, Svver.

Ex India Orientali adfertur.

II. **Narcissus** ex albo rubescens.

**Narciss.** Gareti, flore albo exteriore parte rubicundo, Svver.

III. **Narciss.** Ind. obtuso latiss. folio bulbo

vastissimo.

**Narciss.** Indicus Orient. bulbo magno & compressiore rotundo, folijs Narcissi, Svver.

IV. **Narciss.** Ind. obtuso latissimo folio alter.

**Narciss.** Ind. Occid. folijs Narcissi latifolij, Svve.

V. **Narciss.** Ind. lato & multiplici folio.

**Narciss.** promontorij Bonæ spei bulbo oblongo, Svver.

VI. **Narciss.** Africanus folijs bifolij.

**Narciss.** African. five **Narciss.** exoticus, Lob. ad. par. 2.

Variat folio acutiore, rotundiore, & complicato; flore est phæniceo.

#### NARCISSVS LATIFOLIUS

simplex pluribus floribus.

#### *Narcissus totus albus.*

I. **Narcissus** albus major odoratus.

**Narciss.** latifolius major, in latifoliorum classe alter, Clus. hist.

Cōmuniter binos, interdum ternos & quaternos flores, ex sex folijs, imò ex duodecim constantes, Clusius notavit.

II. **Narcissus** Orientalis major albus.

**Narcissus** Orient. major polyanthos totus albus, Eyst.

Est latifolius, floribus copiosis albis peramplis, odoratis, tribus staminibus luteis brevibus donatis.

III. **Narcissus** Orientalis medius albus.

**Narciss.** orient. medius totus albus polyanthos, Eyst.

A priori sola magnitudine differt.

IV. **Narciss.** orient. albus calice stellato.

**Narciss.** Orient. albus odoratus calice stellato, Eyst.

Floribus est albis odoratis, in medio stamina auro lutea instar stellæ radiatim disposita.

V. **Narcissus** totus albus major.

**Narcissus** totus albus, Dod. Lob.

**Narcissus** totus albus prior, Clus. hist.

**Narciss.** latif. simplici fl. prorsus albo, Eid. hist.

**Narciss.** albus major, Cam. quintus albus, Tab.

**Narciss.** orient. polyanth. min. totus albus, Eyst.

**Narciss.** medioluteus polyanthos, Ger. ico.

VI. **Narcissus** totus albus major.

**Narciss.** totus alb. alter, Clus. hist.

**Narciss.** latifol. niveus alter, Eid. hist. descr.

G

Nar.

*Narcissus totus albus paucioribus floribus,*  
Lob. ob.

*Narcissus albus minor,* Cam.

VII. *Narcissus niveus.*

*Narcissus latifol. niveus tertius.* Clus. hist.

III. *Narcissus albus flore nuncere lasmini*  
odore.

*Narciss. latifol. niveus tertius alter,* Clus. hisp.

*Narcissus medioluteus.*

I. *Narcissus orientalis albus calice luteo*  
Campanulæ simili maximus.

*Narciss. polyanthos orient. calice medioluteo*  
odoratus maximus, Eyst.

Hujus, vt & duorum sequentium calix, campanulæ instar amplius luteus: flores jucundum odorem spirant.

II. *Narcissus orient. albus calice luteo medius.*

*Narciss. polyanthos orient. medioluteus odoratus medius,* Eyst.

III. *Narciss. orient. albus calice luteo minor.*  
*Narciss. polyanthos orient. medioluteus minor odoratus,* Eyst.

IV. *Narciss. orient. calice aureo pluribus*  
foliolis pleno.

*Narcissus orient. mediocroceus calice pleno,*  
Eyst.

Flos albus, calice aureo pluribus tortilibus  
foliolis pleno.

V. *Narcissus Orient. calice rotundo auro-*  
luteo.

*Narciss. orient. mediocroceus major,* Eyst.

VI. *Narcissus pallidus mediocroceus.*

*Narciss. medioluteus Pisanus,* Lob. ico. Sver.

VII. *Narciss. pallidus medioaureus.*

*Narciss. præcox sulphurei coleris minor,* ad  
Clus. cur. post.

III. *Narcissus albus circulo croceo poly-*  
anthos.

*Narcissus,* Matth. comp. octavus, edit. Ital.

*Narciss. mediocroceus ferotinus polyanthos,*  
Lob. ico.

*Narciss. quart. Matthioli,* Lugdun.

*Narciss. 15. niveus ferotinus,* Tab. totus albus,  
Ger. ico.

*Narcissus,* Castori; quem quinto simplici. flore

junct.

Hic etiam circulo purpureo reperitur, qui  
*Narcissus mediopurpureus,* Eyst.

IX. *Narcissus pallidus circulo luteo.*

*Narcissus mediolut.* Dod. Lugd. Ger. Sver.  
Eyst.

*Narciss. albidus medioluteus,* Lob.

*Narciss. 6. medioluteus 1. Taber.*

X. *Narcissus pallidus circulo aureo alter.*

*Narciss. latifolius 5. uel Narcissus pallido flore*  
medioaureus, Clus. hist.

Meminit Clusius & alterius, cuius flos ex pal-  
lido virefcit, calice angustio flavo.

XI. *Narcissus medioluteus copioso flore*  
odore gravi.

*Narciss. octavus fortè Matth.*

*Narcissus medioluteus,* Ad. Lob. ( cui & Do-  
nas Narbonensium) Clus. hisp. Sver. medio-  
luteus alter, Dod. Lugd.

*Narcissus præcox simpl. flore, vel latifolius sim-*  
plex 1. Clus. hist.

*Narcissus 7. medioluteus 2. Tab.*

*Narcissus alter comofo flore,* Cæs.

*Narcissus Constantinopolitanus minor calice*  
fimbriato, mediocroceus, Eyst.

Variis folijs obtusioribus & acutioribus: sic  
floris colore, qui aliquando sulfureus, sive *oxy-*  
*anthes*; aliquando 10. 12. etiam 18. flores obser-  
vavimus.

XII. *Narciss. medioluteus majoribus florib.*

*Narcissus præcox,* Clus. hisp.

*Narcissus medioluteus alter,* Lob. obf.

*Narciss. latifol. Byzantin. mediolut. 2. Clus. hist.*

Præcocior priore, latioribus folijs, & flori-  
bus majoribus.

XIII. *Narciss. niveus calice flavo odoris*  
fragrantissimi.

*Narciss. latifol. simpl. mediolut. 3. Clus. hist.*

*Narcissus totus luteus.*

I. *Narcissus luteus polyanthos Africanus.*

*Narciss. Africanus flavus polyanthos:* in addit.  
ad Clus. cur. post.

*Narcissus Africanus multiflorus coronatus,*  
Svert.

*Narciss. luteus Africanus major,* &

*Narcissus Africanus aureus major,* Rob.

II. *Narciss. luteus polyanthos Lusitanicus.*

Nar-

Narcissus d' Argiers, aut Aegyptius, Lob. ad. part. alt.

Narciss. de Argiers polyanthos totus luteus. Eyst.  
Narcissus Africanus flore aureo, Svver.

III. Narciss. luteus Constantinopolitanus.  
Narciss. totus luteus ex Thracia, Clus. hisp.  
Narciss. latifol. flavo fl. five 4. Zerincada-cata-  
mer nomine allatus, Eid. hist.

Flos aut omnino luteus, aut pallidus: qui  
pallidus, caliculum planè aureum habet.

IV. Narciss. angustifolius totus luteus.  
Narcissus totus luteus semper florens Caccini,  
ad Clus. cur. post.

Singulis caulisbus ad quindenos flores, idque  
sepius in anno, Florentiæ profert.

V. Narciss. angustifol. flavus magno calice.  
Narcissus 9. qui angustifolius 1. vel Narciss. junc-  
tifolius 1. amplo calice, Clus. hist.

Narciss. maximo calice, flore luteo, Svver. qui  
aliam adjungit

Narcissum oblongo calice, flore luteo.

Narciss. juncifolius præcox major, &

Narciss. juncifolius latiore calice, Eyst.

#### NARCISSVS PORRACEO angusto folio.

I. Narcissus angustifolius albus major.  
Narcisso juncifolio albo flore, junxit Clus. in  
cur. post.

II. Narciss. angustifolius albus minor: qui  
1. in Prod.

III. Narciss. angustifol. pallidus calice flavo.  
Narcissus sulfurei coloris majusculus, ad Clus.  
cur. post.

IV. Narcissus parvus albus fimbria sua ve  
rubente.

Narciss. parvus stellatus albus medio suave ru-  
bente vertice, Lob. ad. par. 2.

V. Narcissus mediocroceus gramineo folio.  
Narcissus mediocroceus tenuifolius, Lob. ad.  
par. 2.

#### NARCISSVS JUNCIFOLIUS simplex, luteus & albus.

I. Narciss. juncifol. oblongo calice luteus  
major.

Narciss. juncifolius prior, Clus. hisp. Lugd.  
Narciss. juncifol. major, Dod. odoratis. Cam.

Narciss. luteus juncifolius vel Africanus præ-  
cox, Lob.

Narciss. 10. angustifol. 2. & juncifol. 1. Clus. hist.  
Narciss. 8. juncifolius 1. Tab. juncifol. præcox,  
Ger.

Narciss. major juncifol. Eyst.

Flores terni, quaterni, quini, interdum ge-  
melli odorati.

II. Narciss. juncifol. luteus minor.

Narciss. juncifol. Dod. flo. Lugd. alter, Clus. hisp.

Narciss. juncifol. min. Dod. Cam. Clus. hist. Eyst.

Narciss. juncifolius ferotinus, Lob.

Narciss. 9. juncifolius 2. Tab.

Narciss. flore luteo, brevi calice, Svver.

Clusius frequentioribus: Lobelius paucioribus  
folijs dicit: vterque eadem figura vititur: vnicus  
aut altero flore flavo & odore.

III. Narciss. juncifol. flore luteo variegato.  
Narciss. luteus albicantibus lineis distinctus, bre-  
vi calice, Svver.

IV. Narcissus juncifol. flore pallidiore, ca-  
lice flavo.

Narciss. juncifol. minor, Clus. hist. ap. & Lob.  
ad. par. 2. minimus Eyst.

V. Narciss. juncifol. flore rotundo roseo.  
Narciss. juncifol. flore rotundæ circinitatis ro-  
seo, Lob. Lugd. Svver. cui flos albus est.

Narcissus 10. roseo luteus major & minor, Tab.

VI. Narcissus juncifolius totus albus.  
Narciss. juncifol. flore albo, alter, Clus. ap. alt.  
auct. & cur. post.

Narciss. juncifol. polyanthos albus, Eyst.

VII. Narciss. autumnalis albus.  
Narciss. juncifol. folijs albus autumnalis medio  
obsoletus, Swer.

VIII. Narciss. albus autumnalis minimus.  
Narciss. autumnalis minor, Clus. hisp. Lugd.  
Tab. parvus, Dod. Lob.

Narciss. ferot. five autumnal. minim. Clus. hist.

IX. Pseudonarcissus gramineo folio, five  
Leuconarcissus æstivus: qui 2. in Prod.

#### NARCISSVS MAGNUS brevis calice

I. Narciss. latifol. max. alb. calice brevi luteo.  
Narcissus albus max. calice luteo brevi, Eyst.

II. Narciss. latifolius pallidus calice amplo  
& aureo, caule striato.

Narcissus latifol. flavo flore amplo calice, Clus.  
cur. post.

Pseudonarciss. pallidus calice amplo, Eyst.

Variat vnico flore, aliquando binos conjunctos habet: hic intensè luteus, ille pallidus: ad Cluf. cur. post.

III. *Narcissus latifolius pallidus* calice amplo alter.

*Narciss.* omnium maximus pallidus amplo calice: in'addit. ad. Cluf. cur. post.

IV. *Narciss.* latifol. sulfureus vel albus breui calice.

*Narcissus sulfurei* coloris breui calice, Svver.

*Narciss.* totus albus breui calice, Idem.

Pluribus est floribus. Addit & alium totum album triplici flore & angustiore folio.

*Narcissus* albus medius calice luteo breui: & Eystet.

**NARCISSVS MAGNO ET OB-  
LONGO** tubo vel calice, latifolius.

I. *Narcissus* maximus pallidè luteus.

*Narciss.* maximus griseus vel pallidus, amplo calice flavo, non descriptus, Svver.

II. *Narcissus* alter crasso bulbo.

*Narciss.* minor pallidus amplo calice flavo non descriptus, Svver.

III. *Narcissus* subflavus tubo sexangulo.

*Narciss.* falsus tuba sexangulari dilutior flavus non descriptus, Svver.

IV. *Narcissus* flavus tubo rotundo.

*Narciss.* oblonga tuba rotunda, quasi abscissa, flavo flore, Svver.

V. *Narcissus* albus tubo luteo.

*Narciss.* alb. oblongo calice luteo, Svver.

VI. *Narcissus* albus calice flavo, moscari odore.

*Narciss.* oblongo calice, Cluf. hist. ap. alt.

*Narciss.* alb. luteo longiore calice: ad. Cluf. cur. post.

*Pseudonarcissus* albus calice luteo, Eystet.

Triplix Clusius meminit: 1. fl. albo, calice flavo. 2. flore albo, sed calicis ore magis croceo: 3. flore ex albo pallecente, aut ἀρχαίου, calice latiore & oris croceis.

Et in curis post, in alijs stylus tubi oras superat, in alijs non excedit. Aliquando (vt ad cur. post. additum) flore majore ex folijs niveis, aut candidis, sed angustioribus & oblongis, odore grato.

VII. *Narciss.* albus calice flavo alter.

*Narcissus* albus. oblongo calice præcox, ad

Cluf. cur. post.

Triplex species: 1. latis & viridibus folijs, caule brevior, flore albo, tubo flavo: 2. folijs angustioribus: 3. folia tubum cingentia pallida, angustiora, & acuminata: & 2. est tubo fimbriato & non fimbriato, vt est

*Narcissus* tuba non fimbriata flavescente, Svver.

VIII. *Narciss.* syl. pallidus calice luteo.

βελβουάδιον Theoph. Codiaminum Gaza vertit, Plin. l. 22. c. 11. fecutus.

*Narciss.* Brunf. Lac. quo ad ico. primam.

*Narciss.* luteus, Trag. Gef. hor.

*Narciss.* 8. Matth. fol. quo ad ico. 1.

*Narciss.* 3. Eid. comp.

*Narciss.* Matthioli, Lugd. quoad 2. ico.

an *Narcissus*, Ang.

Codianum, vel Codiaminum flore Codij, id est, Campanulæ, Gef. hor.

Bulbus syl. & Codiaminum, Eid. col.

*Pseudonarcissus*, Dod. gal. vulgaris, Cluf. hist.

*Pseudonarciss.* luteus, Tab. Eyt.

*Narciss.* luteus syl. Dod. Lon. Lugd.

*Narciss.* totus luteus montanus, Theoph. Lob.

*Narciss.* calice prælongo anguloso, Cæs.

*Pseudonarciss.* Anglicus & Hispan. Ger.

*Pseudo-Narciss.* minor Germanicus, Svver.

Cauli cuilibet communiter flos vnus insidet: aliquando duo: hinc

*Pseudonarciss.* vulgaris binos flores in eodem caule gerens, Cluf. hist. ap. alt. verum & triplici flore adseruo.

Sic Cluf. hist. ap. alt. auctar. multas notat differentias, flores majores, minores, forma & colore dissimiles: aliquibus sex folia tubam amplexantia præpallida, alijs pallida, alijs saturatiora: tubus aut valdè amplus, aut angustus, qui vel pallidus, vel flavus & quasi aureus, aut oris crenatis, vel crenatis & fimbriatis simul, quales sunt

*Pseudonarciss.* simpl. Belgarum &

*Pseudonarciss.* luteus, Eyt.

aut quedammodo æqualibus, & minimè crispis. Huc referri possunt.

Bulbus flore luteo superiore parte aperto, &

Bulbus alius flore luteo humili, cuius semen simile Hemerocallidi Valentinae: plura non habet, Cluf. pan.

IX. *Narciss.* maj. tot. lut. calice prælongo.

Picu-

**Pseudonarciss.** major, Clus. hisp. & Hispanicus Clus. hist. Swert.

**Narciss.** syl. alter, Dod.

**Narciss.** totus luteus montanus, Theophrasti. Hispanicus, Lob.

**Narciss.** totus luteus mont. major, Eyst.

**Huc** similis inodorus, inefficacior locis ad meridiem, Ad. Huc pertinet,

**Pseudonarciss.** aureus præcox, Eyst.

X. **Narciss.** totus luteus flor. folijs reflexis.

**Narciss.** tot. lut. oblongo calice & reflex. folijs, Eyst.

XI. **Narciss.** parvus totus luteus.

**Pseudonarcissi** genus admodum exile, Clus. pan.

**Pseudonarciss.** minor Hispanicus latifol. Clus. hist.

**Narciss.** totus luteus mont. minimus, Eyst.

**Narciss.** Hispanicus flore luteo pumilus, Svver.

XII. **Narciss.** alb. oblongo calice.

**Pseudonarciss.** albo flore, Clus. hist. ap. alt. auct. totus alb. Eyst.

**Narciss.** oblonga tuba totus albus, Svver.

Duplex est: vnus altior flore longiore & tubo angustiore, flore albo, vel etiam *oxycnemus* colorem accedente; alter humilior, flore brevior & tuba laxiore. Aliquando flos non pendulus sed protuberans, Clus. cur. post.

XIII. **Narciss.** albus fimbria lutea.

**Pseudonarciss.** flore albo tuba oblonga, fimbria luteis, Svver.

XIV. **Narciss.** luteus repens.

**Pseudonarciss.** minor lut. repens, Eyst.

#### NARCISSVS ORLONGO calice,

*Vel Calathi figurâ, angusto etiam junci folio.*

I. **Narcissus** angustifolius alb. calice oblongo flore q; reflexo.

**Narciss.** juncifol. alb. fl. reflexo, Clus. app. alt. auctar. & cur. post.

**Narciss.** juncifol. alb. calice magno, Lob. ad. par. alt.

**Narciss.** totus alb. reflexus, Svver.

II. **Narciss.** montan. juncifol. calice flavo.

**Pseudonarciss.** primus, Clus. hisp. juncifol. primus, Clus. hist. & juncis folijs, Eid. cur. post.

**Narciss.** montan. juncifol. minimus, Lob. Lug.

**Narciss.** juncifol. fl. luteo reflexo, Svver.

III. **Narciss.** montan. alter flore fimbriato.

**Pseudonarciss.** juncifol. 2. flavo flore, Clus. hist.

**Narciss.** montan. juncifol. minim. alter, flore luteo fimbriato, Lob. Lugd.

**Pseudonarciss.** juncifol. Eyst.

Huc referendus

**Narciss.** tubâ fimbriatâ flore flavescente, &

**Narciss.** pseudojuncis folijs luteus fimbriat. Svvert.

IV. **Narciss.** montan. albus minimus.

**Narciss.** omn. minimus mont. alb. Lob. Lugd.

**Pseudonarciss.** juncifol. 3. albo flore, Clus. hist.

Variant hi tres: alijs flos amplior, vel flavescentis coloris, vel flavi, vel aurei: in nonnullis stilius oras excedit, in alijs vix ad oras pertingit: aliquando oris æqualibus, aliquando fimbriatis.

V. **Narciss.** montanus juncifol. calice aureo.

**Pseudonarciss.** minim. juncifol. aureus, Eyst.

VI. **Narciss.** montanus coronatus.

**Narciss.** montan. minimus coronatus, Lobico.

#### NARCISSVS PLENO flore.

I. **Narcissus** Orient. fl. multiplici & pleno albo luteo.

**Narciss.** nobilis Orient. polyanthos mixtus, Eyst.

II. **Narciss.** latifol. alb. medioluteus.

**Narciss.** 9. Marth. comp. & primus, Eid. fol.

**Narciss.** 8. Matthioli, Lugd.

**Narciss.** flore multiplici, Clus. hisp. (pleno flore i. in hist.) Lugd. multiplex, Dod.

**Narciss.** albus polyanthos (five Chalcedonicus & multiplex) Lob. Ger.

**Narciss.** 4. Lon. i. polyanthos, Marth. Tab.

**Narciss.** exoticus five Constantinopolit. Cam.

**Narciss.** major fl. multiplici, Eyst.

**Narciss.** Chalcedonicus pleno flore albo, Svver.

**Narcissi** mediocrocei plenifloris degeneraciones, in sua historia se propositurum, Lob. ad. par. 2. pollicetur.

III. **Narciss.** latifol. alb. medioaureus.

**Narciss.** pleno flore secundus, Clus. hist.

Terni, quaterni, flores, suavis odoris.

IV. **Narciss.** albus corona multiplici lutea.

**Narciss.** pleno flore 2. Clus. pan. 3. Eid. in hist.

**Narciss.** albus alter media fimbriata lutea mul-

tiplici corollâ, Lob. ico.

Narcissus medioluteus corona duplici, Svver.

Odore est, inter Narcissum & Muscari medio: etiam cum decem floribus vidimus.

V. Narcissus bulbo anguloso.

Narcissus Constantinopolitanus, quem Zeiden Sari vocant, Camer.

VI. Narciss. multiplex totus flavus.

Narciss. plenus quartus flavo flore, Clus. hist.

Narciss. flavus pleno flore, Svver.

VII. Narcissus mediopurpureus multiplex.

Narcissus pleno flore quintus, Clus. hist.

Flos vnus, interdum duo, odore ad Muscari accedens: aliquando viginti & pluribus: aliquando sexaginta quatuor folijs constat.

VIII. Narciss. totus niveus multiplex.

Narciss. pleno flore sextus, Clus. hist.

Narcissus albus pleno flore, Svver.

IX. Narciss. albus multiplex ex Virginea.

Narcissus totus albus de Virginea pleno flore, oblongo apice, Svver.

X. Narcissus syl. multiplex calice carens.

Pseudonarcissus pleno flore, Clus. hist.

Pseudonarciss. luteus polyanthos, Tab.

Narcissus syl. multiplex, Dod.

Narciss. luteus duplici flore, Lob.

Narciss. luteus multiplex Dodonæi, Lugd.

Narciss. cuius flos multiplici plexu rosæ instar constat, Cæs.

Narcissus ex luteo pallidus flore pleno, Cam.

Narciss. syl. stellatus, Eyft.

Duplex est: vnus elegantior est, florem explicatum semper gerens: hic

Pseudonarcissus luteus flavo pleno flore, Svve.

Alter verò florem explicat, sed involucri inclusus permanet: vterq; pallidus.

XI. Narcissus flore pleno variegato.

Narciss. Septentrionalis flore pleno luteo, Eyft.

XII. Narcissus luteus syl. duplici & triplici tubo aureo.

Narciss. duplici tuba flore luteo, Svver.

Pseudonarcissus pleno flore, seu triplici tuba,

Clus. hist. ap. alt. & cur. post.

Narcissus Septentrional. calice luteo pleno, duplicatis folijs, Eyft.

XIII. Narcissus luteus syl. triplici tubo alter.

Pseudonarcissi pleno flore varietas, Clus. cur. post. qui duplicem proponit,

Narcissi toti lutei præcoci Septentrionalium: five montani Theoph. omnium vulgarissimi, triplicem ex eadem radice differentiam, additâ figurâ, Lob. ad. par. 2. recenset.

Narciss. Septentr. pleno luteo oris incisus, Eyft.

XIV. Narciss. luteus tubo diviso.

Pseudonarcissus duplex diviso calice odoratus, Svver.

XV. Narciss. latifolius luteus multiplex.

Narcissus Cyprius luteus polyanthos fl. pleno, Lob. ad. part. altera: & addit.

Narcissum polyanthea Byzantinum huius familiaris esse, quem tamen non describit.

XVI. Narciss. juncifol. aureus multiplex Anemones formâ.

Narcissus juncifol. pleno flore, Clus. cur. post.

Narciss. juncifolius luteus flore pleno, Eyft.

Est & huic similis alter, qui licet multiplex sit, tamen adeo multiplex foliorum textura non est, quem

Narcissum aureum pleno flore vocat Svver. hunc à Patre Gregorio de Regio Capucino, vna cum alijs ex Italia accepimus.

#### NARCISSEVS MARITIMVS.

I. Narcissus maritimus.

*Maritimus*, Theoph. 6. hist. i. vbi *Elium Gaza* vertit.

Hemerocallis quibusdam putatur, Bulbus scilicet littoralis, Theoph. Pancratium Monspel. & Squilla minor Pharmacop. Ges. hor.

Hemerocallis Valentina, Clus. hisp. & hist. Dod. fl. Lob. (cui & Narcissus Constantinopolitanus Matth.) Cam. (cui & Con Zambach Turcis) Tab.

Pancratium floribus rubris, Lob. ico.

Pancratium Dalech. Lugd.

Narcissus marinus, Dod. Clus. hist. ap. alt. & cur. post. Cæs.

Narcissus Pancratium marinum flore albo, Sw.

Variat flos colore: apud Monspelienfes est albo, est subluteo, & est pallefcence: apud Italos, rubeo & purpureo, quandoq; punicante: hinc apud Lobelium in iconibus duplex figura, Pancratium marinum, &

Pancratium floribus rubris: & apud Taber.

Lilium marinum album.

Lilium marinum luteum: & Svver.

Narcissus maior five Pancratium floribus rubris,



bris, & Narcissus Pancratium maritimum sive Hemerocallis Valentina.

II. Narcissus Illyricus liliaceus.

Narciss. 3. vel Constantinopolitanus, Matth. & Lugd. quod priorem putat.

Aleutenas de las Indias, Lob. ob.

Lilione narciss. Hemerocallidis Valentinae facie, &

Lilione narciss. Orient. Placau, Clus. hist.

Lilione narciss. Hemerocallidis facie, Eytt.

Narcissus montanus sive marinus alter, qui Matthioli tertius, Clus. hist. app. 2. & in auct. huius meminit.

Narcissus Constantinopolitanus, Tab.

Narciss. 3. Matthioli multiflorus albus, Svver.

Pancratium Indicum alterum vernum, sive

Narcissus Indicus alter facie Pancratij Mensepiani, Lob. ad. par. 2.

Flores seni, septeni: sic, caule duplici: ab vno 14. Liliacei candidi, ab altero 12. aliquando vnus caulis triginta quinque flores sustinuit: aliquando flos fuscus caryophyllo aromatico concolor.

III. Narcissus Indicus autumnalis.

Pancratium Indicum, aut Narcissus Indicus maximus autumnalis quorundam, Lob. ad. par. 2.

IV. Narciss. Indic. folio latissimo triquetro.

Narcissus sive Pancratium Orientale Svver.

V. Narcissus Indicus latifolius alter.

Narciss. Indic. sive Pancratium Occid. Svver.

## LEUCOIVM BVLBOSVM

eiusq. Species.

**Λευκόιον** apud Theoph. 6. hist. 7. & 7. eiusd. 13. *Gaza violā albam vertit. Leucoion, inquit, florum prima se ostendit, emicat ubi caelum clementius statim, etiam nondum hyeme exalta: ubi vero immittitur, postea. Plin. l. 21. c. 11. Viola alba florum prima ver nunciantium, cuius vita longissima est trimatus.*

I. Leucoium bulbosum vulgare.

Leucoium Theophrasti, & Viola alba, Plinij.

Narciss. Martius, Brunf. septimus, Matth. Lug.

Viola alba Theoph. Trag. (cui & Hemerocallida Diosc.) Fuch. Gef. cat.

Narcissus & Viola alba, Tur.

Narcissi candidi genus, Cord. in Diosc.

Narcissus aquaticus, Cæs.

Viola alba bulbosa Fuchsij, Lugd.

Leucoium Theoph. Dod. gal. Lon.

Leucoium bulbosum Theoph. Gef. hor. Thal.

Leucoium bulbosum primum, Tab.

Leucoium bulb. hexaphyllum, Dod. Cam. minus, Eytt.

Leucoium bulb. præcox majus, Clus. pan. & hist. Ger. ico.

Leucoium alterū bulbaceum Theoph. Portæ.

Leuconarcissolirion prat. vernum paucioribus floribus, Ad.

Leuconarcissolirion paucioribus floribus, Lob.

Leuconarcissolirion vulgare, & Opitilion Theoph. Cam. in Matthiolum.

Narciss. Germanicus vulgaris, Svver.

Flores in singulis pediculis singuli, rariss. gemini: tribus & quinque folijs pingit Svver. nomine

Narcissi Hispanici Leucoij minoris.

II. Leucoium bulbosum flore patulo.

Narcissoleucoion Bohemicum, Svver.

Leucoium bulbosum hexaphyllum majus, Eytt.

Folij est lationibus, flore majore & patulo.

III. Leucoium bulbosum majus sive multiflorum, quod aliqui Acrocorion Plinij statuunt.

Leuconarcissolirion prat. vernum, Ad. Lob.

Leucoium bulbosum polyanthemum, Dodon.

Cam. Lugd. multiflorum, Tab.

Leucoium bulbosum majus, Ger.

Leucoium serotinum majus, Clus. pan.

Leucoium serotinum, Eytt. qui & minus exhibet.

Narcissus 2. Matthioli. Lugdunens. 3. & Matth.

10. Tab.

Narcissoleucoium majus Hispanicum, Svver.

Variat folijs pallidioribus, minus mucronatis,

sed

sed velut bifidis : floribus, maculis ex viridi pallidioribus infectis.

IV. *Leucoium bulbosum trifolium minus*.  
Narciss. tertius alter, Matth. comp.  
Narciss. 8. alter, Eid. fol. 2. Lac. ico.  
*Leucoium bulbosum triphyllon*, Dod. Cam.  
minus, Eyst.

*Leucoium bulbosum præcox minus*, Clus. pan.  
& hist.  
*Leuconarcissol. prat. vernum omn. minimum*,  
Ad.

*Leuconarcissolirion minimum*, Lob.  
*Leuconarcissolirion bifolium*, Cam. in Matth.  
Narcissus, Matth. quoad. 1. fig. Lugd.  
Narciss. montan. alter, Cæf.

V. *Leucoium bulbosum trifolium majus*.  
*Leucoium bulbosum Byzant.* Clus. pan. præ-  
cox, Eid. hist. & Lob. ad. par. 2.  
*Leucoium bulbosum triphyllum majus Byzant-*  
inum, Eystett.

an Narciss. sextus Matth. Lugd.  
*Leucoium bulb. 1. Tab. sub bulbo præcoce*,  
Ger.

VI. *Leucoium bulbosum trifolium cæru-*  
leum.  
*Leucoium triphyll. flore cæruleo Someri*, Lob.

ad. par. 2.

VII. *Leucoium bulbosum autumnale li-*  
tisolum.

Narcisso leucoium autumnale, Svver.

IX. *Leucoium bulb. autumnale*.  
*Leucoium bulb. autumnale minimum*, Dod. mi-  
nus, Clus. hisp.

*Leucoium bulb. autumnale tenuifolium*, Clus.  
hist.

*Leuconarcissolirion minimū autumnale*, Lob.  
& Ad. par. 2. *tenuifolium autumnale*.

IX. *Leucoium bulbosum tenuifolium ver-*  
num.

*Leucoium bulb. vernum minimum, sive folio*  
*capillari præcox*, Clus. cur. post.

X. *Leucoium vnico & junceo folio*.  
*Bulbus maripollas seu vnifolius*  
an *βαλβίος* Theophrasti, Clus. hist. app. 2. auct.  
an *Ornithogalum vnifolium flore albicante*,  
Svver.

XI. *Leucoio bulbo affinis duplex*.  
*Bulbus quatuor aut quinque flores gestans in*  
*modum Campanulæ albæ*, Clus. pan. & hist.  
Alterum addit bulbum flore magno, Campa-  
nulæ formæ, terram spectante, intus luteo, se-  
ris purpureo, ibid.

## TVLIPA ET EIVS SPECIES.

**T**VLIPA, cuius descriptionem & figuram primus Gesnerus, Anno 1560. in append. ad  
Cordi hist. dedit, à pileo Dalmatico, vel amiculo capitis, ab ipsis gestari solito, nomen habet,  
idg, propter floris cum pileo similitudinem. Sunt qui Anemonem, *Λειμωνίας* Theoph. velint, cum  
ibi Pulsatillam intelligere videatur: alij Cynorrhodon Plin. l. 21 c. 5. censent: alij ad Sasyrium  
trifolium referunt. Turca Ale & Zampul vocant, *πενδινα* fortè Theophrasti.

Genera prima tria sunt: præcoxius unum: serotinum alterum: dubium tertium, medio  
tempore florens.

Præcox, caule est pedali, firmā medulla pleno, quem folia plerumq; terna, nonnunquam qua-  
terna & quina amplectuntur, propendentia & nutantia, interdum surrecta: cauli flos vnicius  
(rarissimè gemini, vel summo caule coniunctim nascentes, vel bifido inherentes) sex folijs (ra-  
rissimè septenis & octonis) conitans, ex quo tot stamina, quot folijs constat, colore variantia  
prodeunt.

Serotina, caule est cubitali & tripedali, fungosa materia pleno, quem quaterna plerumq;  
folia, nonnunquam quina & sena firmiora, ut plurimum erecta non nutantia ambiunt: semine  
quem in præcoxi maiore, & bulbo longiore maioreq; plerumq; constat: sic & caulem ramosum  
interdum habet.

Dubia, quæ præcoxi flore marcescente suos explicant, & serotinis florere incipientibus,

iam

*iam senescunt, & cum his interdum florent. Sunt inter has nonnullæ, quæ serotinarum magnitudinem æquant : aliæ quæ præcoces non superant, nec illis forma ab similes sunt : & illa quidem vel amplissimis floribus prædita, vel præcoces non maioribus : quadam etenim præcocius humiliores sunt.*

*Omnia folia apice mucronato aut, orbiculato : vel tria interiora orbiculata, exteriora mucronata, & contrâ existunt.*

**TULIPA PRÆCOX SIMPLICIS & vnius coloris.**

**I. Tulipa præcox lutea.**

an Stryrion triphyllon Dioscoridis.

Tulipa alia, Gef. ap. ad Cordum, lutea, Cast.

Lilionarcissus luteus, Lob.

Tulipa præcox flava, Clus. hist.

an Ouludia, Lugd.

Variat : vel pallet, vnguibz plerumq; aureis, vel ad auri fulgorem accedentibus, vnguibus veluti fuligine aspersis : interdum flos inodorus, vel odor imbecillus, vel quasi croci sive etiam cæræ recentis. Aliquando flavus, sequenti anno flavum & rubrum commixtum habuit.

**II. Tulipa præcox rubra.**

Tulipa Turcarum, Gef. ap. ad Cordum.

Narcissus quintus, Matth. Lugd.

Anemone limonia Theoph. Tulipa quorundam, Gef. hor.

Lilij rubentis genus videtur : Idem.

Stryrion erythronium fortè : Idem.

Lilionarcissus sanguineus puniceusq; Ad. Lob.

Tulipa, Dod. Lon. major, Lugd. rubra, Cast.

Colore est nunc saturatiore, modo dilutiore & gratissimi aspectus : interdum ineleganti & obsoleto : foliorum vngues, vel lutei omnino, aut levi fuligine in luteo aspersi : in quibusdam in medio vngve macula nigra, in alijs ita lata, vt sola linea lutea ambiens conspiciatur : interdum vngues folij partem dimidiam occupant. Odor inftar mali aurei, vt plurimum obscurus, vel papaveris virus refert. Aliquando qui ruber fuit, sequenti anno variè commixtus, ex rubro & flauo inter se confusus coloribus, modo flavo, medium folium occupante, modo rubro, vel vtroq; radiatim per oras discurrente fuit. Verùm eæ quæ nativum colorem mutant, subinde corrumpi solent. Huc pertinet ex Eystett. Tulipa præcox floribus rubris in album luteum languescentibus.

**III. Tulipa præcox purpurea.**

an Cosmo sandalos Veterum inter coronarias?

Lilionarcissus purpureus, Lob.

Tulipa præcox purpurea, Clus. hist.

Aliàs dilutior & Damascenam rosam colore referens : interdum admodum diluto, vt albescere videatur : aliàs purpura saturatior, & violaceum sive amethystinum colorem habet : hic est

Lilionarcissus purpureo-violaceus, Lob.

Aliàs Pœoniæ floris æmulus : aliquando ex purpura nigricat, & obsoletior est : hic est,

Lilionarcissus purpureus sanguineus, puniceusvè quintus, Lob : & huc referas duos sequentes :

Lilionarcissus sanguineum panicumvè 8. &

Lilionarcissus sang. puniceumvè obsoletum, tribus exterioribus mucronatis folijs, internis verò reclusis, Lob.

Vngues cum apicibus aut pallent, aut lutei sunt : nonnulli apices nigros habent, pediculis veluti fuligine infectis : odora est & inodora. Aliquando purpurea, sequenti anno album & purpureum colores, variè inter se commixtos, & radiatim folia secantes, habuit. Item ex Eyst.

Tulipa purpurea calice pallecente &

Tulipa summe miniata calice luteo.

**IV. Tulipa præcox alba.**

Lilionarcissus niveus, Lob. ico.

Tulipa præcox alba, Clus. hist.

Flos omnino candidus, nisi tria folia exteriora dorso cineracei vel cærulei quippiam admixtum haberent, vngues lutei, nonnunquam veluti fuligine aspersi, apicibus & staminibus pallidis, aliquando vngues prorsus albi, apicibus nigricantibus :

Admonet Clusius, se Tulipas cærulei omnino coloris nondum vidisse : totum florem pallide violaceum in horto meo habui.

**TULIPA PRÆCOX**

Varia,

**I. Tulipa præcox rubra varia, Clus. hist.**

Rubrae variae floris folia exteriora mucronata, interiora orbiculata magna ex parte sunt :

H

hu-

hujus differentie octo:

1. Est magnis oris auri fulgore splendentibus, magnis vnguibus luteis: apicibus, vel nigris, vel obsoleta purgura tinctis, pediculis veluti fuligine infectis.

2. Foliorum exteriorum ora foris lutea, interius dilutius rubentia, rubedine quasi radiatim in luteas oras desinente: ad interiora rubet, vngues lutei, stamina cinerea.

3. Folia dilutione minij colore rubent, oris mediocribus, foris minij colore, interiora folia ferè tota occupante, & virgatim in oras luteas desinente: vnguibus magnis, flavis, apicibus cineraceis, pediculis luteis.

4. Folia exteriora medio dorso luteo, sanguineis virgulis distincta sunt, parte reliqua rubra, orisq; luteis: interiora omnia ferè rubra, sed rubro colore in aureas oras radiatim desinente: interiore parte lutea, rubris radijs circa medium folium distinctis: vngues & pediculi lutei, apices nigri.

5. Folia omnia mucronata, externa, dorso lutei, reliqua parte sanguinei coloris, oris tamen extremis luteis, quæ internè sanguineis radijs tota respersa: interiora foris sanguinis modo omnino rubent, oris luteis five flavis coloribus se commiscantibus, interna parte flavis, circa medium sanguineis radijs, instar orbis insignitis: vngues & pediculi lutei, apices nigri.

6. Folia mucronata, oris aureis, reliqua parte rubris, excepto dorso foliorum exteriorum quod aureis virgulis aspersum: omnium vngues lutei, radiatim in rubrocòmixti, pediculi lutei, apices nigri.

7. Folia externa mucronata, interna orbiculata tota rubra, oris tamen aurei coloris radiatim in rubro desinentibus: exteriores saturatiora, interiore tamen parte magis aurea: vngues, stamina, pediculi cum præcedenti conveniunt: omnium istorum flores satis odorati sunt.

8. Folia sunt parvis oris aureis, per reliqua elegantissimi rubri coloris: vngues flavi, stamina veluti fuligine tincta, apices obsoletè purpurei.

II. Tulipa rosea variegata polyanthos.

Tulipa polyanthos præcox rosea, colore mixta, Eyst.

III. Tulipa præcox lutea varia, Clus. hist.

Lilionarcissus luteolis averfa parte folijs, secundum ora strijs rubris decoratus: intus verò luteus amœnus, Lob. ico.

Huius etiam differentie novem sunt.

1. Folia primis diebus totus luteus, at quarto, vel quinto, folia extrinsecus per oras rubris virgulis leviter distinguitur, interna parte (præsertim tria externa) luteis remanentibus, & vnguibus nonnunquam veluti fuligine tinctis, apicibus interdum luteis, pediculis fuscis.

2. Floris folia externa, circa medium rubris radijs raris insignita sunt, interiora autem frequentioribus, & ad extremum vsq; folium ferè excurrentibus: vngues aurei, stamina pallida.

3. Foliorum exteriorum oræ, foris planè rubent, interius à medio ad oras extremas rubris virgulis distinguitur: interiora folia internè omnino rubent: internè, à medio ad summum, rubrum nervum protensum, & latera rubentibus radijs exornata, habent.

4. Folia exteriora dorso luteo sunt, per oras verò dilutioris cinabaris colore virgatim distincta: interiore parte, ad vnguem vsq; cinabaris color tota occupat: interiora folia cinabaris colore infecta, nervo tamen duplici luteo secundum longitudinem, & luteis virgulis in oras externas excurrentibus: apices nigricant, pediculi lutei nonnullis fuligine infectis: vngues aurei, magni, stamina quodammodo superantes: huc refer

Lilionarcissum luteum coccineum rubentibus oris, Lob.

5. Flos odorosus est, cuius folia tria exteriora mucronata & lutea sunt, oris purpura rubescente radiatim interculsante insignitis: dein orarum extrema lutea sunt, & interna parte, ad folij medium, radij frequentes rubri coloris conspiciuntur: sic interiora folia orbiculato mucrone prædita, lineis rubris ab infimo ad extremas oras luteas distinguuntur: interior pars minus radiata, quàm exterior: vngues magni & cum staminibus & apicibus lutei.

6. Flos aliquantulum odoratus, cuius folia orbiculata, foris cinerea, oris luteis, intus lutea, linea aurei five rubri coloris flavo permixti, radiatim & transversim folium medium secante: pediculi lutei, apices cineracei.

7. Folia orbiculata, exterioribus, dorso ad extremum mucronem luteo, oris latis ex auro ru-

rubris: vngvibus, flaminibus & apicibus luteis: nonnihil odoros.

8. Flos priori par, sed dilutioris coloris, flaminibus & apicibus duntaxat variantibus: nec odore caret.

9. Flos luteus, oris strijs rubris distinctis, & vngvibus subviridibus: hic est.

Lilionarcissus luteus hilaris, oris rubris striatis, carinâ subviridi, Lob. ico.

Huc referatur ex Eyflett.

1. Tulipa lutea maculis minutis aspersis.

2. Tulipa lutea lituris aureis.

3. Tulipa lutea margine roseo.

4. Tulipa lutea maculis rubens.

5. Tulipa lutea prope calicem radio rubro.

6. Tulipa lutea lituris miniatis.

7. Tulipa ex pallido tota virefcens.

8. Tulipa ex luteo citrini coloris lineis, dorsalibus viridibus.

9. Tulipa flava ex sulphureo colore pallentibus lituris prope apices roseis flâmi formib.

10. Tulipa floride pallens oris coccineis.

IV. Tulipa præcox purpurea varia, Clus. hist. Huius differentia decem sunt.

1. Folia omnia mucronata, quæ Pœonia pleno flore purpureum colorem imitatur, oris ex albo purpurascens, vngvibus ex luteo viridis; coloribus permixtis, subobscuris, circulo exalbido eos ambiente: pediculis flavis veluti fuligine infectis: apicibus nigris: floribus magnis & admodum patulis.

2. Folia mucronata sunt, foris purpurea, internis media parte carnei coloris, oris ex albo pallentibus, vngvibus, flaminibus, & apicibus flavis sive luteis.

3. Folia mucronata, foris & intus purpurea, oris extremis albis: vngves lutei, albo orbe circumdati: apices obsolete purpurascētes initio, dein ubi obversi sunt, flavo polline aspersi: pediculi flavi.

4. Folia mucronata, saturatiore purpureo colore prædita, ora exalbida, vngves albi, in imo flavi, apices & stamina pallida.

5. Folia mucronata, coloris purpurei dilutioris magisq; floridi: ora exalbida, vngves ex viridi pallentes, pediculi nigricantes, apices pallidi: hic solus odoros.

6. Folia mucronata, obscurioris purpuræ, & quasi amethystino colore prædita: magnis oris

albis: vngvibus, flaminibus & apicibus flavis.

7. Folia orbiculatis oris, magnis & albis, reliqua parte saturatiore, nitentq; purpureo colore prædita: vngves flavos, orbis albus ambit: apices cineracei, pediculi flavi.

8. Folia interiora aliquando orbiculata, dilutior purpureo colore splendent: interiore parte tota ferè alba, omnium extremitates magnæ albæ: vngves, stamina & apices flavi coloris sunt: & hic est

Lilionarcissus rubellus nitid. candidis oris, Lob.

9. Folia externa mucronata & reflexa, exterius obscure purpurascens: interna orbiculata & dilutius purpurascens: vtræq; in magnas oras albas desinentia, interiore parte veluti purpureum orbem, totum florem per medium ambientem, habentia, & vngves luteos vel flavos, albo orbe inclusos: apices obsolete purpurascētes, obtinent.

10. Folia omnia mucronata, & externa tria foris purpurea, magnis oris albis prædita, interiore parte alba, & eorum mediam partem orbe purpureo secante: vngves flavos, circulus albus ambit: stamina cum apicibus pallent.

Huc pertinent ex Eyflett.

1. Tulipa rosea venis luteis.

2. Tulipa miniata, linea viridi.

3. Tulipa florib<sup>9</sup> reflexis, interius miniatis, exterius herbaceis, margine ex cinabari rubente.

V. Tulipa præcox alba varia, Clus. hist.

Et huius differentia octo notantur.

1. Folia externa albescunt, exceptis oris, quæ elegantis & dilute admodum purpurascens sive carnei coloris sunt: interna magis purpurascunt, vngves lutei, dein exalbidi: stamina cum apicibus flava. Huc refer,

Lilionarcissus candore & rubore confusum, Lob.

2. Folia exteriora dorso sunt exalbido, virgulis purpureis adpersis, reliqua parte purpurascens, aut incarnato: interiora purpurea sunt: vngves stellatim flavi, dein albi: apices lutei: pediculi veluti fuligine adpersi.

3. Folia externa dorso albo sunt, punctis purpureis distincto, interiore parte dilutior purpura nitente: interna, saturatiore sunt purpuræ: vngves flavi, radiati, stellæ instar: apices nigri: pediculi fusci.

4. Folia externa oras magnas carneo colore prædita habent, reliqua parte alba: interiora verò quasi carnei coloris sunt.

5. Folia externa, dorso sunt pallescente, aliàs alba præter oras, quæ foris brevibus & raris purpurascens radijs exornantur: interiora albescunt, oris, lineis purpureis longioribus & frequentioribus foris insignitis.

6. Folia exteriora, dorso & mucrone extremo pallent, aliàs candida, ora interius paucis purpurascens radijs distinguuntur: interiora, à medio ad oras radijs purpurascens, foris aspersa sunt: intus alba, oris rarioribus virgulis distinctis.

7. Folia exteriora alba: interiora oras habent, nunc paucis, nunc multis virgulis purpurascens, sive carnei coloris distincta: vngues flavi: apices ac pediculi omnium pallent.

8. Folia omnia, coloribus albo & carneo permixtis prædita sunt: sed qui cineraceum carneo coloris temerè persusum referant: vngues exalbidi: apices obsoletè purpurascens, pediculi albi sunt.

Verùm si Tulipæ præcoxis semina germinant, rorò nativum matris colorem retinent, sed in varios colores flores transformant, præsertim Albæ, ex quibus aut omnino albi, aut albo varij: vel lutei & luteo varij: aut rubri atq; rubro varij: vel purpurei, ac purpureo varij, quorum videlicet purpurea folia albis oris ornata fuere. Quoad flavas, aut rubras, pleraque proles matris colorem retinet, sæpè etiam in alium commutatur. Huc referantur ex Eystett.

1. Tulipa candida lineis viridibus.
2. Tulipa alba maculis roseis.
3. Tulipa albicàs maculis latis rubentibus.
4. Tulipa alba marginibus rubescens.
5. Tulipa argentei & albicantis coloris.
6. Tulipa præcox ex albo in luteū lineis oblongis rubris.
7. Tulipa ex albo ruffa margine rubente.
8. Tulipa explicata flore candido lineis rubris.

VI. Tulipa præcox angustifolia.  
Tulipa Persica præcox, Clus. cur. post. qui duplècem facit.

VII. Tulipa angustifolia altera sive: folijs Hyacinthi.

Tulipa bicolor, tribus luteis & tribus rubris folijs Caccini, ad. Clus. cur. post.

#### TULIPA SEROTINA.

##### I. Tulipa serotina lutea.

Tulipa sive Lilionarciss. luteus latifol. obtusus phœniceis rubentibus oris, Lob.

Tulipa lutea, Clus. pan. serotina flava, Eid. hist.

Tulipa sive Lilionarciss. luteus latifolius, Lugd.

Flos coloris dilutoris, & quidem modo flavo, vel pallescens, vel intensioris & quasi auri modo rutilantis: est cuius foliorum oræ sanguineis guttis aspersæ sunt: ungues ceræ recentis coloris, interdum nigricantibus venis distincti, vel macula nigra notati: apices cum pediculis, vel flavi, aut cineracei, vel fuligine infecti, aut omnino nigri. Huc referatur ex Eyst.

##### I. Tulipa aurei coloris.

Tulipa lutea, ex rubro viridi coccineo variegata.

Tulipa globosa serotina aureo colore punctata.

##### II. Tulipa serotina alba: cuius varietas ex Eystett.

1. Tulipa albicans margine coccineo.
2. Tulipa albicans ex flavo purpureo, folijs prope calicem luteis vnguibus.
3. Tulipa nivea oris rubeo purpurascens.
4. Tulipa nivea oris ex rubro purpureis.
5. Tulipa serotina stellata.
6. Tulipa diversæ coloris alba linea rubente.

##### III. Tulipa serotina coccinea: cuius varietas ex Eystett.

1. Tulipa coccinea albescens oris.
2. Tulipa globosa serotina cinnabari colore.

##### IV. Tulipa serotina rubra, Clus. hist.

Floris color plerumque saturatior & quasi nigricans: interdum dilutor & perelegas: vngues aut omnino flavi, aut nigri, qui, Sole illustrati cæruleum quidpiam permixtum habere videntur: vel macula nigra maiore, vel minore, (tenui orbe aureo inclusâ) flavum inficiente: apices cum pediculis, vel flavi, vel nigri: sic apices cinerei & pediculi flavi.

Ex his varietas observata, quod interdum ex rubræ semine, flava: contra ex flavæ semine, rubræ nascuntur, vnguibus sæpè variantibus. Huc referatur.

Tuli-

*Tulipa versicolor*, parte mediâ viridibus signaturis, alterâ verò rubrâ, Eyst.

V. *Tulipa serotina* ramosa major.

*Tulipa serotina* *παυλάκης* major, Clus. hist.

*Tulipa serotina* polyanthos, Eyst.

VI. *Tulipa serotina* ramosa minor.

*Tulipa serotin.* *παύλας* min. Clus. hist.

Vtraq; & rubro & flavo flore reperitur.

VII. *Tulipa serotina* brassicæ floridæ similis, vel *Tulipa viridis* prima.

*Tulipa viridis*, Eystett.

Variat simplici & duplici foliorû serie: & hæc *Tulipa serotina* viridis, duplici foliorum in flore serie, Clus. hist.

IX. *Tulipa viridis* altera.

*Tulipa serotina* viridis, oris pallidis & albis, Clus. hist.

IX. *Tulipa serotina* flore pleno.

1. *Tulipa serotina* flore pleno miniato, Eyst.

2. *Tulipa serotina* tota lutea fl. pleno. Eyst.

#### TULIPA DUBIA.

*Tulipa dubia* major.

*Lilionarcif.* luteus phœniceo confusè mixtus, Lob.

*Tulipa media* major prima, Clus. pan.

*Tulipa dubia* prima maior, Clus. hist.

Differentiæ, huius sunt novem.

1. Folij est mucronatis, calice admodum pallido, vel flavo: vnguibus ceræ recentis instar flavis.

2. Folij habet flava orbiculata ad aurei mappræmaturî colorem accedentia: stamina cum apicibus flava, & flos odorosus est.

3. Flos omninò aureus, cuius externa folia, dorso flavo prædita, oris dilutionis cinnabaris colore: radiatim distincta: interna, cinnabaris coloris, binis nervis luteis, & radiolis flavis in latera excurrentibus: vngues magni, flavi: apices nigri: pediculi flavi, fuligine infecti.

4. Folia orbiculata flava, venis rubris secundum longitudinem excurrentibus, interdum totum midium folium inficientibus.

5. Flos dilutius ruber, cinnabaris colore, folijs mucronatis: vel saturatioris & quodammodo nigricantis coloris, exterioribus mucronatis, interioribus orbiculatis: vnguibus flavis veluti fuligine aspersis, vel in omnibus folijs, vel in exterioribus apicibus modo flavis & le-

viter nigricantibus, modo omnino nigris: pediculis flavis media ex parte nigricantibus.

6. Flos coloris albi exoleti, folijs ex albo pallescentibus, dorso flavescente: folijs interioribus orbiculatis, vnguibus apicibusq; pallescentibus.

7. Folia orbiculata dilutissimi purpurei coloris & quodammodo carnei, vngues maximi albi, quorum principia cum staminibus & apicibus flavent.

8. Flores saturatius purpurascunt, prædulcium rufescentibus vuarum instar, folia interiora orbiculata: vngues cum apicibus flavescent.

9. Flores saturæ admodum purpuræ, & cerasorum acidorum nigrorum succum referunt (*Wiersefarb* & nos vocamus) vnguibus sub cæruleis, vel ex cæruleo nigricantibus, staminibus fuscis.

II. *Tulipa dubia* major altera.

*Lilionarcif.* phœniceus peramœnus oris luteis, Lob.

*Tulipa media* major secunda, Clus. pan.

*Tulipa dubia* prima, major altera, Clus. hist.

Huc refer

*Lilionarcif.* luteis oris flore patulo, Lob. qui in Lugdunensi historia, *Tulipæ* sive *Lilionarcisso* luteo latifolio iungitur.

III. *Tulipa dubia media* sulphurei coloris.

*Lilionarcif.* luteus candidis flaverubentibus oris, Lob. ico.

*Tulipa dubia* secunda, media prima, Clus. hist.

Variat quoq;

1. Flos pallidi coloris costum sulphur refert, folia mucronata, vngues fuligine infecti.

2. Flos eleganter flavus, folia mucronata, vngues & apices nigri, pediculi fuligine infecti: hujus flos ex sedecim, mox tredecim, octo & sex folijs compositus.

3. Flos ex flavo & rubro coloribus permixtus, folijs sex magnis mucronatis & flavis constans, quæ ab vngue nigro rubras venas per folia radiatim excurrentes & in latera sparsas habet. Huc referantur ex Eystett.

1. *Tulipa lutea* lineis & maculis.

2. *Tulipa* subciliata, oris rubris.

IV. *Tulipa* dubia media.

*Lilionarcif.* luteus phœniceo confusè mixtus, Lob. par.

par & similis, odoratus Croci aut Narcissi æmulatione, & inodorus præcox & serotinus, Lob. ico.

Lilionarcissus Chalcedonicus totus luteus sanguineo puniceo par & similis, Lob. obs.

Tulipa dubia tertia, media secunda, Clus. hist.

Et hujus differentiarum novem.

1. Flos coloris flavi dilutionis, vel pallefcientis, cuius folia externa foris virefcunt: alterius folia orbiculata, vngues subvirefcientes: item folia flava, interiora orbiculata & guttis sanguineis aspersa: vel folia flava, vngues cerei coloris: vel in vngvibus macula nigra splendens: vel ex fusco & viridi coloribus commixtis.

2. Flore est flavo vario, initio flavo, tertio die tenui limbo rubeo exornato: cuius folia in vna flava, oris cinnabaris colore infectis: in altera pallidiora, oris rubris venis ornatis, vel mali aurei præmaturi colore perfusis. Invenitur versicolor flavo & rubro colore commixtis, instar sericei panni flavi, cuius subtegmen rubrum & vngues nigri sunt, & hæc dicitur Tulipa dubia 3. media 2. versicolor, Clus. hist.

3. Flos albus in flavum degenerans, folia vel omnia mucronata: vel interiora orbiculata: vngues, stamina & apices pallent.

4. Flos Ochrae colore, cuius foliorum mucro rubro colore tingitur: pallidus, oris rubris vel purpureis, vel carnei coloris venis distinctis.

5. Flos albus, initio virefcente colore perfusus, staminum apicibus fuscis.

6. Flos albus, varius, dilutior, folijs interioribus orbiculatis, vnguibus exalbidis, macula purpurascēte notatis, staminibus exalbidis, apicibus nigricantibus: vel vnguibus & staminibus candicantibus: vel vnguibus exalbidis, orbe subcæruleo inclusis, staminibus albis, apicibus nigricantibus, vel folijs extrinsecus saturatoribus, oris candicantibus, vnguibus exalbidis cum subcærulea macula, staminibus albis, apicibus nigricantibus, folijs exterioribus mucronatis: vel folia mucronata, dilutionis aut saturationis coloris: vel venæ purpureæ per totum folium dispersæ.

7. Flos purpureus, vel dilutioris & magis floridi coloris, folia interiora orbiculata, vngues exalbidi, stamina purpurascētia, apices nigricantes, vel purpureæ dilutionis, oris candicantibus, vnguibus vel flavis, aut veluti fulgi-

ne infectis, vel ex albo flavescētibz, aut ex cæruleo, flavo, & subvirefcēte mixtis, modò saturationis, venis albicantibus permixtis, vnguibus ex flavo nigricantibus, aut flavis, aut ex viridi nigricantibus, aut subcæruleis, vel ex cæruleo flavescētibz, aut cæruleis, orbe flavescēte ambiente: sunt; & dilutè purpurei & remissè miniati, aurei mali coloris, & vel dilutiones internæ & per oras, vel saturatioris: interdum internè dilutissimi, foris saturatioris: vngues vel flavi, vel fuliginoso orbe cincti, vel ex viridi nigricantes, vel fusci sunt. Est humilior folijs interioribus orbiculatis, vnguibus vel albis, vel candicantibus, supernè cæruleis, staminibus albidis, apicibus subfuscis, vel vnguibus cæruleis, aut ex cæruleo virefcētibz, vel nigricantibus: huc pertinet,

Lilionarcissus coccineus rubentibus medijs folijs candicans, & ad basin notulis rubris cordis effigie aspersis, Lob. & Lilionarcissus coccineus, candidis oris, Lob. ico.

8. Flores purpureo varii, folijs vel dilutè purpurascētibz, vel saturatoribus, oris mucronatis, vel orbicularis exalbidis: vngues sunt aut albi, aut subcærulei, aut albi, orbe lato carnei coloris cincti, stamina plerumq; nigricantia.

9. Flos rubet, foris purpurascens, intus carnei coloris: vngues, stamina, apices, flavi: vel folijs exterioribus, flavo colore aspersis: & colore obscuro ad lateritium accedente, vngues flavi, vel nigri: vel rubra serotinae similes, vnguibus flavo orbe cinctis; Oculus solis cognominatur: hic est,

Lilionarcissus coccineus puniceus ut rutilans, Lob.

10. Floris folia mucronata, initio viridia, dein oris pallefcētibz, quæ in rubrum colorem mutantur. radiatim alteri colori se miscēte, colore viridi, qui senescēte flore langvescit, præsertim intrinsecus.

Verum ex semine interdum serotina nascuntur: sic ex purpurea præcoci, purpurea serotina dilutior, intrinsecus aurei mali colore, vnguibus flavis, in exterioribus nigricantibus, nata: item ἀργεῖον. E purpurea varia præcoce, purpurea serotina ad rubrum tendente, vel dilutionem elegantem: vel ad carneum colorem accedente: vnguibus ex cæruleo nigricantibus.

E pur-



**E** purpurea præcoci *Ἀρχαῖον* ferotina, rubra ferotina, vnguibus & flaminibus flavis; purpurea ferotina, vnguibus nigricantibus: & purpurea varia ferotina. Sic ex ferotinis, aliquando præcoces, vt ex alba ferotina, natæ sunt præcoees, alba, flava, rubra, vnguibus flavis, rubra Oculus folis, & purpuro dilutior.

Nec omnes versicolores, tam præcoeces, quam ferotinæ, singulis annis eandem coloris gratiam retinent: sed alternis sæpius variant: vt Flava varia & Alba varia, vno interdum anno nitidissimæ sunt, sequenti vix aliud color quam flavus, vel albus conspiciuntur: sic Rubra varia & Purpurea varia, nonnunquam magnas oras flavas & albas habent, sequente valde exiguas. In summa, tanta in Tulipis colorum varietas, ita vt singulis annis adhuc nascantur, quibus pares nunquam antè conspectæ: ita DEVS in ipsis floribus admirabilem suam potestatem ostendit, vt ex prædictis, ex Clusio, Lobelio, Camerario, propriasq; observatione adductis, colligere est: ita vt ducentarum specierum numerum superare deprehensum sit. Sic in Florilegio Swertij, Tulipæ inprimis variegatæ differentiæ triginta duæ proponuntur: quemadmodum & in Florilegio de Bry, & etiam Pafini, aliquot species exhibentur: & in horto Eystett. supra quinquaginta depinguntur.

V. Tulipa bulbos in foliorum alijs ferens. Tulipa bulbifera, Clus. pan. & hist. Tab. 6. c. Tulipa prolifera, Cam.

#### TULIPA PUMILIO.

- I. Tulipa pumilio latifolia alba.
- Tulipa pumilio alba vnguibus luteis, Eystett.
- II. Tulipa pumilio latifolia sulphurea.
- Tulipa pumilio fulvo sulphurei coloris, Eystett.
- III. Tulipa pumilio latifolia rubra.
- Tulipa pumilio, Lob. ico.
- Tulipa dubia humilior, Clus. pan.
- Tulipa dubia pumilio, Clus. hist.
- Tulipam nanam sive pumilionem flore luteo, Camer. habuit.
- IV. Tulipa pumilio angustifolia.
- Tulipa pumilio altera, Clus. hist.

Tulipa pumilio angustifolia alba, Lob. ad. par. alt.

V. Tulipa pumilio gramineo folio.

Tulipa pumilio alba altera Lusitanica, Lob. ad. par. alt.

#### TULIPA MINOR.

- I. Tulipa minor lutea Italica.
- an Narcissus octavus, Matth. comp. quem sub Narcisso Constantinopolitano primo Matthioli, ex eius hist. latina, Lugd. proposuit.
- Lilionarcissus Bononiensis luteus, sive Tulipa, Lob. Lugd.
- Lilionarcissus Bononiensis, Eyst. & *καριωνισσος πολύχλωρος*, Cam. in Matthiolum.
- Ionchitis, Cæf.
- Tulipa Apenninea, Clus. hist. Italica prima, Tab.
- Tulipa Bononiensis quæ plerumque polyclo-nos, Cam.
- Senis, nonnunquam octonis folijs, flos constat.

- II. Tulipa minor folio latiore.
- Tulipæ Byzantinæ genus alterum, Clus. hist.
- III. Tulipa minor rubra.
- Tulipa rubra Apenninæ similis, Clus. hist.
- Tulipa rubra angustifolia facie Bononiensis, Lob. ad. par. 2.

- IV. Tulipa bombycina Cretica.
- Tulipa bombycina flore rubro, Rob. Swert. & Bry.
- Tulipam Bononiensem faciæ & formæ refert, sed bulbos lanugine obsitus, & veluti tomentosus est.

- V. Tulipa minor lutea Gallica.
- Tulipa minor Narbonensis, Dodon. minor, Lugd.
- Narcissolilium luteum, Ad.
- Lilionarcissus Narbonensis luteus montanus, Lob.
- Tulipa Narbonensis, Clus. pan. hist. Cam.
- Tulipa Italica secunda, Tab.
- Clusius in cur. post. meminit Creticæ Caccini, Mompelianæ, & ejus quæ in montanis Plantæ centiæ (at hæc quænam est?) nascitur.

#### VI Tu-

VI. Tulipa minor ex luteo purpurascens.

Tulipa Hispanica, Clus. pan. & hist.

VII. Tulipa variegata Persica.

Tulipa Persica, Rob. Swer. Bry. & Eyslett.

Tulipa Persica minor altera, Clus. cur. post.

Folia tria interiora alba, tria exteriora rubra, per oras albicantia, vngue nigra macula notata, flaminibus violaceis.

## FRITILLARIA.

**F**RITILLARIA, ab abaco in quo Scacorum lusus exercetur, quem Fritillam dici existimant, nomen habet: alijs Meleagris à Meleagris, avis plumia, quas, si non coloris specie, tamen varietate, & dispositione, & macularum magnitudine, referi.

I. Fritillaria præcox purpurea variegata.

Meleagris, Dod. Meleagris flos, Lugd.

Fritillaria, siue Lilionarciss. purpureus variegatus, Lob. & ad. part. 2.

Fritillaria dilutior, Clus. pan. & hist. cui &

Lilium variegatum vulgo.

Fritill. & Narciss. Caparotius ab inventore, Cam.

Fritillaria, Eysl.

Fritillaria vulgaris purpureo colore, Swer.

Flos sæpissime vnicus, interdum bini, raro terni: sex folijs vt plurimum constans, rarius octonis & duodenis: areolis nunc quadratis, nunc longiusculis, colore partim candidi, partim purpurei, siue saturationis carnei: est alia præcocior, alia serotina, & harum quadrae, vt plurimum saturatius, interdum dilutius purpurascunt. huc

Meleagris flore max. Ital. flore gemello, Eysl.

II. Fritillaria ramosa.

Fritillaria maxima purpurei coloris, Svver.

III. Fritillaria polyanthos flavoviridis.

Fritillaria polyanthos lutea, Eysl.

Fritillaria triceps colore flavo viridi, du Bry.

IV. Fritillaria umbellifera.

Fritillaria Hispan. umbellifera, Rob. Svver. & Bry.

V. Fritillaria flore magno pleno.

Fritillaria flore pleno, Cam. Eysl.

VI. Fritillaria alba variegata.

Fritillaria alba ex phæo purpureo tessulata, Lob. ad. par. 2.

VII. Fritillaria alba præcox.

Fritillaria alba altera, Lob. ad. par. 2.

Fritillaria alba, Clus. hist. app. alt. & in app. 2. auct. vnus flos totus albus: alterius foris albus, internè venis quibusdam purpurascens distinctus, & in cur. post.

Fritillaria albo flore, Svver. alba, Eysl.

VIII. Fritillaria serotina atropurpurea.

Fritillaria saturatior, Clus. pan.

Meleagris altera, Dod.

Lilionarcissus variegatus atropurpureus Xantonicus, Lob.

Fritillaria Xantonica serotina, Lob. ad. par. 2.

IX. Fritillaria serotina floribus ex flavo viridibus.

Fritillaria s. Clus. pan.

Fritillaria Aquitanica, Clus. hist.

Fritillaria Clusij, & Brisotti serotina, Lob. ad. par. 2.

Fritillaria minor obsoleto colore inodora, Eysl.

Fritillaria Aquitanica flore luteo obscuro, Svver.

X. Fritillaria flava rubris maculis distincta:

Fritillaria tertium genus, Clus. hist.

Fritillaria lutea Someri, Lob. ad. par. 2. Svver.

XI. Fritillaria angustifolia lutea variegat. magno fl.

Fritillaria, juncifolia, Eysl.

XII. Fritillaria angustifolia lutea variegata parvo flore.

Fritillaria Lusitanica, Clus. cur. post.

XIII. Fritillaria flore minore.

Fritillaria Pyrenæa, Clus. hist. ap.

Fritillaria nigra Pyrenæa, Lob. ad. part. 2.

Fritillaria Pyrenæa obsoleto luteo colore, Eysl.

Flos exterius obsoleti color. venis flavescens: distinctus: interius, ex viridi flavescens, maculis saturatè purpurascens, tessulatis dispositis notatus: odore gravi.

Variat: interrè ex luteo virefcit, oris reflexis lineis viridibus striatis, à mediò ad centrùm subfusca purpura tessulatus. 2. Flos hilarior purpurascens, tessulis similibus præditus. 3. ex luteo magis viridi parum subfuscus, intus minus tessulatus: 4. ex fusco & luteo sublividus, intus minus tessulatus.

XIV. Fritillaria minima pluribus floribus.

Fritillaria minima, Svver.

## SECTIO TERTIA.

## CROCUS: COLCHICVM: ORNITHOGALON.

## CROCUS ET EIVS SPECIES.

**C**ROCVM puerum, cum Smilacem virginem adamares, in hunc sui nominis florem versum esse, Virgil. & Plin. l. 16. c. 35. testantur. Κρόκον vero, filum villumq. significat, cuius modi sunt croci stamina, seu villi, qui κρόκιδες appellantur, qui plerumq. terni, nonnunquam etiam plures in floris medio conspiciuntur, & cum soli in usum veniant, per excellentiam Croci nomine donantur.

Genera duo fecit Theoph. sativum, de quo 3. hist. 6: 6. eiusdem 6: 7. eiusd. 9. & 10. Montanum, de quo 6. hist. 7. At Dioscorides l. 1. c. 25. sativi meminit, qui pro ratione Regionum, in quibus plantatur, varias. Sic sylvestrem dicimus, alium maiorem, alium minorem. Alium vernum, alium autumnalem: qui rursus colore & floris & foliorum variant.

## I. Crocus sativus.

Crocus, Brunf. Trag. Fuch. Tur. Dod. Cord. Lac. Gef. Lon. Lob. Tab. Sativus, Ang. Lugd. Crocus sativus autumnalis, Eyst. Crocum, Matth. Cast. Cæs. hortense, Cam.

Hic aliquando bis per annum florere solet, aliàs nihil à vulgari differens: & hic dicitur Crocus biflorus, Eyst.

Habetur Crocus verus purpureo colore, apud Syvert.

## CROCUS SEROTINVS.

## I. Crocus alpinus autumnalis.

Crocum montanum, Clus. hisp. (1. in hist.) Lugd.

Crocus montanus autumnalis, Lob.

Crocus syl. autumnalis, Dod. Cam.

Croci alterum genus syl. Cæs.

Crocus montanus vernus, Eystett.

Flores modò candicantes, modò purpureascentes, est instar sativi, sed dilutiores & minores.

II. Crocus autumnalis florem sine folijs promens odor.

Crocus montanus 2. Clus. hist.

Crocus syl. autumnalis, Lob. ad. par. 2.

III. Crocus autumnalis subcæruleus multiflorus.

Crocum montanum 3. Clus. hist.

Huic affinis

Crocus syl. Byzant. serotinus, Lob. ad. par. 2.

IV. Crocus autumnalis flore minore.

Crocum Pyrenæum autumnale, Clus. hist. ap. 2.

V. Crocus autumnalis flo. majore variegato.

Crocus montanus autumnalis, Portæ.

## CROCUS VERNVS LATIFOLIUS.

I. Crocus vernus latifolius purpureus variegatus.

Crocus vernus latifol. purp. varicolore flore vel 5. Clus. hist.

Variat flore, qui communiter sex, quandoq; octo folijs donatur.

II. Crocus vernus latifol. flore purpureo magno.

Crocus vern. latifol. purp. fl. maiore, Clus. hist.

III. Crocus vernus latif. albus variegatus.

Crocus montanus sive alpinus, Gef. hor.

Crocus syl. mont. fl. albo, Ad. Lob.

Crocus syl. vernalis alter, Dod.

Crocus vernus major alter, Clus. hisp.

Crocus vernus latifol. albo flore, Eid. hist.

Variat, folijs externis venis purpurascensibus aspersis: aliquando foliorum mucrones pur-

purpurascunt: aliquando linea purpurea, vel nigra, per folium fertur, & hic est

Crocus fl. albo lineis nigris, Svver.

IV. Crocus vernus albus versicolor alter.

Crocus vernalis major 1. Clus. hisp. def.

Crocus vern. latifol. alb. versicolore fl. 1. Eid. hist. def.

V. Crocus vernus latifolius purpuro violaceus.

Variat: 1. flore purpuroviolaceo: 2. fl. albo, purpuroviolaceâ basi: 3. aliquando flos superne purpureus inferius flavesceat: 4. est & flore violaceo, vel cæruleo distincto: 5. vel cæruleo lineis violaceis variegato.

1. Crocus vern. purpuro violaceus, Lob.

Crocus syl. vernalis prior, Dod.

Crocus vernalis major, Clus. hisp. & Lugd.

Crocus vern. latif. purp. fl. minore, Clus. hist.

2. Crocus syl. vernus 3. fl. albo purpuroviolaceâ basi, Lob.

Crocus vern. albus fundo violaceo, Eyflett.

At Dodon. Clus. & Lugdun. vtrumque vnâ tabellâ exprimunt.

3. Crocus syl. primus Dalech Lugd.

4. Crocus vern. fl. violaceo, Eyflett.

Crocus violac. & cærul. distinctus, Svver.

5. Crocus cæruleus lineis violac. distinctus, Eid.

VI. Crocus vernus flore pleno.

Crocus vern. latifol. duplici flore, Clus. hist.

VII. Crocus vernus latifolius, multiflorus.

Crocus vernus polyanthos, isq; duplex, Eyflett. alter purpuroviolaceus, lineis candidis: alter floribus candidis, lineis purpureo cæruleis.

Crocus vern. mult. alb. facie lutei majoris, Svve.

VIII. Crocus vernus minor albicans.

Croci montani species, Gef. hor.

Crocus syl. minor prior, vel syl. 4. Dod.

Crocus vern. ferotinus primus, Lob. ico.

Crocus vernus latif. albus versic. flore 2. Clus. hist. ico.

IX. Crocus vernus minor purpurascens.

Crocus montanus flore ex candido & puniceo mixtis, Gef. hor.

Crocus syl. 5. vel minor syl. alter, Dod.

Crocus vernus albus 2. Lob. ico.

Crocus vernus latifolius alb. versicolore flore 1. Clus. hist. ico.

Crocus vernus flore vario, Cam.

Crocus ferotinus, Lugd. quem præced. junxit.

Crocus purpuro rubeus, Svver.

X. Crocus vernus latifolius albus, vel cinericeus.

Crocus cinericeus, duplex, Svver.

XI. Croc. colubinus duplex, Svver. (quid?)

#### CROCUS VERNUS LATIFOLIVS luteus, aureus.

I. Crocus vernus latifolius flavus.

Crocus vern. latif. flavo flore, vel Croci sexti species prima, Clus. hist.

Crocus vernus luteus 1. Lob. ad. par. 2.

Crocus flore luteo, Svver.

Crocus vernus polyanthos fl. luteo, Eyflett.

Variat: 1. flore flavo five fulvo nitido latiore, & majore. 2. minore & pallidiore. 3. fl. luteo corona phœnicea, Lob. ad. par. 2.

II. Crocus vernus latifolius aureus.

Crocus vernus Mæsiacus, Clus. pan.

Crocus vern. latif. fl. aureo, vel Croci sexti alia species, Clus. hist.

Crocus aureus, Lob. ad. par. 2.

III. Crocus vernus latifolius pallidus.

Crocus vernus Mæsiacus 2. Clus. pan.

Crocus vernus latif. pallido fl. Eid. hist.

Crocus luteus fl. pallido, Lob. ad. par. 2.

IV. Crocus vernus latifolius flavo varius.

Crocus vernus latifol. flavo vario flore 1. vel Crocus vernus 7. Clus. hist.

Crocus vernus latif. flavo vario flore Constantinopolitanus, seu Crocus luteus alter, Lob. ad. par. 2.

Crocus luteus lineis nigris, Svver.

V. Crocus vernus latifolius flavo varius alter.

Croci vern. latif. flavo vario flore, vel Croci verni septimi alia species, Clus. hist.

Crocus syl. vernus versicolor aureo rutilo paulo concolor, Lob. ad. par. 2.

A priori potissimum differt radijs, foliorum exteriorum dorsum totum inficientibus.

VI. Crocus vernus latifolius flavo vario flore duplici, Clus. hist.

Crocus vern. latif. secundus Constantinopolitanus, Lob. ad. par. 2.

CRO-

## CROCUS VERNUS ANGUSTIFOLIUS.

## I. Crocus vernus angustifol. magno flore.

Crocus syl. angustifolius, Ang.  
 Crocus vernus minor primus, Clus. hisp. Lug.  
 (quem cum 3. jungit) Tab.  
 Crocus vernus angustifol. 1. Clus. hist.  
 Crocus syl. min. Hispanicus flore patulo, vulgo  
 Nozilicha minor, Lob.  
 Crocus vernus, Ger.

Variat: flores infernè flavescent, intus candicant, reliqua ad cæruleum sive violaceū vergunt: inveniuntur & toti candidi.

## II. Crocus vernus angustifolius gemino bulbo.

Crocus sylvestris, Lob.  
 Crocus vernus minor alter, Clus. hisp. Tab.  
 Crocus vernus angustifolius 2. Clus. hisp. desc.  
 Crocus syl. vernalis minor alter, Dod.  
 Croci verni minoris alterum genus, Lugd.  
 Crocus syl. 1. Dalech. Lugd.  
 Crocus vernus fl. violaceo, Eystett.

Flos ex folijs sex, aliquando octo constat.

## III. Crocus vernus angustifolius parvo flore.

Crocus syl. vernalis 6. Dod.  
 Crocus vernus minor 3. Clus. hisp. Lugd. Tab.  
 Crocus vernus angustifol. 3. desc. at ico. 2.  
 Clus. hist.  
 Crocus sylvestris Hispanicus, vulgò Nozilicha major, Lob.

IV. Crocus vernus juncifolius purpureus.  
 Crocus vernus angustifol. quartus, sive violaceo flore, Clus. hist.

Hujus iconem, figuræ primæ Lobelius in iconibus junxit.

V. Crocus vernus capillari folio, Clus. hist. app. 1. & app. 2. fine & cur. post.

Duplex est, vnus purpurascens flore, ipsius folijs tribus venis saturationibus distinctis: alter albo flore, qui etiam duplex, flore majore, & minore.

VI. Crocus vernus angustifol. variegatus.

Crocus vernus aureus variegatus, Eyllt.  
 Flos interius aureus, exterius striis ex purpura nigricantibus radiatus.

## COLCHICUM ET EIVS

## Species.

**Κολχικόν**, quòd plurimum in Colchide nascatur, Dioscorid. l. 4. c. 84. cui ἐφήμερον, quòd eadem die, quâ sumptum, interficiat. Colchici appellatio apud Plin. l. 22. c. 9. inter venena reperitur.

## Colchicum autumnale.

## I. Colchicum commune.

Primula Veris, Brunf.  
 Colchicum, Trag. Tur. Fuch. Dod. Matth.  
 Lac. Gef. hor. Lon. Cast. desc. at Ephemerum, ico.  
 Colchicum nigrum & subrubens, Cord. hist.  
 Colchicum sive strangulatoriū & Ephemerum crocifolium, Lob.  
 Hermodactylus vulgo & Crocus syl. Cæs.  
 Colchicum Ephemerum, Lugd.  
 Colchicum masculinum & fœmininum, Tab.  
 & album, Eid.  
 Colchicum commune pallido colore, Svver.  
 Hermodactylus niger & rufus, Mesueo & Serapioni.

Variat: nam in montibus folio est latiore, in pratis angustiore: flore communiter dilutè vel saturatè purpurascens, aliquando albo: bulbo nigricante, aut rubente foris & interius. quare Colchicum vulgare purpurascens flore & Colchicum vulgare album, Eyllt. & Colchicum autumnale flore albo & flore rubello, Eid.

Addit Svvertzius  
 Colchicum, cui hoc solum peculiare, quòd autumno folia proferat.

II. Colchicum radice siccata alba.  
 Colchicum album, Cord. hist.  
 Hermodactylus legitimus, Dod.  
 Hermodactyli non venenati officin. Lob. ico.  
 Hermodactylus officin. Lon. Tab. orientalis, Cæs.

Hemodactylus albus, Serapioni.

III. Colchicum Anglicum candidum angustifolij.

Colchicum candido flore Anglicum, Lob.

Colchicum Anglicum Lobelij, Lugd. album, Clus. hist. Tab.

Huc referri potest quod flore dilutioris coloris & lactei candoris.

Colchicum Lusitanicum serotinum, Lob. obs.

Colchicum pratense Salmanticum, Clus. hist.

IV. Colchicum montanum angustifolium.

Colchicum mont. Clus. hisp. Lugd.

Colchicum Hispanicum & *καρχεδωνιον*, Clus. hist.

Colchicum minus, Lob. Tab.

Colchicum Hispan. parvum, Cam.

Colchicum mont. minim. angustifol. autumn. Eyst.

V. Colchicum pumilum croci folijs.

Colchicum minim. tenuif. Gallæciū, Lob. ad. p. 2.

VI. Colchicum Illyricum, Ang. Lob. Lug. Tab. Clus. hist. (quod sibi nunquam conspectum scribit) quid?

VII. Colchicum vere & autumnno florens.

Colchicum biflorum, Clus. hist, Lob. ad. par. 2. & Eystett.

*Colchicum variegatum.*

I. Colchicum florum folijs albis & rubris alternatim dispositis.

Colchicum album & rubrum, Eyst.

II. Colchicum multiflorum.

Colchicum exoticum folijs ternis purp. ac alijs ternis albicantibus, varians: Eyst.

III. Colchicum alb. strijs variegatum.

Colchicum mixtum autumnale, Eyst.

Flos albus, strijs saturatè rubris seu sanguineis maculis inæqualibus infestus.

IV. Colchicum polyflorum variegatum.

Colchicum versicolor polyanthes reflouescens, Eyst.

Flos in albo pallidus, strijs & maculis dilutè purpurascens variegatus, è cuius medio alius flos prolis modo exurgit.

V. Colchicum latifol. variegatum.

Colchicum 4. sive latifolium, Clus. hist.

Colchicum Lusitanicum fortè, Eidem.

Colchicum Byzantinum polyanthos. Fritillarise facie. autumnale, Eyst.

VI. Colchicum purpureo lacteum variegatum.

Colchicum versicolore flore sive 3. & *πικνολαβες*, Clus. hist.

Huc refer

Colchicum album strijs purpureocæruleis variegatum, Eyst.

Colchicum album distinct. lineis rubris, Sver.

VII. Colchicum ex albo & purpurascens varium.

Colchicum *πικνολαβες* alterum, Clus. hist. ap. 1.

IX. Colchicum flor. Fritillarise instar testellatis.

Colchicum Neapolitanum, Clus. hist. & ap. 1.

Colchicum Fritillarise facie pallidum, Sver.

IX. Colchicum florum folijs angustis & variegatis.

Colchicum mont. minus versicolore flore, Clus. hist.

Floris folia longa & angusta, interius alba, exterius media parte viridia, altera carnei coloris.

X. Colchicum pleno flore variegatum.

Colchicum fl. pleno maculatum autumn. Eyst.

XI. Colchicum latifol. multiflorum variegat.

Colchicum polyanthos candid. eleganti rubore varium, Lob. ad. par. 2.

Folia latiora, cubitalis longitudinis.

*Colchicum polyanthes, sive multiflor.  
simplex & plenum.*

I. Colchicum candidum multiflorum.

Colchicum Pannonicum *πολύανthes* albo flore, Clus. hist. Cam.

Colchicum candid. Pannon. polyanthon, Lob. ico.

Colchicum polyanth. Tab. vulgare poly. Eyst.

Colchicum Pannon. albo flore, Sver.

Septenis, denis, duodenis, vel pluribus floribus lactei candoris: floribus etiam eleganter rubentibus reperitur: & hoc dicitur

Colchicum polyanthos, Lob. ad. par. 2.

II. Colchicum polyanthes laro Ellebori albi folio.

Colchicum Byzantinum *πλάγυλλον πολυανthes*, Clus. hist.

III. Colchicum polyanthos multiplex.

Colchicum polyanthos. fl. multiplici autumnale, Eyst.

IV. Col-

## IV. Colchicum pleno flore.

Colchicum *πολυφύλλανθρον*, sive pleno flore, Clus. hist. & ap. 1.

Colchicum pleno flore, Lob. ad. par. 2.

Colchicum autumnale, Eystett.

Quò bulbis major & vetustior, eò plures, majores & majore foliorum numero, flores constant. Sunt etiam flore albo. vel purpureo, quod

Colchicum vernum fl. pleno purpureo, Eyst.

Colchicum album rubr. pleno flore, Svver.

V. Colchicum polyanthes folijs latis convolutis.

Colchicum vernum flore purpureo plenum, Eyst.

*Colchicum vernum.*

I. Colchicum vernum Helveticum.

Colchicum subobscurum flore & minore, Ges. Cam.

an Colchicum brumale, Lob. Belg.

II. Colchicum vernum Hispanicum.

Colchicum vernum, Clus. hist. ap. 2.

Colchicum vernum fl. purpureo, Svver.

Flore est antequam se expandat albo, postea coloris purpurei dilutionis vel saturationis.

III. Colchicum Alexandrinum. quid?

C. Ichicum Orientale, Marth. alterum orient. Matthioli, Lugd.

Colchicum Syriacum Alexandrinum, Lob. Tab.

Tulipæ genus, quale Appenninæ videtur, Clus. hist.

Item scribit, se semen Colchico semine simile nomine Hermodactyli Syriaci accepisse.

## COLCHICVM LUTEVM.

I. Colchicum luteum majus.

Lirium alterum, Theophrasti.

Helichryso Cratevæ similis, Ang.

Narciss. autumnalis quorundam, Clus. hisp. Lug.

Narciss. autumnalis major, Dod. Clus. hist. Ger.

Narciss. autum. flore luteo, Eyst.

Narciss. autumnalis, Cæs. & Lob. ad. par. 2.

(cui & Colchico-Narcissus) autumnalis luteus, Cam.

Colchicum luteum, Lob. Tab. luteo flore, Svver.

Variat in hortis Belgij angustioribus folijs & cauliculo dodrantali turreto, Lob. obs. & Dod. ac Clus. hist. aliquando largiore foliorum numero à præcedente discrepat, & est Narcissus autumnalis flore luteo multiplex, Eyst.

II. Colchicum melino flore.

Narciss. Persicus, Clus. pan. & hist. Cam. Tab. Ger.

III. Colchico luteo similis flore albo.

Sparganium Placeæ, Clus. hisp. & hist.

IV. Colchicum luteum minus.

Colchicum parvum mont. luteum, Lob. ico. Ger.

Narcissus autumnalis minor, Clus. hist.

Colchicum mont. luteum minus, Tab.

V. Colchicum luteum vernum.

Narcissus vernus præcocior flavo flore, Clus. hist. ap. 2.

Narcissus luteus vernus facie Narcissi autumnalis lutei, Lob. ad. par. 2.

Narciss. vernus flore luteo, Svver.

an Colchicum vernum flavo flore Plateau, Clus. hist.

## ORNITHOGALVM ET EIVS SPECIES.

**O**ρνιθόγαλον, propter lacteum colorem, qui in flore nitet, similem ei, qui in alis aut ovīs gallinarum observatur, nomen accepisse videtur. Dioscorides l. 2. c. 174. unius, ut & Plin. l. 21. c. 17. Ornithogale nominans, meminere. Sunt qui Bulbinam Theoph. 7. hist. 13. & Athenæi censent.

## ORNITHOGALVM VMBELLATUM album.

I. Ornithogalum umbellatum maximum.

an Narcissus quartus, Marth. Lugd. Tab.

Ornithogalum majus, Dod. Arabicum, Clus. pan. & hist. Eyst.

Lilionarciss. polyanthos, Lob. obs.

Lilium Alexandr. Neotericon, Lob. ico. Cam.

Hyacinthus de Padro nostro Italorum, Clus. hist. ap. 2. negans esse Narcissum 4. Matthioli,

quod prius alseruerat.

Dulipan apud nos barbaro nomine, Cæs.

Ornithogalum Arabicum multiflorum album, umbilico interiore nigro, Sver.

II. Ornithogalū vmbellat. maius angustifol. Ornithogal. medium, Eyst.

Flores intus candidi, exterius virentes, staminibus ex viridi pallentibus.

III. Ornithogalum vmbellat. alb. medium latifolium.

Ornithogalum aliud vulgare, Clus. hist.

IV. Ornithogalū vmbellat. med. angustifol. Ornithogale, Manardo, Hermolao.

Ornithogal. Dod. gal. Tur. Ang. Gef. hor. A. ma. Ger. Cast. secundum, Matth. Lugd.

Ornithogalum 5. sive vulgare: Clus. hist. & pan. Ornithogalum candido flore, Cord. in Dioscorid.

Ornithogalum candidum vulgare, Ad. Lob.

Bulbus Leucanthemum minor, Dod. Lugd.

Ornithogal. alterum minus, Cam.

Bulbus solsequius, Tab.

Ornithogalen spicatum, Sver.

Est & folijs gramineis, vt in cæteris humistratis. Matthiolus duplex habet, & vtrumq; caule foliofo pingit: quare in Lugd. historia vtrumq; à Dodon. differre scribitur: sic Lacuna & Lugd. Matthioli vtramq; figuram proponunt: ac Lonicerus, primam tantum, quam fidam suspicamur.

V. Ornithogal. album minus.

Ornithogal. minus è Pyrenæis, Clus. hist. ap. 1.

Ornithogal. minus, Eyst.

VI. Ornithogal. vmbellatum flosculis ex albo succeruleis.

Ornithogal. Hispanicum minus, Clus. hist.

#### ORNITHOGALUM SPI- catum.

I. Ornithogalum latifol. & maximum.

Ornithogal. max. Myconi, Lugd.

Ornithogalum maximum, Clus. hist. ap. 1.

Ornithogal. vel Lilium Alexandrinum floribus albis innumerabilibus, Sver.

Magna florum spica, aliquando centenis floribus nivei coloris.

II. Ornithogalum latifolium alterum.

Ornithogal. Aethiopicum, Clus. cur. post.

Ornithogalū Indic. promont. Bonæ spei, Sver.

III. Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virentibus.

Asphodelus femina, Dod. gal. Gef. hor.

Asphodelus Galeni, Lac. bulbosus Gal. Dod. Lugd. Cam.

Asphodel. Hyacinthinus fortè Galeni, Lob. obs. Hyacintho asphodelus, Lob. ico.

Ornithogal. majus, Clus. in pan. majus primum, Eid. hist.

Ornithogal. Pyrenæum, Clus. cur. post.

Ornithogalum aliud spicatum, Cam.

IV. Ornithogalum angustifolium, spicatum maximum.

Ornithog. lacteum, spicatum max. Eyst.

V. Ornithog. spic. seu comosum fl. lacteo.

Ornithogali lactei species major, Eyst.

VI. Ornithogal. majus spicatum flore albo.

Ornithogal. Narbonense, Dod. Lugd.

Ornithogal. spicatum Monspel. flore lacteo, Lob.

Ornithogal. alterum, Cam. apud. Matthioli. qui vulgari adjunxit.

Bulbus Ornithogalo similis Cæs.

Ornithogal. majus Monspel. Clus. pan. secundum, Eid. hist.

Ornithogal. spicatum flore lacteo, Eyst.

Μάλο Diosc. l. 3. c. 54. Theoph. 7. hist. 11. & Epimedium Plinij l. 19. c. 5.

VII. Ornithogalum majus spicatum alterum.

Ornithog. 3. vel majus Byzantin. Clus. hist.

Ornithog. spicatum minus, Lob. obs.

VIII. Ornithog. majus spic. flore luteo.

Bulbus Ornithog. similis, flore luteo, Cæs.

IX. Ornithog. spicatum fl. viridi lactescente.

Ornithog. Pannon. albo flore, Clus. pan. & hist.

Ornithogal. Pannonic. Tab. Ger. Eyst.

Ornithogal. flore albo viridiq; linea in dorso prædito, Sver.

an Ornithogalum serotinum, Cam.

X. Ornithogal. spicatum album.

Ornithogal. Hispan. spicatum, Eyst.

XI. Ornithogalū cæruleo pallente flore.

Ornithogalum cæruleum pallens Hyacintho autumnali pene par, Lob. obs.

XII. Ornithogalum exoticum magno flore, minore innato.

Hyacinth. arvorum Ornithogaloides, Colum.

Narcissus 4. Matthioli, Clus. hist. ap. 2.

Ornithogal. Neapolitanum, Eidem ap. 2. Eyst.

Ornithogalum Neapolitan. flore interius candido, exterius cinereo, Sver.

Phalagij nomine, Honorius Belli ex Creta misit.

OR-



## ORNITHOGALVM LVTEVM

I. Ornithogalum luteum sive pallidum majus.

Ornithogalum 7. sive pallido flore, Clus. hist.

II. Ornithogalum luteum magno flore.

Ornithoga. flavum Alcmarianum, Clus. hist.

III. Ornithogalum luteum.

Bulbus, Trag. (cæpa agrestis) Lac. syl. Ruel.

Fuch. Tur. Gef. cat. Dod. Lugd. Cam. Eyf.

Bulbus syl. alius bifolius, Gef. hor.

Sisynrichium, Cord. hist.

Bulbus esculentus, Cast. Lon.

Ornithogalon luteum, Cord. in Diosc. Ad. Lob.

Tab. Lugd. Col. Sver.

Bulbus Ornithogalo similis florib. luteis, Cæs.

Vbi adolevit, folia interiora amittit, quare

apud Tabernam. & Gerar. duæ figuræ

Ornithogali lutei, & Ornithogali majoris, Tab.

Ornithog. lutei & Cæpæ agrariæ nomine, Ger.

IV. Ornithogalum luteum minus.

Ornithogalum 10. sive Pānon. luteo, flore Clus.

pan. & hist.

Ornithogali lutei species minor, Lob. obs.

V. Ornithogal. angustifol. bulbi ferum.

Ornithogalum angustifolium campestre lute-

um minimum bulbosum, Colum.

Variae: nam locis pinguioribus folia latiora &

plura, sicut & flores: folia circa bulbillos hirsuta & candidiora sunt.

## SECTIO QVARTA.

## CEPA: PORRV: SCILLA: AL-

## LIVM, ET MOLY

## CEPA ET EIVS SPECIES.

**A**gyptiorum numina, Cepas & Allū (Plin. l. 19. c. 6.) prosequamur. Cepa à capitis magnitudine, Græcis κεράνιον, ὅτι κεράς σὺμμενίει ποιεῖ, quod oculi pupillam comprimere cogat, utpote secundū Aristot. 20. probl. 22. mordaci nimium vapore lancinando & lacrymas movendo.

Genera Theophrast. 7. hist. 4. à locis cognominata refert, Gardiam, Cnidiam, Samothraciam, Sasanicam, Ascaloniam; & fissilem. At Dioscorides l. 2. c. 181. longa, rotunda, flavæ & candida meminit. Plin. l. 19. c. 6. Cepa, inquit, genera apud Græcos Sardia, Samothracia, Alfidena, Setania, Schista, Ascalonia, &c.

Quare alia maior est, alia minor: alia candida, alia viridis, alia rufa, alia subrubens: alia est rotunda; alia oblonga: omnes ut plurimum duplici aut triplici membranâ, quas Festus callas, alij tunicas vocant, vestita. Sic alia acerrima, alia mediocriter acres, aut nih. ferè acedinis habentes. Sic alia scruntur, alia deponuntur: aliquando feminis locò bulbos gerunt. Et Dalechampius notavit.

I. Cepa vulgaris.

Cepe, Brunf. Gef. Lob.

Cepa, Trag. Fuch. Tur. Matth. Lac. Cord. in

Diosc. Ang. Cast. Cæs. capitata, Matth.

Cepa rotunda, Dod.

Cepa sativa Marthioli, Lugd.

Cepa alba & rubra, Gef. hor. Lon. Tab.

Variae colore floris, vel candido, vel purpu-

rescente: tunicarum quoq; coloris rubri, aut

candidi: radices formâ, major est, & minor: ob-

longa, sessilis, vel orbiculata, turbinata, qui-

buldam communioribus, in compressam latior-

rem circumferentiam bulbaceam abit.

Cepas porraceas, vocant stolones, qui primo

Vere, dū tenelli sunt, antequam caulescunt, in

cibos eruuntur.

II. Cepa oblonga, Dod. Gef. hor.

Cepe Hispanica oblonga, Lob. ico. Cam.

III. Cepa radice candida dulci.

Cepa quarta, Gef. hort.

IV. Cepa plurimum caulium.

Cepa ovata à radices figura, Cord. hist. V.

V. *Cepa scitilis*, Matth. Cast. Lugd.  
an Gethyon Græcis, & *Cepola Columellæ*.

VI. *Cepa fisisilis*, Matth. Lugd. cui & *Cepæ*  
*χρῆσι*.

VII. *Cepa sterilis*, Trag. Gef. hor.  
*Cepa Ascalonica*, Matth. Lugd. cui fortè Bul-  
bus Setanius, quem Theoph. & Plin. *Cepæ* ge-

nus esse testantur.

*Cepæ* species sunt *Ascalonia*, Cast.

*Cepis* affinis, *Ascalonia* vulgo, *Cæf*.  
*Scaliones*, Tur.

Verùm & Lobelius hist. Belgica *Ascalonitidem*  
antiquorum exhibuit, fortè à priore diver-  
sam.

## P O R R U M E I V S Q V E Species.

**Q**UOD πρᾶσον *Dioscorides* l. 2. c. 179. vocavit, & in κεφαλῶνι, *capitatum*, & ἀμ-  
πελόπρασον *distinxit*; id Latini *Porrum*, quod porro eat, & longè lateq; graßeunt,  
vocarunt. *Theophrast.* 2. caus. 20. & 3. eiusdem 23. τὸ κακῆν πρᾶσον, *consum porrum* addidit:  
alias 7. hist. 1. 2. 3. 4. 5. & 6. de Porro egit. At *Plin.* l. 20. c. 6. est *scitivum* & *capitatum*; &  
illud l. 19. c. 6. duplex fecit.

I. *Porrum commune capitatum*.  
*Porrum*, Brunf. Cord. in *Diosc. Dod.* (& *Por-  
rus Palladij*) Gef. hor. Cæf. Cast. Tab.  
*Porrum commune*, Matth. Lug. vulgare, Lob.  
*Porrum capitatum*, Fuch. Tur.  
*Porrum capitatum vulgare*, Cam.

II. *Porrum scitivum latifolium*.  
*Porrum scitivum*, *Plinio*, *Dod. Cæf.*  
*Porrum scitivum capitatum*, Matth. & (*scitile*)  
*Lac. Lugd.*  
*Porrum tonsile & capitatum*, Lob.  
*Porrum tonsile sive scitile*, Cam.

Hæc duo genera non differunt, cùm ex eo-  
dem semine generentur, & cultura solùm dif-  
crepent: quia id quod ad culinaria jusscula sæ-  
pius detonderi solet, *Scitivum* aut *Scitile*  
*Columellæ* & *Palladio* nominatur: quod verò  
capitatum fieri debet, non tondu, & au-  
tumnali tempore transferendum: etiam *Plin-*  
*io* monente.

III. *Porrum scitivum juncifolium*.  
*Porrum scitivum*, Trag. Fuch. Gef. hor. Lon.  
*Lugd.*  
*Porrum scitile*, Matth.  
*Cepa Ascalonica*, Matth. desc. Ger.

*Cepa fisisilis* & *Gethion*. Tur.  
*Schœnoprasum*, *Dod. Lob.* (cui *Ascalonia*  
Matth.) Tab.

*Porro tonsili cognatum*, Cam.  
*Gethyllis*, quam *Ceparum* genus *Nicandri*  
*Scholiastes* dicit, Gef. hort. in *Porro scitivo*.  
Differt à veterum *Scitivo*, cùm illi folia lata,  
huic pro folijs junci inanes sint: hinc nomine  
ex *Iunco* & *Porro* composito, *Schœnoprasum*  
vocarunt.

Majus & minus habetur: illud rarius & ad  
condimenta mitius, quod *Gethium* *Gesnero*:  
minus *Gethyllis*.

*Gethyllidem* sylvest. Gef. lib. de hor. proponit.

IV. *Porrum folio latissimo*.

*Porrum Syriacum*, Tab.

V. *Porrum syl. inodorum*.

*Porro simile*, *exilius* & *inodorum*, Lob.

VI. *Porrum syl. gemino capite*.

*Ampeloprasum*, seu *Porrum syl. Lob. Lugd.* cui  
à *Matthioli* diversum.

*Porrum sylvestre primum*, Tab.

VII. *Porrum syl. vinearum*.

*Ampeloprasum*, Matth. Ruel. Ama. Ang. Gef.  
hor. Lugd.

## SCILLA EIVSQUE SPECIES.

**Σ**ΚΙΛΛΑ *Theoph.* 1. hist. 7. & 10. proposuit, & 7. hist. 11. *Scilla Epimenidia* vocata, &  
que ab usu nomenclationem sortita sit, meminit. Sic *Dioscorid.* l. 2. c. 202. σκίλλαν habet,  
& cap

& cap. seq. *πανράϊον*, quod Scillam aliqui nominant. Genera duo Scilla medica, Plin. l. 19. c. 5. *mafcula albis folijs, fœmina nigris*: & tertium genus cibus gratum, Epimenidium vocatam &c. Et l. 20. c. 9. *Scillarū in Medicina alba est, quæ mafcula, fœmina nigra: candidiffima viliffima.*

I. Scilla vulgaris radice rubra.

Pancratium & Scilla Diofc.

Scilla fœmina, Plinio.

Squijlla, Brunf.

Scilla, Trag. (& Cæpa maris) Matth. Fuch.

Tur. Cord. in Diofc. Gef. hor. Lon. Cam. Cæf.

cuius bulbus rufi coloris, & nigra in montibus non longè à mari, reperitur.

Scilla communis & Pancratium, Dod. gal.

Scillanigra & fœmina Plinij, & Pancratium Dioscoridis, Coftæo.

Scilla major, Caft.

Pancratiū, Guil. Cl. hisp. & his. Dod. Lug. Tab.

Scilla rubentibus radices tunicis folio aloës carinato, Lob.

II. Scilla radice alba.

Scilla, Guil. Dod. Hispanica, Cluf. hisp. & his.

Caft. ap. Lugd. alba, Eyst.

Scilla (five cæpa marina) Lob. major, Tab.

Scilla minor, five Pancratium, Caft.

III. Scilla esculenta.

Scilla epimenidia, Theoph.

Scillæ 3. genus epimenidia, Plin.

Scilla vera & legitima, Ang.

Scilla dulcis & candida in Cephalonia, & Creta, Coftæo in Mefuem.

## ALLIVM EIVSQVE SPECIES.

**A**llium foris à ἄλλοις exilire, quod exiliendo crescat. Σκορδον Diofc. dil. 2. c. 182. vel quasi σκαῖον ῥόδον, id est, radis rosa, propter odorem gravem: vel quod comestum, vapores excrementitios ad cutim pellat, & vescentibus paniculationes moveat. Sunt qui ab halante gravi odore deducant, & Allium scribant.

Genera Dioscoridi, sativum & hortense, quod vel multiplici in Aegypto, vel singulari, ut Porrum, capite conflet, cuius nucleos Græci ἄγλιδας nominant: aliud sylvestre, quod ὀφιοσκορδον. At Theophrasto 7. hist. 4. aliud praxos, aliud serotinum: differunt præterea magnitudine singulari: quædam etiam non nucleis, quædam vero multis coagmentantur, quos γίλεις Theoph. ἄγλιδας, Galenus: σκελλίδας, Aegineta l. 4. c. 33. ὄνυχας, Aëtius lib. & cap. 11. vocat. Verum Plinio l. 19. c. 6. Genus Allij differentia, in tempore, praxos maturefcit 60. diebus: sum in magnitudine. Vlpicum quoq, in hoc genere Græci appellaverunt. Allium Cyprium, aliq Anisacorodon (foris relictius Aphroskorodon) &c: sunt qui velint Allium Vlpicum Plinij, Allium Aegyptiacum Dioscoridis esse.

In Virginea multis locis Allium nascitur, ab Anglicano parum differens: descr. Virgin. quod vi & Cape in Hispaniola, vix unquam bonum evadit: par. 4. Amer. c. ult. Et Indi ex omnibus Europæis radicibus Allium eligunt, quo ventriculum reficiant: Joseph. Acosta l. 4. cap. 18.

I. Allium sativum.

Allium, Brunf. Trag. Matth. Ruel. Cord. in

Diofc. Tur. Lac. Ang. Lon. Lob. Caft.

Allium hortense, Fuch. vulgare, Cam.

Allium sativum, Dod. Gef. hor. Cæf. Lugd.

Allium sativum multifidum, Cord. hist.

Verum Marthiolus, Lobelius & Dodonæus,

una figura Allium sine flore, Allium cum flore,

& Allium amphicarpon; & Tabernæmont. sub Porro syl. latifolio proposuit.

Genus quoddam capitibus ingentibus ex Africa adferri, Cæsalpinus auctor est.

II. Allium sativum alterum: five Allioprasum caulis summo circumvolutum.

Allium sativum amphicarpon, quod & radicem nucleis feritur, & seminibus, quæ nucleos fimi.

similitudine referunt, Cord. hist.

Allium sativum secundum, Dod.

Scorodoprasum secundum, Clus. pan. & hist.

Allium Creticum, sive Serpentinum, Cam.

III. Allium sativum radice simplici.

*Μάλαρα* Hippocrati.

Allium mas, Matth.

Allium simplex, Cord. hist.

Allium sativum singulari capite, & Allium masculum, Vercell.

Allium Aegyptiacum, Portæ.

IV. Allium Cyprium Theoph.

Allium Vlpicum, Plin.

Allium Vpicum vel Punicum, Columell.

Aphroscorodon, sive Allium Vlpicum, Ruel. Ges.

Allium Cyprium, sive Vlpicum, Portæ.

Allium sativum tertium, Dod.

V. Allioporrum sive Scorodoprasum.

Scorodoprasum, Dioscor. l. 2. c. 83. Gal. Aegin.

Scorodoprasum, Trag. Matth. Cord. in Diosc.

Ges. hor. l. ac. Cast. Lugd. Portæ.

Allium porrinum, Car. Stephano.

Scorodoprasum & porrum Turcicum, Amat.

VI. Allium sphaericeo capite, folio latiore, sive scorodoprasum alterum.

Ampeloprasum primum, Dod.

Scorodoprasum sive allioporrum, Ad.

Scorodoprasum, Lob. Cæs.

Scorodoprasum, Clus. pan. & hist.

Scorodoprasum alterum, Lugd. qui cum sequenti eadem tabellâ pinxit.

Porrum Indum, Cam.

VII. Allium sphaericeo capite folio angustiore.

Scorodoprasum alterum, Lob. Lugd.

IX. Allium sylvestre latifolium.

Allium syl. quod vrsinum vocant, Plin. l. 19. c. 6.

Allium syl. Brunf. Trag. (& colubrinum) Eri.

Cordo: syl. latioris folij, Dod.

Allium vrsinum, Matth. Fuch. Dod. gal. Ama.

Ges. col. Tur. Clus. hist. Lugd. Thal. Cæs. Cast.

Cam. Eyst.

Allium vrsinum latif. Ad. Lob. Lug.

Allium syl. bifoliū & arctoscorodum, Ges. hor.

Allium syl. ophioscorodon appellat, Cord. in Diosc.

Ophioscorodon, Lon.

an Scorodoprasum, Ang.

Moly, sive Allium Vrsinum, Sver.

Sunt qui Dioscoridis Scorodoprasum, aut eius Ampeloprasum, aut Ophioscorodon, sed male, censent.

IX. Allium montanum, latifolium maculatum.

Allium anguinum, Matth. Lugd. Portæ. serpentinum, Cast.

Ophioscorodon, Lob.

Victoralis longa, Ges. hor. Clus. pan. & hist. (cui & major) Eyst.

Allium alpinum, Ges. hor. Dod. Tab. cui & Victoralis mas.

Est mas & femina, illa latioribus, hæc angustioribus est folijs, quare

Victoralis mas, & femina, Camerario dicitur.

X. Allium syl. campestre purpurascens.

Allium caninum primum, Trag.

Allium syl. primum, Fuch.

Allium campestre, Cord. in hist.

Allium syl. Ges. hor. Cæs. Cast. syl. minus, Dod. gal.

Allium tenuifolium, Cam.

XI. Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus.

Allium in arvis, Plinio.

Allium sylvest. quod Ophioscorodon, Ruel. Matth.

Allium syl. tenuifolium, Ad. Lob. ico. Dod.

XII. Allium syl. capitatum purpurascens minus: quod à primo potissimum magnitudine differt, cum palmare sit, & folijs junceis.

XIII. Allium syl. bicorni flore obsoleto.

Allium caninum alterum, Trag.

Allium syl. Tur. syl. alterum, Fuch.

Allium sylvestre majus, Dod. gal.

Allium rubentibus nucleis, Lob. ico.

Est majus & minus.

XIV. Allium aquaticum.

Allium fluviatile in sabulo ad Albim fluvium in Misnia, Franc. hort. Lusat.

#### ALLIUM MONTANVM.

I. Allium mont. bicorni latifolium flore dilute purpurascens.

Allium sive Moly mont. latifol. 1. Clus. pan. & hist.

II. Allium montan. bicorni angustifolium flore purpurascens.

Ampc-

**Ampeloprasum proliferum**, Lob. ico. Cam.  
**Ampeloprasum** 1. Cam. apud Matth.  
**Allium** sive **Moly montan.** 2. Clus. pan. (& **Moly montan.** gramineo folio) & hist.  
**Moly montanum** carmineo colore, Svver.

III. **Allium mont.** bicornae flore exalbido.  
**Allium** sive **Moly montan.** 3. Clus. pan. (& **Moly mont.** junceo folio) & hist.  
**an Gethioides** syl. Colum.

IV. **Allium mont.** bicornae flore obfoletiore.  
**Allij mont.** quarti species 2. Clus. pan. & hist.  
 Huc referri potest  
**Moly lurido** colore, Svver.

V. **Allium m.** nt. bicornae fl. pallido odore.  
**Allij mont.** quarti species 1. Clus. pan. & hist.

VI. **Allium juncifol.** bicornae luteum: quod 1. est in Prod. Monspelio D. Saltzman. attulit.

VII. **Allium mont.** capite rotundo.  
**Allium** sive **Moly mont.** 5. Clus. pan. (& **Moly mont.** purpureo flore) & hist.

IX. **Allium Pyrenæum.**

**Moly Pyrenæum** purpur. flore, Clus. hist. ap. alt.

IX. **Allium mont.** folijs narcissi majus.  
**Alliū** sive **Moly narcissinis** fol. 1. Clus. pan. & hist.  
**an Moly folijs Narcissi**, Lob. Lugd.

Variat: 1. est, folijs splendentibus viridibus, floribus purpureis. 2. folijs magnis cinereis & mollioribus, floribus dilutioribus. hoc posterius, est **Moly narcissin.** folijs primi altera spec. Clus. hist.

X. **Allium montan.** folijs Narcissi minus.  
**Allium** sive **Moly Narcissinis** folijs 2. Clus. pan. & hist.

**Allium saxatile** & **Bulbus vomitorius**, Cam.  
 Et hujus altera species folijs longioribus & angustioribus, floribus dilutioribus, & est **Moly narcissin.** fol. secundi alt. spec. Clus. hist.

XI. **Allium mont.** radice oblonga: quod 2. in Prod.

**an Allium mont.** sive **Petroscorodon**, Gef. hor.  
**Allium mont.** radice oblonga, Eid. col. stirp.

XII. **Allium montanum** minus: quod 3. in Prod.

## MOLY ET EIVS SPECIES.

**M**ΑΤ, ἀπὸ τῆς μολύειν τὰς νόσους, ab amoliendis morbis. Vnius Theoph. 9. hist. 15. & Dioscorid. l. 3. c. 54. meminere: at Plin. l. 25. c. 4. duplex proposuit: alteram radice rotunda: alteram verò longa.

I. **Moly latifolium** liliflorum.  
**Moly** Theoph. fortè & Plinij radice rotunda.  
**Moly** Theoph. Ang. Dod. Clus. hisp. & hist. Cam.  
**Moly** liliflorum, Ad. Lob. Lugd.  
**Moly latifolium**, Moly Theoph. Dod.  
**Moly** Homericum, Scillæ alterum genus, & **Pancratium**, Diosc. Cæs.  
**Moly Indicum** flore purpureo, Svver.  
 Flore est candido, vel subrubente.

II. **Moly latifolium Indicum.**  
 Duplex figura proponitur: altera priori similis, paucis folijs, caule oblongo, capite rotundo: altera, folijs plantaginis, caule brevi, capite ex pluribus bulbulis compacto: illud dicitur **Caucasum**, **Moly Indicum** vocatum, Lob.  
**Moly Ind.** Dod. Lugd. **Indicum** 1. Tab. 2. Cam.

Alterius figure nomina:  
**Caucasum**, Lob. ico.  
**Moly Indicū**, Clus. hisp. & hist. **Indicum** 2. Tab.  
**Narcissus** sive **Pancratium** Clusij, Svver.

III. **Moly latifolium Hispanicum.**  
**Moly Hispanicum** purpureum, vel **Moly mon-**

**tanum** latifol. purpur. Hispan. ad Clus. cur. post.  
 Flores plus minus 60. dilutè rubentes, aut purpurascetes. Huc refer  
**Moly latifolium**, Eyst.

IV. **Moly latifol.** luteum odore allij primum.  
**Moly mont.** latifol. flavo flore, Clus. hist. ap. alt.  
**Moly luteum** Boranicorum **perperam** Ornithogalum luteum latifolium, Lob. ad. par 2.  
**Moly flavo** flore, Svver.

V. **Moly latifol.** luteū odore allij secundum.  
**Moly latifolium** flore flavo, Eyst.

VI. **Moly Africā.** vmbella purpurea. in Prod.  
 VII. **Moly exoticum** florib. albiviridibus.  
**Moly** flore albo lineis viridis coloris, Svver.

IX. **Moly angustifolium** vmbellarum.  
**Moly**, Matth. Cast. Lugd. Lon. angustifolium, Dod.

**Moly Dioscoridis**, Lob. Clus. hisp. & hist. Cam.  
**an Allium vrsinum** alterum, Cæs.

IX. **Moly humile** folio gramineo.  
**Chamæmoly**, an **Moly Diosc.** Colum.

X. **Moly parvum** caule triangulo.

Moly parvum Pefarenfe, Ponn. Ital.

XI. Moly angustifol. florib. majoribus.

Moly minus, Cluf. hist.

Moly minimum albo flore, Svver.

XII. Moly angustifolium folijs reflexis.

Moly serpentinum vocatum, Lob. Lugd.

Scorodoprasum alterum Clusij, quibusdam.

XIII. Moly atropurpureum Svver. mihi incognitum.

XIV. Moly moschatum capillaceo folio.

Allium syl. perpusillum juncifolium moschatum, Lob. ad. part. alt.

## SECTIO QUINTA.

### LILIVM: MARTAGON: CORONA

IMPERIALIS.

#### LILIVM ET EIVS SPECIES.

**L**ILIVM, κρίνον & λείριον *Græc.* Theoph. 6 hist. 6. Lilij florem variare dixit, & purpureum esse, singulis annis, aliàs unum, aliàs plura exire. Dioscorides l. 3. c. 116. duo genera agnovisse videtur, dum scribit, & rubra lilia esse. At Plinio l. 21. c. 5. Lilium triplex, album, rubens, purpureum, quod aliquando gemino sit caule, quod Narcissum vocent. Drivdinus in Lilium radice bulbosa & una, ut sunt Lilia alba, Martagon: vel pluribus, Asphodeli bulbis constante, ut Lilium luteum & rubrum.

#### LILIVM ALBUM

I. Lilium album flore erecto & vulgare.

Lilium sive rosa Iunonis, Apuleio.

Ambrosia sive Lilium album Nicandri, Ang.

Lilium Brunf. Dod. gal. Tur. Matth. Lac. Cast.

Cæf.

Lilium album, Trag. Fuch. Ges. hor. Ang.

Lon. Lugd. Tab. Eyft.

Lilium candidum, Cord. in Diosc. Ad. Lob.

Dod. Franco.

Lilium album vulgare, Cam.

Variat: aliquando circa caulis medium, foliorum quasi cespes, ut pingit Bry, nomine

Lilij multisilij Sturgardiæ nati.

aliquando ex caule plano trium vnciarum lato, numerosi flores exurgunt, ut idem figuram habet, cui titulus.

Lilium liliorum, sive 122. lilia ex eodem bulbo enata.

II. Lilium album floribus dependentibus, sive peregrinum.

Sultan Zambach (sive Martagon Constantino-

politano) Cluf. pan. & hist. Eyft. du Bry.

Martagon album, Lilium candidum Byzanti-

num, Lob. ico.

Lilia candida Martagonis Constantinopolitani nomine insignita, Lob. ad. par. alt.

Lilij albi species alia, Cam.

Hoc nonnunquam sexagenos flores in plano & lato caule protulit, quare

Lilium alb. Byzantina. *πελοννησις*, Clusio.

Sic Lobeli<sup>us</sup> ad. part. alt. in taule palmaris latitudinis, humanæ proceritatis, ducentos & plures candidissimos & suavissimos flores observavit.

Huc referendum

Lilij pulchri albi & ignoti species Theophrasti, Rauwolfii.

Lilium album Syriacum, Lugd. in ap.

an Lilia cædidissima in Baya, medicinæ tota vtilia, Linc. par. 4. Ind. or. c. 14.

#### LILIVM PURPUREOCROC- ceum.

I. Lilium purpureocroceum majus.

an Bulbus cruentus, Hippocrati.

Lilium purpureum Diosc. rubens Plinij.

Hemerocallis Diosc. Matth. Amat. Ang. Lac.

Cast.

Hemerocallis i. Matthioli, Cam. & Lugd.

Hya-

Hyacinthus & Cosmofandalos Poëtarum, Dod. & Portæ.

Lilium rubrum, five aureum, Brunf.

Lilium rufum, Trag. Dod. gal.

Lilium rubens, Gef. cat. Fuch. ico.

Lilium rubens vel croceum alterum, Gef. hor.

Lilium croceum, Fuch. Lon. fyl. croceo flore, Cæf.

Lilium purpureum, Tur. Ad. purpur. majus, Lob. Dod. (& Cynorrhodon Plinii, vt & Ang. & Portæ) Lugd. Eyft.

Lilium aureum majus, Tab.

Martagon, Caft. ico.

Martagon radice alba, Ang.

Martagon Chymiftarum, Lob. ico.

Vidi & candido flore.

II. Lilium purpureo croceum flore pleno.

Hemerocallis 1. Matthiol. flore pleno, Cam.

Lilium cruentum flore pleno, Eyft.

III. Lilium purpureo croceum minus.

Lilium purpureum minus, Ad. Lob. Dod.

Lilium purpur. alterum minus, Lugd.

Lilium rubrum minus non bulbiferum, Cluf. pan.

Martagon 3. Hyacinthus Poëtarum, Ang.

Lilium puniceum non bulbiferum minus, Cluf. hift.

Variat: communiter flore puniceo & quasi rubente, numero paucioribus: aliquando viginti & plures observantur: reperitur & pleno flore, duodecim, viginti, aut plurimum foliorum textura, constans.

IV. Lilium phœniceum.

Martagon phœnicum dilutum, Lob. belg.

Martagon Chymiftarum alterum, Lob. ico.

Lilium puniceum non bulbiferum majus flore diluto, Cluf. hift.

Flores nonnunquam sexaginta vno caule.

V. Lilium Sandycis colore polyanthos.

Lilium cruentum polyanthos, Eyft.

Flores 84. in hoc observati.

VI. Lilium cruentum planraginis folio.

Lilium cruentum latifolium, Tab. quod?

Lilium cruentum bulbos gerens, Lugd.

Martagon bulbif. majus, Cluf. pan. vel primum, Eid. hift.

Martagon rubrum, Tab.

II. Lilium bulbiferum angustifolium.

Martagon cruentum angustifolium, Lob. ico.

III. Lilium bulbiferum minus.

Lilium rubens vel croceum alterum, &

Lilium rubens semiferum, Gef. hor.

Lilium cruentum 4. secundum caulem bulbulis donatum, Lob. cruentum aliud, Lugd.

Lilium purpureum tertium, Dod.

Martagon bulbifer. minus, vel pratense, Cluf. pan.

Martagon bulbifer. 3. vel lilium puniceum bulbiferum 3. Cluf. hift.

Hemerocallis prima Matthioli bulbifera, Cam.

Lilium cruentum bulbif. Eyft.

IV. Lilium bulbiferum incanum.

Martagon bulbifer. incanum, Cluf. pan. vel 2. Eid. hift.

Hujus iconem, Lobelius primo, adiunxit, & apud Lugdunensem, sub Lilio cruento bulbos gerente pingitur.

#### LILIVM FLORIBVS RE. flexis latifolium.

I. Lilium floribus reflexis montanum.

Affodillus, Brunf.

Hyacinthus Poëtarum, vel. 5. Trag.

Afphodelus foemina, Fuch.

Lilium purpureum, Fuch. ico. Gef. hor.

Lilium fyl. Dod. Cam. alterum, Cluf. pan.

Lilium fyl. purpureo flore, Cæf.

Lilium alterum, Martagon Italis, quod Petilium Plinius appellat, Ama.

Lilium montanum, Ad. Lob. five fyl. 2. minus, Cluf. hift.

Martagon, Matth. Lac. Lugd. Caft. desc.

Martagon primum, Ang.

Hemerocallis, Dod. gal. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lon.

Lilium montanum flore purpurascens puniceum, Eyft.

Variat floris colore, qui plerumque subruber, aliquando dilutus albicansque: sic & maculae rubrae inordinatae florum folijs, & intus & foris, maxime circa foliorum exortum, intrinsecus asper-

asperguntur: huius tres differentias Clusius agnoscit: huc referre oportet

Martagon Pannon. flore suave rubente, ipsius Bry.

Reperitur etiam longiore spica, & dicitur Martagon mont. longiore spica, Bry: & etiam quasi duplici corolla ab eodem pictum, Franco-karti natum.

II. Lilium floribus reflexis alterum, lanugine hirsutum.

Lilium purpureum mas, Gef. hor.

Lilium syl. primum & majus, Clus. pan. & hist.

Hemerocallis flore rubello, Lob. ico.

Lilium Saracenicum, Tab.

Flores priore plures, saturatè purpurascen-tes, maculis nigricantibus distincti: aliquando dilutè purpurascen-tes, maculis carentes; Lilium flore purpurascen-te non punctatum, Eystett.

Pingit insuper Bry

Martagon exoticum flore spadiceo, &

Martagon flore carneo.

III. Lilium floribus reflexis, varijs, five tertium.

Lilium mont. five syl. tertium, Clus. hist.

Lilium montanum max. polyanthos variegatum, Eyst.

Simile est Clusiano.

Flos antequam explicetur, foris carneus: explicatus, intus albus, notis purpureis insignitus.

Clusius & quartum genus addit, floribus saturatè purpurascen-tib; ferius florentibus, & odore non insuavi præditis.

IV. Lilium flor. reflexis albis non punctatis.

Lilium mont. albo flore, Clus. hist. ap. alt. & cur. post.

Lilium mont. minus alb. non punctatum, Eyst.

Martagon imperiale niveum sine maculis, Bry.

V. Lilium flor. reflexis albis punctatis.

Lilium montanum albis floribus maculis purpureis insignitis, Clus. cur. post.

Lilium mont. majus alb. punctatum, Eyst.

VI. Liliū flor. reflex. polyanth. alb. punctat.

Lilium montanum maximum polyanthos album rubris maculis aspersis, Eyst.

VII. Lilium Byzantinum miniatum.

Lilium rubrum Zuphiniare, five miniatū Chalcedonicum, Clus. pan.

Lilium rub. five miniat. Byzant. Eid. hist.

Hemerocallis Byzantina altera, Lob. ico.

Lilium Chalcedon. miniatum serotin. Lob. ad. par. alt.

Hemerocallis Constantinopolitana phœnicea vnico flore; Lugd.

Flos colore elegantissimi minij aut ceræ rubræ recentis, rarius prorsus nivei, aliquando flavicoloris: modò vnus, modò duo, quatuor, quinque, sex, tredecim.

IX. Lilium Byzant. miniatum polyanthos.

Lilium Byzant. miniatò saturatiore flore *reclat*, five Zupiniare, Clus. hist.

Liliū Chalced. miniat. præcox, Lob. ad. par. alt.

Flores quinos, senos, denos vt plurimum profert, rarius 20. 30. vel 40. in caule duorum triumve digitorum latitudine, aliquando saturationis, aliquando dilutionis coloris, hocq;: Lilij Byzantini miniatì dilutionis floris nomine pingitur à Clusio in hist.

Lilium Byzantinum serotinum, Eyst.

Lilium Byzant. flore multiplici, Eid.

Hoc florum foliorum numero duodenario, & staminum multitudine à priore discrepat.

Varietas in folijs: quæ flore est dilutiore, caulem & folia viridiora habet: quæ verò saturatiore, huius caulis & folia plerumq; ex purpura nigricant. Aliquãdo flores in modū corollæ dispositi nascuntur, vt Bry pingit, nominans Martagon corollam præbens.

IX. Lilium purpureo sanguineū fl. reflexo.

Hemerocallis altera, Matth. Lug. quâ cum Lilio Zupiniani eandem vult, Clus.

Lilium sylvestre alterum, Dod. ico.

Hemerocallis Chalcedonica purpureo sanguinea polyanthos, Lob. Cam. (cui idem cum Lilio Zupiniani Clusij) Bry.

X. Lilium pyramidale moschatum.

Lilium syl. five Hemerocallis moschata polyanthos, &

Martag. imperiale nuperorum, Lob. ad. par. alt.

Martagon imperiale moschatum, Eyst.

Est florum centum & viginti & plurium, rosæ moschatae odore, qui diluti & lividi coloris inaculis ex fusco purpureis notati: florum 250. ferax in horto Eyst. conspectum fuit.

#### L I L I U M F L O R I V S R E - flexis angustifolium.

I. Lilium rubrum angustifolium.

Lili



*Lilium rubrum præcox*, Cluf. hist. Bry.

Vno, duobus, tribus est floribus: & quia aliquando angustioribus est folijs, vel latioribus, ideo Clufius in hist.

*Lilium rubrum præcox* 1. & 2. facit.

II. *Lilium breui* & gramineo folio.

*Lilium rubrum præcox* 3. angustifolium, Cluf. hist.

*Lilium miniat. tenuifol.* Cluf. hist. ap. alt.

*Hemerocallis Macedonica* & *Martagon Pomponium*, Lob. ad. par. alt.

*Lilium montanum rubrum præcox*, Eystett.

Floribus aliquando 35. 46. & 48. sed in plano caule, vel miniati, vel cruenti coloris.

III. *Lilium miniatum* od. rum angustifolium.

*Lilij miniati tenuif.* aliud gen<sup>o</sup>, Cluf. hist. ap. alt. *Martagon Pomponij*, Eid. & cur. post. & Eyst.

IV. *Lilium flavum angustifolium*.

*Lilium montanum flavo flore maculis distinctum* & non distinctum. Cluf. hist. ap. 1. & alt.

*Lilium montan. flavo flore*, Lob. ad. par. alt.

*Lilium montanum flore luteo punctatum* & non punctatum, Eystett.

*Martagon* five *Hemerocallis punctata flavo fl.* & *Martagon* non punctatum, flore flavo, &

*Martagon* five *Lilium* de Canada auri colorem referens, flore intus nigris maculis asperso, Bry.

*Lilium montanum magis flavo flore* & atrioribus maculis, Cluf. cur. post.

Variat flos colore flavo, vel dilutiore quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clufius in hist. ap. de. nominat: variat etià subviridi flo. & dicitur *Martagon subviridi flore*, Bry.

# LILIVM SIVE CORONA

Imperialis.

I. *Lilium* five *Corona Imperialis*.

*Corona Imperialis*, Dod. Lugd. (& *Chalcedonicum* Lale) Lon. Tab. Cam. Eyst. Rob. qui & *Coronam* imperialem majorem addit.

*Lilium* five *Corona Imperialis*, Lob.

*Tufai* five *Lilium Persicum* 1. (& *Hemerocallis* *Dioscoridis*) Cluf. pan. & hist. & du Bry.

Variat flos colore luteo, vel verius pallescens,

te, vel purpurei *Lilij* instar rubente, aut *Sandaracæ* colorem refert, & hæc dicitur *Tufai* 2. Clufij hist.

At *Lobelius* ad. part. alt. varietatem in caule, flore & folio adfert: cui alia præcocior, alia ferotina: præcocior altera folio lato dilutè vi-  
rente, fl. pallidior; altera media, quæ elatior, folio pallidior, angustior, flore dilutiore. At ferotina folijs latioribus, atrovirentibus, flore saturo phœniceo.

II. *Lilium*, five *Corona imperialis multiflora* lætæque caule.

*Tufai*, five *Lilium Persicum* 3. & *Tufai πολυανθης*, Cluf. hist. pan. & rar.

*Corona imperialis polyanthes*, Eystett.

*Corona platycaulis*, five *laticaulis*, Lob. ad. par. alt.

Flores 20. 30. 40. 50. & etiam 70. in caule lato, qui sequenti anno caulem rotundum acquirit, cum 3. 5. 7. aut octo floribus.

III. *Lilium* five *Corona imperialis duplici corona*.

*Corona imperialis phœnicea duplici corona*, aut serie florum, Lob. icon.

*Corona imperialis polyanthes*, Tab. ico.

*Corona imperialis florum clausæ duplici*, Eystett.

*Corona polyphyllis* five *foliosa*, Lob. ad. par. alt.

*Tufai*, five *Lilium Persicum* 2. du Bry.

*Corona imper. duabus coronis ornata flore flavescens*, Svver.

Et hujus varietas apud *Lobel.* caule numerosis folijs stipato, corona duplici nonnullis floribus in caulibus fastigio: altera, flore dilutiore minus propendente, ob florum acervum caulem ambiente: & hæc est

*Corona polyphyllis* & *polyanthes altera*, Lob. ad. par. alt.

IV. *Lilium* five *Corona imperialis non fecens*.

*Tufai* quarta differentia, Cluf. hist.

V. *Lilium* five *Corona Imperialis ramosa*.

*Tufai διπλωρος*, Cluf. hist.

Ramis singulis 11. flores: vel in altero 8. vel plures: in altero, 5. vel sex.

# LILIVM PERSICVM

*Lilium Persicum*, Dod. (& *Hyacinth. spurius* 6.) *Lilium*

6.) Lob. ( & Pannachio Perſianorum) Lugd.  
Tab. Cam. Eyſt. Rob. Sver. Bry.  
Lilium Suſianum, Cluſ. pan. & hiſt. Bry.

LILIVM ASPHODELI  
radice.

I. Lilium luteum aſphodeli radice.  
Lilium non bulbolum luteum, Dod. Lug. Ger.  
Lirioſphodelus luteus liliſlorus, Ad. Lob.  
Liliaſphodelus luteo ſloro, Cluſ. pan. hiſt. Cam.  
Liliago minor aſphodelo affinis, Hemerocal-  
lis Dioſcoridis videtur, Cæſ.  
Aſphodelus liliaceus, Eyſt. luteus, Tab.  
Flore eſt communiter luteo, rarius albo.

II. Lilium rubrum aſphodeli radice.  
Hemerocallis Dioſc. Theoph. & Plinij.  
Lilium rubens harundinaceum, Gef. hor.  
Lilium non bulbolum obſoleto colore rubens  
Dod.  
Lirioſphodelus phœniceus, Lob.  
Liliaſphodelus puniceus, Cluſ. hiſt.  
Lilium rubrum non bulbolum, Lugd.  
Liliago maior aſphodelo affinis, Cæſ.  
Aſphodelus liliaceus rubens, Tab.  
Lilium non bulbolum ſive arundinaceum, Cam  
ſive phœniceum, Ger.  
Lilium ſatuum, Eyſt.

SECTIO SEXTA.

ORCHIS: SATYRIVM: DENS CANIS:

OPHIRYS: OROBANCHE.]

ORCHIS EIVSQUE DIF-  
ferentia.

ΟΡΧΙΣ ſive Teſticulus, à Theophrasto 9. hiſt. 19. & Dioſcoride l. 3. c. 141 proponitur: Dioſcorides, inter Orchidem, & Satyrium differentiam hanc fecit: Ορχιδας vocans, quæ radicem bulbosam habent, eamq. geminam, oblongam oliva modo angustam, ſuperiorem pleniorẽ, & inferiorem molliorem, ac rugosiorẽ. Satyrium autem, quod radicem habet unam, eamq. bulbosam, mali magnitudine.

Genera Orchidis, Dioſcorides duo fecit: unum, Κυνὸς ὄρχιν, teſticulum canis: alterum, σερapiάδα cognominatum. Sic Satyrium duplex, alterum σατύριον τριφυλλον; alterum σατύριον ἑνυφύγιον, vel ἑνυφαικόν. Plinius l. 26. c. 10. Orchideum Satyriorumq. descriptiones confundit: & l. 22. c. 8. Cynosorchidis nomine repetiit.

Liber diſtingvere in eas, quæ radices habent, vel rotundas teſticulorum forma, vel palmas manusve referentes. Illas, in eas quæ radices habent vel geminas, quas Orchides: vel unicam, quas Satyria nominabimus: has verò Orchides palmatas appellabimus. Orchidis genera facimus, Cynosorchin ſive Canis teſticulum, Teſticulum morionis, Orchin ſatidam, ſive Teſticulum hircinum: Orchin Serapiada, vel Teſticulum vulpinum & Teſticulum odoratum: ad quæ generâ quinq. Orchidum ſpecies reduci poſſunt.

CYNOSORCHIS, SEV T. E.  
ſticulus canis.

I. Cynosorchis latifolia hianthe cucullo major.

Satyrium primum, Brunf. mas, Trag.  
Orchis mas latifolia, Fuch. vel major, Lon.

Orchis & Teſticulus canis officin: Ama. latifol. Eyſt.  
Orchis ſive Teſticulus & Cynosorchis, Ang.  
Orchis prior Dioſcoridis, Corn.  
Orchis primum genus, Dod. gal. Lugd. Thal.  
Teſticulus 9. Matth. 3. Lac.

Teſt.

Testiculifol. Tab. & Satyrion triphyllon, Eid.

II. Cynosorchis latifolia hianthe cucullo altera.

Cynosorchis mas nostra vel, 4. testiculus, Trag.

Cynosorchis nostramajor, Lob. Lugd.

Cynosorchis prior, Dod. media, Cam.

Cynosorchis major 3. Tab. & altera, Ger.

Serapias Dioscoridis, sive Basilica Siderites, vel Erythræa, Gemmæ.

III. Cynosorchis latifolia spica compacta.

Cynosorchis tertia, Dod. Lugd.

Cynosorchis major altera nostra, Lob.

Cynosorchis major quarta, Lob.

Cynosorchis palustris, Ger. ico.

Orchis, Cynosorchis & Testiculus canis major flore incarnato, Cam.

Serapias Dioscoridis secunda, sive Orchis basilica altera syderites flore candidiore, Gem.

Satyrion sive Orchis major rubra, Syver. du Bry.

IV. Cynosorchis latifolia hianthe cucullo minor.

Cynosorchis altera, Dod. Lugd. Tab.

Cynosorchis major, Ger.

Cynosorchis majoris secunda species, Lob.

Hæc communiter latioribus, rarius angustioribus folijs reperitur.

V. Cynosorchis angustifolia hianthe cucullo: quæ 1. est in Prod.

#### CYNOSORCHIS MILITARIS.

I. Cynosorchis militaris major.

an Testiculus 4. cum Cynosorchide 2. Trag.

Testiculus alius tertio loco, Cord. hist.

Cynosorchis quarta, Dod.

Orchis strateumatica sive stratiotes major, sive militaris, Gemmæ, quæ Basilica 3. Lob.

Orchis strateumatica major, sive Basilica tertia Gemmæ, Lugd.

Orchis latifolia altera, Clus. pan. & hist.

Testiculus 5. militaris, Tab.

Omithophora candida, Ger. ico.

Orchis purpurea, du Bry.

II. Cynosorchis militaris media.

Orchis flore rubro elegantissimo, Clus. pan. at secunda, Eid. in hist.

III. Cynosorchis militaris minor.

Orchis strateumatica minor, Genu. Lob. Lugd.

Orchis strateumatica, Ger.

Testiculus strateumaticus minor, Tab.

IV. Cynosorchis militaris montana spica rubente conglomerata: quæ 2. in Prod.

V. Cynosorchis militaris pratensis elatior, floribus variegatis: quæ 3. in Prod.

VI. Cynosorchis militaris pratensis humilior.

Orchis Pannonica 4. Clus. pan. & hist.

Orchis minor fl. incarnata, Eyit.

Orchis Pannonica, du Bry.

Hujus species altera ampliore, crassiore & longiore spica.

VII. Cynosorchis montana purpurea odorata.

Orchis quinta odora serapiada Diosc. Trag.

Orchis quarta Dodonæo, Lugd.

Testiculus primus, Matth. species 4. Eid. comp.

Testiculus candidus, Cord. hist. ico.

Orchis femina, major, Fuch.

Orchis femina Eid. ico. Tur.

Orchis tertium genus, Dod. gal.

Testiculus 12. Tab.

Major & minor habetur, quare species duæ Trag.

IX. Cynosorchis obscure purpurea odorata.

Orchis Pannonica tertia, Clus. pan. & hist.

Cynosorchis flore purpurascente, Eyit.

IX. Orchis globoso flore.

Orchis rotunda Dalechampij, Lugd.

an Orchis species, floribus quasi in umbella, Thal.

X. Chamæorchis alpina folio gramineo: quæ 4. in Prod.

#### ORCHIS MORIO.

I. Orchis morio mas folijs maculatis.

Satyrion mas, Brunf. Cynosorchis, Eid. Ang.

Testiculus 1. Matth. ico. 4. Eid. fol. Lac. Cast.

Orchis altera Dioscoridis, Corn.

Orchis mas angustifolia, Fuch. Tur.

Orchis mas minor, Lon.

Orchis Delphinia palustris, Gem.

Orchis 2. genus, Dod. gal. Thal.

Testiculus morionis mas, Dod. Lugd.

Cynosorchis morio, Lob. Franç.

Cynosorchis morio mas, Tab.

Cynosorchis maculata, Ger.

L

Saty-

**Satyrium Apulei, Sver. du Bry.**

Flore est purpureo, vel ex roseo candido, purpureis maculis notato.

II. Orchis morio folijs sessilibus maculatis. Cynosorchis delphinia sessilibus maculosis obtusioribus folijs, flore purpureo violaceo, caule sesquicubitali, Lob. ico.

Cynosorchis maculata, Tab.

Cynosorchis morio mas, Ger. ico.

III. Orchis folijs sessilibus non maculatis. Orchis colore vario, vel 5. Clusij, pan. & hist. descript.

Variat floribus colore, modò purpureo saturatiore, modò dilutiore, modò carneo, modò omnino lacteo; nunc maculis, interdum nullis, aspersis.

IV. Orchis morio femina.

Testiculi species tertia, Marth.

Testiculo alteri adjungit, Lac.

Orchis, sive Cynosorchis femina minor, Fuch.

Orchis angustifol. femina altera, Fuch. ico.

Orchis tertium genus, Dod. gal.

Orchis delphinia montana, Gem.

Testiculus morionis femina, Dod. Lugd.

Cynosorchis morio femina, Lob. Lugd. Ger.

Cynosorch. morio 3. Tab. Cynosorchis femina, Eyst.

an Testiculus alius, Cord. hist.

Huc referri potest.

Orchis angustifol. femina altera, Fuch. ico.

Orchis sive Cynosorchis femina minor, Fuch.

Orchis quartum genus, Dod. gal.

V. Orchis morio minor, folijs maculatis.

Cynosorchis minimis & secundum caulem pedalem & cubitalem maculosis folijs, floribus purpureis, Lob. ico.

Satyrium maculosum, Sver.

VI. Orchis flore nudi hominis effigiem representans, mas.

Orchis Antropophora oreades altera, Colum.

VII. Orchis flore nudi hominis effigiem representans, femina.

Orchis antropophora oreades, Colum.

IX. Orchis flore simiam referens.

Orchis Zoophora cercopithecum exprimens Oreades, Colum.

#### ORCHIS FOETIDA.

I. Orchis barbatus odore hirci, brevior latiorq; folio.

Tragorchis, Dod. gal. maximus, Ger.

Testiculus hirci, Dod. Lob. ob. primus, Tab.

Testiculus, sive Tragorchis, Ad.

II. Orchis odore hirci longior angustiorq; folio.

Testiculus hircinus vulg. & leporis testic. Lob.

Testiculus hircinus secundus, Tab.

Testiculus lingua bifurcata, Cæf.

Orchis saurodes, vel scincophora lacertarum æmulatione, Gemmæ, Lugd.

Testiculus hircinus vulgaris, Lugd.

Tragorchis mas, Ger.

III. Orchis odore hirci minor.

Tragorchis minor & verior, Gem. sive Coriophora, Lob. Lugd.

Testiculus hircinus tertius minor, Tab.

Tragorchis femina, Ger.

IV. Orchis odore hirci minor spicâ purpurascente.

Orchis Batavica sexta, Clus. hist.

V. Orchis spicâ purpureâ foetida.

Orchis terribilis odore foetida, Clus. pan. & hist.

### ORCHIS SERAPIAS.

**S**erapiades dicuntur, quod horum flores infesta fecunda & lasciva referant, tanquam à Serapiade Alexandrinorum olim deo nomen habentia: cuius templum excellens Canopi erat, ubi lascivius, cantibus & saltationibus colebatur, Strabone 17. sua Geographia referente.

I. Orchis bifolia latissima.

Orchis latifolia maxima, Clus. pan.

Orchis prima amplissimis folijs, Clus. hist.

Orchis bifolia latifolia, Thal.

II. Orchis bifolia altera.

Orchis latifolia altera, Clus. pan. & hist.

Orch. hermaphrodita, Lug. Ger. secunda, Gem.

Testicul. vulpin', Eyst. hermaphroditicus, Tab.

Orchis psychodes diphylla, Lob.

Orchis bifolia, Tab.

Testi-

Testiculi species quinta, Cam. epit.

III. Orchis alba bifolia min. calcare oblōgo.

Orchis altera serapias, Gef. cat.

Orchis altera Satyrium vulgō, Ang.

Orchis serapias, Bras. at primus, Dod. Lugd.

Orchis bifolius, Cam. Orchis fl. albo minor, Eyst.

Testiculus bifolius, Cord. hist.

Testiculi tertij species prima, Matth. Lugd.

Testiculus vulpinus, Franco.

Testiculus vulpinus primus, Lob. latifol. Tab.

Orchis Ornithophora, Ger. ico.

Orchis flore albo, du Bry.

IV. Orchis trifolia major.

Testiculus sacerdotis, Ruel.

Orchidis vndecima species, Trag.

Testiculus candid. odorat. major, Cord. hist.

Testiculus vulpis, Dod. gal. Lugd.

Satyrium trifolium, Fuch. Tur. Lon. qui tres bulbos adpingit.

Triorchis trifol. Tab. & triorch. major mas, Eid.

Satyrium trifolium, Ama. Tab.

Flore communiter est candido: reperitur & purpureo: si quis cum præcedenti eandem velit, facile assentiemur.

V. Orchis trifolia minor.

Culices minores triphyllæ, Lob. ico.

VI. Orchis hermaphroditica.

Orchis batrachites, Gem. Lob. Tab. Lugd.

Orchis Melittias, Ger. ico.

VII. Orchis fucum referens major foliolis superioribus candidis & purpurascens.

an Orchis Serapias Dioscoridis.

Satyrium quartum, Brunf.

Orchis sexta, & satyrium alterum, Trag.

Orchis five Testiculus minor violaceis floribus,

Cord. hist.

Orchis serapias femina, Dod. gall.

Orchis serapias secundus major, Dod. Lugd.

Orchis secunda species Dodonæi, Lugd.

Orchis sphogodes, Gem. Lob. ob. Lugd.

Testiculus vulpinus major, Lob. ico.

Testiculus 7. sphogodes, Tab.

Orchis strateumatica, Ger. ico.

Testiculi species 2. Matth. Lac.

Orchis serapias 2. Dodonæi, Lugd. Eyst.

Triorchis femina, Fuch. Lon.

Satyrium floribus apes referens, Tur.

Satyrium, testiculus vulpinus, Svver. du Bry.

VIII. Orchis fucum referens flore subviride.

Orchidis sextæ species altera, Trag.

Testiculus vulpinus minor, Ad.

Orchis serapias secunda minor, Dod.

Orchis melittias five apes cadaveruluna exprimens, Lob. Lugd. Tab.

Triorchis femina, Tab.

Orch. myodes & Testicul. vulpinus major, Ger. ico.

IX. Orchis fucū referens colore rubiginoso.

Testiculo vulpino similis minor, Ad.

Testiculus vulp. 2. sphogodes, Lob. ico.

Satyrium minus, Svver.

Hæc non longe Monspelio in pratis à Lattes, cæruleis, punctatis, albis, pallidis, purpureis, variegatis floribus, reperitur.

X. Orchis muscam referens major.

Orchis myodes altera, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus muscarius quartus, Tab.

XI. Orchis muscæ corpus referens minor, vel galeæ & alis herbis.

Satyrium exiguum & 7. Trag. Satyrium, Tur.

Testiculus pumilio, Cord. hist.

Orchis quintum genus, Dod. gal.

Orchis angustifolia femina tertia, Fuch. ico.

Orchis femina minor, Lon.

Orchis serapias tertius, Dod.

Orchis myodes prima, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus muscarius primus, Tab.

Serapias batrachites, Ger. ico.

Triorchis serapias tertius, Lugd.

XII. Orchis muscam referens lutea.

Testiculus vulpinus luteus, Ad.

Orchis myodes lutea Narbonensis, Lob. Lugd.

Testiculus muscarius tertius luteus, Tab.

Orchis myodes minor, Ger. ico.

Orcheos genus humile, Lugd.

XIII. Orchis angustifolia.

Testiculus 16. minor, Tab.

Orchis andrachnites, Ger. ico.

XIV. Orchis papilionem expansum herbacei coloris referens.

Cynosorchis quintus, Dod.

Orchis ornithophora, vel ornithes folio lævi, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus vulpinus, Tab.

Orchis Ornithophora folio maculoso, Ger. ico.

Orchis, du Bry.

XV. Orchis papilionem referens, folijs maculatis.

Orchis ornithophora fol. maculoso, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus 15. Ornithophorus, Tab.

Testiculus sphegodes, Ger. ico.

Variat foliorum forma, est prægrandibus, parvis, ovalis figuræ ex acuto in latum, vel in rotundum desinentibus: florum colore purpureo, subpurpurascente, albo.

XVI. Orchis papilionem referens angustifolia alba.

Ornithophora candida, Lob. ico.

XVII. Orchis araneum referens.

Orchis andrachnitis, Lob. ico.

XVIII. Orchis montana Italica flore ferrugineo lingua oblonga: sub Orchide 5. in Prod. desc.

Testiculi tertij species prima, Matth. fig. major.

Testiculi 3. species Matthioli, Lugd. fig. 2.

Testiculus 13. Tab.

XIX. Orchis mont. Ital. lingua oblonga altera.

Orchis macrophylla, Colum.

#### MONORCHIS ET TRIORCHIS.

I. Orchis odorata moschata, sive Monorchis.

Orchis pusilla pallida odorata, vel 6. Clus. pan. at 7. in hist.

an Testiculi species minor bulbo singulari, Ges. hor.

Variat folio breviori, latiori, longiori, & angustiori.

II. Orchis lutea hirsuto folio.

Orchis Frisia littoralis, Lob. Lugd. qui & quinram junxit.

Orchis Frisia, Ger.

Testiculus luteus, Tab.

III. Triorchis lutea folio glabro.

Triorchis lutea, Gem. Lob. Lugd. Triorchis lutea 2. Tab.

Testiculus odorat. Ger. quem cum seq. junxit.

Modò terni, modò quaterni pusilli, penduli testiculi subsunt.

IV. Triorchis lutea altera.

Orchis minor Leodiensis, Lob.

Triorchis lutea, Gem. Lugd prima, Tab.

V. Triorchis lutea radice oblonga.

Triorchis lutea tertia Gemmæ, Lob. (qui in icon. etiam 2. junxit, vt & Lugd.) Tab.

Orchis Leodiensis, Ger.

VI. Triorchis, vel Tetrorchis alba odorata major.

Tetrorchis, vel Triorchis alb. spiralis, vel autumnalis, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus odoratus major, Dod.

Triorchis, Ger. Triorchis odorata, Tab.

Aliquando ternos, aliquando quaternos testiculos oblongos fibrosos obtinet.

VII. Triorchis alba odorata minor.

Satyrium 3. vel odoriferum, Brunf.

Testiculus candid. odorat. minor, Cord. hist.

Testiculus odorat. sive Orchis spiralis minor, Lob.

Testiculus odoratus, Ad. Lugd.

Testiculus odorat. minor, Dod. Tab.

Orchis flore albo odorato, Cam.

IX. Pseudoorchis.

Orchis minor radice repente, Cam.

Orchis repens, Eysl.

IX. Chomæorchis lilifolia.

Orchis lilifolius minor sabuletorum Zelandiæ & Bataviæ: sive

Chamæorchis aggerum Zelandiæ & Bulbo criorphoro similis bulbos, Lob. ad. par. 2.

an Pseudoorchis *morifellæ*, Clus. hist.

## ORCHIS PALMATA ET SATYRIUM.

**Q**UAS Orchides palmatas vocamus, eas recentiores Satyria basilica nominant. Brunfelsius verò & Tragus, Orchidum feminas faciunt, eò quòd præter duas radices instar durarum palmarum iunctas (hinc vulgo Palma Christi) notam impudicam, vulvæ muliebri similem, habeant. Digito citrino Avicenna, Matthiolus censet.

Dio-

*Dioscorides* l. c. 3. 143. 144. *σαύριον duplex proposuit: alterum, quod alij τριφυλλον vocant, quod ut plurimum serena folia, rumici aut lilio similia, sed minora atque rubescentia habeat, caule nudo cubitali: flore lili candido: radice bulbosa maius magnitudine, rufa, intus alba, onii instar, sapore dulci, orig. grato.*

*Alterum ἰσθηρόν sive ἰσθηραϊκὸν cognominatum, quod semine est lini majore, firmo, splendense ac laevi: radice cortice aliquantum gracili acyusa, internè alba, dulci & grata: quæ non secus ac prior venerem potenter stimulat. Plinius, Satyrium cum Orchide confundit, ut l. 26. c. 10, videre est, & Satyrii aliud genus erythraicon appellari scribit.*

*Matthioli videtur ad descriptionem Dioscoridis, duplex Satyrium proposuisse: de utroque autem dubitatur.*

### Satyrium.

I. Satyrium primum, Matth. Lugd.

Satyrium trifolium, Cast.

Hoc alij Phallum Hollandicum, alij Faufel, cui tria folia affixa sint, censent.

II. Satyrium erythronium, Matth. Lugd. Cast.

De utroque dubij sumus, & Camerarius in suo emaculato Matthiolo omisit.

III. Satyrium à Guinea, Rob. Sver. nec dum vidimus.

### Orchis palmata.

I. Orchis palmata pratensis latifolia longis calcaribus.

Palma Christi major, Matth. desc. Franco.

Palma Christi altera, Cord. hist.

Palma Christi & Serapias mas lævi folio, Lob.

Palma Christi mas, Ad. Ger. prima, Tab.

Satyrium basilicum, Corn.

Satyrium basilicum mas, Gef. col. Dod. Lon. desc.

Satyrium basilicum majus recentiorum, Lugd. desc.

Satyrium recentiorum Græcorum, & basilicum mas latifolium alterum, Thal.

Palma Christi erecta variegata, Eyst.

Satyrium sive Palma Christi, Sver.

Flores saturato rosei, maculis purpurascensibus insigniti.

II. Orchis palmata pratensis angustifolia major: quæ 6. in Prod.

Palma Christi 3. Eyst.

III. Orchis palmata pratensis maculata.

Orchis femina altera, Trag.

Satyrium basilicum Græcor. & officin. Christi: palma, Ruel.

Satyrii genus, Basilicum Græcum, Gef. cat.

Satyrium Basilic. femina, Gef. col. Lon. Dod.

Palma Christi, Ama. Cord. hist. Cæf.

Palma Christi femina, Ad. Ger.

Palma Christi maculata, Tab. Franco, Eyst.

Palma Christi, serapias femina pratensis, Lob.

Satyrium femina folijs maculatis, Thal.

Serapias femina pratensis, Lugd.

Orchis serapias, Cam.

Satyrium femina, Sver. du Bry.

Variat: flore, qui in purpura vel rubet, vel dilute ad cæruleum inclinat, vel albus est: vel variegatus, albus maculis ac venulis rubescens-

tibus distinctus: interdum maculis caret: huc Palma Christi erecta flore candido & fl. varie-

gato &

Palma Christi candidis floribus, Eyst.

IV. Orchis palmata pratensis maxima.

Cynosorchis macrocaulos, sive conopsea, sive galericulata, Gem. Lob.

Cynosorchis conopsea, Lugd.

V. Orchis palmata minor calcaribus oblongis.

Serapias minor, Lob. minor rubra Gemmæ, Lustl.

Serapias minor nitente flore, Ger.

Palma Christi minor mas, Tab.

VI. Orchis palmata angustifolia minor.

Satyrium femina, Brunf.

Satyrium alterum, Trag. desc.

Orchis femina, Trag. ico.

Palma Christi major, Matth. ico. tertia, Cord. hist.

Satyrium basilicum majus, Lugd. ico.

Satyrium basil. mas, Fuch. Dod. gal. Lon. ico.

Satyrium basilicum mas, tenuifol. Thal.

Satyrium regale, Tur.

Palma Christi fœmina, Tab.

Palma Christi peregrina flore rubro, Eyst.

VII. Orchis palmata angustifolia minor odoratissima: in Phytopinace, & sub 7. in Prod. descripta.

IIIX. Orchis palmata caryophyllata.

Orchis serapias caryophyllata, Lob. ico.

IX. Orchis palmata sambuci odore.

Orchis serapias 7. Clus. pan. Pannonica 8. hist.

Duplex est: 1. florib. exalbidis, foliolis sub floribus pallidis. 2. floribus purpureis, foliolis purpurascensibus.

X. Orchis palmata batrachites.

Serapias batrachites, vel Myodes, Lob. ico.

XI. Orchis castrata.

Satyrium castratum vel eunuchum, Lob.

Satyrium castratum, Gemmæ, Lugd.

Testiculus sextus castratus, Tab.

Serapias castratum, Ger.

XII. Orchis palmata palustris latifolia.

Serapias palustris latifolia, Lob. Ger.

Satyrium Basilicum foliosum, vel 3. Dod.

Satyrium Basil. mas latifolium 1. Thal.

Cynosorchis palustris platyphylla, Gem. Lugd.

Palma Christi palustris, Franc. 3. Tab.

Satyrium latifolium, Svver. du Bry.

Palma Christi flore purpureo, Eystett.

XIII. Orchis palmata palustris altera.

Serapias palustris alt. leptophylla, Lob. Lugd.

Cynosorchis palustris altera, Gem.

Testiculus galeiculus, Tab.

XIV. Orchis palmata palustris tertia.

Cynosorchis palustris lævi folio, Lob.

Cynosorchis leptophylla, Gem. Lugd.

Palma Christi palustris 2. Tab.

Serapias palustris lævifolia, Ger.

XV. Orchis palmata palustris maculata.

Cynosorchis palustris altera lophodes, vel nephelodes, Gem. Lob. Lugd.

Palma Christi palustris 1. Tab. Ger.

XVI. Orchis palmata palustris tota rubra.

Cynosorchis Dracontias, Gem. Lob. Lugd.

Tragorchis, Tab. ico.

Serapias palustris leptophylla, Ger. ico.

XVII. Orchis palmata flore viridi: quæ 8. in Prod.

XIIIX. Orchis palm. mont. maxima: quæ 9. in Prod.

XIX. Orchis palmata montana altera.

Serapias montana folio lævi, & Cynosorchis montana, Lob.

Serapias maxima folio lævi, Gem. Lugd.

Serapias mont. Tab. Serap. garyophyll. Ger. ico.

XX. Orchis palmata montana maculata.

Cynosorchis mont. folio maculoso, Gem.

Serapias candido fl. (montana) Lob. Lugd. Ger.

Palma Christi major, Cast.

Palma Christi maculata montana, Tab.

Satyrium folijs maculatis, Svver.

XXI. Orchis palmata angustifolia alpina nigro flore.

Satyrium basilicum alpinum, Gef. hor.

Satyrium basilicum odoratiss. Gef. cat.

Satyrium basilicum minus, Dod.

Palma Christi minor, Matth. Lug. Franco, Cast. descript.

Orchis minor odoratus, Ad.

Palma Christi minor fœmina, Tab.

Orchis serapias odoratiss. flore minima alpina, Cam.

#### ORCHIS ABORTIVA.

I. Orchis abortiva fusca.

Coagulum terræ Plinij quibusdam.

Satyrium nonum, Trag.

Orobanchæ, Gef. col.

Orchis sylvestris, Lon.

Neottia, Dod. Franco.

Nidus avis, Dod. gal. Lob. ico. Lugd. Eyst.

Satyrium abortivum (spec. Hypocistidis) Lob. ico. part. alt. & Ger.

Orchis abortiva Lobelij, Clus. hist.

an Orobanchæ prima, Tab.

II. Orchis abortiva violacea.

Limodorum Austriacum, Clus. pan.

Pseudolimodorum, Eidem hist.

### OPHRIS.

**A**d Orchides propter formam referenda videtur Ophris à Plinio l. 6. c. 15. nominata, quam vocem aliqui Supercilium reddunt.

I. O.



I. *Ophris bifolia*.

Perfoliata sylvestris mas, Brunf.

Satyrion 10. & bifolium, Trag.

Alisma, Cord. Gef. hort.

Ophris, Matth. Fuch. Ang. Gef. cat. Cast. Tab.

Cam. Cæf. Thal. Franco.

Bifolium, Dod. gal. Ad. Lob. Lon. Cam.

Pseudoorchis seu bifolium, Dod.

Ophris bifolia, Ger.

Est major & minor, tamen hac, quam in trifolia.

II. *Ophris trifolia*.

Perfoliata sylvest. femina, Brunf.

Ophris trifolia, Tab. Ger.

III. *Ophris bifolia bulbosa*.

Pseudorchis, seu Bifol. bulb. Dod. ed. Belg. & post.

IV. *Ophris minima*: in Prod. descripta.

an Ophris pumilum & tenellum genus, Clus. cur. post.

## DENS CANIS.

I. *Dens canis latiore rotundiorq; folio*.

Mithridatum Cratevæ Plinij, Ang. Cæf.

Pseudohermodactylus, Matth. Lugd. Tab.

Hermodactylus Mesuæi, folio maculoso, & Dens canis, Gef. hor.

Satyrion erythronium, Gef. col. Ad. Lob. ico. Tab.

Dens caninus, Dod. (Ephemero Diosc. conveniens) Cæf. Cam. Ger.

Dentali 1. Clus. pan.

Dens caninus purpurascens flore, Clus. hist.

Satyrion & Dens caninus, Lob.

Satyrion rubrum Dalech. Lugd.

Dens canis flore rubro, Eyst.

Flos ex purpura ruber, aut candore micat, aut purpura ex candore confusus pallet: qui flore rubro est, maculis rubris: qui albo, lacteis maculis variegatur: sic folia aliquando maculata, aliquando ijs carent: & communiter bina habet: tantum bina, Cæsalp: plurimum terna, Advers: raro terna, Clus: quina etiam, Lugdun.

II. *Dens canis angustiore longiore folio*.

Erythronium flore albo angustiorib. folijs, Lob. ico.

Dentali 2. Clus. pan.

Dens caninus albo flore, Clus. hist. Cam. Eyst.

Satyrion trifolium & Satyrion Dalech. Lugd.

Flos lacteus, aut ex purpurascens alboq; mixtus.

## OROBANCHE.

**O**ΡΟΒΑΓΧΗ, *Ervangina Gaze*, quod ὀρεβον ἄγχι, *erum frangit*, dicitur. Duplex est, aliud Theophrasti 8. hist. 8. aliud Dioscoridis l. 2. c. 172. & *Orobanche* Plin. l. 18. c. 17. & l. 22. c. ult. nominatur.

I. *Orobanche major garyophyllum olens*.

Limodorum (quasi famem adferens), Theophrasto.

Orobanche, Diosc. Gale. Oribas. Aeginet. Aërio.

Cynomorion; à canini genitalis similitudine, Plinio.

Leonina herba, Hermolao. & Legumen leoninum, Ruel.

Leo herba, Constantino.

Orobanche, Matth. Ama. (herba tauri, vel vacæ) Ang. Cord. in Diosc. Lac. Gef. cat. (Leontobotanos) Lon. Lob. Cast. Thal. Cæf. Eyst.

Orobanche vera, Gef. hor.

Limoderon, sive Orobanche, Dod.

Orobanche 1. Clus. hist. altera, Lugd. Tab.

Rapum genistæ, Dod. gal. Ger.

Variat: quæ Genistæ vulgari adnascitur, flore est subviridi: quæ Hispanicæ, floribus majoribus luteis.

Hæc semper alicuius vicinæ plantæ fibris adnascitur: observavi ad Genistam, florem tinctorum, Hieracium Sabaudum, Trifolium, Astragalum sylvaticum.

II. *Orobanche flore majore, ex cæruleo purpurascens*: quæ 1. in Prod.

III. *Orobanche Monspelica floribus oblongis*.

Orobanche major, Lob. ico.

Limodorum Monspelicum, Clus. pan.

IV. Oro-

## IV. Orobanche majore flore.

Orobanche quarta, Lob. ico.

Orobanche, Eyst.

Orobanche 2, Clus. hist.

V. Orobanche quæ Hypopytis dici potest:  
quæ 3. in Prod.

VI. Orobanche ramosa.

Orobanche 5. Lob. ico.

Orobanche altera brevior &amp; ramosa, Cæs.

Orobanche, Cam. ad Matth.

Orobanche 3. *πελώιδανος*, Clus. hist.

Variat: floribus aliquando cæruleis, aliquando purpurascens, aliquando subalbidis, &amp; libenter inter Cannabem nascitur.

VII. Orobanche radice dentata major.

Dentaria major, Matth. Lob. Lugd. Cam. Franco, Ger. Eyst.

Anblatum (id est aphyllon, quod folijs careat)

Cord. hist. Dod. (&amp; radix squamata) Thal. Squamata, Lon.

Dentaria major, sive *δραλλος*. Clus. pan. & hist. Eystett.

Dentaria absq; folijs, Cast.

Dentaria crocodilia, Tab.

Arachidum è genere Orobanches, Cæs.

Aegolethros Plinij, malus Henricus vinitoribus, Gesf. in hist. bovis &amp; col.

IIX. Orobanche radice dentata minor.

Dentaria *αφύλλος* altera, seu min. Clus. pan. & schist. an Anblati species minor, Thal.


Clusius, suæ flores ex albo purpurascens tribuit: Thalius, candidam totam scribit.

IX. Orobanche radice coralloide.

Dentaria *δραλλος* 3. Clus. pan.

Dentaria coralloide radice, Clus. hist. Eyst.

Dentaria minor, Ger. aphyllus minor, Tab.



## LIBER TERTIVS.

## OLERA ET OLERACEA.

## SECTIO PRIMA.

**RAPA: RADICES JNDIS EDVLES: R A-**  
*punculus: Campanula: Rapistrum: Napus: Raphanus: Lepidium:*  
*Jberis: Dracunculus esculentus: Eruca: Sinapi: Rheseda:*  
*Luteola: Erysimum: Hydropiper, siue Persicaria:*  
*Capsicum, siue Piper Jndicum.*

## RAPA ET EIVS SPECIES.

**R**APA, quasirapa, quoddè terra eruat, Varroni l. 4. ling. Lat. at verisimilius à Græco *ράπης*, Athenæol. 9. c. 2. γογγύλη, Dioscorid. l. 2. c. 134. à rotunda orbiculariue radici figura. Genera: Theoph. l. 7. hist. 4. aut alios diversitatem generis putare, alios negare, sed mare tantum fœminaq. differe, & ambas ex eodem semine nasci, sed ut effœminentur raras deponendas: nam si densa posita sint, omnes mascullescere: at 7. hist. 6. Rapa sylvestris meminit. Sic Dioscorides, sativum & sylvestre agnoscit. Plin. l. 18. c. 13. Græcos secutus, duo prima fecit genera, masculum, fœmineumq., & modum eas ferendi ex eodem semine. Species verò omnium tres (addit) aut enim in latitudinem fundi, aut in rotunditatem globari, tertiam speciem sylvestrem appellavere, in longitudinem radice procurrente: & l. 19. c. 5. Medici, masculini sexus faciunt in his rotunda: latiora verò concava fœminini.

Dividimus in sativam & sylvestrem: illam in longam & rotundam, siue fœminam & marem: rotundam, in sessilem & orbiculatam. Raparum solum in India tam ferax est, ut ea in vijs quoq. publicis sponte proveniant: ita ut cum Indi in nonnullis locis agros frugibus consuevi essent, propter ingentem Raparum propaginem, ab instituto ipsis desistendum fuerit: Joseph. Acosta l. 4. c. 18.

## I. Rapa sativa rotunda.

Rapa mas, Theoph. Plinij: Rapum, Dioscoridis.

Rapa sativa, Brunf. Cord.

Rapum sativum, Fuch. Ruel. vulgare, Trag. Dod.

Rapum vel Rapa, Ang. Tur. Lac. Geshor. Cast.

Rapum rotundum, Matth. Lon. Ama.

Rapum sessili rotunditate, Cæf.

Rapum majus orbicular. seu turbinat. Ad. Lob.

Rapum sativum orbiculatum, Lugd.

Rapum orbiculatum, Franco, Taber.

Rapum rotundum, vtrumq. majus & minus, Tab.

Rapum majus & minus rotundum, Ger. at ro-

M

tun-

tundum Rapum *utrumque* sub Buniade.

Variat colore externo radicis, viridi, candido, puniceo, obsoleto nigricante: habentur aliquando in Alfatia, quæ foris & intus flavescent: magnitudine & parvitate, Plinius & Tragus 40. Amatus vero 50. & 60. libras excedentes videntur: communiter forma tuberosa, raro globi instar orbiculata, frequentius in latitudinem effusa.

II. Rapa sativa oblonga, seu fœmina. Rapa fœmina, Theoph. & Plinio.

Rapum oblongum, Trag. oblongius Dod. Rapum longum, Matth. Lon. Cast. Lugd. Franc. Tab. qui majus & minus facit: *utrumque* sub Raphano sativo Gerardus habet. Rapum tereti, rotunda, oblongaque radice, Ad. Lob. Rapa oblonga, Ama. Cæf.

Aliquando cubitalis, rarius sesquicubitalis est: sic 30. librarum Matthiolus notavit.

III. Rapa sylvestris: & Cæf.

Rapum sylvestre, Matth. Lugd. Tab. Ger. Rapum sylvestre non bulbosum, Ad. Lob.

## RADICES VARIAE QUIBVS.

### INDIVESCUNT VRET

utuntur.

**Q**uem admodum varijs fructibus ob insignem arborum fructiferarum varietatem vescimur: sic in India Occidentali, varijs radicibus in cibis utuntur. Quare Iosephus Acofta lib. 4. c. 18. vel par. 9. Ind. occid. recenset, Papas (de qua inter Solana agemus, Solans tuberosi esculenti nom. ne) quæ ipsi præcipua est, Manihot, Ocas, Yacocas, Camotes, Batates, Xiquimas, Yuca, Cochuecho, Cavi, Totoras, Mani: addens & alias infinitas esse, & inter ceteras Batates, an in istar cibi delicatæ & suavisissimi comeduntur. Sic etiam radices ex ista India ad Indos delatas magis propagari, quam Indicas, sin Europam deferantur. Et Plinius Faber, ut in par. 7. Amer. cap. 9. habetur, apud Carios India populos, Triticum Turcicum, vel Atejs & Mandeochade, Padades, Mandeoch parpij, Mande poere, Manduris, VVache Ku, &c. invenisse refert.

I. Rapum Americanum folijs Bryoniæ. an Octum Plinij l. 21. cap. 15. mandunt (scilicet Ægyptij) & Octum, cui pauca folia minimaque, verum radix magna.

*Octum* (alii *duyvor* legunt) sive Vingum ut Gaza reddit, Theoph. l. 1. c. 11. quod Ægyptij Vingum appellant, folia habet ampla & germen pusillum, sed radix longa & in modum fructus, & cibo idonea.

Hetich Indis & Æthiopibus, Dalech. in Plinij. Hetich Americum Theveti, Lugd. Lerio desc. Bras. c. 12.

Radix rapis magnis similis, longitudine sesquipedalis, crassitudine amborum pugnorum: cujus tres species Lerius censet: nam inter coquendum alia violaceum, ceu pastinacæ: alia aureum, ut cotonea mala: alia denique album colorem acquirit.

II. Rapum Brasilianum, sive Americanum alterum.

Igname in insula S. Thomæ, Scalig. Lugd.

Ignames, Advers.

Iniamos in Guinea cibis Negritarum vulgarissimus, quo & panis loco utuntur: par. 6. Ind. Or. c. 38. & 57. & Linseot. par. 4. or. c. 11.

Ingramos, par. 6. Ind. or. c. 12. & 13.

Inhame Lusitanorum, sive Igname, Clus. hist. & notis in Garzi.

Tres species propter medullæ colorem: at lutea, Carotæ colore in pretio est: magnitudine etiam variat: ac Clusius duplex genus agnoscit.

Alterum à priore differens cortice inæquali & tuberculis obdito, cum viticulis spinosis, quam Ycam Peru nominant.

III. Mandioca: radix in Insula S. Catharinæ: hist. Brasil. five par. 3. Amer. c. 4. 9. 11. 15. 17.

IV. Manihot Indorum, sive Yuca folijs cannabinis.

Arachidna, Theoph. & Aracidna Plin. quibusd. Manihot, Theveti, Lugd. Lerio desc. Bras. c. 8. Yuca, Gomaræ hist. gen. Lugd. Ioseph. Acoftæ

4. c. 17.

Yuca

Yuca Peruana, Frag.

Iucca, Benzoni l. 1. c. 28. vel par. 4. Ind. occid.

Mandeochade radix apud Carios: par. 7. Am. 7.

Mandioca: par. 3. Amer. l. 1. c. 4. 9. 17.

Cocufhavv, Hariot in Virginea.

Hujus folium latum in septem lacineas divifum effe scribunt: at radix brachij craffitie, ex qua Indi farinam conficiunt (par. 2. & 3. Amer.) qua cum carne & pifcibus, ut nos pane vtuntur: ex ea & placetas & panem conficiunt, quem Cazabis, Benzo: at Môardes & Acofta, Cacavi nominant: fic in Hispaniola ex hac fecundarium panem, què Cazabi vocant, conficiunt (par. 5. Ind. occid. 12.) ex hujus fucco potiorem parant: par. 3. Amer. l. 2. c. 15.

Huc referre oportet.

Maniel folijs pœoniæ; par. 3. Am. ep. 1. de Bras.

V. Hatle radix in Florida, ex cujus farina in annonæ penuria panis fit: par. 2. Amer.

VI. Aypi Brasilianorum, radix sesquipedalis, femoris craffitudine, ex qua farinam duplicem conficiunt: aliâ percoctam & duram, quo diutius confervetur: aliam minus coctâ & molliorẽ, panis candidi medullæ faporem referens: illâ Oy-entan, hanc Ovy-pou appellant folijs pœoniæ fimilitudine: Lerio defc. Brasil. five par. 3. Amer. c. 8.

VII. Yuca folijs Aloës.

Yuca, Gerardo.

Yuca nova gloriofè elata & opinata, Lob. ad altera parte.

II X. Batatas, Camotes Hispanorum, Cluf. hisp. & hist. Lugd. Cast.

Battades, Ad.

Batata Hispanorum, Camotes five Amotes & Ignames, Lob.

Batatas Indiæ occid. Benzoni, Monard.

Potates & Potate, quas Camotes nominant: par. 8. Ind. occid.

Camotes, Ioseph. Acofta l. 4. c. 18. Frag.

Batates radix: par. 9. Ind. occid. l. 4. c. 18. cibus

Nigritarum vulgaris: par. 6. Ind. or. 38.

Batatas fructus in Angra; Linscot. par. 3. Ind.

or. 6. & par. 4. c. 12. & par. 8. & par. 9. addit. Ind. oc.

Pina five Batata radix: par. 8. Ind. occid.

Sifarum Peruvianum, Tab. Ger.

Radix Raphani prægrandis amplitudine: genera tria, corticis colore vel purpurascete, vel pallente, vel candido, quæ affata fructuum, vel leguminum loco Indis est.

IX. Hajas Indiæ occident. similis Batate, nisi quod minor & suavior fit: Benzon. five par. 4. Amer. c. 28.

Aies, Clusio.

X. Cochucho, radix parva, dulcis, quam aliquid, quo magis in delitijs fit, coniungunt: Ioseph. Acoft. l. 4. c. 18.

XI. Xiquimas, radix qua æstate vtuntur ad refrigerandum fitimq; sedandam: Idem l. c.

XII. Mandeoch parpie, radix Castæarum fapore: par. 7. Ind. occid. 7.

XIII. Mandeoch Mandapore, radix ex qua vinum conficiunt: l. c.

XIV. Bacheku radix: par. 7. Ind. occ. c. 18.

XV. Mandues, Carios populi edunt: par. 7. Ind. occid.

XVI. Mandepore: apud Siberos radix super terram eminens amplissimis folijs, quæ aquam cõtinet, non secus ac si in vase aservaretur, & ex radice sæpe dimidijs cantharus exprimitur, qui colorè lactis habet, par. 7. Ind. occid. c. 26. etiam ex hac radice vinum conficiunt: idem cap. 7.

XVII. Cardes radix, qua Indi ad levandum sitim vtuntur: par. 7. Ind. occid. c. 3. & 21.

XIX. Cassavi radix: par. 8. Ind. occid.

XIX. Tagari, radix in Naupon pro lavando corpore: par. 4. Ind. or. c. 8.

## RADICES VARIÆ IN JS- sula Virginea.

**R**adices quarum in Insula Virginea pro cibis usus est, Thomas Hariot recenset, & sunt Opinaruk, Okcepenauk, Koishucpenauk, Tfinavv, Cocuf avv, Habafcon.

I. Opinaruk; idem cum Papas Acoftæ, quod Solanum tuberosum esculentum nominamus.

II. Okcepenauk, radix rotunda, capitis humani magnitudine, quam cum carnibus & pifci-

bus in panis penuria comedunt: Hariot.

III. Kaishucpenauk; radix alba, ovi galinacei magnitudine & forma, qua elixa vescuntur, Hariot.

M 2

IV. Tri-

I V. Tfinaw; radix, Chinæ similis, ex cuius succo cum aqua, panis pinfitur, & puls, gelatinæ similis, conficitur, Hariot.

V. Cocuschaw, Hariot; est Manihot Indo-

rum, de quo antè.

VI. Habascon; radix magnitudine & figura pastinacæ, quæ cum alijs coquitur: Hariot.

## RAPUNCULUS ET CAMPANULA glabra.

**R**apunculus vulgò dictus, γογγύλις ἀγρία, rapum sylvest. Dioscoridis l. 2. c. 135. malè censetur: & à Plinio l. 20. c. 3. Rapi sylvestris nomine proponitur. Alijs lasione eiusd. l. 22. c. 22. creditur, cuius tamen verba, rectius ad Smilacem lavem referuntur. Erinus Nicandri & Dioscorid. l. 4. Erineon Plinij l. 23. c. 7. ex Columna sententia. In hanc Classem & Campanula, à floris forma nominata, referenda sunt.

I. Rapunculus esculentus.

Raponeoli, Brunf.

Rapunculum vulgare, Trag.

Rapunculus, Matth. Lac. Dod. Cam. Tab. Cast. Cæs. P. rtæ.

Rapum sylvestre, Gef. hort. Fuch. Dod. gal.

Rapuntium parvum, Ad. Lob. (& pes locustæ vicennæ) Ger.

Rapunculus minor, Matth. & Dodonæi, Lugd. Erinus Nicandri & Diosc. Colum.

Flore est cæruleo, purpureo, aliàs candicante.

II. Rapunculus minor folijs incisif.

Erinus, Cæs.

Erini seu Rapunculi minimum genus, Colum.

III. Rapunculus spicatus.

Rapunculum sylvestre, Trag. Lon.

Rapi syl. genus, in syl. & mont. Gef. hor.

Rapum sylvestre majus, Dod. gal.

Rapunculum alopecuron & Rapi syl. 6. genus, Dod.

Rapuntium majus alopec. comoso flore Ad. Lob.

Rapunculus alopecuroides long. spica, Clus. hist.

Rapunculus syl. spicatus, Thal.

Rapunculus major Dodonæi, Lugd.

Phyteuma folijs Rapunculi, Cæs.

Rapunculus flore spicato purpureo & albo, Cam.

Rapunculus nemorosus primus, Tab.

Rapuntium majus, Ger.

Spica vel longior, vel brevior alba, vel, cinerea; hæcquæ variat folijs modo maculis nigris ad umbilicum notatis, & marem; modo non maculatis, & feminam dicunt: est & coloris violacei elegantis & saturi.

Huc pertinet

Rapunculus syl. spicatus cæruleus, Thal.

IV. Rapunculus folio oblongo spicâ orbiculari.

Rapunculus Alopecuroides orbiculari penè spica, Clus. hist.

Rapuntium corniculatum montanum, Colum. Spica est orbiculari; folijs etiam variat.

V. Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo. Scabiosæ 3. genus sive ovium, Dod. gal. Gef. hor.

Scabiosa minor, Dod. ico. 3. desc. minor 5. Tab.

Scabiosa media servato angustifolio flore globulariæ, Ad.

Scabiosa media, Lob. Lugd.

Scabiosa ovilla, Cam.

Aphyllantes 1. Theoph. Lugd.

Rapuntium alterum leptophyllum capitatum, Colum.

Scabiosa syl. minor cærulea, Eyst.

Caulis habet 5. 7. etiam 30. flores cæruleos, rariùs albos: folia aliquando crenata, aliquando solum hirsuta.

VI. Rapunculus umbellatus Sonchi folio.

Rapunculus Sonchi folio, Clus. hist.

VII. Rapunculus umbellatus latifolius.

Rapunc. syl. cæruleus umbellat. minor, Thal.

Rapunculus syl. umbellatus 2. Cam.

IX. Rapunculus umbellatus angustifolius.

Rapunculus syl. cæruleus umbellat. major, Thal.

Rapunculus syl. umbellatus. 1. Cam.

IX. Rapunculus umbellatus folio gramineo.

Rapunculus 7. umbellat. 3. Cam. ico. ad. Thal. Rapun-

Rapuntium alterum angustifol. alpinum, Colum.

X. Rapunculus perficifolius magno flore. Phyteuma, Marth. Lugd. Cam. Cæf. Campanula cærulea sativa, Dod. gal. sive hortens. Lugd.

Campanula media, Dod.  
Campanula Persicæfolia, Lob. Clus. hist. Ger.  
Rapunculus campanulatus Nerijfolius 1. Thal.  
Campanula angustifolia, Tab.

Flore est cæruleo, aliquando albo, & sub Campanula alba & cærulea perficifolia, Eyst. pingit.

XI. Rapunculus nemorosus angustifolius magno flore major.

Rapunculus nemorosus 2. Tab. nemorosus, Ger.

Rapunculus campanulatus nerijfolius 3. Thal.  
Rapunculus syl. major, Eyst.

XII. Rapunculus nemorosus magno flore minor.

Rapuntium sive Erinus magno flore, Colum.

XIII. Rapunculus nemorosus angustifol. parvo flore.

Rapunculus nemorosus 3. Tab.

Campanula lutea linifolia, Ger. ico.

XIV. Rapunculus hort. latiore folio seu Pyramidalis.

Campanula major, Dod. major lactescens, Lob. Lugd.

Campanula lactescens fetidior, Clus. hist.

Pyramidalis, Cast. Lugd. Lutetiana, Eyst.

Campana Pyramidalis, Cam.

Campanula lactaria, Tab.

Campanula lactescens pyramidalis, Ger.

Folio est oblongo, quandoq; subrotundo.

XV. Rapunculus Creticus, seu Pyramidalis altera.

Petromarula seu lactuca petræa Cretica Belli, Ponæ: & apud Clus. in epist. 1. Belli.

XVI. Rapunculus alpinus, seu pyramidalis minor: qui 1. in Prod.

an Campanula, folijs serratis cærulea, Eyst.

XVII. Rapunculus alpinus corniculatus, quem sub Rapunculo alpino spicato simili, in Phytopinace & Matthiolo, & 2. in Prod. descripsimus.

Trachelium petræum minus, Ponæ.

Rapuntio corniculato affinis, Colum.

XIX. Campanula alpina latifolia flore pullo.

Rapunculi alpini latifolij nomine, Doft. Burserus ex Austria misit; sub 3. in Prod.

XIX. Campanula alpina linifolia cærulea: in Phytopin. sub. 3. in Prod. sub. 4. descripsimus, quæ cum sequenti minimè confundenda.

XX. Campanula minor rotundifolia vulgaris.

Rapi syl. genus minus, quod Campan. cærulea, Ges. hor.

Campanula sylvestris minima, Dod.

Campanula minor rotundifolia, Lob. Lugd.

Campanula minor alpina rotundioribus imis folijs, Clus. hist. ico.

Phyteuma alterum montanum, Cæf.

Rapuncul. campanulatus linifolius seu 7. Thal.

Rapunculus sylvestris minor, Tab.

Campanula rotundifolia, Ger.

Campanula minor syl. fl. cæruleo, Eyst.

Floribus communiter cæruleis, subinde candidis.

X XI. Campanula minor rotundifolia flore in summis cauliculis.

Rapunculus syl. flore ex purpureo candicante, Tab.

Rapunculus sylvestris flore albo, Eidem.

Rapunculus syl. minor, Eyst.

Campanula minor alba: & purpurea, Ger.

XXII. Campanula minor rotundifolia alpina.

Campanula minor alpina, Clus. pan. & hist. descrip.

Flos nunc cæruleus, nunc purpureus, aut violaceus, modò colore dilutior, & quasi cinereo, interdum niveo.

X XIII. Campanula rotundifolia minima. Cantabrica Plinij, Ang.

Phyteuma unico fl. in summis cauliculis, Cæf. In Phytop. & in Prod. sub. 5. descripta.

XXIV. Campanula Cymbalaræ folijs, vel folio hederaceo: in Phytop. & in Prod. pro 6. descripta.

XXV. Campanula serpillifolia. In Phytopinace, & in Prod. pro 7. descripta.

# TRACHELIVM SIVE CAM- panula hirsuta.

**T**rachelium dicitur, quod in colli affectibus commendetur, hinc Cervicaria, imò & Vvularia: & à forma, Campanula.

## I. Campanula maxima folijs latissimis.

Trachelium majus Belgarum, Lob. Clus. hist.

Hæc instar suffruticis est & perennis, florum colore varians, albo, cæruleo, & etiam cinereo.

## II. Campanula hortensis Rapunculi radice.

Trachelium in maritimis, Ad.

Trachelij genus molliorib. fol. Clus. pan. & hist. Cervicaria 4, Dod. major syl. Eyst.

III. Campāula folijs subrotundis: pro campanula hirsuta prima in Prod. describitur.

## IV. Campanula hortēsis folio & fl. oblongo.

Medium, Matth. Gef. hor. vulgare, Cam.

Rapi syl. genus maximum, Gef. hor.

Viola Mariana, Gef. hort. Ad. Lob. Dod. Lugd.

Clus. hist. Tab. alba & purpurea: & Ger.

Rapunculi alterum genus grandius, Cæs.

Flore est communiter cæruleo, est & purpureo, subalbido & lacteo: hinc figuræ quatuor apud Eyst.

Medium fl. albo: cæruleo: purpureo & argenteo. (flore pleno reperiri asserunt.)

## V. Viola mariana lacinitis folijs peregrina

Medium Dioscoridis, vel Mindium Rhafis, Rauwolf. in Itin. & Lugd. & Cam. in Matth.

VI. Campanula Drabæ minoris folijs: est Campanula hirsuta, 2. in Prod.

VII. Campanula vulgarior folijs vrticæ, vel major & asperior.

Vvularia major, Trag.

Campanula, Ang. major, Fuch.

Trachelium majus, Dod. gal. Lugd. Ger.

Cervicaria, Lon. & Digitalis purp. altera, Eid.

Cervicaria maior, Dod. Tab.

Trachelium sive Cervicaria, Ad. Lob.

Trachelium folijs vrticæ, Clus. pan. sive vulgare, Clus. hist.

Archangelica, Cæs.

Rapi syl. genus mai<sup>9</sup> folijs ferè vrticæ, Gef. hort.

Cervicaria maxima, Thal.

Flore est communiter subcæruleo, est dilute purpureo, est & candido: tota planta strigosior

reperitur, hinc tres figuræ apud Tabernæmontanum & Gerardum: & apud Eyst. duæ, Cervicaria hortensis flore cæruleo.

Cervicaria hortensis flore albo.

II X. Campanula vrticæ folijs oblongis minus asperis.

Cervicaria major altera, Dod.

IX. Campanula media folijs inferius candida lanugine vestitis.

Cervicaria media, Thal.

X. Campanula folijs Echij.

Cervicaria major tenuifolia, Thal.

Trachelium *supradis* Clusij, ipsi Camer.

XI. Campanula folijs Echij floribus villosis: quæ 3. in Prod.

XII. Campanula folijs Anchusæ floribus oblongis.

Trachelium montanum, Lugd.

XIII. Campanula alpina pumila lanuginosa.

Trachelium pumilum alpinum, Clus. pan. & hist.

XIV. Trachelium saxatile folijs pulmonariæ Gallorum.

Pyramidalis villosa saxatilis latifolia, vel Rapunculus montanus pulmonariæ Gallorū folio & Trachelij flore, Clus. cur. post.

XV. Campanula alpina sphærocephalos.

Trachelium majus petræum, Ponæ.

XVI. Campanula Alpina Tragopogi folio.

Trachelium montanum, Colum.

Trachelium Tragopogi folijs, Clus. hist.

XVII. Campanula pratensis fl. congestato.

Vvularia exigua, Trag.

Rapi syl. genus, Vvularia in pratis, Gef. hort.

Trachelium minus, Dod. gal. Ad. Lob. Clus. hist.

Lugd. Ger.

Cervicaria tertia, sive minor, Dod.

Cervicaria minor, Thal. Tab.

Duplex est: alteri flores in summo caule coarctati in orbem nascuntur: ijq; vel majores, vel minores: alteri singulares per caulem spat.



gantur. &amp;

Cervicaria sphaerocephalos duplex, Claf. hist.

XII. Trachelium Gignanteum &amp;

XIX. Viola Calathiana, apud Gerard. quid?

XX. Cervicaria Valerianoides caerulea.

Trachelium umbelliferum caeruleū, Ponæ Ital.

## RAPISTRUM.

**R**apistrum, à similitudine c. m. Rapa folijs dictum videtur: unde quibusdam Rapa syl. altera nominatur: alij Erysimum Theoph. censent: alij ad Sinapi: alij ad Lampfanam referunt.

I. Rapistrum flore luteo.

Rapistrum, Brunf. Dod. Gef. hor.

Rapistrum arborum, Ad. Lob.

Sinapi agreste quartum, Trag.

Irion, Fuch. Tur. five Erysimum, Cam. Cast.

Raphanus sylvestris, Cord. in Diosc.

Lampfana, Matth. (quibusdam etiam Irio eiusdem)

Gef. hor. Ang. Lugd. Lon. Ger.

Lampfana vera, Lugd. flore melino, Tab.

Radix sylvestris, Cæf.

Folij est aliquando incisus, vel sinuatis: aliquando minime: hinc quidam duas species faciunt.

II. Rapistrum flore albo siliqua articulari.

Sinapi agreste tertium, Trag.

Lampfana, Tur. Cæf.

Rapistrum flore albo Erucae folijs, Lob. ico.

Armoracia, quibusdam Rapistrum albū, Tab.

Raphanus sylvestris, Ger. ico.

Rapistrum purpureum, Tab. arborum, Ger.

Flore est albo, subcaeruleo, aliquando purpureascente.

III. Rapistrum flore alb. lineis nigris depicto.

Lampfana Apula, Plinij &amp; Dioscoridis, Colum.

IV. Rapistrum floribus Leucioj marini: hoc

i. est in Prod.

V. Rapistrum Italicum siliquis longissimis.

Rapistrum montanū five sylvestre Irionis folio, Colum.

VI. Rapistrum monospermon.

In Phytopinace & Matthiolo: & in Prod. pro secundo descriptum.

## NAPUS.

**B**OTNIAZ Dioscoridi l. 2. c. 136. significatione à tumente figura deducta, quare Rapis, hoc nomen magis competere, sunt qui velint: γογγύλης species Galeno.

Differentias duas & in Medicina Græcos servare, Plinius l. 20. c. 4. scribit, alterum Bunion, alterum Buniada vocantes: sunt qui Buniaden, Napum sylvestrem esse velint. At. l. 19. c. 5. Naporum genera quinq. facit, ubi legendum est Raphanorum, cum ex Theophrasto 7. hist. 4. desumpta sint, ubi τῶν παφιδίων genera quatuor dicit.

I. Napus sativa,

Napus, Brunf. Ang. Matth. Tur. Gef. hor. Dod.

Lac. Cord. in Diosc. Cast. Cam. Lon. cui prima.

Rapum sativum alterum & Napus veterum, Trag.

Napus Bunias sativus, Fuch. Lugd.

Bunias five Napus, Ad. Lob.

Radix colore albo, vel luteo, five buxæ est; rarius nigro.

II. Napus sylvestris.

Rapum sylvestre, Trag.

Napus agrestis, Tur. syl. Dod. Lugd. cui & Bunias.

Bunium &amp; Napus syl. Matth. Ad.

Napus Bunias sylvestris, Fuch.

Napus 2. Lon. Bunias syl. Lob. ico.

an Rapa sylvestris, Cæf.

Nascitur etiam ex non transplantatorum semine.

III. Napus syl. Cretica: in Prod. descripta.

RA-

## RAPHANVS.

**P**αφανίς (quasi radix perspicua) Dioscorid. l. 2. c. 137. Posterioribus dicitur παφανός, παφα τὸ παδίον φαίνομαι, quia satum statim oritur. Theophrastus utraq; voce usus quidem est, sed quem Raphanum vocamus, ipse παφάδα appellavit: at παφανός, ipsam Brassicam nominavit; quae causa erroris fuit Plinio, dñ l. 19. c. 15. scribit, Gracos Raphani genera tria fecisse, foliorum differentia &c. quae de Brassica intelligenda, cum ex Theoph. 7. hist. 4. desumpta sint. Latinis radix (πίσα Theoph.) quod ceteras amplitudine corporis superet, vel quam paucissimis magnitudine cedat: siquidem in frigidis locis, quibus gaudet, sicuti in Germania, infantium puerorum magnitudinem aequet, l. 19. c. 5. teste. Sic in regno Congiano, crassitudine humana tibia, gratiq; saporis sponte provenire, Pigafettus in eius regni descriptione l. 1. cap. 1. testatur: alijs copiosissime in India provenire, asserit Linsc. par. 4. Ind. Orient. 10. par. 7. cap. 19. & par. 8.

Genera duo Dioscoridi, sativum & sylvestre: at Theoph. sex, Corinthium, Cleonaeum, Lithalassium, Baotium, & genus quod folijs cruca simili constat: hac Theophrasti, Plin. l. 19. c. 5. Naporum nomine recenset, posterius genus sylvestre statuens: at ibidem, ex Romanorum sententia, inquit, nostri Raphani alia fecere genera, Algidense à loco, longum atq; translucentum: alterum Rapi signa, quod vocant Syriacum, suavisissimum fere ac tenerissimum &c. etiamnum subiungit, unum sylvestre, Graci agrion vocant, nostri Armoraciam.

Quare observavimus alium praecocem, serotinum alium: praecox, corpore est oblongo, gracili, semine maiore, in quod facile abit. Serotinus albus, qui vel oblongus, vel orbicularis: niger, qui rotundus, varijs oblongus, siliquis quidem maioribus, sed semine minore: ruber, oblongus, cortice rubro, fibris nonnullis rubentibus, per substantiam dispersis. Radice lutea Camerarius notavit: meminit & Byzantini, semine Constantinopoli accepto, qui postea in communem degeneravit, radice penitus languescente.

I. Raphanus major orbicularis, vel rotundus.

Raphanus, Brunf. Trag. Ang. Cord. in Diosc.

Raphanus vulgaris, Gef. hor. primus, Matth.

Raphanus magnus, Lob. five Radicula sativa, Dod.

Raphanus sativus, Fuch. Lac. Cast. Lugd.

Raphanus rotundus, Lon. Tab. & orbiculatus, Tab. Ger. & pyriformis.

Radix vulgò, quib. Radicula, Cæs.

Floribus purpureis aut candidis, & radice rotunda, vel orbiculata, variat. In India frequentes sunt: & licet brachij humani crassitudine proveniant, tamen substantiae tenerae & suavis saporis sunt, quibus pro vulgari cibo utuntur: Ioseph. Acosta l. 4. c. 18.

II. Raphanus niger.

Raphanus cortice nigricante, Gef. hor.

Raphanus niger, Lob. ico. radice nigra, Cam.

Raphanus sylvestris, Cast. ico.

Radix & parva & crassa, pro sationis tempore.

III. Raphanus minor oblongus.

Raphanus Cleonaeus, Theoph. Algidensis, Plinij.

Raphanus longus, Trag. Matth. Lon.

Raphanus praelongus, Gef. hor.

Raphanus secundus, Matth. Lugd.

Raphanus minor purpureus, Lob. Lugd.

Radicula sativa minor, Dod.

Cortice est albo, rubello, praesertim parte quae extra terram eminet.

IV. Raphanus Creticus: de quo in Prodromo.

V. Raphanus rusticanus.

Thlaspi alterum, Diosc. l. 2. c. 186.

Raphanus syl. Dioscorid. l. 2. c. 138. & Raphanus syl. seu Armoracia Plinij, quibus, Armoracia au-

Raphanus major, Brunf.

Raphanus major, Trag. Gef. hort.  
 Raphanus fyl. Fuch. Ang. marinus, Tab.  
 Raphanus vulgaris & rusticus, Matth.  
 Armoracia Plinij, Lac.  
 Thlaspi majus, Cord. in Diosc. Lon. magnum,  
 Cæf.  
 Raphanis magna, sive Radicula magna, Dod.  
 Raphanus rusticus, Lob. Ger. rusticus, Cam.  
 Lugd.

das laciniis divisis.  
 an Raphanus cuius folia Erucæ similia Theophr.  
 & Napi fyl. genus, Plinij.  
 Radicula sylvestris, Dod.  
 Raphanus fyl. officin. aquaticus, Lob. ico.  
 Raphanus aquaticus, Tab. Ger.  
 Raphanus fyl. & Raphanus palustris, Lugd.  
 Sisymbrium fyl. Cæf.  
 V III. Raphanus aquaticus alter.  
 Rapistrum aquaticum, Tab. Ger.

V I. Raphanus aquaticus folijs in profun-

## LEPIDIVM.

**Λ**επίδιον Dioscoridi l. 2. c. 205. sic dictum, quod λεπίδας, seu squamas & maculas faciei delect: vel από τῆς λεπίδος, id est, ἐκ δειγν διδόν, quod sua acrimonia vrenti vulnera, excoriet, eaq; facultate, vel ferro notas fronti servorum inuistas delect; de quo forsam Columella l. 10. Lepidium Plinio l. 20. c. 17.

I. Lepidium latifolium.  
 Piperitis, Brunf. Lon. Dod. gal.  
 Lepidium sive Piperitis, Trag. Matth. Cam.  
 Lepidium magnum, Fuch. Tur. majus, Cord.  
 hist.  
 Lepidium Dioscorid. Ang.  
 Lepidium Pauli & Plinij, Matth. Lugd. Cæf.  
 Lepidium Æginetæ, Gef. hort. Tab.  
 Lepidium Plinij, Lob. Dod.  
 Raphanus fyl. officin. Lob. Ger. |

Dentellaria Monspel. & Flamula, Gef. hor.  
 Herba S. Antonij Romæ, Gef. ap. ad. Cord.  
 hist. in Chamænerio.  
 Molybdæna Plinij, Ang. Cam. cui & Crepanel-  
 la Italorum.  
 Sarcophago Cretensibus: Phrocalida in Le-  
 mmo: Mauronia Lesbij, Bellonio.  
 Dentaria, sive Dentillaria Rondeletij & Narbo-  
 nensium, Ad. Lob.  
 Plumbago, Clus. hisp. & hist. Cast. Tab.  
 Dentellaria & Enneaphyllon Plinij, Lugd. &  
 Dentellaria Rondeletij.  
 Glastum sylvestre, Cæf.

II. Lepidium glastifolium.  
 Lepidium annuum, Lob. Lugd.  
 III. Lepidium Dentellaria dictum.

## IBERIS.

**Ι**βερὶς ἡ καρδαμάντις Dioscoridis l. 1. c. 189. Galenus eius descriptionem ex Damocrate in curatione doloris Ischiadici proponit, folia Nasturtij, cum Dioscoride, tribuens. Plinius Iberidis remedia diversis in locis recenset.

I. Iberis Nasturtij folio.  
 Iberis & Lepidium, Matth. fig. major.  
 Iberis, Cast. secunda, Tab.  
 Iberis Cardamantica, Ger.  
 Lepidium campestre, Ang.  
 II. Iberis latiore folio.

Iberis & Lepidium, Matth. fig. min.  
 Iberis, Lugd. Dod. Lac. Gef. hor. Cæf. cui Le-  
 pidium fyl. fortè Columellæ.  
 Lepidium hortense, Ang.  
 Iberis Cardamantica, Lob. cui & Lepidium  
 Iberis Pauli.

# DRACUNCULVS ESCV- lentus.

**T**archon Simeonis Sethi lib. de alim. facult. reliquis Gracis & Mauritanis indicta, aliqui ad Drabam, alij ad Chrysocomen Dioscoridis referunt.

## I. Dracunculus hortensis.

Draco, Ruellio, Dod. gal. Lob.  
Dracunculus hortensis, Matth. Cast. Tab. Eyft.  
Tarchon Avicen. & Sethi, Gef. hor.  
Draco herba, Dod. Ger. hortensis, Gef. hort.  
feu acetarius, Lug. (& Chrysocoma, Diosc.) Cā.  
Dragone vulgo, Cæs.  
Tragum vulgare, Clus. hist.

## II. Dracunculus pratensis serrato folio.

Pyrethrum, Brunf. ico.  
Tanacetum album seu acutum, Trag. (& Mil-  
lefolium 3.) Tab.  
Ptarmica, Matth. Fuch. Tur. Gef. hor. Lon. Cast.  
Lob. (& Ptarmica folio Taraconis, vel Sternu-

tamentoria) Lugd. Clus. hist. (& Ptarmica  
pratensis) Cam. Ger.

Pyrethrum syl. Dod. gal. syl. ac parvum, Cord.  
in Diosc.

Tarchon syl. vel aquaticum, Gef. hor. & col. &  
Draco aquaticus.

Ptarmica syl. Germanica, Thal.

Draco syl. five Ptarmica, Dod.

Mentha Sarracenicæ Myconi, Lugd.

Ptarmica vulgaris, Eyft.

## III. Dracunculus pratensis flore pleno.

Ptarmica vulgaris flore pleno, Clus. hist.

## IV. Dracunculus alpinus folio Scabiofæ: in Prod. descriptus.

# ERVCA ET EIVS SPECIES.

**E**ruca, quod vellicando linguam quasi erodat: ἔρζουον Dioscoridis l. 2. c. 170. & Theoph. l. 1. hist. 9. ob suavitatem quæ ei in condiendis obsonijs inest, Plinio l. 20. c. 13.

Genera duo Dioscoridi, sativum & agreste, cuius semine pro Sinapi in Iberia videntur. Et Plinius l. 20. c. 13. Eruca sylvestris meminit. At Theoph. 7. hist. 4. Eruca generis differentias omnino deesse voluit.

## I. Eruca latifolia alba: sativa Dioscoridis.

Eruca, Brunf. Matth. Ang. Cord. in Diosc. Gef.  
hor. Cast.

Eruca five Rucula marina maior, & Sinapi 8.  
Trag.

Eruca sylvestris, Fuch. ico. Lon.

Sinapis alterum genus, Fuch.

Sinapi hortense, Tur. syl. Dod. gal.

Erucula major, Cord. hist. ico.

Eruca sativa, Matth. Lac. Lob. Dod. Lugd.

Sinapi hortense, Lugd. ico.

Eruca folio latiore, Cæs.

Eruca major, Cam.

Flores pallentes, venas nigras aliquando  
obtinent.

II. Eruca latifolia: pro Eruca 1. in Prod. def.  
an Eruca tertia Anglica, Cam.

III. Eruca sylvest. major lutea caule aspero.  
Eruca syl. Matth. Lob. Dod. Cast. Tab. Ger.

Eruca genus, spontè nascens, Cæs.

Flore majore, circa Monspelium in horto  
Dei, crescit.

## IV. Eruca syl. minor luteo parvæq; flore.

Sinapi 1. genus syl. Fuch. ico.

Eruca syl. Fuch. Tur. Lugd.

Erysimum verum, Lugd.

Eruca syl. fetida, Gef. col.

Eruca palustris minor, Tab.

Sinapi palustre, Ger.

V. Eruca syl. minor lutea bursæ pastoris fo-  
lio: quæ 2. in Prod.

VI. Eruca syl. minor incana: quæ 3. in Prod.

VII. Eruca lutea latifolia, five Barbarea.

Herba S. Barbaræ (& Sinapi agreste 5.) Trag.  
Lon. Cast.

Scopa regia (five Sideritis latissima) Fuch. ico.  
Ang.

S. Barbaræ herba, Fuch. Gef. hor.

Pfeu-

Pseudobunias, Dod. gal.

Nasturtium palustre, Gef. hor. hybernū, Thal.

Barbarea, Dod. Lob. Tab.

Eruca palustris, Lugd.

Bunium adulterinum, Cam.

Variat foliorum magnitudine, nam in hortis ad acetaria culta, acutiora habet, quæ semina dicitur, Tabernæmontano: nonnunquam rubent & nigrescunt.

IX. Eruca lutea sive Barbarea pleno flore: quæ Eruca 4. in Prod.

IX. Eruca cærulea in arenosis crescens.

Hæc est Eruca palustris cærulea, in Phytopinace, & Matthiolo (& in Prod. pro 5.) descripta; magnitudine & parvitate variat.

X. Eruca maritima Italica siliquâ hastæ cu-

spidi similis.

Cakile Serapionis, Ang. Lob. Lugd. Cam.

Eruca maritima, Lugd.

Nasturtium maritimum, Eid.

Erucae genus in maritimis, Cæf.

Eruca Kackile dicta, Colum.

Habetur latifolia & angustifolia: hæc si in hortis feratur, oblongo angustior; folio excrescit.

XI. Eruca maritima Cretica, siliquâ articulatâ: quæ 6. in Prod.

XII. Eruca Monspeliaca siliquâ quadrangulâ echinatâ: quæ 7. in Prod.

Sinapi echinatum, Lugd.

XIII. Eruca angustifolia Austriaca.

Eruca syl. angustifolia, Lob. Lugd.

## SINAPI ET EIVS SPECIES

**SINAPI**, σινάπι. Dioscoridis l. 2. c. 184. & Theoph. 7. hist. 3. & 6. παρὰ τῷ σίνεσθαι τοὺς ὄπας, *Soculos enim ledit: dicitur etiam Theoph. vάπι, quasi munit, ob vehementem eius acrimoniam: & Atheniensis Napy appellasse, Plin. l. 19. c. 3. anthor est, Sinapi nominans.*

Vnus Dioscorides & Theoph. meminere: at Plinium, generatim facit: unum gracile, alterum simile rapi folijs, tertium Eruca.

I. Sinapi rapi folio.

Sinapi Diofco. & Theoph. Sinapi alterum Plinij.

Sinapi, Ang. Gef. hor. Cast. primum, Matth.

Lac. Cæf.

Sinape hortense, Cord. in Diofco. Lon. Lug. desc.

Sinapi sativum prius, Dod.

Sinapi sativum Erucae aut Rapi folio, Lob.

Sinapi album, Cam.

II. Sinapi apij folio sive album.

Sinapi gracile, Plinio.

Sinapi, Brunf. luteum sativum alterum. Trag.

Sinapi primum, Fuch. Tur. Cast. album, Eyt.

Sinapi alterum, Matth. Lac. Cæf.

Sinapi hortense, Fuch. ico. Dod. gal.

Sinapi sativum, Lugd. sativum alt. Dod. Ger.

Sinapi agreste, apij aut potius laveris folio, Lob.

Sinapi syl. luteum, Lon.

Eruca palustris maior, Tab.

III. Sinapi Erucae folio.

Eruca sive Rucula marina min. & Sinapi 9. Trag.

Eruca, Dod. gal. sativa, Fuch. hortensis, Tur.

Eruca sylvestris, Gef. hor.

Sinapi tertium, Matth. Cast. Cæf.

Sinapi sylvestre, Dod. Lugd.

Sinapi syl. minus burfæ pastoris folio, Lob.

IV. Sinapi siliquâ hirsutâ.

Sinapi alterum sativum, Lob. ico.

V. Sinapi parvum siliquâ asperâ.

In Phytopinace & Prod. descriptum est.

VI. Sinapi umbellâ purpureâ.

Sinapi alterum agreste nostras, Colum.

VII. Sinapi Indicum.

Safeni, semen est Sinapis, magna copia in Sundan: par. 4. Ind. or. 8.

VIII. Sinapi simile Indicum semen.

Nachani semen nigrum minurum sapore Se-

cales, ex cuius farina panes conficiuntur, Garz.

Semen sinapi simile sed nigrius, cuius farina

in panes orbiculares subactâ vescuntur tota Æ-

thulopia ora maritima, Clus. in notis.

## R E S E D A.

**R E S E D A** à doloribus sedandis dicta, cum collectiones & inflammationes omnes discutere, Plin. l. 28. c. 12. scribat: propter saporē Erucae, & quod aliqui ex Erucae syl. genere esse censuunt, huc relata est.

## I. Reseda lutea maxima.

Reseda, quæ Sefamoides majus Ghino, Gef.  
hor.

an Pycnocomon, Ang.

Sefamoides magnum, Lac. & alterum, Cæs.

Reseda maxima, Lob. Ger. major, Thal. Tab.

Reseda lutea, Lugd. at Cam. recta.

## II. Reseda vulgaris.

Rheseda Plinij Neoteritorum. Eruca peregrina

Italica, vel Cantabrica, Ad. Lob. Rheseda Plinij,

Ger. Eyft.

Reseda latifolia, Tab. at supina, Cam.

Sefamoides primum, Cæs.

Erucago vulgaris, Colum.

Ludit folijs simplicioribus, & in vnoquoq;  
pediculo plurimis: major & minor est.

## III. Reseda linariæ folijs in prodromo de-

scripta.

an Reseda candida, Lugd.

an Sefamoides Salmanticensis parvum alterum,  
Clus. hisp. & hist.

## IV. Reseda alba minor.

Sefamoides parvum Salmanticum, Clus. hisp.  
& hist. Lob. Tab. Ger.

## V. Reseda lapidea.

Plantamarina Resedæ facie, Clus. exot.

## VI. Resedæ affinis Phyteuma.

Phyteuma Monspelienfum, Gef. Ad. Lob.  
Narbonensium, Lugd.

Sefamoides parvum, Lac. tertium, Cæs.

Erucago Apula, Colum.

Variat folijs nunc oblongis, nunc in aliquot  
lacinias, & quidem frequentius quatuor, mo-  
dò quinque divisis.

## LUTEOLA.

**C**VM Luteolam aliqui Resedam Plinij faciant, & in multis cum Reseda conveniat, de ea  
nunc, quæ sic dicta, quod eâ panni lanei & tela lineæ, candida quidem, colore luteo, vi-  
rente verò, qui antè ceruleo tincti, inficiantur. Quare Plinius l. 33. c. 5. Luteam. Vitruvius  
7. Architect. 14. Luteum. & Virgil. Eclog. 4. Lutum nominat. At Cæsalpinus l. 9. c. 35. My-  
agron seu Melampyron Dioscoridis statuit.

## I. Luteola herba falicis folio.

Antirrhinon, Trag. Lugd. Thal.

Pseudostruthium, Matth. Cast. Lugd. Eyft.

Struthium, Lac. Gef. hor.

Lutea vel Luteum Vitruvij, Gef. hor. Cam.

Herba lutea, Dod. gal. Lugd.

Lutum herba, Dod.

Luteola, Lob. Ger.

Guadarella vulgo, Cæs.

Catanance, Lon. Tab.

## II. Luteola Cretica.

Struthium legitimum Dioscoridis quæ xymum  
in tota Græcia appellatur, quâ fullones in tin-  
gendo serico luteo vtuntur, Hon. Belli ep. 2.  
ad. Clus.

## III. Luteola herba folio canabinæ.

Lutea maxima Cretica Belli, Ponæ in Bal.

Lutea major frutescens Cretica, Ponæ ed. Ital.

## IV. Luteola herba sterilis.

Lutea major sterilis Cretica, Ponæ ed. Ital.

## ERYSIMVM.

**E**ρύσιμον Dioscoridi l. 2. c. 188. alijs ἀπὸ τοῦ ἐρείκειν, foliorum multiplici sectione: alijs quæ  
si ἐρίσιμος, quod est pretiosum: alijs ἀπὸ τῆς ἐρίκειν, quæ ad ob suam caliditatem trahendi fa-  
cultate pradium sit, dictum: nam Sinapis sapore est, & multis Sinapis fyl. species est. Plin. l. 22.  
c. 25. Irio, Erysimum Græcis: ubi Erysimon Dioscoridis, cum Erysimio fruge Theophrasti 8. hist.  
1. & 4. c. 16. (Gaza Trionum vertit) confundit.

## I. Erysimum vulgare.

Hierobotane semina, Brunf. 4.

Verbena semina & Sinapi 7. Trag.

Sinapi alterum genus fyl. Fuch. ico.

Verbena, Tur. recta sive mas, Fuch. Lugd.

Erysimum, Synapi fyl. species, Gef. hort.

Ery.

*Erysimum* Dioscoridis, Dod. gal. Ger.  
Irio, Matth. Cord. in Diosc. Lac. Lugd. Lon.  
Cæf.

Irio sive *Erysimum*, Ad. Lob. Dod. Cast.  
Cleome Oſtavij, Ang.

*Erysimum* noſtrate, Thal. primum, Tab.

II. *Erysimum* alterum ſiliquis *Erucae*.

*Erysimum* 2. Tab. ſub *Eruca ſativa*, Ger. ico.

Majus eſt & minus.

III. *Erysimum* polyceration, vel corniculatum.

Irio alter, Matth. Lugd. Cam.

*Erysimum* verum, Ang.

*Dentilaria* alia, Irio aliquibus, Geſ. hor.

*Irionis* tertia ſpecies, Cæf.

*Saxifraga* Romanorum, Lugd. deſc. figura ſub  
*Saxifraga aurea*.

IV. *Erysimum latifolium majus glabrum*.  
Irio Apulus alter lævi folio *Erucae*, Colum.

Ex ſemine *Irionis* nomine, à D. Imperato  
miſſo, & nomine *Rapiſtri* Hiſpanici non ſcri-  
pti, à D. Gillenio, in horto meo crevit.

V. *Erysimum anguſtifolium majus*.  
*Rapiſtrum ſylveſtre* *Irionis* folio, Colum.

VI. *Eryſimo ſimilis lævis laciniata ſiluleis*.  
Herba S. Alberti, Cæf.

an *Barbarea minor*, Lob. ob.

VII. *Eryſimo ſimilis hirsuta non laciniata*  
alba.

Variat folijs latioribus, anguſtioribus: ma-  
gis minusve crenatis & hirsutis: icon & de-  
ſcript. in Matth. & Prodroſo habetur.

*Barbarea muralis*, Ioh. Bauhino, lib. de Plan-  
tis à Sanct.

## HYDROPIPER SEV Perſcaria.

**Υδροπίπερι**, *Dioscoridi* l. 2. c. 191. id eſt, *Aquaticum piper*, à loco & ſapore nomen habet;  
Latinis *Perſcaria*, à foliorum forma: hæc vel mitis acidaſue ſapore, vel acris eſt: illa folijs  
maculoſis, vel ijs carentibus.

I. *Perſcaria* mitis maculoſa & non macu-  
loſa.

*Pulicaria* ſœmina, Brunf. *Perſcaria* ſœmina,  
Eid. Lon.

*Perſcaria*, Fuch. Dod. Ang. Caſt. Lugd. cui  
& *Plumbago* Plinij quibusdam.

*Perſcaria* altera, Trag. Matth. Tab.

*Perſcaria* maculata, Ericio Cord. Ger.

*Perſcaria* maculis nigris, Geſ. hor.

*Perſcaria* mitis maculoſa, Lob.

*Perſcaria* prima, Britannica Plinij, Cæf.

*Cratægonum*, Lac.

*Plumbago* Plinij l. 25. c. 13. quibusdam: alijs  
Britannica eiufdem l. 25. c. 3. alijs *Lapathum*  
quodam videtur.

Floribus eſt communiter purpureſcentibus,  
aliquando candidis: folijs aliquando maculam

nigram in medio habentibus, aliquando ea  
carentibus.

II. *Perſcaria* vrens ſeu *Hydropiper*.

*Perſcaria* maſcula, Brunf. mas, Lon.

*Perſcarie* primum genus, Trag. Tab.

*Hydropiper*, Fuch. Ang. Dod. Matth. Cord in  
Dioſc. Lac. Caſt. Cæf. Lugd. Ger.

*Cratægonon*, Ang.

*Perſcaria* vrens, Lob. mordax, Thal.

Flore eſt ex roſeo rubiundo: colore *Berſili-*  
co: candido: aliquando folijs macula rubra a-  
ſperſa eſt.

III. *Perſcaria anguſtifolia*: in Prod. deſcript.

IV. *Perſcaria* minor.

*Pulicaria* puſilla repens, Lob. Lugd.

*Pulicaria* pumila, Tab.

Floribus eſt albis, aut purpureis.

## CAPSICVM SEV PIPER Indicum.

**Καψάν** *Actuario*, à καπνῷ mordeo, quòd ſemen comestum mordeat. inò adurat. Plin-  
l. 19. c. 12. *Siliquaſtrum*, quod ob piperis ſaporem *Piperitidis* nomine ſit acceptū: *Axi*, Indis.

℞ ʒ

Pi.

*Piper*: *Piper Brasiliæ* : *piper Indicum* in *Gaiana* : *piper Indicum cornutum*, à quibdam *Siliquastrum* : *Auctoribus historiar. Indicarum.*

*Differentia in foliorū latitudine, vel angustia; in fructus colore & forma: colore, qui in initio alijs viridis, alijs niger, in maturitate, aut ruber, aut croceus, flavusve; rarius albus. Figura alijs longa, eaq; vel crassa, vel gracili, vel incurvata: alijs brevis eaq; lata, cordata, vel rotunda cerasiforma, vel angulosa: & vel erecta, vel dependens: deniq; & caule piloso.*

*Axi aroma* in *Ind. occid.* quod in *Cnseo, Veho: in Mexico, Chili: in Castilia*, *piper Indicum* appellatur. *Est viride, & rubrum, & croceum. Aliud vehementius mordicat, quale Caribbe vocatur: aliud lenius, & moderatius: est & genus quoddam dulcissimum, quod è manibus vellunt, & edunt: & quoddam aliud exilius, quod moschum fragrat & gustu admodum sapidum, Ioseph. Acofta lib. 4. c. 20. vel par. 8. Ind. occid.*

#### I. *Piper Indicum* vulgatissimum.

*Siliquastrum*, *Trag.* (vna figura tres species proponit) *Lac. Tab.*

*Capficum rubrum & nigrum, Fuch. ico.*

*Siliquastrum majus & minus, Fuch.*

*Piper Indicum, Matth. Gef. hor.* (cui & *Calecuticum*) *Cæf.* (cui *Circæa Dioscor. fortè*) *Cast. Cam.*

*Piper Indicum medium, Eyst.*

*Cardamomum Arabicum, Gef. hort.*

*Piperitis seu Siliquastrū Peruvianū, Cord. hist.*

*Piper Ind. 3. rubrum & nigrum, Gef. hort.*

*Capficum, Clus. in Mon.*

*Capficum vel piper Indicum longioribus siliquis, Lob. Capficum Aftuarij, Eid. ico.*

*Capficum five Piper majus & minus, Lugd.*

*Piper Americanum vulgatius, Clus. cur. post.*

*Axei five Capficum, Monardi.*

*Piper Indicum Occid. quod Axi vocant, Frag.*

#### II. *Piper Indicum* propendentibus siliquis oblongis recurvis.

*Capficum oblongius, Fuch. ico. Dod. gal. Lugd.*

*Capficum longiorib. siliquis, Ger.*

*Siliquastrum tertium, Fuch.*

*Capficum oblongiorib. & recurvis siliquis Dod.*

*Piper oblongum recurvis siliquis, vel 9. Regio, in Clus. cur. post.*

Hujus differentię tres sunt.

1. *Siliquis longissimis, deorsum spectantibus in mucronem recurvum abeuntibus, quod Piper Indicum maximum longum, Eyst.*

2. *a priore sola magnitudine differt, quod Piper Indicum minus, recurvis siliquis, Eyst.*

3. *Siliqua flava, vel aurea, eaq; oblonga vel lata, vel ovali figura, quod Piper Indicum siliquis flavis &*

*Piper Indicum aureum latum, Eyst.*

#### III. *Piper Indicum* propendentibus siliquis rotundis.

*Siliquastrum latis siliquis, Trag.*

*Capficum latum, Fuch. ico. Dod. gal. Lugd.*

*Siliquastrum quartum, Fuch.*

*Piper Indicum rotundum, Gef. hor.*

*Capficum cordatum, Cam.*

*Siliquastrum fructu propendente rotundo, Reg. in Clus. cur. post.*

Et hujus differentię quatuor sunt.

1. *Siliqua lata, rugosa, 2. cordata, eaq; oblonga vel rotunda, quod*

*Piper Indicum cordatum oblongum &*

*Piper Indicum cordatum, Eyst.*

3. *siliqua olivari: 4. siliqua rotunda Cerasorum modo, eaq; majore vel minore, rubri vel nigri coloris, quod*

*Piper minimum siliquis rotundis, Eyst.*

#### IV. *Piper Indicum* fructu dependente pomi amoris forma.

*Piper Indicum rotundum maximum, Eyst.*

*Folia sunt Solani vulgaris, fructus rotundi, sulcis aliquot distincti pendent, rubore corallini.*

#### V. *Piper Indicum* fructu aculeato.

*Majus est & minus: illud rotundum, hoc orbiculatum, vtrumq; rubet: & in innoxium quasi aculeum abit, quod*

*Piper Indicum rotundum aculeatum &*

*Piper Indicum orbiculatum medium, Eyst.*

#### VI. *Piper Indicum* siliquis surrectis & oblongis.

*Piper oblongū erectum, Reg. in Clus. cur. post.*

Hujus differentię quatuor.

1. *Pyramidale majus. 2. pyramidale minus: quod*



Piper Indicum medium longum erectum, Eyst.

3. oblongum surrectū majus & minus, quod  
Piper Indicum minimum erectum, Eyst.

4. Siliqua bifurcata, quod

Piper Indicum bifurcata siliqua, Eyst.

VII. Piper Indicū siliquis surrectis rotundis.

Piper rotundum majus surrectum, Reg. in Clus.  
cur. post.

Hujus quoque differentiae quatuor

1. Rotund. maximum obtusum, quod

Piper Indicum max. rotund. erectum, Eyst.

2. Rotundum minus parum acuminatum:

3. cordatū majus: 4. cordat. min' angulosū.

Verum Piperis Indici differentias novendem,  
du Bry in suo Florilegio proposuit: at scul-  
ptor lingvæ Latinæ ignarus, omnes siliquas  
propendentes sculpsit, licet rectè depictas & no-  
minibus notatas ad ipsum transmississemus.

IX. Piper Ind. siliquis surrectis cerasi forma.

Capficum brevioribus siliquis, Lob.

Capficum Brasiliæ, Clus. ad Monard. Lugd.

Capficum minimis siliquis, Dod. Ger.

Siliquastrum rotundum, Cam. ep. Matth.

Piper Indicum surrectis corniculis, Cam.

Siliquastrum rotundum angustifolium, Tab.

IX. Piper Ind. caule piloso flore majore.

Piper Ind. caule pilis albis prædito, Cam.

X. Piper Indicum radice eduli.

Piperis tertium genus minoribus granulis,  
cui sunt radices letuki dictæ, satie boni saporis,  
quas in minima frusta conscindunt & plantant,  
& sarmenia in modum Lupuli, supra terræ su-  
perficiem spargunt: Stad. par. 3. Americæ.

XI. Tomales, grana sunt recentia & viridia  
quæ cruda esitare solent: & ex ijs plerūq; con-  
dimenta parantur: par. 8. Ind. occid. l. 4. c. 20.

## SECTIO SECUNDA.

*NASTURTIVM: THLASPI: BVRSA PA-*

*STORIS: MYAGRVM: DRABA: ALLIARIA:*

*COCHLEARIA.*

## NASTURTIVM EIVSQUE SPECIES.

**N**ASTURTIVM Καρδαμους Dioscoridi lib. 2. c. 185. Theoph. 7. hist. 1. quasi Καρδαμους,  
quod caput calore suo & acrimonia sentes: vel ἀπὸ τῆς καρδίας, quod cordatos faciat,  
vel quod in Syncope Cardiacā dicta, plurimum valeat. Latinus Nasturtium, à naribus torquen-  
di; quod odore & seminis acrimonia sternutamenta provocat: hinc Plinio l. 19. c. 8. (& Varro-  
ni) à narium tormento velut torporem excitans.

Genera, Theoph. 4. hist. 7. plura esse dicit. Dioscorides tantum Nasturtium Babylonicum  
optimum esse scribit. Plinio l. 20. c. 13. est hortense sive sativum, latiorib. folijs, est & sylvestre:  
illud album, hoc nigrum, ubi de semine eum loqui censemus. Dividimus in hortense, pratense,  
aquaticum, & montanum.

### NASTURTIVM HORTENSE.

I. Nasturtium hortense latifolium.

Nasturtium Hispanicum, Ges. hor. Tab. Ger.

Nasturtio, tale folium Cam. ep. Matth. adpingit:

descriptio & figura Matthiolo addita.

II. Nasturtium hortense vulgatum.

Nasturtium album, Plinio.

Nasturtium, Brunf. Ang. Matth. Cæs. Cast.  
Tab.

Nasturtium hortense, Trag. Fach. Tur. Lac.

Ad. Lob. Dod. Lugd. Ger.

Aliud est folijs simplicibus, quod læve & al-  
bius, vel subhirsutum minusq; album, aliud fo-  
lijs valde divisis, & vel majus, vel minus.

III. Na-

## III. Nasturtium hortenſe criſpum.

Eſt latifolium & anguſtiſolium, vtrumq; in  
Matth. deſcriptum & depiſtum, ſicut & in Pro-  
dromo.

*Nasturtium pratense.*

## I. Nasturtium pratense magno flore.

Flos cuculi, Brunſ. Dod.

Nasturtium pratense (vel 3.) Trag. Geſ. Tur.  
Hiberis, Fuch. ico.

Nasturtium agreſte, Fuch. ſylveſtre, Lon.

Lepidium minus, Cord. in Dioſc.

Sifymbrium Cardamine, Dod. gal. Lac. Lugd.

Sifymbrium aquat. alc. quoad folia, Matth. &  
Tab.

Cardamine altera, Lob. Lugd. Ger.

Cardamine 1. & Sifymbrium alt. Dioſc. Tab.

Cardamine altera ſimplici flore, Cluſ. hiſt.

Cardamine latifolia, Ger. quoad folia.

Sifymbrio aquatico non abſimilis, Cæſ.

Iberis ſive Cardamantica naſturtij folio 1. Thal.

Naſturt. aquat. ſimplici flore, Eyſt.

Flos communiter ex candido, leviter pur-  
purafcit, aliquando prorſus albus eſt.

## II. Nasturtium pratense flore pleno.

Cardamine altera pleno flore, Cluſ. hiſt.

Naſturt. aquaticum flore pleno, Eyſt.

## III. Nasturt. prat. parvo flore: quod 2. in Prod.

## IV. Nasturt. prat. folio rotundiore, flore majore.

Cardamine ſive Sifymb. alterum Dioſcoridis,  
Lob.

Cardamine, Ger. ſecunda, Tab.

Et hæc floris colore variat, hinc

Cardamine 2. ſpecies altera florib. lacteis, Tab.

Cardamine lactea, Ger.

## V. Nasturtium pratense rotundifol. minuto flore.

Sifymbrij alterius, ſeu Naſturtij aquatici tertia  
ſpecies, Thal.

## VI. Nasturtium pratense odoratum radice granul. tuberosa.

Cardamine quinta Dalech. Lugd.

## VII. Nasturt. sylvestre minus: quod 3. in Prodromo.

*Nasturtium Aquaticum.*

## I. Nasturtium aquaticum ſupinum.

Sifymbrium alterum vel Cardamine, Dioſc.

Naſturtium aquat. (& 2.) Trag. Lon. Dod.

Vella Galeni, Ang.

Sium & Laver, Dod. gal.

Creſſo, Laver odoratum, Eri. Cordo.

Sifymbrium Cardamine, Fuch. Lugd.

Sifymbrium aquatic. Matth. Cæſ. Caſt. primum,  
Tab.

Sifymb. alterum, Cord. in Dioſc. Geſ. hor. Thal.

Sifymbrium tertium, Lac.

Sion Cratevæ, Sifymb. 2. Dioſc. & Senecio Se-  
rapionis, Ang.

Sion Cratevæ Erucaſolium, Lob.

Sium majus, Ger.

an Naſturtio ſimilis herba Scorbutum curans:  
par. 9. Ind. occid. additam.

## II. Nasturt. aquatic. majus &amp; amarum.

Sifymbrij alterius ſpecies ſecunda, Thal.

## III. Nasturt. aquat. erectum folio longiore.

Sium, Lac. Caſt. vulgare, Matth. Lugd.

Sion Matthioli & Italorum, Lob.

Hoc licet glabrum ſit, tamen caule & folio-  
rum cauliculis villoſis habemus.

## IV. Nasturtium aquaticum minus.

Sifymbrium aquaticum alterum vel minus,  
Cam. ep. Matth.

Cardamine quarta Dalech. Lugd.

Variat magnitudine & parvitate, fortè ratio-  
ne loci nam in aquaticis major eſt: in vinetis ve-  
rò Wilenſibus riguis, vti & Patavij minorem  
multò obſervavimus: ſic caule erecto, & penè  
aphyllo, in arenosis prope Wiſam fluvium,  
reperitur.

*Nasturtium Montanum.*

## I. Nasturtium montanum luteum.

Sium alterum aquaticum luteum, vel Carda-  
mine tenuifolium montanum, Colum.

## II. Nasturtium alpinum trifolium.

Cardamine trifolia, Lob. Lugd. Tab. Ger.

Cardamine alpina 1. trifolia, Cluſ. pan. & hiſt.

## III. Nasturtiū alpinum minus reſedæ folijs.

Hoc in Phytopinace, ſub Naſturtio 8. in Prod.  
ſub. 4. deſcripſimus, quod aliquando altius,  
aliquando ad tres tantum uncias exurgit.

## IV. Nasturt. alpin. minus folijs in orbem ſparſis

Cardamine alpina media, Cluſ. pan. & hiſt.

## V. Nasturtium petraū folijs burſæ paſtoris.

Naſtur-

Nasturtium petraeum, Tab. Ger.

VI. Nasturtium alpinum inſpidum.

Cardamine alpina inſpida, Colum.

VII. Nasturtiū alpinū tenuiſſimè diviſum.

Nasturtiolum, Gef. in epiſt.

Cardamine alpina 3. minima, Cluſ. pan. & hiſt.

Cardamine alpina, Tab. Ger.

Thlaſpi montanum minimum, Lugd.

Hoc rariùs palmare, frequenter vnciam ſolum altum reperitur.

II X. Nasturtium pumilum vernum.

Cardamine pulſilla, ſaxatilis montana *diernordii*, Colum.

IX. Nasturtium alpinum capſulā Nasturtij hortenſis.

In Phytopinace ſub Nasturtio 9. in Prod. ſub 5. deſcripſimus.

X. Nasturtium alpinum bellidis folio majus 6. in Prod.

XI. Nasturtium alpinū bellidis folio minus. Plantula Cardamines æmula &

Simapi pumilum alpinum, Cluſ. pan. & hiſt.

Folijs eſt modò longiorib. modò rotundiorib.

XII. Nasturtium Barbareæ folijs: quod 7. in Prod.

*Nasturtium Sylveſtre.*

I. Nasturtium ſyl. Oſyridis folio.

Burſa paſtoris minor, Brunſ.

Thlaſpidij genus & Naſturt. 5. Trag.

Burſa paſtoris 1. & 4. Eidem.

Thlaſpi anguſtiſol. Fuch. Lugd. minus, Dod. Ger.

Thlaſpi minus hortenſe vulgare, Lob. ico.

Thlaſpi min. tenuiſolium, Lon.

Iberis, Tur.

Nasturtium ſyl. Thal.

Thlaſpi minus Germanicum, Tab.

Luteum eſt & album, & quia acerrimum ad Nasturtium referimus.

II. Naſturt. ſyl. tenuiſſimè diviſum.

Seriphium Germanicum, Trag.

Nasturtium ſyl. Fuch. ico. Gef. hor.

Seriphium abſynthium, Fuch. Lon.

Thalierum, Dod. gal. Gef. hor. Lugd.

Thaliſtrum, Thal. (cui Nasturtium *μυτίφυλλον*) Tab.

Sophia Chirurgorum, Ad. Lob. Dod. Ger.

Accipitrina, Cæſ.

Folio eſt latiore, anguſtiore ſe, hinc

Thaliſtrum latiſolium & anguſtiſolium, Tab.

Sophia duplex, Gerardo.

Accipitrina duplex, Cæſalpino.

III. Nasturtium ſylveſtre Erucæ affine.

Naſturt. ſyl. Cluſ. hiſp. & hiſt. Lugd.

Eruca Naſturtio cognata tenuiſolia, Lob.

## THLASPI ET EIVS

### Species.

**N**ASTURTIO Dioſcorides l. 2. c. 186. *θλάσπι* ſubjungit, quod à fructus forma, qui veluti infractus & contusus, à *θλᾶν* infringo, nomen accepit: ἢ *θλασπίδιον*, quaſi fructum elypeſtam; ἢ *σίνηπι* ἄγριον.

Genera duo Dioſcoridi & Plinio l. 28. c. 13. alterum anguſtis, alterum latiſ folijs, quod Perſicum Simapi Crateva dicatur: ſorè *Raphanus ruſſicanus*.

### *Thlaſpi arvenſe*

I. Thlaſpi arvenſe ſiliquis latiſ.

Nasturtium 4. Trag.

Thlaſpi Dioſcoridis (& Scorodathlaſpi) Dod. gal. Lugd. Ger.

Thlaſpi 2. Matth. Lugd. majus, Tab.

Thlaſpi 1. Dioſc. Creticum Galeni, Ang.

Thlaſpi drabæ folio, Ad. Lob.

Thlaſpi Dioſc. Drabæ & Chælinæ folio, Eid. ico.

Thlaſpi latiſ Dod. platycarpon, Cam.

Thlaſpi, & Thlaſpi nigrum Galeni, Cæſ.

Varietas in ſiliquis: aliud majoribus, aliud exilioribus reperitur.

II. Thlaſpi arvenſe Vaccariæ lato læviq; folio.

Thlaſpi majus, Tab. Ger.

III. Thlaſpi Vaccariæ folio burſæ paſtoris ſiliquis: primum in Prod.

O

IV.

IV. *Thlaspi arvense* Vaccariæ incano folio majus.

*Thlaspi*, & vulgare *Thlaspidium*, Trag.

*Thlaspi latifolium*, Fuch. Tur.

*Thlaspi primum*, Matth. Lac. Cast. Lugd.

*Thlaspi alterum*, Dod. Lugd. 3. sive *Cratæva*, Ang.

*Thlaspi minus*, Cord. in Diosc. minus latifol. Lon.

*Thlaspi Cardamoides*, Cord. hist.

*Thlaspi vulgatiss.* Vaccariæ folio, Lob.

*Thlaspi vulgatiss.* Ger.

*Thlaspi verum* cujus semine in Theriaca vti-  
mur, Cam.

*Thlaspi officinarum*, Colum.

Folij est aliquando leviter crenatis, aliquan-  
do ijs caret: hinc diversa authorum figura: qua-  
re apud Matthiolum posuimus *Thlaspi* 1. &  
*Thlaspi ferrato folio*.

V. *Thlaspi Vaccariæ incano folio minus*:  
quod 2. in Prodomo.

VI. *Thlaspi villosum* capsulis hirsutis.

In Phytopinace, & pro 3. in Prod. descripsimus,  
& in Matthiolo nostro sub *Thlaspi villosa* figu-  
ra habetur.

VII. *Thlaspi arvense perfoliatum majus*.

*Thlaspi oleraceum*, Tab. sub *Thlaspi incano*,  
Ger. ico.

*Thlaspi primum* Dalech. Lugd.

*Thlaspi alterum* mitius rotundifolium bursæ  
pastoris fructu, Colum.

In Phytopinace sub 5. descripsimus.

IX. *Thlaspi perfoliatum minus*.

*Thlaspi pumilum*, vel *Thlaspi montan.* minus,  
Clus. pan. & hist.

*Thlaspi minimum*, Tab. minus, Ger.

#### *Thlaspi umbellatum.*

I. *Thlaspi umbellatū arvense Iberidis folio*.

*Thlaspidij aliud genus*, vel 3. Trag.

*Nasturtium syl.* Lugd.

*Thlaspi amarum*, Tab. Ger.

*Thlaspi Allobrogicum Cretico*, par. Clus. hist.

Flores è cæruleo alboq; communiter mixti,  
rarius penitus albi, vel flavescentes: in Phyto-  
pinace sub 14. descripsimus.

II. *Thlaspi umbellatum Creticum Iberidis*  
*folio*.

*Draba sive Arabis*, aut *Thlaspi Candia*, Dod.  
Gef. hor. Lugd.

*Thlaspi* 4. Matth. Lugd. cui & *Thlaspi* 4. Do-  
donæi.

*Thlaspi Cappadocicum*, Ang. flore incarnato  
& flore albo, Eyft.

*Thlaspi Creticum*, Gef. hor. Cæs. Tab. Cam.

*Thlaspi Candia* vmbellatū Iberidis folio, Lob.  
*Thlaspi Candia*, Ger.

*Dryophanon* Plinij Cordo, referente Lugd.

Flore est purpureo, aliquando albo, luteo  
haberi ajunt: & communiter in vmbella, rari-  
us in oblonga spica.

III. *Thlaspi Cret.* flore albo majus: sive 4.  
in Prod.

IV. *Thlaspi vmbell.* Cret. flore albo odoro,  
minus.

*Thlaspi* 4. parvum odorato flore, Clus. hist.

*Thlaspi Cappadocici minoris annui nomine*,  
D. Doldius misit.

V. *Thlaspi vmbell.* nasturtij folio Monspe-  
liacum.

*Thlaspi alterum minus vmbellatum Nasturtij*  
*hortensis folio Narbonense*, Ad. Lob. ico.

*Thlaspi aliud vmbellatum Penæ*, Lugd.

*Thlaspi Narbonense vmbellatum*, Tab. Ger.

#### *Thlaspi montanum.*

I. *Thlaspi montanum glasti folio*.

*Thlaspi* 1. vel mont. peltatum, Clus. pan. & hist.

*Thlaspi pannonicum*, Lob. ico. Tab. Ger.

II. *Thlaspi alpinum bellidis cæruleæ folio*.

*Thlaspi secundum* & *Badense*, Clus. pan.

*Thlaspi montanum* 2. Clus. hist.

*Thlaspi album supinum*, Lob. ico. Tab. Ger.

*Thlaspi montanum bursæ pastoris fructu* 1.  
Colum.

Siliquis nō nihil variat, hinc apud Tab. & Ger.  
figuræ duæ ad Clusii & Lobelij imitationem:  
sic & flores aliquando in vmbella, vt re-  
ctè Columna pinxit: communiter in modum  
spicæ dispositi.

III. *Thlaspi montanum semper virens*.

*Thlaspi mont.* candidum, Lugd.

IV. *Thlaspi saxatile rotundifol.* quod 9. in  
Prod.

V. *Thlaspi alpinū majus capitulis rotundis*.

*Thlaspi ternum*, Matth. Lugd. Thal.

Ut Matthiolus pingit ex Italia habemus: verum vt in nostris alpihus provenit, ab illo planè diverfum, in noſtro Matthiolo & Prodrōno figura exhibetur.

VI. Thlaſpi alpinum minus capitulo rotundo.

Thlaſpi tertium faxatile, Cam. epit. Matth. & hort.

Thlaſpi petræum myagrades, Ponæ.

Thlaſpi faxatile minore folio, in noſtro Matthiolo vbi figura & deſcripto: vt & ſub 6. in Prod.

VII. Thlaſpi alpin. repens: pro 7. in Prodrōmo deſcript.

IIIX. Thlaſpi parvum faxatile flore rubente.

Lithothlaſpi quart. carnoſo rotundo folio, Colum.

Ex Provinciæ ſaxoſis & hoc, & 9. & 11. à D. Burſero habemus: ſimile cum 11. ſed foliis & thecis maioribus, ex Hiſpania D. Albinus attulit.

I X. Thlaſpi faxatile vermiculato folio. Lithothlaſpi montan. fruticoſius vermiculato acuto folio, Colum.

X. Thlaſpi montan. incanum luteum ſerpilli folio majus.

Thlaſpi ſupinum luteum, Lob. ico.

XI. Thlaſpi faxatile incanum luteum ſerpilli folio minus.

Lithothlaſpi luteo flore, incanum montanum *Arenandis*, Colum.

### *Thlaſpi Alyſſon dictum,*

*ſive Alyſſon.*

I. Thlaſpi Alyſſon dictum campeſtre majus.

Alyſſon, Matt. Ang. Lugd. Cam.

Thlaſpi Græcum, Lob. ico. Ger.

Thlaſpi Græcum polygonati folio, Tab.

Floſculis eſt albis, interdum luteis.

II. Thlaſpi Alyſſon dictum campeſtre minus.

Thlaſpi 4. Dod. gal.

Alyſſum minus Dalech. Lugd.

Thlaſpi minus clypeatum, Tab.

Alyſſum minimum, Cluſ. pan & hiſt,

Polium alpinum flore luteo, Eſt.

Si cum præcedenti non idem, ſaltem affine.

III. Thlaſpi Alyſſon dictum maritimum.

Thlaſpi Narbonenſe centunculi anguſtiſolio,

Ad. Lob. ico. Lugd. Tab.

Thlaſpi umbellatum Narbonenſe, Ger. ico.

Thlaſpi maritimum Dalech. Lugd.

### *Thlaſpi clypeatum.*

I. Thlaſpi biſcutatum aſperum Hieraciſolium & majus.

Thlaſpi parvum hieraciſolium, ſive Lunaria lutea Monſpelienſium, Ad. Lob.

Thlaſpi clypeatum, Cluſ. pan. & hiſt.

Thlaſpi quoddam genus, in monte S. Iuliani, Cæſ.

Lunaria lutea Dalech. Lugd.

Thlaſpi biſulcatum, vel Lunaria biſulcata, Cam.

Thlaſpi majus clypeatum, Ger.

Thlaſpi minus clypeatum 1. Tab.

Leucoium montanum 1. Thal.

Leucoium aliſoides umbellatum montanum, Colum.

Hoc ipſum ex Creta Thlaſpi nomine, Honorius Belli miſit, quod folijs minus aſperis, ſed tota planta incana eſt.

II. Thlaſpi biſcutatum aſperum minus.

Iondraa aliſoides Apula ſpicata, Colum.

Folijs eſt brevioribus, craſſioribus, incanis, totaq; planta humilior: ex Hiſpania D. Albinus attulit: at multò minoribus, minusq; aſperis ex montibus Tyrolenſibus habemus.

III. Thlaſpi biſcutatum villoſ. flore calcari donato.

Leucoium montanum flore pedato, Colum.

Hoc ſub 8 in Prodrōmo deſcribitur.

IV. Thlaſpi clypeatum ſerpilli folio.

Thlaſpi alterum minus clypeatum ſerpilli folio, Ad. Lob.

Thlaſpi minus clypeat. Penæ, Lugd.

Thlaſpi minimum ſpicatum, lunatum, Colum.

Lunaria Græca quarta, Cæſ.

Aliquando thecæ veluti in longam ſpicam diſpoſitæ ſunt, quemadmodum D. Columna miſit, aliquando magis in ſummo compaſtæ, vt Monſpeſuli legimus.

*Thlaspi fruticosum.*

I. *Thlaspi fruticosum* Leucoij folio latifolium: hoc 9. est in Prod.

Est majus circa Massiliam à D. Bursero: est minus pauloq; angustioribus folijs, in Italia collectum.

II. *Thlaspi fruticosum* Leucoij folio angustifolium.

*Thlaspi fruticosum* folio Leucoij marini minoris, Lob. Lugd. Tab.

*Thlaspi* semper virens, Cam.

III. *Thlaspi fruticosum* folio thymbræ hirsuto.

*Thlaspi fruticosum* alterum, Lob. Lugd. Tab.

*Thlaspi fruticosum* minus, Ger.

*Thlaspi* 5. Hispanic. albo flore, Clus. hist.

IV. *Thlaspi fruticosum* spinosum.

*Thlaspi fruticosum* spinosum Narbonen. Lob. Lugd.

*Thlaspi spinosum* 5. Tab. Ger.

Folia habet Leucoij oblonga, incana, obtusa, vt in monte Lupi observavi: at in hortum Monspeliensem translatus, vnde D. Burserus attulit, breviora & rotundiora obtrinet.

V. *Thlaspi fruticosum* incanum.

*Thlaspi incanum* Mechlinense, Lob. Lugd. Clus. pan. & hist.

an *Thlaspi incanum fruticosum* Franconicum, Cam.

an Iberis prima, Tab. quod sub *Thlaspi fruticoso*, Ger. ico.

*Thlaspi exoticum.*

I. *Thlaspi repens* hederæ folio.

*Thlaspi hederaceum*, Lob. Lugd.

II. *Thlaspi Alexandrinum.*

Hoc in Phytopinace sub 12. in Prod. sub. 10. descripsimus.

## BURSA PASTORIS.

**T***hlaspi species apud antiquos fuit, quam nunc Bursa pastoris, à marsupiolis compressis (alijs Capsetta) dicitur: quibusdam Sanguinaria & Crispula.*

*Bursa pastoris folijs sinuatis.*

I. *Bursa pastoris* major folio non sinuato: in Phytopinace & Prodromo sub prima descripta.

II. *Bursa pastoris* major folio sinuato.

*Bursa pastoris* major, Brunk. Trag. Ges. hor. cui & *Thlaspi fatuum*.

*Bursa pastoris*, Matth. Lac. Cord. in Dioscor. Ad. Lon. Lob. Thal. Cæs. (& *Thlaspi* genus antiquorum) Lugd. Cast. & herba Cancr. Ger.

*Pastoria* butha, Fuch. Dod. major Tab.

Folij variat: aliquando eleganti est folio, instar Coronopi repentis.

III. *Bursa pastoris* media.

*Bursa pastoria* minor, Tab. minima, Ger.

IV. *Bursa pastoris* minor folijs incis: & Thal.

*Pastoria bursa* minor, Dod. minima, Lob. ico.

Hæc aliquando ad duas tresvé solum vnicas apud Monspelienses exurgit, aspectu ob foliorum incisuram elegantissimo, quam *Thlaspi* minus nominant.

*Bursa pastoris folijs integris loculis oblongis.*

I. *Bursa pastoris* major loculo oblongo.

*Draba minima*, muralis Dioscoridis, Colum.

*Thlaspi* Veronicæ folio, Richerio.

In Phytopinace sub 6. in Prod. sub. 2. descripsimus.

II. *Bursa pastoris* minor loculo oblongo.

*Gensbium* id est, anserum flos, Brunk.

*Bursa pastoris* sexta, Trag.

*Paronychia alsinefolia*, Lob. Lugd. Cam.

*Paronychia vulgaris*, Dod. latifolia, Ger.

*Herbula bursæ pastoris* affinis, Cæs.

*Thlaspi* minima species, Thal.

*Alsine minima*, Tab.

*Pilosella filiquata* minima, Cam. ad Thal.

*Myosotis parva* Dalech. Lugd.

Folij communiter integris, rarissimè lacinatis.

III. *Bursa pastoris alpina* hirsuta: quæ 3. in Prod.

IV. *Bursæ pastoris* similis filiquosa major, leu

feu majoribus folijs.

Paronychia altera myagri folio, Gef.

Pilosella filiquata major, Thal.

Aizoon telephium Dalech. Lugd.

V. Bursæ pastoris similis filiquosa minor, seu minoribus folijs.

Pilosella filiquata minor, Thal. & Cam. fig. hor. D.

## MYAGRVM.

**M**άγρον Dioscorides l. 4. c. 117. meminit, cui Rubia folia tribuit: & Plinio l. 17. c. 27. Myagros dicitur: verum quid sit, nunc non discernimus. Sunt qui nostrum Myagrum, Erysimum Theoph. & Galeni velint: alijs Sesamum, ob seminis similitudinem, & olei ubertatem.

I. Myagrum filiqua longa.

Viola lutea syl. Trag.

Myagrum alterum Thlaspi effigie, Lob. Lugd.

Myagrum 2. Tab. Erysimum 3. Eid.

Camelina, Ger. Eruca syl. angustifolia, Eid.

Ratione foli variat, cubitalis, folijs latis, aliquando trium quatuorve vnciarum angustis: & inter hæc est medium.

II. Myagrum sativum.

Linaria quinta, Trag.

Sesamum, Trag. Lac. Lon. Sesamum non est Gef. hor.

Myagrum, Ang. Dod. gal. Ad. Lob. Lugd. Ger.

Myagrum primum, Tab.

Pseudomyagrum, Matth. Lugd.

Camelina sive Myagrion, Dod. Thal.

Dorella, Cæf.

Aliquibus in locis feritur olei causa, & latioribus folijs est: multis locis spontè provenit

& hoc strigosius, hinc figurarum varietas, vt in Matthiolo nostro videre est.

III. Myagrum sylvestre.

Pseudomyagrum alterum, Cam. in Matth.

Paronychia 2. Tab.

Huic simile minus, quod

Myagrum 3. in arvis, Cam.

IV. Myagrum fœtidum; quod 1. in Prod.

V. Myagrum monospermon latifolium.

Myagrum hortense monospermon, Eysf.

Hoc in Phytopinace sub 5. & in Matthiolo, vbi & figura exhibetur, & sub 2. in Prod. habetur.

VI. Myagrum monospermon minus: 3. in Prod.

VII. Myagro similis filiqua rotunda.

In Phytopinace sub Myagro 6. in Prod. sub 4. descripta.

## DRABA.

**D**RABAM δράβη Dioscorides lib. 2. c. 186. ipsi Thlaspi subiungit, vnius sultâ mentione.

I. Draba umbellata, vel Draba major capitulis donata.

Arabis sive Draba, Matth. Ang. Ad. Lob. (& Nasturtium Babylon.) Lugd.

Arabis, Lac. Lon. Arabis verior, Cam.

Draba vulgaris prima, Clus. pan. & hist.

Draba Dioscorid. Cæf. Cast. Colum.

Folijis dentatis observavimus, sunt qui non dentatis pingant.

II. Draba tenuifolia velut spicata: 1. in Prod.

III. Draba minor capitulis orbicularibus.

Draba minor, Clus. hist.

IV. Draba alba filiquosa.

Draba secunda, Clus. pan. & hist.

V. Draba alba filiquosa repens.

Draba altera, Lob. ico.

Draba 3. succulento folio, Clus. pan. & hist.

Arabis seu Draba altera, Lob. ob. Lugd.

Eruca muralis, Lugd.

an Thlaspios generibus cognata filiquosa, Thal.

VI. Draba Erysimi flore & filiquis.

Sinapi & Thlaspi media Provincialis planta, Ad. Lob. ico. Lugd.

VII. *Draba lutea* siliquis strictissimis.  
*Arabis* quorundam, Cam. ep. Matth. & hor.

IX. *Draba* flore cæruleo galeato: hæc est in Prod.

## ALLIARIA.

**A**LLIARIA è quod folia digitis comminuta, *Alliam* seu *Porrum scellivum* cum *Nasturtio* redolent: quibusdam, *Thlaspidium* secundū *Cræva*: alijs *Alectorolophos* Plinij lib. 25. cap. 5.

*Alliaria*, Trag. (cui & *Thlaspidium cornutum*) Fuch. Matth. Dod. (cui & *Pes asininus* Pandect.) Lac. Lob. Cast. Lugd. Cæs. Thal. Lon. Tab. Cam. Ger. *Alliaria* altera, Ama. *Alliastrum*, Gef. hor.

*Rima marina*, Eri. Cordo. *Rima maria* Ang. *Alectorolophos* Plinij quibusdam, Dalech. in Plinium.

Folio latissimo amplissimoq; & subrotundo, quandoq; reperitur.

## COCHLEARIA.

**C**OCHLEARIA, à foliorum forma modicè cava, parvum & non valde profundum *Cochlear* referentia, dicta: quam aliqui *Telephium*, alijs *Britannicam* Plinij l. 25. c. 3. volunt (licet forma & sapore *Thlaspi* & *Nasturtii* affinis sit) eo quod ei malo, quod *Stomacacen* & *Scelotirben* vocant (*Scorbutum* esse volunt) auxilio esse *Britannicam* Plinius scripserit.

I. *Cochlearia* folio subrotundo.  
*Cochlearia*, Dod. Gef. hor. Lugd. Cam. epist. Matth. & hort. & par. 3. Ind. orient. navig. 3. *Telephium*, Lac. *Britannica*, Gef. hor.

*Cochlearia* Batava, Lob.

II. *Cochlearia* folio sinuato.

*Cochlearia* Britannica, Lob. Dod. Lugd.

III. *Cochlearia* minor erecta: quæ 1. in Prod.

IV. *Cochlearia* Danica repes: quæ 2. in Prod.

## SECTIO TERTIA.

### BRASSICA EIVSQVE SPECIES.

**B**RASSICA *Theophrasto* l. hist. 19. inter *Olera* est, quæ ἀπὸ τοῦ βράζειν à vorando. *Dioscoridi* l. 2. c. 14. κράμβη, quasi κράμβη, quod oculorum pupillas ledat, dicitur. *Theophrasto* & βράχων dici, in *Raphano* monuimus.

Genera: *Dioscoridi* sativa, sylvestris & maritima. At *Theoph.* 7. hist. 4. alia crispata, alia laevis, alia sylvestris. *Plinius*, cum l. 19. c. 8. *Brassica* cauliumve tria genera ex *Catone* c. 157. c. narrasset, plura adhuc esse refert, *Cumanam*, *Aricinam*, *Pompeianam*, *Sabellicam*, *Lacuturam*. At l. 20. c. 9. *Græcos* in tres species divisisse scribit: *Crispam*, quam *Selinada*, à similitudine foliorum appj vocant: alteram *leam*, latius folijs, quæ *Caulodes* quibusdam: tertiam propriè *Crambem* appellatur.

Recentioribus differentia sunt pro foliorum colore, crispitudine, densitate, alijsq; qualitatibus. Alijs enim color viridis, alijs candicans, alijs purpurascens. Crispitudo & laetitas, tam in candida, quam in viridi, quam nigram vocant, rarius in purpurea, reperitur. Summa genera sunt *Sativa*, *sylvestris*: *Sativa*, alba & rubra &c.

*Bras*



*Brassica capitata.*I. *Brassica capitata alba.*

*Brassica alba*, Brunf. quæ capitata & sefsilis, Cord. in Diosc.

*Brassica alba sefsilis* & glomerata, Lob. ico.

*Caulis capitatus*, Trag.

*Caputium*, *Brassica* 3. genus, Cumanum Plinij, Eric. Cord.

*Brassica capitata*, Matth. (& Lacuturris) Lac. Gef. hor. Lon Tab. Lob. Cast. alba, Ger.

*Brassica alba sefsilis glomerata*, aut capitata *Lactuca* habitu, Ad.

*Brassica capitata albida*, Dod. (cui Tritiana) Lugd. Cæf.

*Brassica* 4. genus, Fuch. Tur.

*Brassica capitata* 1. genus, & Cumana Plin. Cæf.

Hæc candida est, quæ Lacuturris Plinij est & viridis, quæ Tritiana.

II. *Brassica alba capite oblongo non penitus clauso.*

*Brassica* albæ 2. species, Lacuturris, Dod. gal.

*Brassica patula*, Sabauda vulgo, Ad.

*Brassica Sabauda hyberna*, Lob. ico.

*Brassica Sabauda*, Tab. Ger.

III. *Brass. ex capitibus pluribus cōglobata.*

*Brassica capitata polycephalos*, Lugd.

In hac aliquando quinquaginta capita ovorum magnitudine numerantur.

IV. *Brassica capitata rubra.*

*Brassica rubra* 2. species, Dod. gal. Lugd.

*Brassica convoluta* & arcuè occlusa rubro colore, Ad.

*Brassica capitata rubra*, Dod. Tab. Ger.

V. *Brassica gongylodes.*

*Brassica albæ* 4. species, Dod. gal.

*Brassica thyrsuta*, Gef. hor.

*Caulorapa*, *Brassica peregrina*, medio caule turbinata & rapata, Ad.

*Brass. caule rapu gerens*, Dod. rapicaulis, Cam.

*Brassica raposa*, Rapitius colis Catoni, Lugd.

*Caulorapum*, Scalig. Lob. ob. Cam. ep. Tab.

*Rapa Brassica peregrina*, caule rapum gerens, Lob. ico.

*Brassica capitata* 2. genus, Lacuturris Plinij, Cæf.

Variat rapo rotundiore & longiore: illa *Caulorapum rotundum*: hæc *Caulorapum longum*, Tab. & Ger.

VI. *Napoprafsica*, in Prodomo descripta.

VII. *Brassica cauliflora.*

*Brass. Pöpejana* aut *Cypria*, Dod. gal. Lug. Cam.

*Brassica florida*, Ad. Ger.

*Brassica cauliflora*, Dod. Cam. ep.

*Brassica florida botrytis*, Lob.

*Brassica capitata* 3. genus, Cæf.

*Brassica prolifera florida*, Tab.

An hæc Theophrasti, qui nullum aut prævum semen producere scribit?

*Brassica non capitata.*

I. *Brassica alba vel viridis.*

*Brassica*, Brunf. lævis, Matth. Cæf. Cast.

*Brassica sativæ majoris species altera*, Trag.

*Brassica candida*, Gef. hort. lata alba, Lon.

*Brassica alba vulgaris*, Lugd.

*Brassica vulgaris*, Ad. sativa, Lob. Dod. Ger.

*Brassica prima*, Tab.

*Brassica* in India, folia semper hiantia servat, nec vnquam capita profert: par. 4. Ind. or. c. 10.

Hæc est *Brassica lævis* Theoph. & Plinij, cui & Caulodis.

II. *Brassica rubra.*

*Brassica* 1. genus, Fuch. rubra 1. genus, Lugd.

*Brassica Cumana* five rubra, Dod. gal.

*Brassica prima*, Tur. vulgaris, Cord. in Diosc.

*Brassica rubra*, Gef. hort. Ad. Lon. Tab. Ger.

III. *Brassica spinosa*: hujus in Phytopinae & Matthiolo (vbi & icon) mentio fit: & in Prod. sub 2. describitur.

IV. *Brassica folia peregrina.*

*Achanaca* Theveto, & Lugd. qua in regno Melly, vt nos Guajaco, vtuntur.

V. *Brassica Brasiliiana folijs Nymphaeæ.*

*Cajova brassica* genus, Leriio desc. *Brass. c. 12.*

*Brassica crispa.*

I. *Brassica alba crispa.*

*Brassica crispa*, Matth. Lac. Gef. hor.

*Brassica alba crispa*, Lugd.

*Brassica Sabauda*, Dod.

*Brassica Sabauda crispa*, Tab. Ger.

*Brassica patula crispa Sabauda æstiva*, Lob. ico.

quibusdam Lacuturris, alijs Sabellica Plinij.

II. *Brassica asparagodes crispa.*

*Brassica asparagodes* Dalech. Lugd.

*Brassica crispa prolifera*, Tab. Ger.

*Brassica epiphyllitis.*

Folia modò laciniata, modò plana & expansa: vel tota viret, vel venæ & costæ rubent: hinc prolifera, & prolifera crispa, Tab. & Ger.

### III. Brassica fimbriata.

Brassica 2. genus, Fuch.  
Brassica Sabellica sive crispa, Dod. gal.  
Brassica crispa, Dod. Lugd.  
Brassica nigra, Dod. Lugd.  
Brassica nigra crispissima, Cæs.  
Brassica fimbriata, Lob. tophosa, Tab. Ger.

### IV. Brassica fimbriata pumila.

Brassica Anglica, minima, Ad.  
Tota nivea, oris fimbriatis purpureis, maculis aspersis.

### Brassica Apij folio.

I. Brassica lato Apij folio.  
Brassica Selinifolia latifolia, Tab. Selinifolia, Ger.  
II. Brassica angusto apij folio.  
Selinada & Apiana, Plinio.  
Brassica crispa seu Apiana, Trag. Lon. Lugd.  
Brassica rubra 3. species, Dod. gal.  
Brassica Selinoides, Dod. Selinifolia angustifolia, Tab.  
Brassica Selinoides, Ger. scissis folijs, Cæs.  
Brassica tenuifolia laciniata, Lob. Lugd.  
Brassica Apiana crispa, Cam.

### Brassica sylvestris.

I. Brassica arvensis.  
Brassica syl. Trag. Dod. Lugd.  
Brassica 3. Fuch. 5. species, Dod. gal. 1. Tur.  
II. Brassica maritima.  
Brassica syl. Tur. Ang. Cæs. syl. Diosc. Lob. ob.  
Brassica marina syl. multiflora, monospermos, Ad. Lob. ico. Lugd. Ger.  
Brassica Anglica, Tab.  
III. Brassica campestris perfoliata flo. albo.

Brassica altera, Trag.

Brassica siliquosa sive major Tragi, Cam.  
Brassica agrestis, Cord. hist. Lugd. cui altera species.

Perfoliata minor, Ges. hort.

Brassica campestris 1. Clus. hisp. & hist. Cæs. Lugd. Cam.

an Brassica syl. folio betæ, Thal.

Perfoliata Napifolia Anglorum siliquosa, Lob. icon.

Perfoliata siliquosa, Ad. Lob. ob. Ger. napifolia, Tab.

Brassica syl. perfoliata, Dod.

IV. Brassica campestris perfoliata flore purpureo.

Brassica campestris altera, Clus. hisp. & hist.

V. Brassica syl. latifolia folijs non sinuosis.

Brassica syl. maior latifolia, Thal.

VI. Brassica syl. ramosa tota penè glabra.

Turrita maior, Clus. hist.

Brassica syl. procera, Thal.

VII. Brassica syl. folijs circa radicem cichoraceis.

Brassica syl. virgata, Cord. hist.

Brassica syl. prima Cordi, Lugd.

Sinapi album, Eid.

Brassica syl. longifolia, Thal.

IX. Brassica sylvestris folijs integris & hispidis.

Turritis, Lob. Tab. Ger.

Turrita vulgarior, Clus. hist.

Vaccaria, Tab.

IX. Brassica syl. folijs membranaceis: sylvestrem mediam, & syl. minorem Thalius habet, quas non novi.

X. Brass. syl. alpina: quæ sub 3. in Prod. describitur.

Turritis alpinæ nomine, D. Burferus misce.



## SECTIO QVARTA.

## ISATIS SIVE GLASTVM: LAPATHVM:

ACETOSA: SPINACHIA: RHA: CENTA-  
RIVM MAIVS.

## ISATIS SIVE GLASTVM.

**I**satis sativa (Dioscoridi l. 2. c. 215.) folia habet plantaginis, sylvestris, lactuca similia: quarè genera duo fecit: & Plinio lactuca spontanea tertium genus, quod Isatim vocant: & quartum quod Glastum vocitant, folijs prioris simile aut laphato sylvestri.

## I. Isatis sativa vel latifolia.

Isatis domestica, sive Glastum, Matth. Cast.

Isatis sativa, Trag. Fuch. Dod. vt. Cord. in Diof.

(cui &amp; Latinorum Lutea &amp; Glastum) Gef. hor.

Lac. Lon.

Glastum sativum, Tur. Ad. Lob. Cam.

Glastum, vulgo Guadum, Cæs.

Isatis Græcorum, Nil Avicennæ, Indicum officinarum, Fragofo.

## II. Isatis sylvestris vel angustifolia.

Isatis syl. Trag. Matth. Fuch. Dod. vt. Gef. hor.

Lac. Lon. Rob. Lugd. Tab.

Glastum, sive Isatis sylvestris, Ad.

Isatis agrekis, Cord. in Diof.

Glastum syl. Tur. Cam.

## III. Glasto affinis.

Anil herba folijs Mungiriqua (ocymo Clusius vertit) similibus, Garziæ: cum Isatide multum convenire, addit Clusius: &amp; Nil apud A-

vicennam, interpres Glastum vertit.

Nil sive Anil, Cam.

Anil sive Indigo, Gali sive Nil, herba roris marini facie, Linsc. 4. par. Ind. or. 52.

Herba anil sive Enger, 4. par. Ind. or.

Planta ex qua Anil sive Indigo conficitur, par.

9. Ind. occid. l. 4. c. 23.

Agnir, Fragofo.

Pastellus herba ad colorandas lanas expetita,

ex cujus venditione in Insulis Azores victum

comparant: Linscot. par. 3. Ind. or. 6.

Indigo in Sian crescit maxima oopia: par. 8.

Ind. or.

Color Indicus quem in Cambaja Anil vocant

par. 2. Ind. or. 11.

## IV. Isatis montana.

Glastum montanū Dalechampij, Lug. quid est?

V. Waffewowr herba quam decoquunt pro rubri coloris tinctura in Virginea.

## LAPATHVM ET EIVS

## Species.

**L**APATHVM à Theoph. 1. hist. 9 inter olera numeratur: & 7. hist. 2. tota forma cum perfectum est, Beta proximum cernitur. λάπαθον Diof. l. 2. c. 140. ab effectu nominatur, ἀλαπάθον exinanendo, quod foliorum decoctum alvum emolliat, & exinaniat, Latinis Rummex, ut Plinio l. 19. c. 21. qui Lapathum sativum & l. 20. c. 21. Oxalidis tribuit.

Genera quinq. Dioscoridi, ὀξυλάπαθον, κυκλῶν, ἄγριον, ὀξυλάπαθον, ὑπολάπαθον, Theoph. 7. hist. 4. genera plura sunt, & c. 6. in sylvestrem & urbanam partitur. Plinius l. 20. c. 21. meminit sativi, sylvestris, Oxylapathi, Hydrolapathi & Hippolapathi. Libet ab Acetosa ordiri.

P

ACE-

## ACETOSA.

I. *Acetosa pratensis*.

*Lapathum* 4. Diofco. fylveftre, Plinio.

*Acetofa*, Brunf. Lon. major, Caft. Colum.

*Oxalis*, Trag. Matth. Lac. Fuch. Dod. Ad. (& *Lapathum oxalida*) Lob. Cæf. Tab. Ger. major, Thal. Lugd.

*Rumicis* 4. genus, Tur. Cord. in Diofco.

*Lapathi alia* fpecies, Ang.

*Lapathum minimum*, *Oxalis dicta* major, Gef. hor.

Hujus folia aliquando media parte virent, altera verò candida funt: aliquando in imo vtrinque bifurcata: nonnunquam folia crispantur, & hæc

*Oxalis crispa*, Tab. & Ger.

II. *Acetosa montana maxima*.

*Oxalis* major Brockenbergenfis, Thal. an *Oxalis* altera, Cæf.

III. *Acetosa montana geniculis nodofis*.

*Oxalis amplifimo folio*, Cluf. pan.

*Oxalis montana maxima*, Eid. hift.

IV. *Oxalis montana bulbofa*.

*Acetofa quarta*, Colum.

V. *Acetofa tuberofa radice*.

*Oxalis tuberofa*, Lob. Dod. Lugd. Tab. Ger. an *Acetofa* altera minor bulbofa radice, Colum.

VI. *Acetofa Americana*, folijs longiffimis pediculis donatis: hæc 1. in Prod.

*Acetofa veficaria peregrina*, Eyft.

VII. *Acetofa calthæ folio peregrina*.

*Oxalis Zarynthi*, Alpino.

IX. *Acetofa rotundifolia hortenfis*.

*Oxalis Romana* & *Veterum*, Dod. gal.

*Oxalis rotundioribus folijs*, Gef. hor. rotundifolia, Dod. rotunda, Lugd. Tab.

*Oxalis fativa Franca rotundifolia repens*, Ad. Lob.

*Oxalis Franca* feu *Romana*, Ger.

*Oxalis tertia*, Cæf.

*Acetofa* rotundis folijs, Cam. qui &

*Acetofa* Hispanicæ grãdifiimis folijs meminit.

Ludit folijs, communiter fubrotundis, rarius ad formam foliorum Boni Henrici oblongis & in acutum definentibus.

IX. *Acetofa rotundifolia alpina*: quæ 2. in Prod.

X. *Acetofa fcutata repens*: hæc 3. in Prod.

XI. *Acetofa Cretica femine aculeato*.

Hæc in *Phytopinace* fub 10. in Prodr. fub 4. defcripta, & Matth. vna cum figura adpofita.

XII. *Acetofa Ocimi folio Neapolitana*.

*Acetofa ocimi folio Neapolitana* *βουφθαλόφρα*, Colum.

Hanc D. Columna mifit.

XIII. *Acetofa arvenfis lanceolata*.

*Oxalis minima*, Trag. (& *Lapatholum*) Dod.

*Oxalis minor*, Matth. Gef. hor. Lugd.

*Oxalis tenuifolia finuata vervecina*, Ad. Lob. *Acetofella*, Lon.

*Acetofa minor*, Caft.

*Rumicis* feu *Lapathi* 6. genus, Cord. in Diofco.

*Oxalis* spontè nafcens, Cæf.

*Oxalis ovina*, Tab. tenuifolia, Ger.

Ratione loci pinguioris aridiorisve, major minorve, latioribus anguftioribusve folijs reperitur.

XIV. *Acetofa lanceolata anguftifolia repens*: hæc 4. in Prod.

Hujus fpecies minor videtur quæ dicitur

*Oxalis minima* 1. Tab. minor, Ger.

XV. *Acetofa arvenfis minima non lanceolata*.

*Oxalis minima* 2. Tab. minima, Ger.

XVI. *Acetofa folijs fimilis villosa*.

Herba Iohannis infantis, Monardi, Lugd. Frag. Caft.

## LAPATHUM.

*Lapathum hortenfè*.

I. *Lapathum hortenfè folio oblongo*, five fecundum Diofcoridis.

*Rumex hort.* vel 2. Trag. fativus, Cord. in Diofco.

*Lapathum hortenfè*, Gef. hort. Lugd.

*Lapathum fativum*, Ang. Dod. defcr.

*Hippolapathum fyl.* Matth. Lugd.

II. *Lapathum hort.* feu *Spinacia femine fpinofa*.

*Spinachia*, Brunf. Fuch. Dod. Tab.

*Spinacia*, Matth. Ad. Lob. Lugd. Cæf. Ger. mas, Cam.

*Spinachia*, Matth. Lon. Caft.

*Olus Hispanicum Spinachia vulgaris*, Trag.

*Spinaceum olus*, Gef. hor.

*Spinachia*, ob femina dura & fpinofa, Græcis recent-

recentioribus *παραχρησάμενοι* à raritate in vfu Medico, alijs Seutolapathum, hoc est, mediæ naturæ inter Betam & Lapathum : alijs Seutlomalache.

III. Lapathum hortense seu Spinacia femine non spinosa.

Spinachia nobilis & 1. Trag.

Spinachia fativa mas, Lugd.

Hujus figuram in Matthiolo exhibemus.

IV. Lapathum hortense seu Spinacia sterilis.

Spinachia tertia, Trag.

Spinachia femina, Lugd. Cam.

*Lapathum fyl. folio acuto.*

I. Lapathum folio acuto plano.

Oxylapathum, Diofc. & Plinij.

Lapathum acutum, Trag. Lob. Dod.

Lapathum acutum five acutifolium, Ad.

Oxylapathum, Fuch. Dod. gal. Matth. Lac. Cast.

Rumicis 1. genus, Tur.

Rumex acutus, Cord. in Diofc.

Lapathum fyl. Gef. hor. fativum, Cam.

Lapathum seu Rumex, Lon. Cast. Cæf.

II. Lapathum folio acuto crispo.

Lapathum acutum crispum, Tab.

Hydrolapathum minus, Ger. ico.

III. Lapathum folio acuto rubente.

Lapathi tertij altera species, five Lapathum nigrum, Dod. gal.

Rumicis species folijs rubentibus venis distinctis, Cord. ob.

Sanguis draconis herba, Gef. hort. Lon.

Lapathum sanguineum, Ad. Lob. Cam. rubens, Dod.

Lapathum rubrum, Cam. in Matth.

Lapathi fyl. 3. genus, Lugd.

Folij paulo latioribus, rotundioribusq; vulgari scribit Cæsalpinus.

Lapathum rubrum Cretense, nominans.

IV. Lapathum folio acuto flore aurco.

Lapathi fyl. 4. genus, Dalech. Lugd.

V. Lapathum minimum.

Lapathum acutum minimum, Lob. ico. Ger.

Lapathum minimum, Tab.

*Lapathum fyl. latifolium.*

I. Lapathum vinctuosum.

Bonus Heinrichus, Brunf. Trag. Matth. Tab. Ger.

Rumacis 2. genus, Tur. 3. genus, Fuch.

Atriplicis fyl. species, Gef. col.

Atriplex canina, Lon. ico.

Tota bona Spinaciæ facie, Ad.

Tota bona, Lob. Dod. (quibusdam Chrysolanum) Thal.

Lapathi fyl. secundum genus, Lugd.

Folij maximis Aaronis instar aliquando reperitur.

II. Lapathum folio subrotundo.

Lapathi 3. species, Dod. gal.

Lapathum fyl. Ang. folijs ferè rotundis, Gef. hor.

Rumex agrestis, Cord. in Diofc.

Lapathum folio retuso, Ad.

Lapathum folio minus acuto, Lob. ico.

Hippolapathum fyl. Tab.

Hydrolapathum magnum, Ger. ico.

III. Hippolapathum latifolium.

Hippolapathum Diofcoridi, Galeno, Plinio & Rumex vrbana, Theoph.

Rhabarbarum, Brunf.

Rhabarbarum Monachorum (Franciscanorum) Trag. Gef. hor. Cam.

Hippolapathum, five Rhabarb. Monachorum, Ang. Dod.

Hippolapathum, Matthiolo : fativum, Cast. Tab.

Hippolapathum fativum latifolium, Ad. Lob. (& Patientia vulgi) Lugd.

Rumicis 2. genus, Fuch. 3. genus, Tur.

Lapathum fativum, Dod. gal. hortense, Lac. Lon.

maximum, Gef. hor. magnum, Cæf.

Lapathum latifolium, Cam.

Lapathi species, Cord. in Diofc.

Rumex major, Thal. latifolius, Clus. hist.

IV. Hippolapathum rotundifolium montanum.

Lapathum rotundum, Ang. hor. Cæf.

Lapathum rotundifolium, Clusio pan. Camer.

Hippolapathum rotundifoliū, & Pseudo-Rha recentiorum, Ad. Lob. Lugd.

Rhabarbarum Monachorum triplex vidi 1. folio oblongo, radice longa, fibris oblongis, intrinsecus rufescente: 2. folio rotundo: 3. folio subrotundo, fibris transversis, radice intus flava.

V. Lapathum Ægyptiacum lætescens siliquā Asclepiadis.

Beidel-sar, Alpini.

Ossar vulgo in Ægypto: fructus verò Beid el ossar, hoc est ovum ex Ossar: Arabibus Saccharum Alhufar: fortè Arbor lanigera, Belonij l. 2. obs. Hon. Belli ep. 4. & 5. ad Clusf.

Apocynum Syriacum, seu Palæstinum sive Ægyptiacum, Clusf. hist.

Esula Indica, quibusdam.

### *Lapathum aquaticum.*

I. Lapathum aquaticum folio cubitali. Rumex palustris, Trag.

Rumicis 5. genus, Cord. in Diosc.

Lapathum 1. Ang. palustre, Tab. sub Lapatho acuto, Ger. ico.

Hippolapathū, Dod. gal. Matth. Ges. hor. Lon.

Hippolapathum syl. Matth. desc. Cast. Thal.

Hydrolapathum magnum sive aquaticum, Ad.

Hydrolapathum majus, Lob. Lugd.

Lapathum sativum, Dod. ico.

II. Lapathum aquaticum minus.

Hydrolapathum sativum, Lob. Lugd. Tab.

Hippolapathum sativum, Ger. ico.

III. Lapathum maritimum fœtidum: hoc in Prodro-mo describitur.

## RHA ET EIVS SPECIES.

**C**vm Hippolapathi viriūq; radix, pro Rhabarbaro, sed in dupla, triplāve dosi vsurperetur, nunc de Rhabarbaro: dein Rhapontico, quod quibusdam ex Lapathi generibus: tum de Centauryo magno, cum id vulgò Rhaponticum & nominetur, & pro eo vendatur, & ei aliqui Hippolapathi rotundi folij radicem substituant.

**RHABARBARYM**, Dioscoridi l. 3. c. 2. ῥῆμα & ῥῆον. Rha, & Rheum, cuius tantum radicem describit, dictum volunt. Romanis, Rhaponticum appellatum: Arabibus, Raved & Rhabarbarum: cuius tria genera Mesueo 2. med. purg. 5. Indicum quod optimum & Rha vedensi vocant: alterum Barbarum: tertium Turcicum, quod deterius, in quo genere Rhaponticum fuerit, quale est Rhabarbarum acerbum officinarum, colore minus vario, minus croceo, minus odorato, minus densum, ac facultate minus solvente. Verum videtur Dioscorides suo Rha, non Rha barbarum nostrum, cuius Mesues meminit, sed Rhaponticum, cuius iconem Lobelius proposuit, intelligere.

### I. Rhabarbarum Officinarum.

Rhabarbarum nostrum, idem genere cum Dioscoridis Rhapontico, tantum loco differens, Cord. in Diosc.

Rhabarbarum seu Indicum, Cord. hist.

Rhabarbaricum verum, Lapathiorum generis videtur, Ges. hort.

Rhaponticum & Rhabarbarum idem, Ang.

Reobarbarum, Lac.

Rhabarbarum cholagogen, Ad.

Rhabarbarum Garziæ, Acoštæ, Frag. Lobel.

Rhabarbarum tertium, Tab. secundum, Ger.

Rhabarbarum Americanum, Monar.

Rhabarbari 2. nomine, aliam cum foliis & radice pingit Tab. sub Hippolapatho rotundi-

folio apud Ger.

Rhabarbarum, nullibi, nisi in China provenit, quæ inde per Vsbeken in Turciam, hinc Venetias deferitur & quidem vel navibus, quod citius corrumpitur, vel itinere terrestri, quod durabilius & carius, Linsc. par. 4. Ind. orient. 29.

II. Rhabarbarum Matthiolus pingit, quem sequuntur Lon. Lugd. Cast. Tab. & Ger. an idem sit cum superiore, cum Rhabarbari nec folia, nec flores visa sint, ignoramus: meminit quoq; Alpinus Rhabarbari, quod habeat folia Rumice latiora, crassiora, & lanugine alba obfusa.

III. Rha & Rheum Dioscoridis.

Pon-

Ponticum Rha antiquorum, Ad. Lob.  
an Rhapontica, Lon. Rhaponticum verum of-  
fic. Tab.

Rhaponticum siccatum, Ger.

IV. Rhaponticum folio Lapathi majoris  
glabro.

an Rhaponticum, Tab. qui alteram iconem ex  
vetusto Codice addit.

an Rheum antiquis appellatum, Cæs.

Rhaponticum Thracicum, Alpino.

V. Rhaponticum folio Helenij incano.

Rha, Rhecoma & Rhacoma Plinij, Dod. gal.

Rhaponticum, Lac. Cast.

Rha capitatum folio Enulæ Centaurij majoris  
facie, Ad. Lob.

Rha sive Rhei, vt existimatur icon, Dod.

Rhapontici icon alia, Tab.

Rha capitatum, Ger. Helenij folio, Lugd.

VI. Rhaponticum angustifolium incanum.

Rhaponticum alt. angustiore folio, Lob. Lugd.

## CENTAVRIVM MAIVS.

**C**ENTAVREI majoris Dioscoridis lib. 3. cap. 8. & Plinius lib. 2. cap. 15.  
*meminere.*

I. Centaurium majus folio in lacinias plu-  
res diviso.

Rhapontica, quæ hodie Centaurea major,  
Trag. Er. Cord.

Centaurium majus, Ang. Tur. Lac. Ad. Lon.  
Lob.

Centaur. majus alterum, Ges. hor.

Centaurium magnum, Matth. Dod. Cast.

Centaurium majus, Rhaponticū Pharma. Cord.  
in Diosc. & hist. Cam. Tab.

Centaurea major, Cæs.

Centaurium majus i. vulgare, Clus. hist.

II. Centaurium majus folio non dissecto.

Centaurium majus alterum, Clus. hisp. & hist.  
Dod. Ad. Lob. Lugd.

III. Centaurium Alpinum luteum.

In Phytopinace sub 3. & in Prodrom. descripsi-  
mus, & postmodum Rhapontici Lusitanici no-  
mine, ex horto Patavino accepimus.

## SECTIO QUINTA.

**BETA: BLITVM: ATRIPLEX: HALIMVS:**

*AMARANTHVS: PARIETARIA: MERCVRIALIS:  
PHYLLON.*

### BETA ET EIUS SPECIES.

**B**ETAM Dioscorides l. 2. c. 149. τεύτλον nominat, dicitur & σεύτλον ab impulsu, quod  
facile excrescat: Beta vero, quoniam figuram literæ β dum semine surgit referre vide-  
atur.

Genera: Dioscorides nigram & candidam fecit: & Theoph. 7. hist. 4. candida sapore ni-  
grâ præstantior, quæ Sicula (nunc Cicla Prædictis) appellatur: at 6. hist. 3. & sylvestris in gene-  
re Carduorum meminit, quæ tamen folia aculeata non habeat. Plinius l. 19. c. 8. ex Theoph.  
Beta à colore duo genera Gracifaciunt, nigrum & candidum, quod præferunt appellansq; Sicu-  
lum: nostri (subjungit) Beta genera faciunt Vernum & Autumnale. Idem l. 20. c. 8. Candida  
nigram, usum proponit, & sylvestrem, quam Limonium vocant, addit, quam Dioscorides l. 4.  
c. 16. λειμώνιον nominat.

*Beta minor.*I. *Beta communis* five *viridis*.Beta *agrestis*, Trag.

Eandem cum Beta sequenti qui volet, dicat.

II. Beta alba vel *pallescens*, quæ Cicla offic.

Beta, Brunf. Tab. Ger. candida, Trag. Fuch.

Tur. Cord. in Diosc. Dod. Lac. Lugd.

Beta alba, Matth. Ang. Gef. hor. Lon. Ad. Lob. Cast. Cam.

Beta folio brevior &amp; viridior, Cæf.

Variat foliorum colore, viridi, vel ex obscuro magis virente, quam nigram vocant etiam Advers.

## III. Beta rubra vulgaris.

Beta rubra, Brunf. Trag. Lon. Dod.

Beta nigra, Ang. Matth. Fuch. Dod. gal. Lac. Gef. hort. (&amp; rubra) Cast. Lugd.

Beta rubra vulgarior, Ad. Lob. Lugd.

## IV. Beta rubra radice rapæ.

Beta rubra, Matth. Gef. hor. (cui &amp; Seutlostaphylinum) Ad. Lob. Cast. Lugd. rubra Roma-

na, Dod.

Rapum rubrum, Fuch. Gef. hort.

Rapum sativum rubrum, Fuch. ico.

Beta nigra, Cord. in Diosc. nigra Roman. Dod. gal.

Beta species 3. Ang. Cæf.

Beta erythrorrhizos, Lugd.

## V. Beta Cretica femine aculeato.

In Phytopinace sub 6. &amp; Matthiolo &amp; Prodr. (addita figura) descripsimus.

## VI. Beta lato caule.

Beta *πλεῖσταυλος* Dalech. Lugd.

## VII. Beta syl. maritima

Beta syl. spontanea marina, Lob. ob.

*Beta maior folijs latissimis.*

## I. Beta pallide virens major.

Beta altera, Cæf.

## II. Beta rubra major.

## III. Beta lutea major.

Beta flava, Gef. hor. lutea, Cam.

Beta quarta radice buxæ, Cæf.

## BLITUM ET EIVS

*Species.*

**B**λίτον *Dioscoridi* l. 2. c. 143. quasi *βλητόν* abijciendum, vel propter inertiam & vilitatem, vel ob insulsum sativumve saporem. Festum, à *βλάξ* pisce omnino inutili, deductus: licet & solidum & insulsum significet: Blitum, *Plin.* l. 2. c. 22.

*Genera Theoph.* 1. hist. 9. plura dixit, at nec *Dioscorides*, nec *Plinius*, differentias proposuere. Aliud majus est, aliud minus: utrumque, album & rubrum.

## I. Blitum album majus.

Blitum album, Matth. Cast. majus, Dod.

Blitum majus album, Dod. gal. Ad. Lob. Lugd.

Blitum, Lac. sativum album, Gef. hor.

## II. Blitum album minus.

Blitum, Trag. ico. Fuch. Tur. Dod. gal. Lon.

Blitum minus, Dod. minus album, Ad.

Blitum syl. album, Gef. hor. syl. minus, Thal.

## III. Blitum polyspermon à feminis copia.

Blitum 3. Trag. syl. Cam.

Polysporon *Cassiani*, Ang. Lugd.

Polyspermon, Lob. Tab.

Atriplex syl. five Polyspermon, Ger.

## IV. Blitum rubrum majus.

Blitum rubrum, Matth. Ad. Lob. ico. Cam. Cæf.

Blitum rubens, Dodon. majus rubrum, Dod.

gal. hortense rubrum, Gef. hor.

Blitum rubrum minus, Matth. in ico. Lugd.

Blitum nigrum, Ang.

Blitum, Lob. ob. Tab. Ger.

## V. Blitum rubrum minus.

an Sanguinaria, Brunf.

Blitum nigrum, Trag. minus rubrum, Dod. gal.

Blitum syl. rubrum, Gef.

Blitum rubrum minus, Ad. rubrum supinum, Lob. ico.

Blitum alterum syl. Cæf.

Hoc vel caule tantum, vel omnibus partibus rubet.

A T R I



LIB. III. SECT. V.  
**ATRIPLEX ET EIVS**  
*Species.*

119

**A** τράφαξι, παρὰ τὸ ἀθρόως ἀνθεῖν, cum oſtavo die à ſatu prodeat, Theoph. 7. hiſt. 1.  
 χρυſολαχανον, olus aur. um, à luteo flore, quem fert, Dioſcor. l. 2. c. 145.

Genera duo Dioſcor & Plin. ob. & cap. 20. ſylveſtre & ſativum. Dividimus in hortenſem,  
 ſylveſtrem & maritimum.

*Atriplex hortenſis.*

I. Atriplex hortenſ. alba ſive pallidè virens.

Atriplex ſativa, Trag. Dod. gal. Lac. Ad. Lug.

Atriplex ſativa alba, Lob. ico.

Atriplex, Matth. ico. Cæſ. hortēſis, Fuch. Caſt.

Atriplex domeſtica, Ang. Matth. fol.

Atriplex alba, Gef. hor. ſativa viridis, Cord. in  
 Dioſc.

Atriplex alba viridis, Lon.

Folio eſt in luteum languefcente, vel pallidè  
 virente: eſt & nigricante.

II. Atriplex hortenſis rubra.

Atriplex ſativa folio rubicundo, Trag.

Atriplex ruſo folio, Cord. in Dioſc.

Atriplex ſativa altera, Dod. gal. Lugd.

Atriplex hortenſis, Dod. hortenſis rubra, Lon.

Atriplex ſativa, Lob. ob. ſativa altera folio &  
 flore purpureo livens, Ad. Lob. ico.

Atriplex rubra, Tab. ſub ſativa alba, Ger. ico.

Atriplex purpurea grandis, Cam.

*Atriplex ſylveſtris.*

I. Atriplex ſyl. folio ſinuato candicante.

Atriplex ſyl. 2. Matth. Lugd.

Atriplex ſyl. Ang. Cord. in Dioſc. Gef. col. Cæſ.

Tab. ſub Atrip. marina, Ger. ico.

Atriplex ſyl. ſinuata, Ad. vulgatio ſinuata, Lob.

Atriplex ſimeteria major, Thal.

II. Atriplex ſyl. altera.

Atriplex agreſtis, Trag. ſyl. prima, Matth.  
 Lugd.

Atriplex ſyl. Fuch. Dod. Lon.

Atriplex ſimeteria minor, Thal.

Cynocrambe 1. Cæſ.

III. Atriplex ſyl. latifolia.

Blitum 4. & Solanum 4. Trag.

Atriplex ſyl. 3. Matth. Lugd.

Atriplex ſyl. ſive Pes anſerinus latifolia, laceris  
 lacinijs, Ad. Lob.

Pes anſerinus, Fuch. Dod. Lon. Lugd. Cam.

Cynocrambe alterum genus, Cæſ.

Chenopodium 1. Tab.

IV. Atriplex ſyl. latifolia acutiore folio.

Blitum 5. & Atriplicis ſyl. genus, Trag.

Bliti ſpecies, Lon.

Chenopodium 2. Tab. ſub Atriplice ſativa pur-  
 purea, Ger. ico.

V. Atriplex ſyl. fructu compreſſo roſeo: hæc  
 1. eſt in Prod.

VI. Atriplex ſyl. mori fructu.

Atriplex ſyl. baccifera, Cluſ. hiſt.

VII. Atriplex ſyl. lappulas habens.

Hæc in Phytopinace ſub 8. & in Prod. ſub 2.  
 deſcripta, in Matthiolo quoq; noſtro depiſta.  
 In monte Ventoso Gallix Narbonenſis, major  
 exiſtit.

IX. Atriplex ſœtida.

Atriplex canina & Blitum ſœtidum, Trag.

Tragium Germanicum, Dod. gal.

Garofmum, Cord. hiſt. Dod.

Atriplex ſyl. altera, Gef. hor.

Atriplex puſilla, olida, hircina, Ad.

Atriplex olida, Lob. Ger. canina, Lon.

Vulvaria, Caſt. Tab. Lugd.

Cynocrambe affinis, Connina vulgo, Cæſ.

IX. Atriplex anguſto oblongo folio.

Atriplex ſyl. altera, Dod. gal.

Atriplex ſyl. 1. Matth. & 2. Lugd.

Atriplex ſyl. polygoni aut Helxines folio, Ad.  
 Lob. Cam.

Atriplex ſyl. humiliſſima, Dod.

Atriplex ſyl. 3. Cam. in Matth.

Folijs eſt oblongis anguſtis non ſinuatis, ra-  
 rius foliorum principio alis duabus appoſitis.

X. Atriplex Virginiana.

Atriplicis genus, ex cuius ſemine pulicula  
 fit, ex caulis cineribus Sal, quo ad ſaliendos  
 cibos vuntur: in deſc. Virginex, vel Ind. Oc-  
 cid. par. 1.

*Atri-*

*Atriplex maritima.*

- I. *Atriplex maritima laciniata.*  
*Atriplex marina*, Matth. Cast. Dod. Lugd. Cam.  
*Atriplex marina repens*, lutea & xerampelina, Ad.  
*Atriplex marina repens*, Lob.

- Cynocrambe* 3. genus, Cæs.  
 Reperitur rubro & etiam herbaceo semine.  
 II. *Atriplex halimi folio.*  
*Atriplex halimoides*, Lob. ob.  
 III. *Atriplex maritima angustifolia*: hæc  
 3. in Prodronio.

## HALIMVS.

**A**λμος Dioscoridi l. 1. c. 121. id est, marinus, eò quòd in maritimis proveniat: vel rectius, ut Plinius l. 8. c. 22. *Olus maritimum salsum*, & inde nomen, nam & alibi quam in maritimis provenit: quòd verò Plinius sine aspiratione legat, forè factum quia Solinus, *Alimon* in Creta nasci prodidit, mirabili effectu, quòd ea ad morsu interdum nulla fames sentiat, ut inde ei nomen impositum sit, quòd famem arceat. Et apud Theoph. 2. hist. 20. αλμον legitur, ubi Gaza *Auronem* vertit.

Generum duorum Plinius l. c. scribit, sylvestre & mitius: per mitius sativum intelligens, quem Tholosani ut Lugd. historia vult, in hortis habent, & ab effectu herbam Colicam vocant: sic & sylvestris non longe Tholosà, in quibusdam sepius nascitur.

- I. *Halimus latifolius* sive fruticosus.  
*Halimus*, Dioscoridi. *Alimus mitius*, Plin.  
 an *Halimus*, Ang.  
*Halimus*, Ad. Lob. primus, Clus. hisp. & hist.  
*Halimus alter latiore folio*, Cæs.  
*Portulaca marina*, Dod. ico.

II. *Halimus verus Dalech.* Lugd. quid? cuius Clusius in hist. meminit, ejus fidem dubiam scribens.

- III. *Halimus angustifolius procumbens.*  
*Halimus* 2. Clus. hisp. & hist. desc.  
 sub *Portulaca* obiter, Dod.

IV. *Halimus seu Portulaca marina.*

- Halimus vulgaris*, Matth. Eyst.  
*Halimi alia species*, Sandalida Cretenf. Ang.  
*Portulaca marina*, Dod. vt. Tur. Lem. Ad. Lob.  
 Lugd. Tab.  
*Halimus* 3. Clus. hisp. & hist: sed fig. in hist. est sub 2.  
*Halimus* 1. tenuiori folio, Cæs.  
 Videtur *Alimus sylvest.* Plinij: licet Lemnius, *Halimum* esse neget: & Advers. & Lobelius *Critimum Dioscoridis* suspicentur.  
 V. *Halimus minor*: qui in Prod. describitur, & nomine *Halimi aurei* arvi D. Feurerus Northusà misit.

AMARANTHVS ET EIVS  
Species.

**A**μαρανθος dicitur, quasi immarcescibilis, eò quòd hujus flos decerptus non marcescat, & cum cunctis flores defecere, aqua madefactus reviviscat, & hybernas coronas faciat. ut habet Plin. l. 21. c. 8. At Theoph. 6. hist. 6. φλόξ dicitur, Gaza *Flammam* vertit.

- I. *Amaranthus maximus.*  
*Blitum*, Matth. in ico. majus, Eid. fol.  
*Blitum, rubrum majus*, Cast. Lugd.  
*Amaranthus purpurascens* 3. Dod. gal.  
*Amaranthi species arborescens*, Gesl. hor.  
*Amaranthus major floribus paniculosis spica-*

- tis purpureis*, Ad. Lob.  
*Amaranthus major fl. obsolexi coloris*, Dod.  
*Bliti peregrini genus* 1. Cæs.  
*Blitum Indicum*, Tab.  
*Amaranthus magnus*, Cam.  
*Amaranthus paniculà sparsà*, Ger.

Qui

Quinoa sive Blitum majus Peruanum,  
Clus. hist.

Amaranthus major paniculis rubris, Eyst.

Petrus Cieca, granis dicit rubris, quo se Quinto  
incolæ sustentent, noster alba fert.

Variat: altera hujus species paulo humilior, di-  
lutiore paniculæ colore & foliis angustioribus.

II. Amaranthus paniculâ incurvâ.

Amaranthus purpureus 2. Dod. gal.

Amaranthus holosericeus sanguineis reticulatis  
floribus, Ad. Lob.

Amaranthus holosericeus, Lugd. cristatus, Cam.  
Eyst.

III. Amaranthus paniculâ conglomeratâ.

Amaranthus, Cæf. primus, Cast.

Flamma, Ang.

Amaranthus Plinii major, Gef. hor.

Amaranthus purpureus saturo coccineus, Ad.  
Lob.

Amaranthus saturo cocci colore, Dod.

Amaranthus purp. Lugd. Ger. purp. major, Tab.

IV. Amaranthus simpliciter panicula.

Circæa, Trag.

Amaranthus, Matth. parvus, Cam.

Amaranthus purpureus, Fuch. Tur. Dod. gal.  
Cord. in Diof. & hist.

Amaranthus Plinii minor, Gef. hort.

Amaranthus communis minor, Eid. col.

Amaranthus angustifolius simpliciter spicatâ pani-  
culâ, Lob.

Amaranthus angustifolius, Lugd.

Amaranthus vulg. Tab. sub Amarantho cocci-  
neo, Ger.

Amaranthus spicatus, Eyst.

V. Amaranthus folio variegato.

Celosia, Trag.

Blitum maculatum peregrinum, Theombrotum

Plinii quibusdam, Corchoro cognatû, Gef. hor.

Blitum maculosum & herba Papagalli, Dod.

Amaranthus tricolor, Ad. Lob. Tab. Ger. Eyst.

Amaranthus altera, Cast.

Amaranthus pictus, Cam.

Symphonia Plinii & Gomphrena, Lugd.

Bliti peregrini alterum genus, Cæf.

Varietas colorû, in altero hilarior extremo fla-  
vo, medio puniceo, reliquo viridi; aliquando vi-  
ridi, luteo, rubro: in altero obscurior, illum fœ-  
minam, hunc marem faciunt.

## PARIETARIA.

**E**λίζον Dioscoridi l. 4. c. 86. à semine aspero vestibus tenaciter adherente: & δίκυον Galeno 6. simpl. quod  
Perdices hac delectentur. Plinio l. 22. c. 17. Helxine & Perdicium. Parietaria, quod in parietinis exeat: unde  
Muralis herba, Celsi l. 2. c. 33.

I. Parietaria Officinarum & Dioscoridi.

Helxine, Brunf. (cui & Parthenii 7. species)

Matth. Dod. gal. Fuch. Lac. Gef. hor. Lon. Cast.

Lugd. Cam. cui & Urceolaris Scribonii.

Helxine, Ad. (Vitriola, sive Perdicium) Lob. Cæf.

Helxine altera, Cord. in Diof.

Parietaria, Brunf. Tur. Cord. hist. Dod. Tab. Ger.

Parietaria vulgaris & major, Trag.

II. Parietaria minor ocimi folio.

Parietaria exigua vel 1. Trag.

## MERCURIALIS.

**Λ**ιζώρις, μερδίκιον. ἰπὺν ῥολαίον Dioscoridi l. 4. c. 191. Linzoostus sive Parthenium, Mercurii inventum  
(Plin. l. 25. c. 5.) ideo Græci, hermu pos, apud nos Mercurialis: Theophr. 9. hist. 19. φούλιον censetur.  
Genera: Dioscoridi, semina est & mas, & Linzoostus syl. mas, quam κυνίας ἢ κυνοχέρμη Glus vocat. Theophras-  
to seminisca & marisca: Plinio masculus & femina.

I. Mercurialis testiculata, sive mas, Diof. &

Plinii.

Mercurialis, Brunf. (cui Parthenii 6. species)

Trag.

Mercurialis mas, Ang. Matth. Fuch. Dod. Lac.

Gef. hor. Lon. Ad. Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Cam.

Mercurialis mascula, Tur. Cord.

Mercurialis fructum ferens, Cæf.

Phyllon arrhenogonon Theophr. Cord. in Diof.

II. Mercurialis spicata, sive femina, Diof. cor.

& Plinii.

Mercurialis vulgaris & 1. Trag.

Mercurialis femina, Ang. Matth. Fuch. Dod.

Tur. Gef. hor. Lac. Cord. in Diof. Ad. Lob. Cast.

Lugd. Tab. Ger.

Mercurialis florens, Cæf.

Phyllon Theligionon Theophr. Cord. in Diof.

Q

Hæc

Hæc unciam vix superans, Monspeffuli locis sterilibus reperitur.

III. Mercurialis montana testiculata.

Mercurialis syl. Trag. Lon. quæ Cynocrambe, Gei. hor.

Mercurialis mascula syl. Cord. hist. Thal. Cynocrambe, Matth. Fuch. Dod. Lac. Ad. Lob. qui una figura utramque expreſſit, Caſt. Lugd. Cam.

Mercurialis mas, Fuch. Cam. ep. Matth.

Mercurialis altera vel montana, Cæſ.

Mercurialis canina mas, Colum.

IV. Mercurialis montana ſpicata.

Cynocrambe ſive Mercurialis ſcem. ſyl. Cam.

Cynocrambe ſœmina, Eid. ep. Matth.

Mercurialis canina ſœmina, Colum.

Mercurialis ſyl. ſœmina, Cord. hiſt. Thal. at Cordo in Dioſc. ſœmina non invenitur.

Hæc aliquando magis folioſa eſt.

V. Cynocrambe Dioſcoridis.

In Matthiolo noſtro & Prodromo deſcripta figurâ additâ.

Alſine, Cæſ.

Alſines facie planta nova, Colum.

Cynocrambe legitima, Belli apud Ponam.

## PHYLLON.

**Φ** *ἴκλον ἀμφυγόρον & ἀνυγόρον* Theoph. 9. hiſt. 19. habet quem ſecutus Dioſc. l. 3. c. 140. hic ἴκλον & ἀνυγόρον quæſi nominavit, ad differentiam Mercurialis, quæ etiam Phyllon dicitur: videntur autem ambo ſubjectam plantam intellexiſſe: in hoc ſolùm diſſentiunt, quòd Theophrasti ἀνυγόρον Dioſcorides ἀνυγόρον vocat, & contra.

I. Phyllon teſticutatum.

Phyllum, Matth. qui marem, at Cam. in Matth. utrumque proponit.

Phyllon mas leu Arrhenogonum, mariparū, Ad.

Phyllum Arrhenogonon, Lob. ico. Lugd.

Phyllon marifecum, Cluſ. hiſp. & hiſt. mas Lob.

ob. Dod. ſic minam exprimit, Caſt. Tab. ſub. Cynocrambe, Ger.

II. Phyllon ſpicatum.

Phyllon theligonon, Dod. in ico. Ad. (ſive ſeminiparum) Lob. ico. Dod. Lugd. Ger.

Phyllum, Gei. hor.

Phyllon ſeminiferum, Cluſ. hiſp. & hiſt. Tab.

Phyllon ſœmina, Caſt.

Etſi oleæ folio ſit, aliquando tamen, licet rarius, ſerratis foliis circa Monſpelium obſervatur.

## SECTIO SEXTA.

LACTUCA, SONCHUS, LAMPSANA, ENDIVIA,

CICHORIUM, DENS LEONIS, HIERACIUM,

Chondrilla, Senecio, Jacobæa.

### LACTUCA ET EJUS SPECIES.

**L**ACTUCA, quòd copia lactis exuperet, & lac ange. it. & de Dioſcoridi l. 2. c. 165.

Genera: Dioſcoridi ſativa eſt & ſylveſtris: Theophrasto 7. hiſt. 3. genera plura ſunt, candida, cuius tria genera laticaulis, rotundicaulis & Laconium: de ſylveſtri 7. hiſt. 6. agitur ſic Pinus l. 19. c. 8. Lactuca tria genera Graeci ſecere, unum laticaulis, alterum rotundicaulis, tertium ſeſſile, quòd Laconium vocant. Alii colore & ſatus temporis genera diſcrevere: nigras, quæ Januario ſeruntur: albas, quæ Martio: rubentes, quæ Aprilis: diligentiores plura genera faciunt, purpureas, criſpas, Cappado. icas, Græcis &c.

Dividimus in ſativam & ſylveſtrem. Sativam, in criſpam, rotundam, capitatam, Cypriam: Folio enim alia eſt latiore, alia longiore, criſpa, plano, ſinuato: colore, alia obſcurius, vel etiam pallide viſcente, rubro vel etiam maculis purpureis aſperſis: ſic capitata, alia alba, alia rubra, ac ſi vinum aſperſum eſſet, alia nigra: ſi q. diobus poſterioribus ſemina nigra, aliis verò candida ſunt.

Lactuca hortendiſis.

I. Lactuca ſativa.

Lactuca, Trag. Gei. hor. Cæſ. Tab.

Lactuca floreicens, Matth. Lac.

Lactuca ſativa, Ang. Dod. Cord. in Dioſc. Lugd. Tab.

Lactuca ſativa folio ſcarioſa, Ad. Lob.

Lactuca capitata, quòd ico. Fuch. Tur.

Lactuca rotunda, Lon. ico.

II. Lactuca ſylveſtis Endivia.

Endivia in hor. Trag. deſc. & Lon.

Lactuca 4. g. nus, Matth.

Lactu-

*Laetuca intybacea*, Tab. Ger.

III. *Laetuca maculosa*.

*Laetuca quinta*, Dod. gal.

*Laetuca Romana*, Matth. Ges. hor.

*Laetuca rubra*, Cæf.

*Laetuca fusci ac rubente purpurei coloris, rubens*  
Plinii, Dod.

IV. *Laetuca folio obscurius virente, femine*  
nigro.

*Laetuca 2. foliis obscurius virentibus, nigra* Plinio, Dod.

*Laetuca Romana dulcior, nigriore & Scariola*  
hortensis folio, Ad.

*Laetuca nigra*, Cæf. *Laetuca Romana*, Cast.

Folia simul ligata in Endivia albescunt.

V. *Laetuca folio oblongo acuto.*

an *Laetuca Gallica*, Cast.

Hanc in Phytopinace, Prodromo, descripsimus.

VI. *Laetuca Italica laciniata: de qua in Prod.*

VII. *Laetuca capitata.*

*Laetuca sativa major, quæ in caput coit*, Trag.

*Laetuca 3. Dod. gal.*

*Laetuca capitata*, Matth. Dod. Cast. Tab. Ger.

*Laetuca sefifilis*, Ges. hor. Lon.

*Laetuca capitata crispis brasiæ foliis*, Lob. ob.

*Laetuca sativa sefifilis, sive capitata, rugosis crispis*  
brasiæ foliis, Ad. Lob. ico.

*Laetuca caputia cognominata*, Cæf.

IX. *Laetuca crispa.*

*Laetuca crispa & 3. Trag.*

*Laetuca*, Tur. crispa Matth. Dod. Lugd. Cæf.

*Laetuca sativa crispa*, Fuch.

*Laetuca crispa non capitata*, Ad. Lob.

*Laetuca crispa 1. & 2. Tab. Ger.*

Foliis latioribus & paulo angustioribus variat:  
hinc duæ apud Tab. & Ger. icones. Habetur alba  
& rubra: hæc verò durior est.

IX. *Laetuca crispa altera.*

*Laetuca Intybacea crispa*, Tab.

*Laetuca Sabaudica crispa*, Ger.

X. *Paravas herba reirigerans: par. 4. Ind. or. 8.*

*Laetuca sylvestris.*

I. *Laetuca sylvestris costâ spinosâ.*

*Laetuca sylvestris*, Diofcor. Theoph. & Plinii, quæ

Thridacine Galeni videtur.

Endivia, Brunnf. syl. Lon. def.

*Laetuca syl. prior*, Trag. Endivia vulg. & 2. Eid.

*Laetuca syl. 1. Ang. Matth. Fuch. Tur. Dod. Lac. Lon.*

Cast. Lugd. Thal. Cæf. Col.

*Laetuca agrestis*, Cord. in Diofcor. & hist.

Seris domestica, altera *Laetucina Diofcoridis*,  
Ad.

Seris domestica, Lob.

*Laetuca syl. vera*, Lugd. defc.

Scariola & Serriola, Eric. Cord.

II. *Laetuca sylvestris odore viroso.*

Endivia major & 1. Trag. Lon. ico.

*Laetuca syl. verior* & Thelion, Lugd. ico.

*Laetuca agrestis*, Cord. hist. ico. Lob. ico.

*Laetuca agrestis*, Scariola hortensis folio, *Laetuca*  
cæ flore, Opii odore, Ad.

*Laetuca syl. Anglica*, odore Opii similis, Cam.

III. *Laetuca mōrana purpureoærulea major.*

*Laetuca syl. purpureo flore*, Ges. hor.

*Laetuca syl. vatica*, in Cord. hist. cap. de Soncho.

*Sonchus arborefcens puniceo flore*, Ges. hor.

*Laetuca syl. ἰερὴ ἑρμῆος*, Thal.

Libanotis Theoph. sterilis, Tab.

*Sonchus 3. Eid. sub Eryfimo syl. Ger. ico.*

*Sonchus mont. purpur. πλεμπάλορ*, Col.

IV. *Laetuca mont. purpureoærulea minor.*

*Sonchus 2. vel lævis purp. flore*, Clus. pan.

*Sonchus levior Pannonicus 4. purp. flore*, Eid. hist.

V. *Laetuca sylvestris Peruana.*

*Laetuca syl. pumila*, Monardi & Lugd. quid?

VI. *Laetuci folia renalis.*

Herba ad renū morbos utilis Monardi, & Lugd.  
quid?

## SONCHUS ejusq. SPECIES.

Σ ο γ γ ε Diofcoridi l. 2. c. 159. & Theoph. 6. hist. 4. καὶ τὸ ζῶλον ὄνομα, quod succum salubrem, qui stomachi ro-  
fiones lenit & nutritibus lac auget, fundat, Latinis Cicerbita, *Laetucella*, *Laeteron*, quod caule dissecto, lac co-  
posum defluat.

Genera duo Diofcor. alter *sylvestrior*, magisq. spinus horrens: alter, qui teneritate quadam mollescit: Theophrastus  
spinosis meminit. Plinio l. 6. c. 22. *Sonchus albus* & *niger*, *Laetuca* similes ambo, nisi spinosi essent.

I. *Sonchus asper non laciniatus.*

*Intybus syl. seu erratica acutis foliis*, Trag.

*Sonchus asper major*, Cord. hist.

*Sonchus tenerior aculeis asperior*, aut horridius-  
cula, Lob. ob.

*Sonchus lævis tenerior*, Ad. Lob. ico.

Sonchus asperior, Lugd. 3. asperior, Dod.

Sonchus alia in ruderibus, Czf.

III. Sonchus asper laciniatus & nō laciniatus.

Cicerbita asperior, Er. Cord.

Sonchus spinosus, Ang.

Sonchus aspera, Matth. Fuch. Tur. Lac. Gef. hor. Lob. ico. Cast. Lugd. asper, Lon. Tab. sub lævi habet Ger.

Sonchus sylvestrior aspera, Dod. gal.

Sonchus asper, Eid. fol.

Sonchus, Cord. in Diosc. Czf. cui & Sonchus alter Dioscoridis.

Sonchus asper minor, Cord. hist.

Sonchus lævis tenerior latifolia, Ad. Lob. ob.

Sonchus lævis latifolius, Lugd.

Andryala major, Dalech. Lugd.

Folia habet laciniosa dentis leonis, ubi solo squalidore oritur: at si lætiore, non laciniata, Displaciat Laetucæ: & senum septenūve cubitorum proceritatem aliquando assequitur.

III. Sonchus asper laciniatus Creticus: qui in Prodromo.

IV. Sonchus asper subrotundo folio: est major & minor: qui 2. in Prod.

V. Sonchus lævis laciniatus latifolius.

Intybus syl. æn Erratica tertia, Trag.

Sonchus lævis, Matth. Gef. hort. Dod. Cast. Lugd.

Sonchus lenis seu lævis, Cord. hist.

Sonchus non aspera, Fuch. tener, Ang.

Sonchus tenerior non aspera, Dod. gal. &

Laetuca leporina Apuleii.

Endivia syl. Lon. ico.

Sonchus lævis vulgaris, foliis laciniatis dentis Leonis. Lob.

Sonchus lævis laciniatis foliis, Lugd.

Sonchus in collibus umbrosis, Gef.

Andryala minor, Dalech. Lugd.

Sonchus lævis alter flore luteo, & tertius flore niveo, Tab.

Sonchus lævis flore albo, & alter fl. niveo, Ger. Flore est luteo, rariùs niveo, vel albo.

VI. Sonchus lævis in plurimas & tenuissimas laciniis divisus: hic 3. in Prod.

VII. Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus.

Scariola syl. Laetucæ species Galeno, Ang.

Laetuca syl. luteo flore, Gef. hor.

Sonchigenus læve, Eid. in ap.

Sonchus lævis alter, Matth. Cast. Lugd.

Sonchus alter folio profundis laciniis sinuato heraceo, Lob.

Sonchus 4. lævis alter, Lugd.

Sonchus lævior vulgaris, Clus. hist.

Laetuca murorum, Czf.

Sonchus sylvaticus 4. Tab.

Major & minor reperitur.

II X. Sonchus lævis minor paucioribus laciniis.

Sonchus lævis latifolius, Tab. Ger.

Est angustioribus foliis in incultis: latioribus in vinetis.

IX. Sonchus lævis angustifolius.

Sonchus lævis Matthioli, apud Lob. ico.

Sonchigenus, terra critica, Gef. hor.

Terracrepulus in Hetruria, Czf.

Crepis Dalechampii, Lugd.

X. Sonchus angustifol. maritim. qui 4. in Prod.

*Sonchus montanus.*

I. Sonchus lævis laciniatus cæruleus, vel Sonchus alpinus cæruleus.

Intybus *ma'vour* Hircynica, Thal.

Sonchus lævis flore cæruleo, Clus. pan. &

Sonchus lævior Austriacus cæruleo flore, Eid. hist.

Sonchus cæruleus & Sonchocichoreum, Cam. in Matth.

Sonchus cæruleo flore, Eid. hort. qui duum generum dicit.

Sonchus lævis 4. flore cæruleo, Tab.

Sonchus flore cæruleo, Ger.

II. Sonchus lævis laciniat. lut. mont. major.

Sonchus Dendroides Dalechampii, Lugd.

III. Sonchus lævis laciniatus luteus minor: qui 5. in Prod.

*Sonchus hirsutus five villosus.*

I. Sonchus villosus luteus major.

Sonchus lanatus Dalechampii, Lugd.

Magnitudine variat, caule aliquando sesquicubitali, cubitali & pedali.

II. Sonchus villosus luteus minor: hic 6. est in Prod.

III. Sonchus latifolius leviter hirsutus.

Cichoreum syl. alterum *amkeis*, five Cichoreum dulce, Colum.

*Soncho affinis Lamplana vulgo, sed male.*

I. Soncho affinis Lamplana domestica.

Chrysolachanum Plinii, Ruel.

*Lampla-*

Lampſana, quibuſdam Napium, Dod. gal.  
 Sonchis cognatum, Gei. hort.  
 Cichorium vel Sonchi genus, Eid. col.  
 Lampſana, Ad. Lob. Dod. Lugd. Thal. Cam. cui &  
 Papillaris in Prutiſia.  
 Sonchus ſyl. 1. Tab. & 3. Eid. ico.

Sonchus ſylvaticus, Ger.

Foliis aliquando proriſus integris, aliquando in lacinias aliquot diſſectis, Thalius notavit.

II. Soncho affinis Lampſana ſylvatica.

Sonchus ſylvaticus 2. Tab.

## INTYBUS SIVE ENDIVIA, CICHOREUM V E

\* ejusq. ſpecies.

**S**oncho ſubjungit Dioſcorides l. 2. c. 260. *Σειν*, cujus verba ſic interpretamur: Seris duum generum, quorum ſylveſtris Picris, & Cichorium vocatur: quæ verò ex hac latioribus eſt foliis ſtomacho commodior eſt hortenſis: Er bujus etiam dua ſpecies ſunt, quarum hac lactuca ſimilior & latifolia: altera verò anguſtior eſt folio & amara. Intubi meminit Theoph. 7. hiſt. 7. inter olera numerando, & univerſa genera Intyborum amara dixit, 2. cauſ. plant. 7. Cichorea quoque mentio 7. hiſt. 9. uti & Intybi erratici 1. hiſt. 15. Plinio l. 20. c. 8. Intubum erraticum Ambugiam appellavere: in Aegypto Cichoriam vocant, quod ſyl. ſit. ſativum autem Seris, quod eſt minus & venoſius. Et ſyl. genus alii Hedypnoida vocant, latioris folii. Seris & ipſa Lactuca ſimilima duorum generum eſt: ſylveſtris melior, nigra ipſa & aſtiva; deterior hyberna & candidior.

I. Intybus ſativa latifol. ſive Endivia vulgaris.

Seris domeſtica latifolia, Dioſcoridi.

Intubum & Seris hyberna, Plinio.

Scariola Arabum interpretibus.

Intubus ſive Endivia, Trag.

Intubus, Tur. major, Matth.

Intubum ſativum latifol. Fuch. Dod. gal. Lob. Lugd.

Intybum ſativum, Cord. in Dioſ. Dod. Ger.

Intybum latifol. Italicum, Gei. hor.

Cichorium ſativum, Eid.

Intybus hortenſis, Lac.

Intybus ſativa major, Caſt.

Seris (ſive Endivia alba) Ang. Gei. hor. Lob. ico.

Seris ſive Intybum ſativum latifolium, Ad.

Endivia, Gei. hor. hortenſis, Cam.

Intybus major ſativa, ſive Cichorium domeſtic. Tab.

Seris ſive Intybus criſpa, Ad.

Intybum criſpum, Lugd.

Endivia criſpa, Ger. Romana criſpa, Cam.

### CICHORIUM.

I. Cichorium ſativum.

Seris ſativa, Ang. Lob.

Cichorium domeſticum, Matth. Caſt.

Cichorium hedypnois, Lac.

Cichorium ſativum cæruleum, Ad. Lob. ico.

Cichorium latioris folii, Dod.

Cichorium ſativum latifolium, Lon.

Intubum ſyl. latifolium, Lugd.

Cichorium ſativum & album ſativum, tres fig. apud Tab. & Ger. ſub ſativo, ſativo latifolio & ſyl.

II. Cichorium ſyl. ſive Officinarum.

Seris *mixta* Dioſcoridi: cichorea Theoph.

Intubum erraticum, Plinio.

Solſequium, Brunf.

Cichorea, Trag. ſylveſtris, Matth.

Seris ſyl. Ang. Lob. Seris picris, Lob. ico.

Senis ſyl. picris, Cichorium, Ad.

Cichorium ſyl. Gei. col. Dod. Caſt. agreſte, Lon.

Intybum agreſte, Er. Cord. Gei. hort. ſylveſtre,

Fuch. Dod. gal. (cui & Ambubeia) Cord. hiſt. Thal.

Intubum ſyl. anguſti fol. Matthioli, Lugd.

Hypochaeris Dalechampii, Lugd.

Cichorium, Lac. Cord. hiſt. Caſt. Tab.

Hieracium latifolium, Ger. ico.

Duplex eſt, alterum folio proriſus integro, un-

ciens in duarum quandoq. latitudine: alterum, in

lacinias diviſio, Thal. At hujus floris color com-

Q 3

muniter caruleus, est & candido & roseo: aliquando caulis latitudinem digitorum quatuor acquirit.

III. Cichorium spinosum, quod in Matthiolo, Tabernæ montano emaculato, & in Prodro-mo, addita figura descriptum.

Cichorium spinosum Creticum Belli, Ponæ.

Cichorium spinosum, vulgò *απορράζι*, h. e. Hydrie spina, Belli in ep. 4. ad Clus.

Chondrilla genus elegans caruleo flore, Clus. histor.

*Cichorium syl. luteum.*

I. Cichorium pratense luteum hirsutia asperum, vel Hieracium hirsutum foliis caulem ambientibus.

Chioerea 3. five lutea, Trag.

Hieracium prat. asperum, Ges. col.

Cichorium luteum, Tab. Ger.

Intybus syl. seu Cichorium syl. flore luteo, Thal.

Lactariola altera, Cæs.

Variat: nam aliud foliis est integris, aliud divis: illud, quadruplex est: 1. caule & foliis spinulis horret: 2. folia inferne aspera, superne glabra in ambitu exasperata: 3. foliis angustioribus asperis: 4. caule brachiato foliis palmatis, in ambitu profunde, ut Dentis leonis, divis: ut Thal. monet. Flore albo notavit Tab. & Cichorium luteum 2. facit.

II. Cichorium part. hirsutum vesicarium. Cichorium syl. vesicarium pratense, Colum.

III. Cichorium mont. angustif. hirsutia asperum. Hieracium intybaceum asperum, vel 9. Tab.

Hieracium asperum, Ger.

IV. Cichorium prat. luteum lævius.

Hedypnois, Dod. gal. Ad. Lob. cui & Aphaca, Theoph.

Cichorium luteum, Ad.

Dentis leonis 3. species, Dod. Tab.

Aphace Dalech ampii, Lugd.

Endivia syl. Cæs.

Dentis leonis cichorizata, Ger.

*Dentis leonis.*

I. Dentis leonis latiore folio.

Aphaca ex olerum genere, Theoph. 7. histor. 7. & 10.

Aphace, Plin. l. 21. c. 15. & 17. & Hedypnois, Plin. l. 28. c. 8.

Dentis leonis, Brunf. Matth. Dod. Lob. (& corona & caput Monachi) Tab. Ger.

Hieracium majus, Trag. parvum, Cord. in Diosc.

Hieracium minus, Ges. hort.

Hedypnois major, Fuch.

Chondrilla Galeni, Ang.

Chondrilla altera & rostru porcinu, Dod. gal. Thal.

Dentis leonis vulgi, five Urinaria, Ad.

Taraxacon minus, Lon.

Aphace, Cæs.

Hedypnois Dalech ampii, Lugd.

Habetur & major & media quæ vulgarior est: folio acutiore, aliquando obtusio.

II. Dentis leonis angustiore folio.

Aphaca angustioris folii, Cæs.

III. Dentis leonis aliphodeli bulbulis.

Cichorium Constantinopolitanum Matth. Cast. Lugd.

Dentis leonis Monspelienis, Ad. Lob. ob.

Chondrilla altera Dioscoridis, Lob.

Dentis leonis altera, Tab.

IV. Dentis leonis latifol. caulescens, qui 1. est in Prod.

V. Dentis leonis tenuissimo folio: qui 2. in Prod.

Hieracium foetidum 3. Colum.

VI. Dentis leonis minor foliis radiatis: 3. in Prod.

an Trinciarella, Camer.

VII. Dentis leonis min. aspero folio: hic 4. in Prod.

VIII. Dentis leonis minimus.

Cichorium syl. pumilum five Hedypnois, Clus. cur. post.

*HIERACIUM ejusq. SPECIES.*

**I** Epάχιον Dioscoridi l. 3. c. 72. Latinis Accipitrina, ab accipitre, qui is est, nomen habet. (Hieracia ab aliis Plinio) quoniam accipitres scalpendo eam succoq. oculos tingendo, obscuritatem cum sensere discutiant, Plin. l. 26. c. 7. ubi inter Lactucam sylvaticam refert, & cum ea confundit: dicitur & Ζεγγινης.

Genera: magni & parvi Dioscor. meminit: recentioribus plures sunt differentia.

Hieracium dentis leonis folio acuto.

I. Hieracium majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites.

an Intybus 2. Trag.

Hieracium majus, Matth. Fuch. Dod. gal. Lac. Tur. (sub Hippogloisi figura) Ad. Lob. Cast. Thal.

Taraxa-



*Taraxacon majus*, Lon.

*Hieracium minus Dalechampii*, Lugd.

*Hieracium magnum*, Cæf.

Aliquando folio asperiore inter segetes reperitur: communiter erectum: nonnunquam reclinatum.

II. *Hieracium majus foliis Sonchi semine curvo*.

*Hieracium majus Creticum sativum*, Gesl. hor.

*Hieracii Cretici pro Endivia lutea misu*, Cam.

III. *Hieracium majus erectum latifolium*.  
*Sonchus* 3. Clus. pan. vel 3. lævis altissimus, Eid. hist. quoad iconem.

IV. *Hieracium majus erectum angustifolium*.

*Hieracium majus Dioici*, Tab. Ger.

Huic ut & priori, aliquando prima folia obtusa sunt.

V. *Hieracium arborescens palustre*.

*Sonchus* 3. Clus. pan. vel 3. lævis altiss. vel *Austriacus* 5. Eid. hist. quoad descript.

*Sonchus arborescens*, Tab. Ger.

VI. *Hieracium dentis leonis folio, flore suaverubente*.

*Hieracium Apulum, suaverubente flore*, Colum.

VII. *Hieracium dentis leonis folio monolonon*.

*Hieracium intybaceum* vel 6. Tab.

Variat: culmo unico nudo ex radice: aliquando pluribus, his tamen singulis ex radice exurgentibus: rarius in eculmo bipedali ramo, subaspero, cujusmodi in Italia reperitur.

IX. *Hieracium minus glabrum, foliis elegantervirentibus*: hoc 2. est in Prod.

X. *Hieracium asperum flore magno dentis leonis*.

*Hieracium foliis & floribus dentis leonis bulbosum*, Lob. ico.

*Viperea* vel *Scorzonera Italica*, Cast. ico.

X. *Hieracium dentis leonis folio hirsutie asperum minus laciniatum*.

*Hieracium alterum saxat. montan.* Colum.

XI. *Hieracium dentis leonis folio hirsutie asperum magis laciniatum*: quod in Prod. n. est.

XII. *Hieracium hirsutum terè umbellatum*.

*Hieracium nonem*, Clus. hist.

- *Hieracium dentis leonis folio obtuso*

I. *Hieracii dentis leonis folio obtuso majus*.

*Hieracium minus primum*, Dod. gal.

*Hieracium longius radiculatum*, Ad. Lob. Ger.

*Hieracium macrorrhizon*, Tab.

*Apargia Dalechampii*, Lugd.

II. *Hieracium dentis leonis folio obtuso minus, flore magno*: hoc 3. in Prod.

III. *Hieracium dentis leonis folio floribus parvis*: quod 4. in Prod.

IV. *Hieracium dentis leonis folio bulbosum*: hoc 5. est in Prod.

V. *Hieracium min. dentis leonis folio subaspero*.

*Hypochaeris porcellia*, Tab. Ger.

an *Hieracium minimum*, Colum.

VI. *Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro*.

*Hyoeris altera vel angustifolia*, Tab.

VII. *Hieracium minus flore ex albo carneo*.

*Hieracium parvum Creticum*, Clus. hist. ap. 1.

IX. *Hieracium minus folio subrotundo*.

*Hieracium minimum vel 8. Clus. pan. in histor. 9. ico. et descriptione. II.*

*Hyoeris latifolia vel macula*, Tab.

*Hyoeris macula*, Ger.

Variat ratione loci: nam in siccioribus natum minus est, quemadmodum Clusius pingit: at locis lætioribus, pluribus est caulibus palmariis.

an *Hieracium minus Hyoeridis latifoliae facie*. Eyft. Sed hoc semen pappiolum fert.

IX. *Hieracium Baticum*, Clus. in cur. post.

*Hieracium Chondrilla folio*.

I. *Hieracium maximum Chondrilla folio asperum*: quod 6. est in Prod.

II. *Hieracium Chondrilla folio hirsutum*.

*Hieracium foliis & facie Chondrilla*, Lob. ico. Cam.

*Hieracium n.* Tab.

Variat: in Germania hirsutius & majus. Monspessuli minus & lævius: at utrobique foliis lacinia- tis: in Italia & minus & lævius, & foliis solum dentatis, provenit.

III. *Hieracium Chondrilla folio glabrum*.

*Hieracium 5. five aphacoides*, Tab. Ger.

IV. *Hieracium Chondrilla folio glabro radice succisâ, majus*.

*Hieracium minus*, Trag. Ang. Matth. Fuch. Lac. Ger. Cast. Tab. minus alterum, Dod. gal.

*Succisa tertia*, Trag.

*Hieracium minus præmorsâ radice*, Ad. Lob.

*Hieracium 4. Dod.*

Sonchus,

*Sonchus*, Lom.

*Picris Dalechampii*, Lugd.

*Hieracium leporinum*, Ger.

Variat foliorū incisiuris profundioribus, & hoc *Hieracium nigrum*, Tabern. & Ger. (quod *Hieracium* foliis Coronopi dici posset) nominant: vel minus profundis.

V. *Hieracium Chondrillæ* folio glabro radice succisâ, minus.

*Lagopus* 3. vel *Lactuca leporina*, Trag.

*Lactuca leporina* Apuleii, Ang.

*Hieracium quintum*, Dod.

*Apargia Dalechampii*, Lugd.

At si quis 4. & 5. solum magnitudine, foliorum latitudine, & angustia differre velit, facile assentiar.

*Hieracium Intybaceo folio.*

I. *Hieracium Intyb.* flore luteo: hoc 8. in Prod.

II. *Hieracium intybaceum* flore magno albedo: hoc 9. est in Prod.

III. *Hieracium intybaceum* fl. ex purpura rubentibus.

*Hieracium intybaceum* 10. Clus. hist.

*Hieracium Cichoraceo folio semine adunco.*

I. *Hieraciū capitulū inclinans semine adunco.*

*Hieracium* facie *hedypnois*, Lob. ico.

*Rhagadiolus*, Cæf.

Magnitudine & parvitate, foliis magis minusve sinuosis, ad agros Monspelienſes variat: & in hortum translatus asperitatem penè amittit.

II. *Hieracium* siliquâ falcatâ.

*Hieracium Narbonensē falcatâ siliquâ*, Lob. Lugd.

*Rhagadiolus* alter, Cæf.

*Hieracium Monspeliacum* & *Narbonensē*, Tab.

*Hieracium falcatum*, Ger.

Quod Monspelii crescit, foliis est latioribus: quod Patavii, angustioribus, à quibus *Sonchus stellatus*, *Chondrilla stellata*, & *Cichorium stellatum* nominatur.

III. *Hieracium proliferum falcatū* quod 10. in Prod.

an *Hieraciū* minim. alterum fortè, Clus. hist.

*Hieracium calyce barbato*, Colum.

IV. *Hieraciū* minim. falcatū: quod 11. in Prod.

*Hieracium montanum hirsutum.*

I. *Hieracium echiioides* capitulis *Cardui benedicti*.

*Hieracium montanum folio Lycopsis*, Ad.

*Buglossum ethioides luteum* Hieracio cognatū, Lob. ico.

*Buglossum luteum*, Cam. Ger.

*Hieracium echiioides*, Tab.

II. *Hieracium mont. rapifolium*: quod 12. in Prod.

III. *Hieracium alpin. asperum conyzæ facie.*

*Hieracium Britann.* vel 4. Clus. pan. & hist.

IV. *Hieracium mont. dentis leonis folio* incano, vel laciniatum lanuginoso folio.

*Hieracium mont. laciniato folio*, vel 7. Clus. pan.

*Hieracium* 8. folio *hedypnoidis*, Eid. hist.

*Hieraciū* mont. angustif. foliis *Cichoraceis*, Tab.

*Hieracium* 7. Clusii, Ger.

V. *Hieracium mont. foliis dentatis flore* magno: quod 13. in Prod.

VI. *Hieracium alpinum latifolium hirsutū* incanum flore magno.

*Hieracium* 1. latifol. Clus. pan. & hist. Ger.

*Hieracium phlomidis*, Tab.

*Hieracium latifol. Pannonicum*, Cam.

Folio est interdum sinuoso, interdum laciniato: maculis aliquando lividis insignitis, plerumque carentibus.

VII. *Hieracium alpinum latifolium villosū* magno flore.

*Hieracium alpinum hirsutū* folio, vel 5. Clus. pan.

*Hieracium* 5. villosū, Eid. hist.

*Hieracium latifol. montanum*, Tab.

*Hieracium* 5. Pan. Cam. 5. Clusii, Ger.

IX. *Hier. ramosū* magno flore: quod 14. in Prod.

IX. *Hieracium montanum hirsutum ramosū* parvis floribus.

X. *Hieracium mont. hirsutum minus.*

an *Intybi* 5. species, Thal?

*Hieracium mont. alterum*, Col.

Hoc etiam in muris Patavinis palmi altitudinem non excedens, observavimus.

XI. *Hieracium alpinum non laciniatum flore* fusco: quod 18. in Prod.

*Hieracium Germanicum* 1. Colam.

XII. *Hieracium hortenie* floribus atropurpureiscentibus: quod 19. in Prod.

*Hieraciū latifoliū peregrinū phlomyodes*, Eysf. Pilosella major quibuidam.

XIII. *Hieracium pumilum saxatile asperum* radice præmoria: quod 15. in Prod.

an Hier-

an Hieracium pumil. 4. Colum. quia glabrum dicit.

XIV. Hieracium mont. lanuginosum laciniatum parvo flore: quod 16. in Prod.

XV. Hieracium alpin. pumilum folio lanuginoso.

Hieracium pumilum 2. Colum.

XVI. Hieracium mont. angustifol. nonnihil incanum.

Hier. mont. vel 6. Clus. pan. & hist. Cam.

Hieracium montan. angustifol. 2. Tab.

Hieracium 6. Clusii, Ger.

Variat foliis magis minusve incanis, iisque integris vel minimum lacinatis: est & tertia foliis integris, atrovirentibus, minimeque incanis.

*Hieracium montanum glabrum.*

I. Hieracium mont. latifol. glabrum majus.

Hieracium montan. majus latifolium. Tab. sub Chondrilla Hispanica, Ger. ico.

II. Hieracium montan. latifolium glabrum minus.

Hier. mont. latifol. minus, Tab. Ger.

III. Hier. alpin. pumilum chondrilla folio: quod sub 7. in Prod.

IV. Hieracium Tragopogonis folio.

Scorfonera 4. Clus. pan.

Hieracium 7. vel pumile, Eid. hist.

V. Hieracium capillaceo folio: quod 17. in Prod.

*Hieracium Mutorum, Pulmonaria Gallica dicta.*

L Hieracium murorum folio pilosissimo.

Auricula muris major, Trag.

Pulmonaria Gallica. Scopa regia fortè Plinii, Gel. hort.

Sideritis Plinii latissimo folio, Eid.

Pulmonaria Gallor. flore Hieracii, Ad. Lob. Clus. hist.

Pulmonaria Gallica sive aurea, Tab.

Corchorus Dalechampii, Lugd.

Pilosella major Gallorum, Thal.

an Costa, Cam.

Variant in pictura; Tragus, Lugdun. & Taber. foliis subrotundis & pilosis: at Lobelius, glabris & oblongis pingit: sic folia quandoque parte inferna rubent: alquando albis maculis aspersa, conspiciuntur.

II. Hier. murorum laciniat. min. pilosum.

Pulmonaria Gallica fœmina, Tab.

Hoc folio est modò latiore, modò angustiore, & hæc

Pulmonaria Gallica tenuifolia, Tab. dicitur.

III. Hieracium murorum angustifoliū non sinuatum: quod 20. in Prod.

*Hieracium pratense.*

I. Hieracium profundè sinuatum pubescens: quod 21. in Prod.

II. Hieracium pratense latifolium non sinuatum majus.

Intybus *εὐμαρέων* major, Thal.

III. Hieracium prat. latifol. non sinuatum minus.

Intybus *ἀπὸνίδεων* minor, Thallio.

*Hieracium fruticosum.*

I. Hierac. fruticos. latifolium foliis dentatis glabrum: quod 22. in Prod.

Hieracium majus latifolium, vel 2. Clus. pan. & hist.

Hoc etiam caule graciliore & foliis angustioribus, in reliquis conveniens, reperitur.

II. Hieracium fruticosum latifol. hirsutum. Erinus, Matth.

Basilicum aquaticum, Cast.

Hieracium frutescens latifolium polyanthos, Eyft.

Variat: 1. foliis uncias quinq; longis, sesquiuunciam latis, subrotundis, dentatis & asperis, quem admodum Patavii provenit, & à Guilandino, Militaribus Galeni & Lactariis Plinii, dicebatur. 2. foliis est multò longioribus, angustioribus, parum dentatis, molli lanugine pubescentibus, quod apud nos reperitur, licet rarius.

III. Hieracium fruticosum subrotundo folio: quod 23. in Prod.

Hieracii foliati nomine D. Jungerm. misit.

IV. Hierac. fruticosum angustifol. majus.

Hieracium Sabaudum, Ad. Lob. Lugd.

Hieracium alterum grandius, Lob. ico. Cam.

Hieracium primum, Dod.

Hieracium majus angustifol. vel 3. Clus. pan.

Hieracii 3. genus alterum angustifol. Eid. hist.

Hieracium mont. angustifolium 1. Tab.

Hieracium intybaceum, Ger. ico.

Caule est aliquando magis, aliquando minus aspero, foliis magis minusve crenatis, longioribus & angustioribus, brevioribus, & latioribus.

V. Hieracium fruticosum minim: quod 24. in Prod.

R

CHON.

## CHONDRILLA &amp; ejus SPECIES.

**X** ΟΝΔΡΙΑΑΗ 2. κινδύειον Diofcor. l. 2. c. 161. dicitur: & propter formam, quibusdam Seridū agrestū species. Anfertē apud Theoph. 7. hist. 9. & 11. Απὸ τῆς. FRAM. GAZ. A.

Genera duo Diofcoridi: Plinius l. 6. c. 22. unus meminit.

*Chondrilla lutea.*

I. Chondrilla juncea viscosa arvensis: quæ prima Diofcoridis.

Cichorea procera vel 5. Trag.

Chondrilla, Tur. altera, Cord. in Diof.

Chondrilla viminea viscosa vinearum, Ad. Lob. ico. Lugd.

Cichorium syl. luteum, Dod.

Chondrilla species in collibus & vineis, Cæf.

Chondrilla viminalibus virgīs, Clus. hist.

Chondrilla juncea, Tab. Ger.

Chondrilla prima Diofcoridis, Colum.

II. Chondrilla viminea viscosa Montepelaea: quæ 1. in Prod.

III. Chondrilla viscosa caule foliis obducto.

Chondrilla saxatilis viscosa caule κινδύειον Col.

IV. Chondrilla viscosa humilis: quæ 2. in

V. Chondrilla viscosa affinis. (Prod.

Ixopus, Cord. hist.

Seris longifolia Mutoni, an Chondrilla altera Diofcor. Lob. ob. quid est?

VI. Chondrilla bulbosa, sive Chondrilla 2. an κινδύειον v. Theoph. l. hist. 11. (Diof.

Chondrilla pusilla marina lutea bulbosa, Ad. Eob. ico.

Cichorium bulbosum Dalechampii, Lugd.

Cichorium strumoiium Myconi, Lugd.

Herba terræ crepola similis, Cæf.

an Chondrilla 2. species, cui florem purpureum tribuit, Ang.

an Hemorrhoidalis, Cast.

Chondrilla altera Diof. Clus. hist. Colum.

Chondrilla marina, Tab. Ger.

VII. Chondrilla bulbosa conyzæ facie major foliis latioribus.

Chondrilla alterius aliud gen<sup>o</sup>, Rauw. Clus. hist.

Chondrilla aliud genus, Diof. Lugd.

III. Chondrilla bulbosa, Conyzæ facie foliis angustioribus.

Chondrilla Diof. altera, Rauw. Lugd. Clus.

Conyza marina, Lugd. (hist.

IX. Chondrilla verrucaria fol. in tubaceis vi-

Cichorium verrucariū, Matth. Clus. hist. (ridibus.

Zacantha, Eid. ico. Get. hort. Cast. Lugd.

Verrucaria, Seridis species, Gef. hort.

Chondrilla species in rudoribus, Cæf.

X. Chondrilla foliis Cichorei tomentosis.

Chondrilla prior, Diof. legitima, Clus. hisp. &

Chondrilla verrucaria, Ad. Eob. Lugd. (hist.

Chondrilla prior, Lugd.

Hieracium magnum Dalechampii, Lugd.

Chondrilla græca, Tab.

XI. Chondrilla tota hirsuta, Cam. quid?

XII. Chondrilla prior Matthioli, Cast. &

Chondrilla altera, Lac. (Lugd.

Figmentum ex Cichorio, aliqui existimant.

*Chondrilla cærulea & purpurea.*

I. Chondrilla cærulea latifolia laciniata.

Chondrilla altera, Matth. Cast. prima, Lac.

Chondrilla latifolia cærulea, Tab. Ger.

Chondrilla purpurascens flore, Lugd. ico.

II. Chondrilla cærulea altera, Cichorii syl. fo-

Chondrilla cærulea Belgarum, Ad. Lob. (liis.

Chondrilla, Dod. gal. altera, Eidem.

Chondrilla prima Cichorio similis, Cord. in

Chondrilla tenera, Eid. hist. (Diof.

Apate Dalech.: & Terra crepola Italorum, Lugd.

Chondrilla cærulea & alba, Tab.

Chond. cærul. & lutea, Ger.

Chond. cæruleo flore, Caccialepore Italis, Cam-

an Chondrilla, Cæf. & prima, Ang.

Flore est cæruleo, rarius albo.

III. Chondrilla foliis laciniatis serratis purpurascens flore:

sub Superba recetiorū anonymos habetur, in Ad.

Chondrilla rara purpurante flore semine nitido deciduo, Lob. ico.

Chondrilla rara purpurea Lobeli, Lugd.

Chondrilla Hispanica Narbonensis, Tab.

Senetio Carduus Apulus, Colum.

In horris latioribus est foliis. ut Tabern. pingis

Columnæ optima est, prout sponte provenit.

IV. Chond. purpureo flore, radice crassa, Cam-

V. Chondrilla purpurascens fetida. (quid?

Chondrilla rubra fetida, Eysl.

In Phytopinace & in Prod. pro 3. descripta.

VI. Chondrilla cærulea cyani capitulo.

Sesamoides parvū, Matth. Cast. Cæ. Tab. Ger. Col.

(cui Cyz-

(cui *Cyzaus* forsâ Plinii) minus Matthioli, Lugd.  
*Coronopus* quidam flore cæruleo, Gef.col.  
*Sesamoides* parva Diofc. Ad.Lob.  
*Chondrilla* species tertia, Dod.

*Catanance* quorundam, Lugd.

VII. *Chond. cærulea* cyani capitulis altera.  
*Sesamoides* parvū fl. magis cōpleto, Cam. ad Mart.  
*Chond. Sesam.* dicta cærulea flore cōpleto, Eyst.

## SENETIO ejusq; SPECIES.

**SENETIO** *herbæ Diofcoridis L. c. 97. quasi Vernus senex, quod flores vere capillorum ritu canescant, & in lanuginem abeant. Theophrastus 7. hist. 7. inter olera & inter bacca numerat: quod per totum annum penè asidua germinet florū productione, 7. hist. 10. semper enim alterum alteri succedens, tempora omnia occupat, idque propter alimenti quandam mediocritatem, ut loquitur 1. cons. plant. 27. Plinio l. 25. c. 13. Erigeron, quod à nostris vocatur Senecio. At nullas differentias proponunt.*

I. *Senecio minor vulgaris.*  
*Erigerum*, Diofcoridis ac Plinii.  
*Verbena* fœmina, Brunf.  
*Senecio vulgaris* & 1. Trag.  
*Senecio*, Matth. Fuch. Tur. Cord. in Diofc. Ang.  
*Gef. hort. Lac. Lon. Ad. Lob. Lugd. Cæf. cui & Carduncellus.*  
*Senecio minor*, Cast.  
*Erigeron secundum*, Dod. gal. minus, Eid.  
*Senecio* 1. Tab. sub *Erygero* tomentoso, Ger. ico.  
 II. *Senecio minor latiore folio sive montana.*  
*Senecio* 2. vel montana, Tab.  
*Erigerum*, Ger.  
 III. *Senecio incanus pinguis.*  
*Erygeron primum*, Dod. gal. majus, Eid.

*Senecio foetidus*, Gef. hort. Lugd.  
*Erygeron tomentosum alterum*, Lob.  
*Erigeron fœtidum seu majus*, Thal.  
*Jacobæa* 1. vel Pannonica mollior, Clus. pan.  
*Jacobæa Pannonica*, Eid. hist.

IV. *Senecio hirsutus.*  
*Senecio* 2. Trag.  
*Erigerum tertium*, Dod.  
*Erygeron tomentosum & Senecio incana*, Lob.  
*Senecionis species Dodonæi*, Lugd.  
*Senecio tomentosa* 3. Tab.  
 V. *Senecio ambrosiæ odore.*  
*Senecio flore odorato*, Cam.  
 VI. *Senecio folio non laciniato.*  
*Senecionis genus Myconi*, Lugd.

## JACOBÆA ejus SPECIES.

I. *Jacobæa vulgaris laciniata.*  
*Flos S. Jacobi*, Brunf. Trag. Lon.  
*Senecio major sive flos S. Jacobi*, Matth. Cast.  
*Herba S. Jacobi*, Fuch. Gef. Cæf. (Lugd.)  
*Jacobæa*, Dod. Ger. vulgaris, Clus. hist.  
*Jacobæa Senecio*, Ad. Lob.  
*Herba Jacobæa*, Tab.  
*Artemisia* *prostrata* & Dodonæi, Thal.  
 Variat foliis: alterius sunt instar *Eruce* laciniata: alterius ad *Raphani* folia accedunt, sed minus hirsuta: tertiæ quercus tenuifoliæ instar divisa sunt.  
*Senecio major*, Cam.  
 II. *Jacobæa subrotundo minus laciniato folio.*  
*Verbasculum minimum*, Lugd.  
 III. *Jacobæa maritima.*  
*Jacobæa marina*, vel *Chrysanthemum*, & *Artemisia marina* neoteriorum, Ad. Lob. ico.  
*Cineraria*, Dod. Lugd. Cæf. (cui *Artemisia* Diofc.)  
*Jacobæa maritima* Penæ, Lugd. (Cam.)  
*Eruca cinerea*, Eid.

*Achavon abiat*, id est, *Artemisia alba*, Alpin.

IV. *Jacobæa incana altera.*  
*Jacobæa marina*, Dod. gal. Lugd.  
*Jacobæa altera*, Dod.  
*Cineraria marina*, Eyst.

Eandem cum præcedenti dicerem, nisi Dodonæus edit. lat. à *Cineraria* distingueret: & in Eyst. horto, à *Cineraria Lobelii* alia dicitur.

V. *Jacobæa marit. sive Cineraria latifolia.*  
 In *Phytopinace* & sub 1. in *Prod. descripta*.  
 VI. *Jacobæa alpina laciniata fl. buphtalmi.*  
*Jacobæa* 3. Clus. pan. & *Jacobæa Pannon.* 3. latifolia 1. Eid. hist.

VII. *Jacobæa alpina foliis rotundis serratis:*  
*Conyza alpina* genus, Gef. hor. & fra.  
*Conyza montana*, Gef. col.  
*Jacobæa latifolia altera*, Clus. pan.  
*Jacobæa* 4. vel latifolia 2. Eid. hist.

IX. *Jacobæa mont. lanuginosa angustif. non*  
*Jacobæa Pannonica* 2. Clus. pan. & hist. (laciniata.  
 IX. *Jacobæa rotundif. incana: quæ* 2. in *Prod.*

# LIBER QVARTVS.

## SECTIO PRIMA.

### TANACETUM; PARTHENIUM; CHRYSANTHE-

MUM; BUPHTHALMUM; CHAMAEME-  
LUM; COITELA

#### TANACETUM ejusq; SPECIES.

**T**ANACETUM, forte à Tanaco, quo nomine Parthenii appellatū fuisse, Plin. testatur: Parthenion microphyllum forte Hippocratis, Hermolao. Asipina καλίσκη & Dioscoridi l. 3. c. 128. quibusdā videtur, nobis non item.

##### Tanacetum odoratum.

##### I. Tanacetum vulgare luteum.

Tanacetum, Matricaria 2. species & Parthenium,

Tanacetum vulgare, Frag. Eyff. (Brunf.

Tanacetum, Matth. Gesl. hor. Lon. Dod. Cæs. Ger.

Tanacetum citrinum: Thal. majus, Dod. gal.

Artemisia tenuifolia sive monoclonos, Fuch.

Arel. rosa quibuldani, Cord. in Dios.

Athanasia vulgaris, Lac.

Tanacetum millefolii foliis, Ad. Lob.

Athanasia seu Tanacetum, Lugd. Cast.

Artemisia Diotcordis, Tab.

Flore est luteo, rarius albo, & dicitur,

Artemisia flore albo, Taber.

##### II. Tanacetum toliis crispis.

Tanacetum argutifloribus fibris, Ad.

Tanacetum cristatū Anglicum, Lob. Lugd. Eyff.

Tanacetum crispum, Dod. Anglicum, Cam. Ger.

Artemisia fativa Anglica, Tab.

##### III. Tanacetū minus albū odore camphoræ.

Millefolium nobile & stratiotes vera, Trag.

Achillea, Matth. Lac. Cord. in Dios. & hist. Thal.

Cast.

Millefolium stratiotes, & Stratiotes, Gesl. hort.

#### TANACETUM AFRICANUM.

**P**Lantam hanc aliqui Argemonem Dioscoridi l. 2. c. 208. & Argemoniam l. 25. c. 9. alii Othonnam Dioscor. l. 2. c. 213. & Plin. l. 27. c. 12. Alii Lycopersicum Galeni: alii Caltham Plinii l. 21. c. 6. quam gravis odor dicit: alii Petiolum flos Plinii l. 21. c. 8. suspicantur. Africanus vel Tunetanus flos dicitur, eo quod primum hic flos in Germaniam fuerit illatus quando Carolus V. Imperator apud Tunetum victoria potitus est; cum in Africa sponte proveniat. Tanacetum appellare lubet.

##### I. Tanacetum sive flos Africanus major flore pleno.

ar. Othonna Dioscoridi & Plinii.

Caryophyllus Indicus major, Matth. Lugd.

Flos Africanus major, Dod. gal. multiplex, Eid.

Rosa Indica magna, Gesl. hor.

Achillea sive millefolium nobile, Tab. Ger.

Tanacetū minus, Dod. cādidi florib. Lob. Lugd.

Achillea sideritis, Lugd.

Scopa regia Plinii, Dalech. in Plin.

Floribus candidis, purpureis & aurum emulantibus, Matthiolo.

##### IV. Tanacetum alpinum.

Iva moschata Rhæcis, Tanaceto cognata herbula, Gesl. hort.

Tanacetum parvum alpinum, Lugd.

##### Tanacetum inodorum.

##### I. Tanacetum mont. inodor. minore flore.

Sideritis 3. Matthioli, quoad folia, & Lugd.

Tanacetum inodorum, Dod. Ger. fl. bellidis majoris, Eyff.

Tanacetum non odorum syl. Ad.

Tanacet. inodor. 2. Clus. pan. & hist.

Tanacet. non odorum, perperam sideritis Italorū,

Tanacetum album seu άσμη, Thal. (Lob.

Athanasia Leucanthemos, Lugd.

Tanacetum Leucanthemum, Tab.

##### II. Tanacetum inodorum flore majore.

Tanacetum inodorum vel ampliore flore, Clus. pan. & hist.

Caltha Africana fruticosa, Eid.

Othonna major polyanthos, Ad. Lob.

Flos seu Caryophyllus Indicus major, Cast.

Flos Indici vulgo, Cæs.

Flos Indicus major flore pleno, Cam.

Flos Africanus major aureus multiflorus, Tab.

Flos Afri-

Flos Africanus major polyanthos, Ger.  
 Caryoph. Indicus fl. multip. luteo pleno major &  
 Caryoph. major Indic. fl. multip. aureo, Eyst.  
 Caryophylli Hispan. dicti prima varietas, Col.

Variat flore, qui aliquando ad pugni magnitudinem crevit, & in globū colligitur; hinc Swer. & Bry.

Africanus flos max. flore aurantii colore.  
 Africanus major flore pleno: addit Bry  
 Caryophyllum Indicum majorem luteum, vel aureum; sic & colore est luteo, pallido, aureo. Aliquando in uno flore observata folia 230. bifida & trifida, & per margines punctis notata.

II. Tanacet. African. majus simplici flore.  
 Caltha Africana fruticosa fl. simplici, Gesl. hort.  
 Flos Africanus major simplici flore, Lob. ic. Tab. Ger.

Flos Ind. major. flore simplici, Cam.  
 Africanus flos maximus simplex flore luteo, Swer. Bry.

Caryophylli Hispanici dicti tertia & quarta varietas, Colum.

Variat: colore est croceo, est pallente: petalis oblongis, aliquando novenis.

III. Tanacetum Africanum, seu flos Africanus minor.

an Argemone Dioscorid. Argemonia Plinii.  
 Caryophylli Indici, Trag. Gesl. hort.  
 Caryophyllus Ind. minor, Matth. Gesl. col. Lugd. Cast.

Flos Africanus, Lob. Indianus minor, Lon.

Flos Indianus seu Viola flammea, Fuch.

Tagetes Indica, Eid. Lugd.

Orbonna, Lac. It. forum, Ad.

Tanacetum Peruvianum, Cord. hist.

Caltha Africana min. flore simplici, Gesl. hort.

Viola flammea quibusdam, Eid.

Flos Portugalicus vel Indicus minor, Eid. col.

Pedua Pœnorum, Guil. pap.

Flos Indix alter minor, Carl.

Flos Africanus minor flore simplici & multiflorus, Tab. Ger.

Flos Ind. minor flore simplici & pleno, Cam.

Caryophyllum Indicus flor. luteo, simpl. minor & Caryoph. Indic. fl. aureo simp. minor, Eyst.

Variat flore simplici & pleno: quamvis multiplicem dari Gesl. hort. neget: croceos, melleos & albos reperiri, Amat<sup>9</sup> scribit: adde & rubros: aliud citius, aliud tardius foret.

Africanus flos simplex & Africanus flos alter pleno flore, Swer. Bry.

Caryoph. Indic. fl. luteo rubescēte simp. minor & Caryoph. Indic. plenus fl. luteo rubescēte minor, Eyst.

Caryophylli Hisp. dicti altera varietas, Colum.

IV. Tanacetum Africanum minimum sericea hirsutie oblitum.

Caryophylli Hispanici dicti varietas septima & octava, Colum.

Variat flore simplici quinis petalis, & altera polyanthos, Colum.

V. Tanacetum sive Flos Mexicanus flore fistuloso simplici.

Caryophyllus Mexicanus fistuloso flore simplex, Colum.

VI. Tanacetum sive Flos Mexicanus flore fistuloso pleno.

Caryophyllus Mexicanus alter polyanthos fistuloso flore, Colum.

VII. Tanacet. Africanum foliis tenuissimè divisis.

Caryophylli Hisp. dicti varietas nona, Colum.

IX. Flos Indicus.

Iolo Suchil, id est. flos cordialis, figura & magnitudine cor repræsentans: Joseph. Acosta lib. 4. cap. 27.

IX. Angiers, Indix flores holosericum tactu referentes, inodori, aspectu amabiles: Idem.

## PARTHENIUM.

Ap<sup>9</sup> 311 in quasi Virginialis, quod morbu mulierum uterinis medeatur (hinc vulgo Matricaria) Dioscorid. l. 3. cap. 155. cui & quægor, ut & Galeno & Aegineta. Plinius & Artemisia & Mercurialis, & hinc, Parthenii nomen tribuit: at de Matricaria agit l. 25. quod in horroꝝ sepibus flore albo nasci scribit. Nunc meminere.

I. Matricaria vulgaris.

Amaracus Galeno & Aegineta.

Matricaria, Parthenii l. species, Brunf.

Artemisia tenuifolia, Fuch. Tab.

Artemisia ramosa altera species, Fuch. ic.

Matricaria, Trag. Lon. Dod. Lugd. Ceti. Cam. Ger.

Matricaria nostras, Ad. Lob. fl. simplici, Eyst.

Parthenii, Matth. Dod. gal. Lac. Cord. in Diosc.

Gesl. hort. Cast. Thal. 2. Tur.

Amaracus Galeni, Eric. Cord.

R 3

Flora

Flore luteo in sylvis caudis reperiri, Tab. scribit.

II. *Matricaria odorator.*

*Matricaria altera ex Illa, Cam.*

*Artemisia tenuifolia odorata, Tab.*

III. *Matricaria flore pleno.*

*Matricaria duplici flore, Lob. ico. Ger.*

*Matricaria pleno flore, Cam. Eyf.*

*Parthenium pleno sive polyphylio flore, Clus. pan. & hist.*

*Artemisia tenuifolia flore pleno, Tab.*

IV. *Matricaria inodora.*

*Achaovan, Parthenium inodorum, Alpi.*

V. *Matricaria alpina Chamæmeli foliis.*

*Parthenium alpinum, Clus. pan. & hist.*

*Matricaria sive Parthenium alpinum, Cam.*

VI. *Matricaria foliis abrotani.*

*Parthenium τριφύλλιον Myconi, Lugd.*

VII. *Matricaria maritima,*

*Cotula sive Parthenium marinum minimum.*

*Ad. Lob. ico.*

*Parthenium maritimum minimum, Lugd.*

*Chamæmelum minimum Dalech. Eid.*

## CHRYSANTHEMUM ET Bupthalmum.

**X** *Πικρὸν δι μόνον, propter flores luteos aureo fulgore splendentes, Dioscoridi l. 4. c. 58. & qui orbem oculi imitatur, etiam ὀφθαλμὸν dicitur.*

*ὀφθαλμὸν adjungimus, quod flore simile sit boum oculis, Plin. l. 25. c. 8. de quo Dioscorides l. 3. c. 156. post Parthenium egit, qui utriusque plantæ ὀφθαλμῶν nomen eribuit. Dein, quia forma & viribus plurimum conveniunt, ut dubitari possit, sint ne apud Dioscoridem & Plinium diversæ plantæ, an verò eadem, quod ex capitis utriusque collatione clarum fiet: quare Galenus & Aegina. Bupthalmi, non vero Chrysanthemi, meminere.*

*Genus Chrysanthemi unicum est Dioscoridi & Plinio, licet l. 26. c. 8. Chrysanthemi primi meminere, ubi pro primo potam legendum censuimus.*

I. *Chrysanthemum foliis matricariæ.*

*Tindorius flos 4. Trag.*

*Chrysanthemum, Matth. Lac.*

*Chrysanthemum & Chalcitis, Tab.*

*Chrysanthemum segetum, Ger.*

II. *Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo.*

*Bupthalmi altera species, Ges. hor.*

*Chrysanthemum Creticum mixtum, Eyf.*

III. *Chrysanthemum majus folio profundi-  
us laciniato magno flore.*

*Chrysanthemum Creticum 1. Clus. hist. luteum, Eyf.*

IV. *Chrysanthem. majus folio in minores lacinias diviso.*

*Chrysanthemum Creticum 2. Clus. hist.*

*an Chrysanthemum, quod crudum edunt in Lemno intula, Bellon.*

*an Chrysanthemum quod μαλακὴ vocatur & à rusticis editur, Belli epist. ad Clusium.*

*Chrysanthemum alpinum.*

I. *Chrysanthemum alpin. incanum foliis laciniatis.*

*Chrysanthem. alpinum 1. Clus. pan. & hist.*

II. *Chrysanth. alp. foliis abrotani multifidis.*

*Achillæa montana Artemisiæ tenuifoliæ facie,*

*Ad. Lob. ico.*

*▲chillæa montana, Lugd. Tab.*

*Ageratum ferulaceum, Lugd.*

*Chrysanth. alpinum 2. Clus. pan. & hist.*

III. *Chrysanth. alp. fol. longis tenuiter incis.*

*Chrysanth. alpinum 3. Clus. pan. & hist.*

*Bupthalmum.*

I. *Bupthalmum Dioscoridis.*

*Bupthalmum, Trag. Matth. Lac. Ad. Lob. Cast.*

*Lugd. Cam. Tab. sub Bupthalmo albo, Ger.*

*Bupthalmus & Chrysanthemum, Ges. hor.*

*Bupthalmum vulgare, Clus. pan. & hist.*

*Chamæmelum chrysanthemum, Fuch.*

*Cotula lutea, Dod.*

*Chrysanthemum, Cord. in Diosc. Tur. tenuifolium, Eyf.*

*Chrysanth. verum, Ges. col.*

*Alter Atticus, Cord. hist. ico.*

*Cotula non fetida, Lon.*

II. *Bupthalmum caule & flore purpurecente.*

*Bupthalm. flore purpurecente, Cam. in Matth.*

III. *Bupthalmum cotulæ folio.*

*Bupthalmum alterum folio & facie cotulæ fetidæ, Ad. Lob. ico.*

*Bupthalmum alterum Penæ, Lugd.*

*Bupb-*



Bupthalmum Narbonense, Clus.pan. & hist.  
 Bupthalmum, Cam.in Matth.verum, Tab.Ger.  
 Chrysanthemum primum, Cæf.  
 IV. Bupthalm. lanuginos. foliis millefolii.  
 Chrysanthemum Valentinum, Clus.pan. & hist.

Lob.ico.Ger.  
 Bupthalm.tenuifol.Narbonense,Lob.ob.  
 Bupthalmum verum Dalech.Lugd.  
 Chrysanthemum alterum ex Sicilia,Cæf.  
 Chrysanthemum Hispanicum,Tab.

# CHAMÆMELUM & COTULA.

**A** Naxos Dioscoridi l.3.c.134. ἀνθὺν Theoph.7.hist.13.dicitur & χαμαίμελον, quod mali odorem habeat;  
 Plinio l.22.c.21. cui & Anthemii.

Genera plura Theophrasto: at Dioscoridi & Plinio tria, flore tantum distantia: flores in medio aurei;  
 orbiculato ambitu candidi & λευκὸν ἔχει: melini & ὑσσανθίου: aut purpurei, & proprie ἡδὲ θυμὸν  
 vocatur.

I. Chamæmelum vulgare, Leucanthemum  
 Diof.  
 Chamæmelum (Parthenii 3.species) Brunf.Lac.  
 Cæf.Cast.Thal.Tab.Ger.  
 Chamomilla 3.& vulgaris, Trag.Lon.  
 Chamæmilla, Ang.  
 Chamæmelum Leucanthemum, Fuch.Gef.hor.  
 Chamæm. syl. Dod.gal. Lugd.vulgare, Gef.hor.  
 Dod.& arvense, Cam.  
 Chamæmelum vel Anthemis vera, Gef.hor.  
 Anthemis, Tur.Cord.in Diof.Marth.Gef.col.  
 Anthemis vulgatio, sive Chamæmilla, Ad.Lob.

II. Chamæmelum nobile seu odoratius.  
 Parthenium & nobilis Chamomilla, Trag.  
 Chamæmelum Leucanthem. Dod.gal.Tur.  
 Leucanthemum odoratum, Dod.  
 Chamæmelum hortense, Gef.hort.  
 Chamæmel.odoratum vel nobile, Eid.  
 Parthenium nobile, Eid.ap.  
 Chamomilla nobilis, Lon.  
 Anthemis, sive Leucanthemum odoratius, Rosma-  
 num, Ad.  
 Anthemis seu Leucanthemis odorata, Lob.  
 Anthemis Leucanthemos, Lugd.  
 Chamæmel.odorat.Ital.simplici flore, Cam.  
 Chamæmelli Romanum, Tab.Ger.fl.simplici, Eyf.

III. Chamæmelum leucanthemum Hispani-  
 cum magno flore: quod. i. est in Prod.

IV. Chamæm. Hispan. luteum odorat: quod. 2.  
 in Prod.

V. Chamæmelum nobile flore multiplici.  
 an Leticanthemum Plinii, Ang.  
 Leucanth. niveum Anglorum flore multiplici,  
 Ad.Lob.ico.  
 Chamæmel.leucanth.odorat.multiplex, Dod.  
 Anthemis leucanthemon nivea Angl. flore mul-  
 tiplici, Lugd.

Chamæmel.Roman.flore multip.Cam.in Matth.  
 Tab.Eyft.

Chamæmel.Anglicum flore multiplici.Ger.  
 Floribus variat, qui altero globolius albus, ut a-  
 pices lutei nō conspiciantur: in altero adhuc con-  
 spiciuntur: est 3.& 4.species, Tab. aliquando flo-  
 res latitudine Ducatum Ungaricum exarquant.

VI. Chamæmel. luteum capitulo aphyllō.  
 Chamæmel.Chrysanthem.Dod.gal.  
 Cham.Chrysanth.odoratum, Eid.post.  
 Anthemis Chrysanthemos herbariorum, Ad.Lob.  
 Lugd.

Chamæmel.hort.alterum, Gef.hort.  
 Chamæmel.luteum odoratum, Eid.ap.  
 Chamæmel.luteum, Tab.fig.trans.  
 Chamæmel.nudum odoratum, Ger.

VII. Chamæmelum inodorum.  
 Cotula, Brunf.Tab.  
 Chamomilla fatua, & 4 Trag.  
 Bupthalmum, Fuch. Er. Cord. majus, Cord. in  
 Diof.

Cotula non fœtida, Dod.gal.Gef.ap.Lugd.  
 Cotula inodora, Ad.  
 Cotula alba non fœtida, an Melandrium Plinii,  
 Dod.post.

Solo odore à Chamomilla vulgari distinguitur.

IX. Chamæmelum fœtidum.  
 Parthenion leptophyllon Hippocratis.  
 Cotula fœtida, Parthenii 4.species, Brunf.  
 Chamomilla 2. & syl. Trag.  
 Cotula fœtida, Dod.gal.Er.Cordo (cui & caninum  
 anethum Germ.) Lac. Gef.hort. Guil. Lon. Lob.  
 ico.Lugd.Cast.Cam.Eyft.  
 Parthenium, Fuch.Ad.Tab.primum, Tur.  
 Bupthalmum minus, Cord.in Diof.  
 Cotula alba, Dod.

Kurtz, Parthenium vel virginea, Lob.  
 Chamæ-

Chamæmelum album seu foetidum, Thal.  
Cota vulgo. Buphthalmū Diof. Gal. & Plinii, Cef.  
Flore pleno, aliquando etiam in agris reperitur.  
IX. Chamæmelum alpinum inodorum.

Pyrethrum alpinum, Gef. hort.  
Leucanthemum alpinum, Cluf. pan. & hist.  
X. Chamæmelum Leucanthemum incanum  
Hispanicum minus: quod 3. in Prod.

## SECTIO SECUNDA.

### ABROTANUM; ARTEMISIA; AMBROSIA;

*Botrys; Absinthium.*

#### ABROTANUM ejusque SPECIES.

**A**βροτανον Diofcoridi 13. c. 29. sic dictum Nicandri interpreti, διὰ τὸ αἰεὶ ὀφειλόμενον εἶναι δεινὸν ὁλοῦς ἔχει, ὡς δὲ τὸ ἀντιπικρὸν ἔχει. hoc est, quod conspectu tenerum, molle & delicatum appareat: aut quod gravem, acremque, & difficilem halitum spirat.

Genera duo Theoph. urbana 6 hist. 1. & agrestis 6. caus. 24. Diofcoridi semina & mas. Sic Plinio 1. 21. c. 7. mas. Abrotanum campestre: semina verò montanum. At Diofcoridi seminam, Chamæcyparissi, id est, pumile Cupressi nomine, Plin. 1. 24. c. 15. donasse videtur.

I. Abrotanum latifol. arborecens.  
Absinthium del Comasco, Ang.  
Abrotanum foemina arborecens, Dod.  
Absinthium arborecens, Lob. Lugd. Tab. Ger.

II. Abrotanum latifolium inodorum.

Abrotanum inodorum, Lob. Lugd. Ger.

Absinth. inodorum & insipidum, Dod.

Abrotanum latifolium, Tab.

Artemisia tenuifolia 2. Cluf. hist. ico.

III. Abrotanum mas angustifolium majus.

Abrotanū mas, Brunf. Dod. Matth. Lac. Gef. hor.

Ad. Lob. Cast. Lugd. Tab. (five masculum majus)

Cam. Franco, Ger. Eyf.

Abrotanum primum, Trag.

Abrotanum vulgare mas, Fuch.

Abrotanum nigrum seu mas, Cord. in Diof. & hist.

Abrotanum mas Diof. montanum Plinii, Cef.

Abrotanum mas vulgare humile: montanum & foemina Plinii, Colum.

Abrotanum foemina, Dod. gal. Ang.

IV. Abrotanum mas angustifolium maximū.

Abrotanum majus & 2. Trag.

Abrotanum magnum camphoratum, quibusdam Incensaria, Cam.

Abrotanum mas magnum, Franco

Abrotanum mas vulgare magnum in hortis cultum, Colum.

V. Abrotanum mas angustifolium incanum.

Abrotanum masculum minus, Tab.

Abrotanum mas incanum, Colum.

VI. Abrotanum mas angustifolium minus.

Abrotanum tertium, Trag. Dod. gal.

Abrotanum odoratum humile, Eid. Lugd.

Abrot. odorat. humile dense fruticosum, Lob.

Abrotanum humile, Tab. Ger.

VII. Abrotanum campestre.

Abrotanum syl. vel 4. Trag.

Ambrosia, Lac. Lon. Cast. altera, Matth. Lugd.

Cam. tertia, Tab.

Ambrosia tenuifolia, Lob.

Artemisia leptophyllus, Gef. hor.

Artemisia tenuifolia, Thal. 3. Cluf. hist. def.

Artemisia 3. Diofcor. leptophyllon, Ad. Lob. ico. Lugd.

Abrotanum campestre, Tab. Ger.

Duplex est: nam alteri cauliculi sunt albicantes, alteri rubentes: illud

Artemisia tenuifolia, vel incana, Clusii in pan. & secunda in hist. hoc verò, 2. vel purpurascens. Ejusdem in pan. & in hist. tenuifolia 2. esse videtur.

IX. Abrotanum campestre incanum Carlini odore: in Prodomo descriptum.

*Abrotanum semina vulgi.*

I. Abrotanum foemina foliis teretibus.

Chamæcyparissus Plinii, Trag. Fuch. Eric. & Val.

Cord. Dod. gal. Tur. Gef. bor. Lon.

Santolina, Ang. altera, Dod.

Abrotanum foemina, Brunf. Matth. Lac. Ad. Lob.

Cast. Cluf. hiip. & hist. Lugd. Tab. Ger. Cam. Eyf.

Cupressus herba, Cord. in Diof.

Santonium minus, Cord. hist.

Centonif. Gef. hor.

Polium, Theoph. Diof. & Arabum, Colum.

Sando-

Sanctolina vulgo, aliis Crespolina, Cæf.

Absinthium marinum, Tab.

II. Abrotanum fœmina flore majore.

Santonicum majus, Cord. hist.

Santolina prima, Dod.

Seriphium verum Penz. Lugd.

Absinthium marinum 1. Tab.

Abrotanum fœmina 3. Cluf. hist.

Polii altera species major, Colum.

III. Abrotanum fœmina foliis Ericæ.

Santolina 3. Dod.

Chamæparissus Dalechampii, Lugd.

Linguentaria Lutetianorum.

IV. Abrotanum fœmina foliis Cupressi.

Abrotanum peregrinum Cupressi foliis, Ad.

Santolina 4. Dod.

V. Abrotanum fœmina Sabinæ folio.

Hujus Lobelius in observationibus meminit.

VI. Abrotanum fœmina repens canescens.

Santolina 5. Dod.

VII. Abrotanum fœmina, villosis & incanis foliis.

Seriphium Diosc. abrotani fœm. facie, Ad. Lob. descript.

IX. Abrotanum fœmina foliis minus incanis.

Abrotanum 2. Cluf. hist.

Abrotanum fœm. foliis magis viridibus, Cam. hort.

Polii altera species non ita incana, Colum.

IX. Abrotanum fœmina viridis.

Abrotanum fœm. Salmantic. 2. Cluf. hisp. at 6. in hist.

X. Abrotan. fœm. foliis roris marini majus.

Abrotanum fœmina Salmanticensis prima, Cluf. hisp. at 4. in hist.

XI. Abrotanum fœmina foliis roris marini minus.

Abrotani fœminæ Salmanticensis 1. altera species, Cluf. hisp. & Abrotanum fœmina 5. Eid. hist.

## ARTEMISIA ejusq. SPECIES.

**A**rtemisia Dioscoridi l. 3. c. 127. sic dicta ab Artemisia Mausoli Carie Regis uxore, quæ hanc sibi, ut loquitur Plin. l. 25. c. 7. adoptavit, cum antea *μαρτυρία* id est, Virginalis; quod virgo Dea illi nomen dederit, vocaretur: quare Apulejus etiam *μαρτυρία* dici affirmat. Sunt qui ab Artemide Ilythia cognominatam putent, quoniam privatim fœminarum malis, quibus *ἀρτεμια*, id est, Diana præest, medeatur.

Genera duo Diosc. proposuit: in quibusdã verò codicibus Græci, ut Goupylii, Assulani, Cornarii, sequitur & aliud caput de Artemisia, quod spiritum videtur: quare Ruellius, in sua interpretatione omisit. Marcellus Virgilius, ut assignitum damnavit: Cornarius, ut suppositivum ex textu Latino removit: non immerito, cum nec apud Galenũ, Orbasium, Aeginetam, Aëtium, nec apud Serapionem, de tertiã specie quidquam legatur, qui tamen simplicia ex Dioscoride enumerant. Sic Plinio genera duo, alterum foliis latioribus, alterum tenuioribus.

I. Artemisia vulgaris major.

Artemisia, Parthenii 8. species, Brunf.

Artemisia, Trag. Ang. Matth. Lac. Cord. in Diosc.

Gesl. hort. Ad. Cam. communis, Dod. gal.

Artem. vulgaris, Tur. Cluf. hist. Thal.

Artemisia major, Cord. hist.

Artemisia latifolia, Fuch. Lon. Dod.

Artemisia mater herbarum, Lob. Ger.

Artemisia vulgaris, Lugd.

Artemisia vulgaris, & Artemisia altera polyclonos dicta, Dioic. Cæf.

Artemisia rubra & alba, Tab.

Variat colore caulis & floris: una, caule & flo-

re rubro, purpurascente, seu subpurpurascente: altera, caule ex viridi albicãte, vel sub, allente spadicẽove: hinc apud Tab. & Ger. figuræ duæ.

II. Artemisia vulgaris minor.

Artemisia minor, Marth. Cast.

Priore minor est & unum tantum caulem producit.

III. Artemisia montana.

Artemisia leptophyllos montana, Lugd.

IV. Artemisia polyspermos.

Artemisia monoclonos quorundam, aliis Ambrosia, Lugd.

an Ambrosia 2. Tab.

## AMBROSIA.

**A**mbrosia Dioscoridi l. 3. cap. 129. Artemisia subicit, Veteribus τὸ τῶν θεῶν βρώμα, id est, Deorum cibis dicitur, quod mortales eam non edant: vel quod, qui eam ederint, immortales evadant, ita eximia fragrantia gratia, etiam Diu expetita. Sunt qui Ambrosiam Dioscorid. Conyzam Hipp. de morb. mulieb. & Artemisiam secundam Plinii velint.

## I. Ambrosia maritima.

Conyza Hippocratis, Ang. Gef. hort. Cam.

Ambrosia, Artemisia forian species, Gef. hort.

Ambrosia sativa hortenſis, Lob.

Ambrosia, Dod. Ad. Cæf. Cam. prima, Tab.

Ambrosia hortenſis procerior, Lugd.

Artemisia monoclonos, Eid.

Plerumq; ramosa est, rarius unicaulis, hinc duæ figuræ in hist. Lugd.

## II. Ambrosia campestris repens.

Ambrosia, Matth.

Ambrosia spontanea strigosior, Lob.

Ambrosia prima Matthioli, Lugd.

Coronopus Ruellii, Dod. gal. Gef. hor. Lugd.

Coronopus repens, Lob. Lugd. Tab. Cam.

Cornu cervi alterum repens, Dod.

Pseudoambrosia, Nasturtium verrucarium quibusdam, Cam. in Matth.

Carara, Cæfal.

## BOTRYS.

**B**otrys Dioscoridi lib. 3. cap. 130. quam Cappadoces Ambrosiam, alii Artemisiam vocarunt: Botrys Plinio lib. 6. 8. quam l. 25. c. 7. cum Artemisia confundit: sic dicta à semine, quod rascenatim ramulis adnascitur.

## I. Botrys Ambrosioides vulgaris.

Botrys, Trag. Matth. Fuch. Tur. Ang. Dod. Lac.

Cord. hist. Gef. Ad. Lob. Cast. Cæf. Lugd. Tab.

Ger. Cam. cui &amp; Patientia Italarum.

Botrys, Artemisia Turcica, Eyf.

Botrys, altera Ambrosiæ species, cujus semen Amomum officin. quibusdam, Cord. in Diof.

II. Botrys Ambrosioides Mexiocana: cujus semen Parote Mexiocanæ nomine missum, in horto D. D. Plateri, feliciter anno 1619. & sequentibus crevit.

## III. Botrys Chamædryoides.

Chamæcyparissus agrestis &amp; Chamæpitys alter

Dioscoridis, Trag.

Chamædrys altera, Matth. Cast. Lugd. Thal.

Chamædrys fœmina, Dod. gal. Tur. Cæf. Lugd.

Cam. Ger. vera fœmina, Fuch. ico.

Trixago vera, Lon.

Chamædrys laciniatis foliis, Lob.

Chamæpitys altera, Dod.

Chamædrys minima, Lugd.

Iva moschata, Tab.

Aiuga, vel Chamæpitys multifidis foliis, Clus. hist.

## ABSINTHIUM ejusq; SPECIES.

**A**ψίνθον Dioscoridi l. 3. c. 26. Sic dictum quasi ἀψίνθον Comici, quasi impossibile, propter insignem amaritatem, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ γλυκύτης: unde & βαδύμπερον, intensa amaritudinis.

Genera tria Dioscoridi, Ponticum, Mariqum, sive Seriphium, & Santonicum, & Galeno & Plinio lib. 27. cap. 3. Theoph. 9. hist. 18. Absinthii in Pontoprovenientis tantum meminit.

## Absinthium Ponticum.

I. Absinthium Ponticum, seu Romanum officinarum, seu Dioscoridis.

Absinthium, Brunf. Matth. Cord. in Diof. &amp; hist. Lon. Cæf.

Absinthium Ponticum, Ruel.

Absinth. vulgare, Trag. Fuch. ico. Lac. Gef. Gnil.

Ad. Lob. Cast. Tab. Lugd. seu Rom. Ponticū Eyf.

Absinthium commune, Tur. Cam.

Absinth. nostrum rusticum, Thal.

Absinth. Santonicum, Dod. gal.

Absinthium majus &amp; vulgare, Clus. pan.

Absinthium latifolium, Dod. Ger.

## II. Absinthium ponticum montanum.

Absinth. commune minus vel alpinum, Gef. hor.

Absinth. mont. Cam. in Matth. seu Romanū, Tab.

Absinth. tenuifolium pont. Galeni, Ger. ico.

Simile vulgari, nisi quod exiliora omnia, &amp; amaritudo gravior.

III. Absinth. pont. Creticum grati odoris.

Absinthium in Græcia communissimum, quod αἰκνῶδια vocant, Ang.

Absinthium Ponticum Belli, quod ἀνὰ νόον αἰκνῶδια in Græcia vocatur: ut ad me Honorii Belli, &amp; scripsit, &amp; plantam misit, ut in Appendice Phytopinacis &amp; sub i. in Prod. videre est.

IV. Absinthium Ponticum tenuifolium italicum.

Abrotanum minus &amp; i. Trag.

Abrotanum fœmina, Fuch. Gef. hor. Lon. Lugd.

Abrotanum album, Cord. in Diof.

Absinthium Santonicum, Ruel. Cæf.

Absinthium Pontic. Matth. Fuch. ico. Dod. gal. Ge

Gef. hor. Guil. Lugd. Tab. vulgare, Cluf. pan. & hift.

Abfinthium Roman. Mefuei, Tur.

Abfinthium tenuifolium, Dod.

Abfinth. Galatium Sardonium Diofc. Ad. Lob.

Abfinthium Romanum vulgare, Thal.

Abfinthium Ponticum album, Eyft.

Hoc medium eft inter Abfinthium & Abrotanum, & eft dnuum generum: 1. planè incanum: 2. cauliculis purpurafcentibus, foliis fupina parte viridioribus.

V. Abfinth. Pont. tenuifolium Auftriacum.

Abfinth. Pont. Tridentinum herbariorum, Lob. Lugd.

Abfinthium tenuifolium Auftriacum, Cluf. pan. & hift.

Abfinth. Seriphium, Dod.

Abfinth. Nabathæum Avicennæ, Tab.

Abfinth. tenuifol. feu Romanum, Ger.

VI. Abfinthium Ponticum repens vel fupinū.

Abfinth. fupinum, Gef. hor.

Abfinth. Pont. fupinum Herbariorum, Lob. ob.

Abfinthium repens, Tab.

Abfinthium marinum latifolium, Ger. ico.

VII. Abfinth. infpidū, abfinthio vulgari fimile.

Abfinthium infpidum, Gef. hor. Lob. ob.

*Abfinthium Seriphium five maritimum.*

I. Abfinth. maritimum Lavendulæ folio.

Abfinth. marinum five feriphium, Matth. Lugd.

Abfinthium Seriphium, Lac.

Abfinthium marinum, Tur. Cæf.

Artemifia marina, Lob. Tab. Ger.

Artemifia folio Lavendulæ. Cluf.

Abfinth. anguftifolium, Dod. Lob.

Abfinth. latifolium marinum, Cam. Eyft.

Hoc foliis ludit, fuperioribus in aliquot lacinias divifis, potiffimum fi in hortos transferatur: & hujus peculiaris figura habetur, nomine Artemifiz marinæ foliis fuperioribus incifis, Lob. Lugd.

Abfinth. anguftifolii ramulus foliis fciffis, Dod.

Abfinthii marini Patavini, Cluf. pan. & hift. ubi feribit ab Artemifia folio Lavend. differre.

Artemifia marina minor, Tab.

an Abfinthiū latifol. rarius Artemifiz folio, Col.

II. Abfinthium Seriphium Germanicum.

Abfinthium Seriphium, Gef. hor.

Abfinth. marinum Miſenſe, Seriphium Belgico fimile, Cluf. pan. & hift.

III. Abfinthium Seriphium Belgicum.

Abfinth. Seriphium feu marinum, Ang.

Abfinthium Seriphium, Dod. gal. Lugd.

Abfinth. Seriphium vulgare perperam Dioſcoridis, Lob. ico.

Abfinth. Seriph. vulgo dictum, Cam. in Matth.

Abfinth. marinum five Seriphium in Belgicis & Anglicis maritimis, Cluf. pan. & hift.

IV. Abfinthium Seriphium Gallicum.

Abfinth. Seriphium tenuifol. Joh. Bauhino lib. de Abfinth.

Abfinth. Seriph. Narbon. Cluf. pan. & hift. Dod.

*Abfinthium Santonicum.*

I. Abfinthium Santonicum Judaicum.

Abfinth. Santonicum, Scheha Arabum, unde ſemen lumbricorum colligitur, Raw.

Scheha Arabum, Lugd. ap.

II. Abfinthium Santonicum Alexandrinum.

Abrotanum mas, Ang.

Semen Sanctum five ſementina, Matth. Ad. (& Semen Zedoariæ) Lob. Lugd. Caſt.

Abfinthium Seriphium Alexandrinum, ſemen, aut Zinz ſemen, Cord. in Dioſc. & hift.

Sementina, Dod. Tab. (cui & Santonicum) Ger. Santonicum, Semen Sanctum, Lon.

III. Abfinthium Santonicum Ægyptiacum.

Abfinth. Seriphium Ægyptium, Matth. Lugd.

Abfinth. aliud peregrinum five Ægyptium, Ad. Lob.

Abfinthium Ægyptium, Dod. Tab. Ger.

IV. Abfinthium Santonicum Gallicum.

Abfinthium Xantonicum vulgare, Lob. ob.

Abfinthii Santonici ſpecies, Cam. in Matth.

*Abfinthium montanum.*

I. Abfinthium Seriphii montanum candidū.

Abfinthii genus, in Valeſia herba alba dicta & Abfinthium Seriphium ſœmina, Gef. hor.

Abfinthium album è Valeſia, Eid. ap.

Abfinthium externum & ſpurium primum, Dod.

Abfinthium Santonicum nonnullis, Cam.

II. Abfinthium alpinum incanum: quod 2. in Prod.

Abfinth. alpinum 2. Ponz in Baldo Ital.

III. Abfinthium alpinum candidum humile: quod 3. in Prod.

IV. Abfinthium alpinum umbelliferum latifolium.



Stratiotes vel militaris millefolia, Dod. gal.  
Helichrysum Italicum, Matth. Cam. Lugd.  
Stratiotes lutea, Clus. hisp. Lugd.  
Stratiotes millefolia flavo flore, Clus. hist.  
Millefol. minus sive Stratiotes Chiliophyllos,  
Dod.

Millefol. luteis floribus, Gef. hor. Cam.

Millefol. luteum, Ad. Lob. Tab. Ger.

Tanacetum lanuginosum, Lugd.

*Millefolium aquaticum.*

I. Millefol. aquat. umbellat. Coriandri folio.

Millefolium aquaticum, Matth.

Millefolium aquaticum alterum Coriandriso-  
lium, Ad.

Stratiotes Millefol. aquat. Lugd.

Foliis Coriandri & umbella subpurpurascens,  
necum viderelicuit.

II. Millefol. aquat. umbellatum capillaceo  
breviq; folio.

Myrioph. Matth. Lac. Cast. prius Matthioli, Lugd.

Millefol. aquaticum, Dod.

Myriophyllum aut Maratriphyllum palustre, Ad.  
Lob.

Myriophyllum alterum, Czf.

Millefolium, Lon. Ger. Tab. cui & Fœniculum  
aquaticum.

III. Millefol. aquat. flosculis ad foliorum nodos.

Myriophyllum aquat. minus, Clus. pan. & hist.

IV. Millefol. aquat. seu Viola aquatica, cau-  
le nudo.

an Potamogeton Castoris apud Plin. l. 26. c. 5.

Myriophyllum alterum, Matth. Lac. Lugd.

Stratiotes fluviatilis, Gef. hor.

Viola aquatilis, Dod. palustris, Ger.

Myriophyllum, Czf. equisetifolium fluviatile,  
Ad. Lob. ob.

Fœniculum aquaticum 2. Tab.

V. Millefol. aquat. equisetifol. caule nudo.

Myriophyllum equisetifol. palustre, Lob. ico.

Viola aquatilis altera icon, Dod.

Viola palustris, Lugd.

Sunt qui cum priore idem velint: at illud folio  
latiore, hoc vero angustiore multo est.

VI. Millefol. aquat. foliis abrotani, ranuncu-  
li flore & capitulo.

Alga prima, Trag.

Alga palustris & fluviatilis, Gef. col.

Millefol. maratriphyllum tertium, flore & semi-  
ne ranunculi aquatici Hepaticæ facie, Lob. ico.  
Ger.

Fœniculum aquaticum 3. Tab.

Millefol. aquat. flore albo, Clus. hist.

Ranunculus tricophyllum aquaticus mediolu-  
teus, vel

Ranunculus aquat. fœniculaceus *πικρόφυλλον*,  
Colum.

VII. Millefol. aquat. foliis fœniculi ranun-  
culi flore & capitulo.

Myriophyllum maratriphyllum palustre alterum,  
Lob. ico. ubi flores omituntur, nec capitula re-  
ctè exprimuntur.

Fœniculus aquaticus Dalech. Lugd. figura im-  
perfecta.

Myriophylli species coliculis fluitantibus, Thal.  
Peucedanum aquaticum, Tab.

Ne quis hoc cum præcedenti, vel cum Ranu-  
culo aquatico folio capillaceo, confundat: nam  
ab illo foliis longissimis, floribus quadruplò ma-  
joribus: ab hoc, quod Ranunculo & rotunda &  
capillacea sint folia: & flos minor.

IX. Millefolium aquat. pennatum spicatum.  
an Alga 3. Trag.

Hoc, quemadmodum & subsequens in Mar-  
thioli & Tabern. ac pro 4. & 5. in Prodro-mo ad-  
dita figura, descripsimus.

IX. Millefol. aquaticum cornutum majus.

X. Millefolium aquaticum cornutum minus,  
necum descriptum.

XI. Millefol. aquat. lenticulatum.

Lenticularia, & Meon aquaticum, Gef. col.

Millefol. aquat. flore luteo galericulato, Lob. ico.

Fœniculum aquat. galericulatum, Tab.

XII. Millefol. marinum filicis folio.

Myriophyllum pelagium Cortusi, Clus. hist.

XIII. Stellaria aquatica, Lob. ico.

Fœniculum aquat. stellatum, Tab.

## CONSOLIDA REGALIS,

*eiusq; species*

**C**onsolidam regalem, Veteres inter flores coronarios reposuere, Hyacinthum nominantes, cuius Dioscorides  
l. 3. c. 85. in Delphinio altero, quod & Hyacinthum vocetur, meminit. Siquidem Plin. l. 21. c. 11. scribit discer-  
rentes non as inesse, ut Græcarum literarum figura. A. I. inscripta legatur: quod in *Consolida regali hortensi obser-*

vatur, cum in floribus solum sit implicatum, quod in albo characteres habet occultatos, ex virgulis cæruleis duas lateras. A.I. aut tres A.I.A. exprimentes. Delphinium duplex est Diofcoridi, cuius altera species Romanis Buccinum dicitur. Quare si apud Diofcoridem, vox *διόσκοριδι* ad flores referatur, tum Consolida regalis hortensis assequior erit: at Consolida regalis segetum, alterum ejusdem Delphinium.

Variat: est major & minor, utraq; flore simplici vel pleno: colore cæruleo pallido, cæruleo intenso, purpureo, incarnato, albo, variegato ex albo & cæruleo.

I. Consolida regalis hort. flore majore & simplici.

Delphinium, Dod. gal.

Delphinium 4. & majus, Gef. hor.

Consolida regalis, Matth. ico. Ang. Cast.

Consolida regalis sativa, Tab. Ger.

Cuminum syl. alterum, Matth. in prim. edit. Lac. Lugd.

Consolida regia sive Calcaris flos recentiorum, Ad. Lob.

Flos regius, Dod.

Delphinium elatius flore cæruleo, Clus. hist.

Consolida regalis fl. cæruleo majore, Cam.

Flos qui vulgo in Hetruria Fior capuccio, Cæs.

Flores communiter cærulei elegantiss. aut ex cæruleo purpurei, carnei, vel saturati, vel diluti, nivei vel exalbidi, cineracei, purpurei seu violacei: hinc figuræ quatuor,

1. Delphinium elatius fl. incarnato, Bry, Swer.

2. Consolida regalis simpl. fl. rubro, Eyf.

3. Delphinium elatius purpureo-violaceum, Swer.

4. Delphinium elatius flore albo, Bry.

II. Consolida regalis hort. flore minore.

Calcatrippa, Cord. hist.

Delphinium 2. flore candido, & 3. flore roseo, Gef. hor.

Consolida regalis fl. rubro, Lob. ico.

Consolida regalis sativa, flore albo: rubro, Tab.

Flos regius flore purpureo, Dod.

Consolida regalis flore incarnato, purpureo albo, Cam.

Delphinium elatius simplici flore, Clus. hist.

Flos cæruleus, cinereus, albus, rubeus, incarnatus.

III. Consol. regal. flore majore & multiplici.

Delphinium elatius pleno flore, Clus. hist.

Consolida regalis flore pleno, Cam.

Flores cærulei, albi; nullæ, aut per exiguo, calcaripati: hinc

1. Consolida regal. fl. pleno incarnato, Eyf.

2. Consol. regal. fl. pleno purpureo, Eyf.

3. Consol. regal. multiplici fl. argenteo, Eyf.

Delphinium elatius albo flore, Bry, Swer.

4. Consol. regal. fl. multiplici cineraceo, Eyf.

5. Consol. regal. fl. pleno albo, Eyf.

6. Consol. regal. fl. pleno rubro, Eyf.

7. Consol. regal. multiplici incarnato fl. Eyf.

8. Consol. regal. multiplici violaceo fl. Eyf.

IV. Consolida regalis arvensis.

Consolida regalis, Brunf. Lac. Gef. hor. Cast.

Consolida regia, Trag. Fuch. Lon. Thal.

Chamæmelum eranthemum, Fuch.

Buccinum & Delphinium alterum, Dod. gal.

Segetum consolida regia strigosior tota, Lob.

Flos regius 2. vel syl. Dod.

Anthemis eranthemos, Lugd.

Cuminum syl. Gef. hor.

Delphinium syl. Eid. vulgare, Clus. hist.

Consolida regalis arvensis, Tab. sylvestris, Ger.

Consolida regalis flore cæruleo minore, Cam.

Flore est cæruleo, albo, candicante, rubro & dilutius rubente, violaceo, & hoc est

Consolida regal. arvensis fl. simpl. violaceo, Eyf.

Consolida regalis fl. variegato.

Delphinium arvense fl. verticillato, Clus. ap. alt. ad l. 6.

Flores quidam tam simplices quam multiplices media parte cæruleæ: altera parte suaviter rubentes, vel cæruleis punctis notati: sic partim cærulei, partim albi: & in eadem planta flores varii coloris, ita ut vix bini flores ejusdem coloris conspiciantur: hinc

Delphin. elatius fl. albo cæruleo distincto, Bry.

Delphin. elatius purpureo-viol. distincto, Bry.

Delphin. elatius pleno variegatum, Swer.

V. Consolida regalis vulgaris fl. multiplici.

Delphinium humilius sive vulgare pleno flore, Clus. hist.

Consolida arvensis fl. rubro pleno vel suaverubente, Eyf.

VI. Consolida regalis latifolia parvo flore.

Delphinium Diofcoridis, Imperato.

In Phytopinace sub 5. & in Prodromo, in Matthiolo quoque & Tabernemontano figura adposita descripsimus.

FUM A-



## FUMARIA ejusq. SPECIES.

**F**UMARIA, *capns* Diosc. l. 4. c. 10. ed. q. *herba succ<sup>o</sup> oculi inditus, instar sumi oculos molestando, lacrymas moveat.*  
*Genera: Diosc. unius, flore purpureo, meminit: at Plin. l. 25. c. 13. Capnos duplex est; prima, quae pes gallinae vocatur, & altera Capnos fruticosa, illam Fumariam bulbosam, hanc vero Capnon Dioscoridis cens. mu.*

## Fumaria non bulbosa.

## I. Fumaria officinarum &amp; Dioscoridis.

Fumus terræ, Brunf. Cam. Thal.

Fumaria, Trag. Mart. Fuch. Cord. in Diosc. Gef. h.

Dod. Lon. Cæf. Lugd. prima & 2. flore albo, Tab.

Capnos, Ang. Ad. Lob.

Fumaria major, Cast. ico.

Fumaria purpurea & alba, Ger.

Flos coloris purpurei violacei, pallefcentis, albi: alia circa Montepesium, foliis tenuissimis floribus albis reperitur.

## II. Fumar. viticulis &amp; capreolis plantis vicinis

Fumar. phragmites, Dod. gal. Lugd. (adhærens.

Fumaria altera, Cæf.

Flosculi cædidi, cæruleo colore aliquando distincti, circa Montepesium in sepibus ad Frontignanum: circa Neapolim flosculis subflavis, in summitate nigrescentibus.

## III. Fumaria minor tenuifolia. (gricantibus.

Capnos minor, Ad.

Capnos tenuifolia, Clus. hisp. & hist. Lob.

Fumaria minor, Cast. ico.

Fumaria species Myconi, Lugd.

Fumaria tenuifolia, Tab. Ger. Eyf. fl. niveo.

Fumus terræ seu Fumaria tenuifol. Hispan. Cam.

Fumaria rubra tenuifolia, Eyf.

Variat floris colore, hilari purpura rubent, est & variegato, ex rubro, albo, viridi & luteo: cauliculis modo surrectis, modo procumbentibus & caducis.

Similem Montispeffuli observavimus, quam

Fumariam nobilem vocant.

Fumaria minor, Ad.

## IV. Fumaria minor folio oblongo capillaceo.

Fumaria altera tenerior Syriaca, Cam.

Selterays nomine ex Syria D. Paludan. attulit.

an Capnos Cretica floribus candidis fuscâ maculâ,

## V. Fumaria lutea. (Clus. hist.

Fumaria corydalis, quibusdam Split, Matth.

Fumaria montana, Gef. hor. Tab.

Fumaria phragmitis altera, Eid.

Fumaria lutea montana, Ad. Lob. (cui & Chelidonium capnites Aëtii) Lugd. Ger.

Split vulgo, Cæf.

Corydalis, Cast. Cam.

(& hæc est

Floribus communiter luteis, aliquando candidis,

Fumaria fl. albis, Ad.

Fumaria Illyrica alba, Tab.

## VI. Fumaria clavicularis donata.

Capnos Plinii & phragmites, Dod. gal. Gef. hort.

Capnos alba latifolia & Splith album quoruamdam, Lob. Lugd.

Fumaria altera, Dod.

Capnos altera Belgica albo flore, Clus. hist.

Foliis latioribus & angustioribus, variat, floribus

est albis & dilute admodum rubentibus.

Fumaria latifolia major & minor, Tab. Ger.

Fumaria Clematites & Clematis minima, Cam.

## Fumaria bulbosa.

## I. Fumaria bulbosa radice cava major.

Capnium sive Fumaria phragmitis, Aëtio.

Aristolochia rotunda, Brunf. Eric. Cord.

Aristol. rotunda vulgaris, Trag. Fuch. (cui & Pistolochia) Gef. hor. Cam.

Hyacinthus 3. candidus & purpureus, Trag.

Fumaria altera, Matth. Cast.

Capnos phragmitis, Tur.

Pistolochia Fuchsii, Apios species videtur, Lac.

Aristolochia phragmites, Gef. col.

Capnos chelidonia, Lon.

Capnos sive Capnium phragmites major & Pes

gallinaceus, Cord. in Diosc.

Chelidonia phragmites altera, Cord. hist.

Radix cava major, Dod. Cast. Clus. hist.

Radix cava herbariorum, Ad. Lob. Clus. pan.

Fumaria bulbosa, Lugd.

Leontopetalum genus quibusdâ, haud planè ineptè,

Leontopetalon alterum, Cæf. (Guil.

Chelid. Capnites quorundâ radice pertusa, Thal.

Aristolochia vulgaris fl. purpureo, Eyf.

Est major & minor: huic folia angustiora, illi

paulo latiora, sed solum loci ratione differunt.

Variat colore floris albo, pallido, subflavescente,

rubro dilutiore, vel egregie rubente: q. si flos minor sit, saturatè rubet, & p. mascula habetur: si maior, languidioris coloris. Figure 8. apud Tab. & Ger.

Fumaria bulbosa purpureo flore nomine, quatuor: totidem flore albo.

Viridi flore Lobelius observavit, & nomine

Radix cava viridi flore, in iconibus proposuit.

Radix

Radix cava, Cast.

II. Fumaria bulbosa radice non cava major.  
Aristolochia rotunda vulg. radice solida, Trag.  
Arist. rotun. altera species radice solida, Gesl. hort.  
Capnos sive Capniū phragmites min. Cord. in Di-  
Chelidoniū Capnites radice integra, Thal. (osc.  
Aristolochia rotunda fl. albo, Eyll.

A prima differt radice, quæ in illa cava, in hac solida: dein in illa, folia quæ flores intercedunt, integra sunt, in hac verò incisa: tum in illa pauciores & majores colore variantes: in hac minores, copiosiores, eleganti purpura rubentes;

alterius coloris hæcenus non observavi: tandem, nunquam utramq; eodem loco reperimus, illa enim pinguiori solo, delectatur.

III. Fumaria bulbosa radice non cava minor.  
Chelidonia phragmitis & Cord. hist.  
Fabacea radice Capnos altera, Ad. Lob.  
Radix cava minor, Dod. Cast. Clus. hist. Ger.  
Capnos fabacea radice, Lugd.  
Fumaria bulbosa seu tuberosa minor, Tab.  
Aristol. rotunda vulgaris minima, Cam.

A majore diversa est, & florum herbaceis rudimentis variat.

## C H E L I D O N I U M.

**X** *ΕΙΣΤΑΙ ΔΕ* Dioscoridi l. 2. c. 211. cui *χελιδών* id est, hirundo avis, nomen imposuit: vel quod hanc primam invenerit, oculis pullorum excitatorum, visum hic restituens, ut ex Dioscoride, Plin. l. 25. c. 8. refert: vel ut idem l. 8. c. 27. Chelidonium visui saluberrimam hirundines monstravere, vexatu pullorum oculis eā medentes: quibusdam sic dictum, quod in hirundinum adventu floreat, & discessu marcescat. Apud Theoph. 7. hist. 14. Hirundinariam Gaza vertit.

Genera duo Dioscoridi & Plin. l. 25. c. 8. majus & minus, quæ cum figuræ multū differant, de minore alibi agemus.

I. Chelidonium majus vulgare.

Chelidonia, Brunf. major, Ang.

Chelidonium majus, Trag. Matt. Fuch. Tur. Lac.  
Cord. hist. Gesl. hor. Dod. Ad. (& Hirundinaria major) Lob. Cast. Ezf. Lugd. Thal. Tab. Ger.

vulgare, Clus. hist.

II. Chelidonium majus foliis quernis.

Chelid. majus laciniato flore, Clus. hist.

In Phytopinace, Matthiolo, & Tabern. descriptum.

## A Q U I L E G I A.

**A** *Quilegia*, quæ quibusdam Chelidonia sylvestris, videtur dicta quasi Aquilina, ob florum mucrones adumbratos, ut sunt aquilini ungues. Veterum *Πορβος* Gesl. 5. 3. flore Theophrasti 1. hist. 21. Casalpino: *Γόρβος*, Dalechampio in *Athenæum*: *Isopyrum* Dioscoridis l. 4. c. 121. *Columina*: at Gesnero *Leontosomum* dicitur. Variat potest. flore: est communiter majore, rarius minore ex carnulis composito, colorum diversorum, rarius roseo colore coq, vel simplici vel pleno.

*Aquilegia simplex.*

I. *Aquilegia sylvestris.*

Aquilegia, Trag. Fuch. Lugd. Lon. Cæf. (columbin quibusdam) Ger. fl. cæruleo, Swer.

Aquileia, Fuch. Er. Cord. Gesl. Dod. tyl. Thal.

Aquileia simplex, Cam.

Aquilina, Matth. Ad. Lob. Cast. Tab.

Isopyrum Dioscoridis, Colum.

Flore est cæruleo, & vix alterius quam punice coloris, in sylvestribus reperias.

II. *Aquilegia hortensis simplex.*

Aquilina rubra, Lob. ico.

Aquilina, Cast. alba, Tab.

Aquileia rubra, Ger.

1. *Aquilegia fl. albo simplici*, Bry. Eyll.

*Aquilegia alba cærulea*, Swer.

2. *Aquilegia castanei coloris*, Swer.

Hæc diversorum colorum reperitur, cæruleo. candido, incarnato, rubro, variegato ex cæruleo & purpureo: candido, nonnullis veluti lituis cæruleis atpersis.

III. *Aquilegia mont. magno fl.* quæ 1. in Prod.

IV. *Aquilegia montana parvo flore*, Thall. & tri folio: quæ 2. in Prod.

*Aquilegia pleno flore.*

I. *Aquilegia hort. multiplex flore magno.*  
Aquileg. multiflora variegata, Lob. ico. & multiplici vario colore flore, Eid. pleno flore, Cam.  
Aquileia multiplici flore, Dod. multiplex, Ger.  
Aquilina pleno flore, Clus. hist. multiplex sive 5. 6. 7. & 8. Tab.

Flos cæruleus, violaceus, cinereus, blandè saturè rubens, albus, ex albo cæruleo, violaceo variè mixtus, maculatus.

L. Aqu

1. Aquilegia fl. cæruleo pleno, Eyst.  
 2. Aquilegia fl. albo pleno, Eyst.  
 3. Aquilegia fl. pleno incarnato, Eyst.  
 4. Aquilegia flore purpureo, Eyst.  
 5. Aquilegia flore rubro, Eyst.  
 Aquilina flore rubro, Bry, Swer.  
 6. Aquileia variegata, Bry.  
 Aquilegia fl. variegato duplici, Swer.  
 II. Aquilegia hort. multiplex flore parvo.  
 A' priore floris magnitud. & pullo colore differt.  
 III. Aquilegia hort. multiplex flore inverfo.  
 Aquilina plenius multiplicib. flor. Lob. ico. Lugd.  
 Aquilina inverfa multiplici albo colore, Lob. ico.  
 Aquilina pleno inverfo flore, Clus. hist.  
 Aquilegia inverfa, Cam.  
 Aquilina 9. Tab.  
 Aquilina carnei coloris, Bry.  
 Aquilegia alba, Swer.

Aquilegia cærulea inverfo flore, Eyst.  
 IV. Aquilegia flore roseo multiplici.  
 Aquilina pleno roseo flore, Clus. hist. Bry.  
 Floris color communiter cæruleus, est & albus,  
 rariss. carneus sive blandè rubens: vel albus nigris  
 punctis, asperis: hinc  
 1. Aquilegia stellata flore purpureo, Eyst.  
 2. Aquilegia stellata rubescens, Eyst.  
 3. Aquilegia stellata flore violaceo, Eyst.  
 Aquilegia stellata cæruleo violacea, Swer.  
 4. Aquilegia stellata flore albo minutissimis  
 nigris punctis ornata, Eyst.  
 V. Aquilegia degener virescens: & Cam.  
 Aquilegia degener, Lob. ico.  
 Aquilina degener, Clus. hist. Bry.  
 Aquilina 10. Tab.  
 Aquilegia stellata rosea, Swer. (scens,  
 Flos vel viridis omnino, vel ex viridi purpura-

## NIGELLA SEU MELANTHIUM,

ejusq. species.

**N**igella, à nigro seminis colore communiter dicta, Dioscorid. l. 3. c. 95. *Meladon* est: de qua Theophr. 7. hist. 9.  
 Plinio l. 20. c. 17. Gith ex Græcâ, alii Melanthion, alii Melanspermon vocant, & quod odoratissimum &  
 nigrissimum, optimum est.

Genera: Dioscorides & Veteres unius meminere: nobis, sativa est & sylvestris: Sativa, simplici & pleno, ma-  
 jore & parvo flore: semine nigro, subflavo, luteo.

I. Nigella arvensis cornuta.  
 an Melanthium & Gith Dioscoridis.  
 Nigella syl. & 2. Trag.  
 Melanthium syl. Fuch. Dod. Ger.  
 Cuminum syl. alterum, Fuch. ico. Cord. in Diosc.  
 Melanthium syl. alterum, Matth. Cast. Lugd.  
 Nigella syl. altera, Ad.  
 Melanthium capitulis reflexis aquilegiz, Lob.  
 Nigella cornuta, Cord. hist.  
 Nigella vulgò dicta, Cæf.  
 Nigella syl. Gesh. Lon. Cam.  
 Melanthium agreste, Tab. arvense, Clus. hist.  
 Meminit Tab. Melanthii agrestis alterius, quod  
 solis capitulis magis reflexis, à priori differat.  
 II. Nigella latifolia flore majore simplici cæ-  
 ruleo: quæ 1. in Prod.  
 Melanthium Hispanicum majus, Eyst.  
 III. Nigella angustifolia flore majore sim-  
 plici cæruleo.  
 Nigella Damascena, Trag. Cord. hist.  
 Nigella, Cord. in Diosc.  
 Nigella hort. altera, Fuch. Lon.

Melanthium sive Nigella, Ad.  
 Melanthium syl. Matth. Lac. Lob.  
 Melanth. syl. quod Damascenum cognominatur,  
 Clus. hist.  
 Melanth. syl. prius Matthioli, Lugd. qui duas figu-  
 ras habet.  
 Melanth. Damascenū, Dod. Tab. Cam.  
 Melanth. Damascenum alterum, Fuch. ico.  
 Melanthium sativum flore simplici, Eyst.  
 Isopyrū, quod Matth. Durantes, Lugd. & Tab.  
 pingunt: nil aliud censemus, nisi quod folia Anisi  
 infernè sint adpicta, quo Dioscoridis Isoporum  
 exprimere videatur.  
 IV. Nigella flore majore pleno cæruleo.  
 Nigella flore majore & numerosioribus foliis,  
 Suneg. Egyptiis, Alpino.  
 Melanthium Damascenū pleno flore, Clus. hist.  
 Eyst.  
 V. Nigella flore minore simplici candido.  
 Nigella hort. Trag. sativa, Lon.  
 Melanth. sativum, Matth. Lac. Dod. Cast. Lugd.  
 Tab.

T

Melan-

Melanth. i. Fuchico. hortense primum, Eid. fol.  
Melanth. five Nigella Romana odora, Lob.  
Gir five Nigella Romana, Tur.  
Nigellæ alterum genus, Cord. hist.  
Melanthium Ger. sativum simplici flore, Clus.  
hist.

Nigella, Ges. nostra, Ang. altera. Czſ.  
Melanth. Damascenum semine pallido, Cam.

Semine est nigro, aliquando pallidè flavente: semine luteo in horto habuimus: rarius candido reperitur.

VI. Nigella flore minore pleno & albo.  
Cardamomi 3. species, & Nigella citrina, Lac.  
Nigella citrina, Ad. flore albo multiplici, Lob.  
Lugd.  
Nigella flore candido, Czſ.

Semen ex Oriente adfertur, inter Cardamomi genera, & Nigella citrina dicitur, Czſ.

Melanth. citrinum multiflorum, Tab. sub Damasceno, Ger. ico.

Melanthium pleno flore, Clus. hist.

Melanthium five Nigella flore pleno, albo, Cam.

Nigella peregrina flore multiplici, Eyst.

VII. Nigella Cretica.

Melanth. simplici flore, Creticum, Clus. hist.

Hujus descriptionem in Phytopinace sub 6. in Prod. sub 2. & in Matthiolo cum figura exhibuimus: in Tabern. nostro figura sub titulo Nigella flore pleno, malè posita fuit.

IX. Nigella Cretica folio fœniculi.

Melanthium peregrinum five Creticum, Pona in Baldo Ital.

## SECTIO QVARTA.

### UMBELLIFERÆ.

*CUMINUM; FOENICULUM; ANETHUM; MEUM; PIRETHRUM; FERULA; THAPSIA; TURPETUM; PENCEDANUM;*

*Daucus; Pastinaca tenuifolia; Gingerdium; Chere-*

*phyllum; Scandix; Caulis; Apium; Sison; Sion.*

### CUMINUM.

**K**UMINON Dioscoridi l. 3. c. 68. Theoph. 7. hist. 4. at Plinio l. 19. c. 8. & l. 20. c. 14. & 15. *Cuminum*.

Genera: *Dioscoridi sativum est, cui Aethiopicum, quod Hippocrates regium vocavit, præfert: secundum quod tenet Aegyptium, reliqua sequuntur. Est & sylvestre: alterum, capitulis in cacumine rotundis: alterum, quod à singulis floribus, cornicula in sublime erecta promit. Theophrasto genera plura sunt: quare Plinio l. 20. c. 15. Sativum est & sylvestre, Aethiopicum & Africanum: at l. 19. c. 8. alterum sylvestre rusticum vocatum, aliis Thebæcum: Aethiopico Africanis, palina est: quidam huic Aegyptium præferunt.*

I. *Cuminum* semine longiore.  
*Cuminum* sativum, Brunf. Trag. Matt. Lac. Cord. hist. Lob. Cast. Lugd.

*Cuminum*, Tur. Lon. Ad.

*Cuminum* Officin. *Cumini* syl. l. genus Diosc. Czſ.

*Cyminum*, Ang. Cord. in Diolc. (cui & *Cyminum Romanum*) Tab. sativum, Cam.

*Cuminum Aethiopicum*, Carnabadium Calsi Bassi & Myrepſii, Guil.

II. *Cuminum* semine rotundiore & minore.  
*Cuminum* dulce Melitenſibus.

Hujus plantam non vidimus: at cū Dalechampii in Plinii l. 20. cap. 15. notas legiſſemus, ex Melita duplex *Cuminum*, utpote acre & dulce adferri: & apud Megiserum in Melitæ descriptione, idem inveniſſemus, ejus nomine ut haberemus

laboravimus: quare, utriusq; semen è Melita inferla transmissum fuit: alterum oblongum, acuminatum, coloris sordidi, gravedens & sapore acro, cui Cimonagero, id est, *Cuminum* syl. inscriptum erat: quod cum *Cymino* Aethiopico officinarum convenit. Alterum verd multo minus, Anisofimile, candicans, gustus lenioris & subdulce, quod nomine Cimonagero dulce, missum. Apud Melitenſes copiose feritur, ad panem condicendum, & ad mercaturam eum eo exercendam.

III. *Cuminum* syl. capitulis globosis.

*Cuminum* syl. l. Matth. Lugd. Cast.

*Cuminum* syl. Ang. Dod. Ad. Lob. ico. Ger.

Lago chymeni, id est leporis cubile in insula Lemno, Bellon.

*Cuminum* syl. live erraticum, Tab. syl. globosum, Cam.

FOENI-

## F O E N I C U L U M.

**M**ΑΨΘΡΟΝ Dioscorid. l. 3. c. 81. ὁ δὲ τῷ μαρτυρεῖται, à marcescendo, quod ejus cum inaruerit, ad condienda plurima, multum usus sit. Plinio l. 19. c. 9. Fœniculum anguibz gratissimum, ad condienda plurima cum inaruit: & l. 20. c. 23. Fœniculum nobilitare serpentes, gestatu senectam exuendo, oculorumq; aciem succo ejus reficiendo. Latius Fœniculum, quod satum magno cum secore semen reddat: vel potius Græcorum imitatione, quod quasi fœnum in hyemes arefactum ac marcidum reponatur.

Genera: Dioscoridi est sativum, sylvestre, quod ἰσχυρὸν ἐστὶν & duplex est: alterum semine magno, Cachri simile, aliud semine Coriandri. Idem Plinius l. 20. c. 23.

Recentioribus est vulgare sive sativum, dulce, rotundum, & erraticum, sive Hippomarathrum.

I. Fœniculum vulgare Germanicum.  
Fœniculū, Brunf. Trag. Fuch. Dod. gal. Tur. Cord.  
in Diose. Tab. commune, Gef. h. vulgare, Ger.  
Fœnicul. syl. cujus semen exilius & acrius, Cæf.  
Fœniculum nostrum vulgare, quibudam Hippo-  
marathrum putatum, Cam. hor.

Huic accedit Mediolanense, quamvis vulgato Germanico gratus sit.

Variat foliorum colore: nam commune foliis est virentioribus, altera subnigricantibus, rubentibus, aliàs non differens: quare

Fœniculum 1. & 2. facit Dodonæus.

II. Fœniculum vulg. Italicum semine oblongo gustu acuto.

Fœniculum, Matth. Lac. Cast. vulgare, cujus semē pallidum sive luteum oblongum, Lugd.

Fœniculum acre, Ang.

III. Fœniculum dulce.

Fœniculum dulce, Matth. Lac. Ang. Gef. hor. Ad. Cast. Ger. desc.

Fœnicul. 3. Dod. solo sapore à primo distinctum.

Fœnicul. sive Marathrum vulgatius dulce, Ad. Lob.

Fœnicul. hortens. semine crasso in rotunditate ob-

longo, Cæf. quod año secundo in sylvestre transit.

Fœnicul. dulce semine majore, gustu anisi, Lugd.

Fœniculum Romanum cujus semen pallidè lu-

teum, Tab. quod tertio anno in commune transit. Fœnicul. Italicum fortè hortensè veterum, quod etiam in nostrum transit, Cam. ep. Matth. Fœniculum majus, Eid. hor.

Hoc semine est vel rotundiore, quod Romanè & Florentinum dicitur: vel in rotunditate oblongo, quod omnium gratissimum & dulcissimum, & Bononia adfertur.

IV. Fœniculum semine rotundo minore.

Fœniculum rotundum, Tab. vulgare, Ger. ico.

A vulgato sapore & odore nō differt, sed humilior est, umbella candida, semenq; vulgari minus & Carui forma.

V. Fœniculum sylvestre.

Fœnicul. erraticum, Matth. Lac. sponte virens in agris Narbonensium, Adv.

an Hippomarathrum, Ang.

VI. Hippomarathrum Creticum: de quo in Prod.

an Hippomarathrum cujus semina magna cachry similia, Hon. Belli ep. 1. ad Clus.

VII. Chaa, herba in Japonia, ex cujus pulvere decoctū preciosum parant, & hospitibus dignioribus propinant: & olla in qua hujus herbæ decoctio facta, in eo apud ipsos precio, in quo apud nos Adamantes sunt: Linicot. par. 2. Ind. or. c. 28.

## A N E T H U M.

**A**ΝΗΘΟΝ Dioscorid. l. 3. c. 67. ὁ δὲ τῷ ἀνδρα, quod cito crescat: Theoph. 1. hist. 18. cui 7. hist. 4. planta ejus genera, quæ non recenset. Plinio l. 20. c. 18. Anethum.

I. Anethum hortensè.

Anethum, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Tur. Dod. Cord. in Diose. Gef. hor. Ang. Lac. Ad. Lob. Cast. Lon. Cæf. Lugd. Tab. Cam. Ger.

II. Anethum sylvestre majus.

Anethum syl. grandius sativo, foliis fœniculi, Cæf.

III. Anethum syl. minus: in Prod. descriptū.

## M E U M.

**M**ΗΘΝ Ἀθαρραν δὲ μείον, Meum Athamanticum, Diose. l. 1. c. 3. Similiter à Plinio l. 20. c. 23. nominatum, Meum scribit, in Italia non nisi à Medicis feritur, & iis admodum paucis. Duo genera ejus (Macedonicum scilicet & Hispanicum: non quidem ea duo diversa genera sunt: ceterum iis in locis plurimum gignitur: hac

T 2 addit

addit ex Dioscorido Dalechampsius in notis) nobiliss, Athamanticum vocant, illi, tanquam ab Athamante inventum; hi, quoniam laureatissimum in Athamante (monte Phthiotidis Thessalia) reperitur.

I. Meum foliis anethi.

Daucus Creticus, Trag. Fuch. vel alpinus, Ges. col.

Lob. ico.

Meum, Matth. Ang. Ges. hor. Lac. (cui & Anethi syl.) Dod. Ad. Lob. Cast. Cxf. Lugd. Tab. Cā. Ger.

Libanotidis r. genus, & Foenicul. porcinius, Dod.

Seseli Creticum, Fuch. ico. Lon.

(gal.)

Tordylion, Cord. in Diosc. & hist.

Daucus, Cast. ico.

Meum vulgare tenuifolium, Clus. hist.

II. Meum Dauci Cretici facie.

Meum aliud, Lugd.

III. Meum alpinum umbella purpurascens.

Mutcellina vulgo in albis, Caros vel Daucus

alpinus videtur, Ges. hor. & frac. Cam. ep. Math.

an Daucus montanus, Clus. pan. & hist.

IV. Meum latifolium adulterinum.

Meum secundum, Matth. ed. secunda.

Meum spurium alterum Italicum, Lob. Lugd.

Meum adulterinum, Tab.

## P Y R E T H R U M.

**P** *ῥεθρον* Diosc. l. 3. c. 86. ab igne nomen habet, ob radicis ejus fervorem ignem. Salivariis Romanis, quod mansa Salivam eliciat. Apud Plin. l. 28. c. 9. Pyrethri nomen solum habetur.

I. Pyrethrum flore bellidis.

Pyrethrum, Brunf. Trag. Fuch. Tur. Dod. Lac.

Pyreth. Germanicum, Ges. hor.

Pyreth. alterum, Matth. Lugd. Cxf. Cam. primū.

Pyrethrum majus, Lon. verum, Cast. (Tab.)

Pyrethrum Officinatum, Ad. Lob. Ger. Eyst.

II. Pyrethrum umbelliferum.

Foeniculum montanum, Trag.

Pyrethrum verum, Math. Lugd.

Pyrethrum Italicum, Ges. hor. ap.

Pyreth. alterū, Ad. Lob. Cast. Tab. sylvestre, Ger.

an Pyrethrum, Cxf.

Saxifragæ species, Dod. 8.

Pyrethrum Dioscoridis 1. Cam.

Umbella variat, quæ alba: at Patavino in herbis

luteâ, longioribusq; foliis collegimus.

III. Pyrethrum foliis anethi.

Pyrethrum Gesneri, Lugd.

## F E R U L A.

**N** *ῥαῖς* Diosc. l. 3. c. 91. *ῥαῖς* *ῥαῖς*, Theoph. 6. hist. 2: id est, Gaza interprete, Ferula & Ferulago. Plin. l. 13. c. 22. Ferula.

Genera duo Ferula Plinio: Nartheca Græci vocant, in altitudinem assurgentem. Nartheciam verò semper humilem: & Ferula sine dubio est Thapsia, sed sui generis &c. Er. l. 20. c. 23: Ferula, quæ ab una caule dividitur in cucurmine, semina putatur.

I. Ferula foemina Plinii.

Ferula, Matth. Ang. Tur. Lac. Cord. in Diosc. Ges.

hor. Lon. Ad. Lob. Dod. Cast. Lugd. Tab. Cam.

Ferula mas, Cxf.

Libanotis prima Dioscoridis ferulacea, Ges. hor.

II. Ferulago latiore folio.

Ferulago, Ges. Dod. Cam.

Ferula galbanifera, Lob. Lugd. Tab.

Ferula foemina, Cxf.

Quibuscūq; Narthecia Theoph. & Thapsia Dioscoridis.

III. Ferulago tenuiore folio.

Narthecium Theoph. Ferulago Gaza, Lugd.

Ferulago, Tab.

## T H A P S I A.

**Θ** *ῥαῖς*, quod in Thapsia, ejus nominis Insula primum inventa, Diosc. l. 4. c. 157. quæ tota natura Ferula similis: meminere Thapsia Theoph. 9. hist. 8. & Plin. l. 13. c. 22.

I. Thapsia maxima latissimo folio.

Thapsia 3. Clus. hiip. & hist.

II. Thapsia latifolia villosa.

Thapsia latifolia, Clus. hiip. Tab.

Thapsia 1. Clus. hist.

Seseli Peloponense majus, Lob. peloponense ut putatur Dod.

Seseli peloponense 1. Tab.

Seseli peloponense folio cicutæ, Ad. Lugd.

III. Thapsia foliis libanotidis foetidissima.

Tuero, Clus. hiip.

Thapsia 4. Clus. hist.

IV. Thapsia foeniculi folio.

Thapsia Diot. Ad. Lob. Lugd.

Thapsia 2.

Thapsia 2. vel tenuifolia, Clus. hisp. & hist.  
Thapsia angustifolia, Tab. tenuifolia, Ger.  
V. Thapsia carotæ folio.  
Thapsia, Matth. Ang. Lon. Lugd. Cast. Cæs. cui &  
Turbitalbum Mesuei.  
Thapsia major, Cord. hist.

Thapsia vera & Turbith montis Gargani, Ges.  
hor.

Thapsia vulgaris carotæ effigie, Ad. Lob.  
an hæc Ferula Sagapenifera.

Hujus radix sæpè pro Costo, magno errore vè-  
ditur, uti supra inter Costi genera ostensum fuit.

## T U R P E T U M.

**T**urbith vox Arabica est, ab Avicenna & aliis usurpata, quamvis aliqui à turbando deducant, quod propter magnam violentiam, purgando corpus turbet. Duplex est, aliud Arabicum, aliud Indicum. Arabicum, Mesueo 2. simpl. est radix herba, folia Ferula minor a ferentis & lacteo succo turgentis: quæ sanè causa, cur alii Pityusa, alii Alypi, nonnulli Tripolii Græcorum radicem esse voluerint: cujus genera varia Mesueo, domesticum, sylvestre, magnum, parvum, album, nigrum & flavum. Indicum, radice non est magna, nec longa, caule hederæ modo per solum extenso, digiti crassitudine: foliis & floribus Althææ similibus, cujus tantum caulis pars inferior juxta radicem gummosa, utilis est, Acofta, Frag. Dodonæo ex Garzia monentibus. Quare hoc ab eo: quo in Officinis vulgo u-  
tur, longe aliud est, monente etiam Clusio in Garziam. Idcirco inter se differre volunt, Turbith Avicennæ, & Turbedh aut Turbadh.

I. Turpetum Arabum, seu Turbit Offinarum.  
Turbith Mesuei, Matth.  
Turbium sive Turbit Arabum, Cord. hist.  
Turbith Alexandrinum, Ad. Lob. ico. Ger. Cast.  
Tripoliū Diofc. si Serapioni credimus, nil aliud est quam Turbith, Cord. in Diofc.  
Turpetum Mesuei, tithymalli myrsinitis radix, Brat. at Fuch. Thapsiæ radix.  
Turbith. Off. & Hispaniæ officinæ, Thapsiæ radice pro Turpeto legitimo utuntur, & multis per Europam locis, Scammoneæ radicem concitam pro Turpeto legitimo ostendunt, Clusio in Garz.  
Turpetum, Tab.

Addit Fragosus Turbit aliud genus, à paucis annis in Officinis usitatum, quo vocentur de la Tier-  
ra, quod quarundam arundinum radicem esse dicant.

II. Turpetum repens foliis Althææ, vel Indicū.  
Turbith Garziæ, Acoftæ, Trag. Dod.

III. Pseudoturpetum Garganicum.  
Turpetum, quod potius Pseudoturpetum dixeris, ex Gargano Apuliæ monte duplex, unū de Thapsiæ, alterum de Pityusæ radicibus, impostores concinnant, Garz.

Turbith ex Apulia, turbith non est, sed ex lactariis, & secundum aliquos Thapsia, Acoftæ.

## P E U C E D A N U M.

**P**eucesus & Diofc. lib. 3. cap. 92. Theoph. 9. hist. 14. etsi sint qui velint, nomen ab amaritudine sortitum esse, tamen à πῦξ, quæ Lat. Pinus, dictum videretur, cum hujus folia cum Pimi foliis similitudinem quandam habeant: unde & Pinafellum aliquibus nominatur. Peucedanum Plin. lib. 25. c. 9.

I. Peucedanum majus Italicum.  
Peucedanum, Matth. Ang. Lac. Lugd. Cæs. Cast.  
Peucedanum Italicum, Tab.  
Peucedanum majus Italicum, Lob. Lugd. majus, Ger.  
Peucedanum foliis longioribus, Dod.  
II. Peucedanum Germanicum.  
Peucedanum, Trag. Fuch. Dod. Cord. in Diofc.

& hist. Ges. hort. Tur. Ad. Lob. (cui & Fœniculum porcinum). Lon. def. Lugd. Ger. Tab. cui & cauda porcina.

III. Peucedanum minus.  
Saxifraga 3. Matth. Lugd. Cast.

Saxifragum, Lac.

Peucedani facie pusilla planta, Lob. ico.

Peucedanum Pannonicum, Clus. pan. & hist.

## D A U C U S.

**Δ**αῦξ Diofc. lib. 3. cap. 85. Daucus, Dancum, & Dauchium Latinis.  
Generatim Diofc. primum Creticum folii sæculi: alterum apio sylvestri simile: tertium foliis Cocardii. Dioscles verò 1. 3. de Julub. quartum addidit, nempe Staphylæum. Plin. lib. 25. cap. 9. ait: Dauci genera quatuor, Petronius Diodorus fecit, cum sint differentia due: præcipue in Cretæ sæculi similitudine: alterum  
foliis

*foliū Coriandri: si tertium genus facere libeat, est simile Staphylino, quod Pastinacā erraticā appellant. Idem lib. 19. cap. 5. Pastinaca quartum genus, quam nostri Gallicā vocant, Græci vero Daucon, cuius generā etiam quatuor fecere. De Dauco Theophrasti capite sequenti.*

I. *Daucus foliis fœniculi tenuissimis.*

*Daucus 1. Matth. Lugd.*

*Daucus, Lac.*

*Daucus Cretensis verus Diosc. Ad. Lob. ico. Ger.*

*Daucus Creticus, Cast. desc. Gef. Tab.*

II. *Daucus alpinus multifido longoque folio, sive montanus umbellā candida.*

*Daucus Creticus, Gef. hor. Cam. ep. Matth. & hor. Clus. pan.*

*Daucus montanum, Cæf.*

Variat aliquantum: nam qui in Baldo, foliis est brevioribus compactoribus: qui versò in Helveciorum alpiibus & monte Wasserfalli longioribus & rarioribus: & hujus Gef. in ap. meminit, quem cum eo in Baldo eundem, aut certè similem, & earundem virum scribit.

III. *Daucus mont. multifido brevique folio. Saxifraga Pannonica, Clus. pan. & hist.*

IV. *Daucus mont. multifido folio Selini semine.*

*Selinum mont. pumilum, Clus. pan. & hist.*

*Oreoselinum, Tab. ico. Ger. tertium, Tab. fol.*

V. *Daucus mont. apii folio major.*

*Daucus 2. Trag. (cui & Seseli 2.) Matth. Lugd.*

*Dauci 3. genus, Fuch.*

*Libanotidis alterum genus, Dod. gal. Lugd.*

*Libanotis nigra Dodonæi, Gef. hor.*

*Seseli peloponense, Fuch. ico. Gef. hor. Cam.*

*Elaphobolcum nigrum, Lon.*

*Saxifraga Venetorum, Ad.*

*Daucus Selinoides 2. Ad. Lob.*

*Seseli pannonicum 2. Clus. pan. ico. 2. montanum, Eid. hist. ico.*

*Libanotis nigra, cōmuniter Cervaria nigra, Thal.*

*Libanotis Theoph. nigra, Tab. Ger.*

Varietas: 1. est foliis pallide virentibus & splendentibus. 2. foliis latioribus, forte ob culturam, quam Pseudo-costum Cortusius nominabat. 3. foliis minus divisis, supina parte dilutius virentibus & aliquantulum splendens, prona subcinereis, quam Cervariæ nigræ nomine, Lipsiâ D. Jungermannus misit.

VI. *Daucus mont. apii folio minor.*

*Apium montanum & Oreoselinum nigrum, Gef. hor.*

*Dauci secundi Selinoidis varietas, sive Selinoides Cordi, Lob. obsf.*

*an Daucus Selinoides latifolius, Cord.*

*an Apium sylvaricum, Thal.*

VII. *Daucus mont. apii folio albicans.*

*Seseli 2. mont. pannonicum, Clus. hist. deic. Seseli peloponensis Jenensium nomine, D. Jungermannus misit.*

IX. *Daucus mont. apii folio flore luteo: qui in Prodomo.*

IX. *Daucus prat. apii folio: qui 2. in Prod.*

X. *Daucus campeltis apii folio.*

*Dauci 2. genus Dalechampii, Lugd.*

*an fortè Pimpinella Saxifraga.*

XI. *Daucus petroselinii vel coriandri folio.*

*Bunium Dalechampii, Lugd.*

XII. *Daucus Creticus nodosus umbellā lutea.*

*Daucus 3. Cret. Belli, Ponæ & ep. 1. ad Clus.*

XIII. *Daucus pratensis millefolii palustris folio.*

*Daucus prat. Dalechampii, Lugd.*

Hic foliis & umbellâ, quæ tamen alba est, cum Millefolio aquatico Matthioli convenit, foliis tamen inferioribus, Coriandro similibus, exceptis.

## PASTINACA.

Σ *ταρυν* & Diosc. lib. 3. cap. 59. fortè à colore uva nigricantis, cuius coloris, unius radix est: qui sylvestris, in cuius umbellâ candida medio, exiguum quid coloris purpurei, cernitur: & etiam sativi meminit. *Saxif. & Theophrasto (Pastinacā Gaza vertit) 9. hist. 15. cui Daucus specie Lauri, colore croci apud Archades nascitur: & in Patrensi agro præstantior ceteris: hinc vis calefactoria est, radix nigra: & c. 22. Daucum agro Spartensi Achæi laudatissimam referunt: naturâ calefactoriam, radice nigram.*

*Pastinaca (qua à pascido dicta videtur, cum corpus alat) nomine, Latinis quatuor plantas significari, Plin. lib. c. 5. ostendit; Pastinacæ, inquit, unum genus agreste, spontè provenit. Staphylinus Græcè dicitur: alterum feritur radice, vel semine: est & quartum genus in eadem similitudine Pastinacæ, quam nostri Gallicā vocant, Græci vero Daucon: at lib. 20. cap. 5. Staphylinus, pastinacā erraticā appellant.*

Duple



*Duplex est Pastinaca, tenuifolia & latifolia: de tenuifolia tam sativa, quam sylvestri nunc: de latifolia, sectione quinta.*

I. Pastinaca tenuifolia syl. Dioscoridis, vel Daucus Officinarius.  
Daucus agrestis, Gal. de alim.  
Pastinaca erratica, Plinio, Fuch. Cord. in Diosc. Tab.

Staphylinus syl. Trag. Dod. gal. Cæf.  
Pastinaca syl. Matth. Lac. Lon. Cast. Lugd. syl. tenuifolia, Dod. Ger.

Daucum Officin. usitatus, Ad.  
Pastinaca syl. genuina Diosc. Lob.  
Pastinaca 2. Tur. 4. Plinii, Cam.  
Dauci 3. genus, Dod. gal. Thal.  
Daucus vulgaris, Clus. hist.

Differt magnitudine & parvitate: sic & ratione umbellæ, in cuius medio aliquando macula purpurea, subnigræ, aliquando crocea: foliis etiam, aliquantum laxioribus, in altera multo tenuioribus: quare Thalius illam, Daucum 3. Dodonæi, hanc verò Daucum 3. tenuifoliū nominat.

II. Pastinaca tenuifolia syl. umbella majore.  
Pastinaca syl. daucoides Apula, Col.

Umbellæ est majore, obscure purpurascens, quæ non in totum, ut in priore, conglobatur.

III. Pastinaca syl. hirsuta echinato fructu.  
an Daucus angulosus, Cordi hist.  
Daucus *ασπιδωλης*, i. e. hirsuto caule, Thal.

IV. Pastinaca syl. angustifolia fructu echinato.  
Pastinaca echinophora Apula, Colum.  
Hanc à D. Columna accepimus.

V. Pastinaca tenuifolia sativa radice lutea, vel alba.  
Staphylin. sativus & Daucus domesticus, Galeno.

Staphylinus 1. & 2. Trag. luteus, Dod. gal.  
Sifer, Lac. alterum, Matth. Tab.

Carota crocea malè Sifer, Guil.

Pastinaca sativa 1. Fuch. sativa flava, Lon.

Pastinaca sativa 1. & 2. Tab.

Pastinaca radicibus luteis, vel albis, Gef. hor.

Pastinaca sativa Diosc. Lob. Cord. in Diosc.

Pastinaca tenuifolia sativa, Dod. Ger.

Carotta vulgaris radice flava, Ad.

Carota radice buxæ coloris, Cæf. ex albo flavescens, Cast. nostra lutea, Cam.

Pastinaca 3. Daucus Staphylinus altis & hortensis, vulgo Carotta, Cam. hor.

Variat solum radicis colore, quæ vel alba, vel pallidè lutea, vel lutea est.

VI. Pastinac. tenuifolia sativa, radice atrorubente.

Staphylinus sativus Dioscoridi.

Daucus radice nigra, Theophrasti.

Pastinaca sativa, Plinii.

Staphylinus 3. Trag. niger, Dod. gal.

Carota, Matth. altera, Lugd. radice sanguinei coloris, Cæf. radice rubra, Cast.

Pastin. sat. altera, Fuch. prima, Tur. sativa rubens, Dod. Tab. atrorubens, Lob.

Daucus niger Theoph. Carotta vulgaris, Ad.

Pastinaca radicibus purpureis, Gef. hor.

Been rubrum & album, an Daucus sativus & syl. Galeni, Ang.

Carota Italica radice rubra & alba, Been rubri & albi *απὸ καλλόμυρα* esse volunt aliqui, non malè, Cam.

## GINGIDIIUM.

*Πυρέθρον* Dioscorides lib. 2. cap. 167. herbam sylvestri Staphylino similem dicit: & Plin. lib. 20. cap. 5. *Gingidium* similem Staphylino.

I. Gingidium folio fœniculi.  
Gingidium Dioscoridis, Raw. Lugd. ap.  
Gingidium Syriacum, Cam.

II. Gingidium umbella oblonga.  
Seseli, Trag. ico.  
Vitisnaga, Matth. Ad. Lob. Lugd. Cast. & Pastin. syl. major.

Gingidium, Ang. Cord. in Diosc. & hist. Dod. gal.  
Clus. hist. cui & Bisanaga.  
Seseli Malsilienfe, Fuch. Dod. gal. ico.

Dauci genus tertium, Fuch. ico.

Cumini sativi alterum genus, Cæf.

Gingidium alterum, Dod. tertium, Tab.

Gingidium Hispanicum, Ger.

III. Gingidium foliis Chæresolii.

Gingidium, Matth. Lugd. Cast. primum, Tab.

IV. Gingidium foliis Pastinacæ latifoliæ.

Gingidium foliis Baucis Syriacum, Lob. Lugd.

Gingidium 1. Dod. 2. Tab. (& latifolium) Ger.

CHÆ

## CHÆROPHYLLUM.

**C**hærophyllo Columella habet: an Plinii lib. 9. cap. 8. sit Chærophyllo, quod Pederot & Graci vocitant, propter brevitatem asserere non licet: & potius ejusdem Anthriscus, lib. 8. cap. 22. fortè Theophrasti 7. hist. 9. ἐνθεός. Enthuscum Gaza vertit. O'psoria: vero Dioscoridis quibusdam videtur.

I. Chærophyllo sativum.  
Cherofolium, Brunf. Dod. sativum, Trag.  
Cerefolium, Matth. Cast. Lugd. vulgare, Ger.  
Cerefoliū, Ang. Dod. gal. Gef. hor. Lon. Ad. Lob.  
(cui Gingidii species) Cæf. Cam. Tab.  
Oreofelinum, Ang. & Cæf. putant  
Gingidium, Fuch. Tur. Lac.

II. Chærophyllo sylvestre.

Dauci syl. genus, Gef. ap.  
Daucus sepiarius, Gef. col.  
Anthriscus Plinii, Lugd.  
Cerefolium syl. Tab. Apium syl. Ger. 100.  
III. Chærophyllo nonnihil similis.  
Percheper (i.e. Saxifraga) Anglorum, Ad. Lob.  
Scandix minor, Tab. (Lugd.)  
Alchimilla montana minima, Col.

## SCANDIX.

**Σ**καδίζ Dioscoridi lib. 2. cap. 168. sylvestre olus est, quod Gingidio subjungit: Theophrasti 7. hist. 3. Plinii lib. 8. cap. 22.

I. Scandix umbella ex apicibus coagmentata.  
Scandix, Lugd.

II. Scandix femine rostrato vulgaris.  
Peſten Veneris, Matth. Ang. Gef. hor. Ad. Lob.  
Cast. Lugd. Cam. Ger.  
Scandix, Dod. Lac. Cord. in Diof. Gef. h. Cæf. Tab.  
Peſten Veneris, ἀγροειδὴς vulgo dicitur, Hon.  
Belli ep. ad Cluf.

III. Scandix Cretica major: quæ 4. in Phytopin. prima in Prod.

IV. Scandix Cretica minor: quæ 3. & 5. in Phytopin. at 2. in Prod.

Anthriscus Plinii, Cluf. hist.  
Anthriscus vulgo τῆς πορδίας, quod vulgæ purgamentum significat, cum Venerem excitat, Hon.  
Belli ep. ad Cluf.  
an Scandix legitima quæ τῆς ἰσθμίου & σκαδίου quæ comeditur, Eid. 1. 1.  
Antiomarathum Apulum, Colum. & Cluf. hist. ap. alt.  
an Apium syl. Dalech. Lugd.  
Duplex est odora & inodora.

## CAUCALIS.

**K**αυκάλις apud Dioscorid. 1. 2. c. 169. Scandicem sequitur, quam aliqui Daucum syl. nominant. Plin. lib. 21. c. 15. secutus Dioscoridem, inter Olera recensuit.

I. Caulalis maxima Sphondilii aculeato femine.  
Caucalis major, Cluf. hist.

II. Caulalis lato apii folio.  
Caucalis, Matth. Lac. Cast. Lugd.  
an Caulalis, Cord. in Diof.  
Daucoides majus, Cord. hist. Thal.  
Caucalis vulgatio, Ad.  
Caucalis flore rubro folio latiore, Lob.  
Caucalis rubello flore, Cluf. hist.  
Gingidium, Cæf.

III. Caulalis arvensis echinata latifolia.  
Echinophora major platyphyllos purpurea, Col.

an Caulalis saturè rubente flore, Cluf. hist.

IV. Caulalis arvensis echinata magno flore.  
Lappa agrestis, Trag.

Lappula canaria Plinii, Ang.  
Caucal. Dod. (& Daucus syl.) Gef. hor. Tab. Eycl.  
Caucalis alia vulgaris, Lugd.  
Caucalis albis flor. vulgaris, Lob. Ger. albo flore proxime ad Dioscoridis accedens, Cluf. hist.  
Caucalis coronata umbella, Cam.  
Tribulus syl. & Lappa campestris, Lon.  
Myrrhis lappa Dalechampii, Lugd.  
Dauci genus arvenſe, Gef. cat.  
Daucus ἀγροειδής seu ἰσθμίου, sive ἐνθεός minor, Thal.  
Echinophora πικράνη, an Gingidium Diof. Col.

V. Caulalis arvensis echinata parvo flore & fructu.

Caucalis flore minuto, Cam.  
an Echinophora 3. leptophyllon purpurea, Col.

VL. Cau-

VI. *Caucalis Monspeliaca* echinato magno fructu.  
*Lappa boaria* Plinii, Lugd.  
*Caucalis* 2. Tab.  
*Daucus* *χιδάκων* & *ξυδιδάκων* major, Thal.  
*Echinophora* alt. asperior *μαρύκων*, Col.  
 VII. *Caucalis* semine aspero flosculis rubentib.  
*Daucoides* minor, Cord. hist. Thal.  
 IIX. *Caucalis* nodoso echinato semine: quod 7. in Phytop. at 1. in Prod. & in Matth. nostro descriptum.

*Scandix*, Colum.

IX. *Caucalis peregrina* semine angosa.  
*Caucalis Hispanica*, Cam. Clus. hist.  
*Gingidio* congener, Cæf.  
 X. *Caucalis tenuifolia montana*: quæ 2. in Prod.  
 XI. *Caucalis pumila maritima*.  
*Caucalis pumila*, Clus. cur. post.  
 XII. *Caucalis folio peucedani*.  
*Caucalis*, Anguil. Ad. Lob. tertia, Tab.  
*Caucalis Anglica*, Eid.  
*Caucalis* Penæ, Lugd.

## A P I U M.

*Σελίνιον*: *Dioscorides* 1. 3. capitibus sex 7. 4. & seq. proposuit; *hortense*, *ιαμασσίλιον*, in humidis: *πετροσίλιον* in montosis: *μαροσίλιον* in Macedonia: *ιπποσίλιον*: tandem *αμύρινον* in Cilicia proveniens. Theoph. hist. 4. de *Selino* egit, cuius plura esse genera 6. caus. 22. scribit: hac 7. hist. 4. inter se cum foliis, tum caulibus differunt: aliud enim folio spisso, crispo, densog; aliud rariore, latioreq; cauleq; majore: horum iterum aliud candidi caulis, aliud purpurei, aut versicoloris. *Plinius* lib. 20. cap. 11. de *Apio*, *Hippofelino*, *Eleofelino*, & *Oreofelino*: & cap. seq. de *petroselino* & *buselino* egit.

I. *Apium hortense*, seu *Petroselinum* vulgo.  
*Selinon* seu *Apium*, Theoph. & *Dioscor.* *Apium mas*, Plinii.  
*Petroselinum*, Brunf. Trag. Cord. in *Diosc.* Ang.  
*Petrocel.* vulgare seu *fativum*, Lon.  
*Petroselin.* syl. Fuch. ico. vulgo *Apium* veterum, Gef. hor.  
*Oreofelinum*, Fuch.  
*Apium hort.* Matth. Lac. Dod. Ad. Lob. Cast. Ger.  
*Apium* commune, non rectè *Petroselinum*, Gef. hor.  
*Petroselinon* vulgi, *petroselinum* verum prisconum, Guil.  
*Apium domesticum*, Cæf. *fativum*, Tab.  
*Apium fativum* vulgare sive *Petroselinum*, Col.  
 II. *Apium* vel *Petroselinum crispum*.  
*Petroselinum crispum*, Cam.  
*Apium hort. crispatum*, Ad. Lugd.  
*Apium crispum* vel multifolium, Tab. Ger.  
*Apium fativum* Sardinum, Col.  
 III. *Petroselinum Creticum*.  
*Agriopastinaca* vulgo in Creta, Belli ep. 5.  
 Duplex est, colore corticis radicum tantum differens: nam unius rufus, alterius niger conspicitur.  
*Buselinon* fortè Plinii 1. 20. c. 12.  
 IV. *Apium hortense latifolium*.  
 an *Apium verum*, Ang.  
 an *Apium fativum Anglicanum*, Col.

Hoc in Phytopinace, Matth. & Prod. descriptum.

V. *Apium montanum* folio tenuiore.  
*Petroselinum Dalechampii*, Lugd.  
 an *Petroselinum succedaneum*, quod in *Apulia* *Anethum* syl. dicitur, Col.

VI. *Apium montanum* folio ampliore.  
*Oreofelinum* sive *Veelgutta*, id est multibona, Dod.  
*Oreofelinum*, Ad. Lob. (sive *Petroselinum*) Clus. hist. Ger.  
*Oreofelinum primum*, Tab.

*Apium montanum*, Cast. Lugd.  
 Variat ratione loci, nam foliis tenuius divisus, in nostris pratis udis Michelfeldæ reperitur.

VII. *Apium syl. lacteo succo turgens*.  
*Apium syl.* Dod. Lugd.  
*Daucus palustris*, Gef. hor.  
*Ossenichium*, Cord. hist. Thal.  
*Thyselinum* Plinii, Lob.

IIX. *Apium montanum nigrum*.  
*Oreofelinum Parisiensium*, Lug.

IX. *Apium peregrinum* foliis subrotundis.  
*Selinum peregrinum* 1. Clus. hisp. & hist.  
*Saxifraga* 3. Cæf.

*Daucus* 3. *Diosc.* 2. Plinii, Col.

X. *Apium peregrinum* cicutæ folio.  
*Selinum peregrinum* 2. Clus. hisp. & hist.

V

Oreo



## SECTIO QUINTA.

*PASTINACA LATIFOLIA; SISARUM; ANGELICA; IMPERATORIA; LASERPITIUM; PANAX; SPONDYLIIUM; LIBANOTIS; Carui; Coriandrum; Anisum; Ammi; Pimpinella; Myrrbis; Cicuta & Cicutaria; Sefeli; Ligusticum; Bulbocastanum; Oenanthe & Filipendula; Pedicularis seu Fistularia, & Barba capræ.*

## PASTINACA LATIFOLIA.

**Ε**ΛΑΦΟΒΟΣΚΟΝ Diofcoridi lib. 3. cap. 80. & Plinio lib. 6. cap. 22. id est, pabulum cervi, hoc enim pabulo cervos serpentes resistere fama est, Diofco. & Plinio auctoribus.

I. Pastinacea fativa latifolia.  
Pastinacea fativa, Trag. Lac. ico. Lug. Gef. h. Cam.  
Pastinacea vulgaris. Dod. gal. Cæf.  
Pastinacea domestica, Matth. Ang. Cast. Ad. Lob.  
Pastinacea latifolia fativa Dod. latifolia syl.  
Ger.  
Sisarum fativum, magnum, Fuch. Tur.  
Sifer Diofcoridis, Col.  
Elaphobosum fativum, Tab.  
II. Pastinacea syl. latifolia.

Pastinaca, Brunf. syl. Trag. Ang. Cord. Gef. hort.  
Thal. Cam. sponte nata, Cæf.  
Sifer syl. Fuch. Tur.  
Elaphobosum, Matth. Dod. gal. Cast. syl. Lac.  
Bauca, Pastinaca syl. Arabum, an Elaphobosum, Ad.  
Elaphosum erraticum, Tab.  
Pastinaca syl. gallica, Cord. in Diof.  
Pastinaca latifolia syl. Dod.  
Spondylium, Ger.

## SISARUM.

**Σ**ΙΣΑΡΟΝ Diofcoridi lib. 2. c. 139. vulgo cognitum, cujus radix elixa, origrata est. Sifer Plinio l. 19. c. 5. quod olim in Germania cibi causa ferebatur, quare eam quotannis à Germanis Tiberius Cæsar, Plinio scribente, flagitavit.

I. Sisarum Germanorum.  
Sifer, Brun. Matth. Cord. in Diof. Gef. h. Lon. Cam.  
Sifer alterum, Lac.  
Sifer fativum, Fuch. minus, Tur.  
Sisarum, Trag. (& Rapunculus hortensis) Dod.  
Ing. Ad. Lob. Tab. Ger. majus, Lugd.

Sifer Germanicum, Cæf. cui Elaphobosum Diofco. & Plinii.  
Elaphobosum Diofcoridis, Col.  
II. Sisarum Syriacum.  
Secacul Arabum & Maurorum five Pastinaca Syriaca, Rauw. Lugd. ap.

## ANGELICA.

**A**ngelica, quam aliqui ad Smyrnum, alii ad Laserpitium five Silphium Cyrenaicum referunt: etiam S. Spiritus radix dicitur, vel à radice suavissimo odore, vel à facultate singulari, qua contra venena valet.

I. Angelica fativa.  
Angelica, Brun. Ang. Gef. hor. Lac. Ad. Lob. Cast.  
Fab.  
Angelica major, Dod.  
Angelica fativa, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. Lon.  
Lugd. Cæf. Ger.  
Angelica odorata, Gef. col. Cam.  
Smyrnum, Cord. in Diof. & hist.  
Laserpitium, Lac.

Variat radice; nostra enim crassior, Bohemica minor & nigricans: illa citius, hæc tardius corripitur.

Huc referenda est Angelica Scandiaca, five Archangelica Tabernæ montani, quæ umbella est flava, semine rotundiore, & ex Norvegia ac Pomerania adfertur.

II. Angelica sylvestris major.  
Angelica syl. Trag. Matth. Fuch. Dod. Lon. Ad. Lob. Lugd. Thal. Cam. Tab. Ger.

In locis humidioribus, foliis est tenuioribus.

III. Angelica syl. minor five erratica.

Pycnocomos, Brunf.

Angelica vitium (& Osteridium syl.) Trag. Lon.  
Herba Gerardi, Dod. Ger.

Elaphobosco simili, Cord. in Diosc.  
 Corchorus quibusdam, Gef. hor.  
 Podagraria, Ad. Lob. Caff.  
 Angelica erratica, Thal. syl. communis, Cam.  
 Eupodium, Tab.

Foliorum incisuris mirè variat.

IV. Angelica syl. hirsuta inodora: in Prodr.  
 descripta.

Herba Podagrariæ cognata, Franco.

V. Angelica syl. montana.

Archangelica, Clus. pan.

Angelica, Caff. Huc etiam referenda.

Angelica minor montana, Tab.

VI. Angelica aquatica.

Archangelica, Lob. Dod. Clus. pan. & hift. Caff.

Lugd. Cam.

Angelica aquatica, Gef. hort. & col.

Angelica altera, Caff.

## IMPERATORIA.

Imperatoria, quæ ob raras & præstantes facultates, sic nominata fuit, inter Laserpitium & Panacem media videtur.

I. Imperatoria major.

Astrantia, Brunf. Gef. hor. & col. Dod. Clus. hift.

Smyrni hortense, Trag. Gef. hor.

Laserpitium Germanicum, Euch.

Lasér sive Laserpitium, Tur.

Struthion, Cord. hift.

Ostrutium, Dod. gal. Lon.

Imperatoria, Matth. Gef. hor. & fra. Lac. Ad. Lob.

Caff. Lugd. Tab. Ger.

Ligusticum, Ang.

Herba rena vulgi, Caff.

Magistrantia, Cam.

II. Imperatoria minor.

Imperatoria vel Astrantia alpina, Cam. ep.

## LASERPITIUM.

Laserpitium; Σιδιον Dioscoridi lib. 3. cap. 94. cujus caulis ferulaceus μάσλιον appellatur, folia sunt apu-  
 similia, semen verolatum: ex cujus caulibus & radice incisif, εἴς θ. i. e. succus colligitur: quibusdam cau-  
 lis σιδιον: radix, μαζιδιεύς, & folium μάσλιον dicuntur: sic Theophr. & hift. 3. Silphium: cujus folium ma-  
 ssetum vocant: Et Plin. lib. 19. cap. 3. Laserpotium, quod Græci Silphion vocant; in Cyrenais provincia repertum,  
 cujus succum Lasér vocant: Avicenna planta Lasérifera: Alitibi dicitur, interpretum aliqui Asam reddunt, forte vocè  
 ex Lasér corrupta.

I. Laserpitium veterum.

Silphion, Dioscoridis & Theophrasti.

Laserpitium, Plinio.

Alitibi Avic. Asa quibusdam.

II. Laserpitium Gallicum.

Laserpitium, Ad. Lob. (sive Silphium) Lugd.

Laserpitium Malsilioticum, Tab.

## PANAX.

Πανάξ, quasi πᾶσι ἀνθ, omnibus remedium adferens, cujus Theophr. 9. hift. 10. genera quatuor: 1. Syriacum:  
 2. Chironium: 3. Aesculapicum: 4. Herculanum: Chironium foliorum utriusque simili: Aesculapium,  
 folio Thapsia: Herculanum, folio magno & amplo, ut quoquoque versus tres palmos perficiat. Dioscoridi lib. 3. c. 55. 56. 57.  
 tria genera sunt: πᾶναξ ἡγεῖται, ex quo Opopanax colligitur, foliis ficulneis, quinque partitis: πᾶναξ ἡγεῖται, foliis  
 foliis faniculi: πᾶναξ ἡγεῖται, folio amaraci.

I. Panax Pastinacæ folio, an Syriacum Theophr.

Sagapenum existimatum, Gef. hor.

Panaces peregrinum, Dod.

Panax altera recentiorum Olusatris aut Pastinacæ

folio, Ad. Lob.

Panax Chironium, Lug. hereuleum: 2. Tab.

Panax hereuleum majus, Ger.

an Panacis heraclei alterum genus, Caff.

Σαγαπένιον Sagapenum & Serapinum in Offici-

nis, an huius forte lachryma, cum sit plantæ

ferulacæ in Media provenientis, medio inter  
 succum Silphii & Galbanum colore, Dioscor. lib.  
 c. 95.

II. Panax costinum.

Costus, Matth. Lon. vulgaris, Cam. ep.

Costus spurius, Matthioli. Lob. ob. Cam.

Pseudocostus, Matth. Lug.

Herba costa, Caff.

Panax Chironium Theophr. Cam.

Panaces costinum & Costus Illyricus, Tab.

III. Pa-

III. Panax sphondylii folio five Hera-  
cleum.

Panaces Heracleum, Matth. Ang. Gef. hor. Lac.  
Cast. Lugd.

Panax Heraclium Herculeæ, five Heraclia fronde  
pastinacæ, Ad.

Panax Heracleum; Lob. Dod. Ger.

Panax Herculeum, Cæf. primum, Tab.

Sphondylium alterum, Dod. 8.

Floribus est albis, luteis dicit Diosc. tales se vi-  
disse, Lobelius testatur.

IV. Panaci Heracleo similis Ungarica.

Tataria Ungarica, Clus. hist.

an Baltracan in Tartaria nascens, Josephi Bar-  
bari.

Hujus radice, Ungari Agriæ vicini, alterius pa-  
nis penuria vescuntur: & Tartari, foliorum in a-  
qua decoctum refrigeratum, Vini instar bibunt.

## SPHONDYLIIUM.

**Σ**φονδύλιον folia habet platano similis ad Panacis soliorum effigiem accedentia. Dioscoridi l. 3. c. 90. Spon-  
dylion Plinio l. 12. c. 26. & l. 24. c. 6. sic dictum fortasse ob odoris gravitatem, à Spondyle insecti genere, odori gra-  
vis, ut Pena tradidit.

I. Sphondylium vulgare hirsutum.

Branca urfina, Brunf. Trag. Cord. in Diosc. (cui  
& Bupleuron Nicandri) Germanica, Dod. gal.

Acanthus vulgaris five Germanica, Fuch.

Sphondylium, Matth. Lac. Gef. hor. Lon. Cast.

Cæf. Tab. vulgare, Dod. 8.

Spondylium, Ad. Lob. Dod.

Variat ratione loci, prout in montosis & planis  
provenit, hinc duæ apud Tabernicones: aliquan-  
do ita ludit, ut in caulis summo, folia sint breviora

quidem, attamen in ternas & quaternas laciniis  
divisa. Floribus est communiter albis: Sed & pur-  
pureis, licet rarius, reperitur.

II. Sphondylium hirsutum foliis angustiori-  
bus: hoc in Prod. primo loco descriptum est.

III. Sphondylium alpinum parvum: quod 2.  
loco in Prod. describitur.

IV. Sphondylium alpinum glabrum: quod  
in Phytopinacæ sub. 2. in Prod. sub. 3. propo-  
nitur.

## LIBANOTIS.

**Λ**ιβανotis. quod radix ὄζου ὀξυς, thus redolcat, duplex est, latifolia & serula folio: Latifolia Theoph. l. 9.  
c. 12. genera duo fecit, alterum sterile, alterum fertile, & alterum tam fructu, quam folio utile, alterum tan-  
tum radice: fructiferum, folium palustri apio simile, sed majus, habet: sterile, folio lactuca amara constat. Plin.  
l. 19. c. 12. de Libanotide confuse egit, sicut & l. 20. c. 16. cum Conycis miscuit.

I. Libanotis latifolia major.

Rosmarinus Theoph. Ang.

an Ligusticum alterum, Matth. Cast.

Libanotis Theoph. major, Lob. Lug. Ger.

Libanotis alba major, Tab.

Elaphoboscum album, Lon.

Seteli æthiopicum 2. Clus. pan. & hist.

II. Libanotis latifolia altera five vulgarior:

Seteli primum, Trag. æthiopicum, Matth. ico.

Fuch. ico. Tur. Lac. Gef. hor. Lon. Lug. Clus. pan.

& hist.

Dauci alterum genus, Fuch. Tur. Lug.

Libanotis alba, Gef. hor. Tab.

Libanotis tertia Dodonæi, Lugd.

Libanotis Theoph. Dodonæo gal. Ad. Lob. alte-  
ra, Thal.

Libanotis minor, Ger.

Seteli æthiopicum herba, Dod.

III. Libanotis latifolia minor semine crispo:  
hæc 2. in Prodromo.

IV. Libanotis minor apii folio:

Daucus anguloso caule, Cord. hist.

Libanotis Theoph. minor, Lob.

Libanotis alba minor, Thal.

Libanotis panacea, Tab.

V. Libanotis apii folio semine aspero:

Rosmarinus foliis Selino similibus, quæ Liba-

notis legitima Theoph. perperam Siler. Creticū.

Hon. Belli ep. ad Clus.

VI. Libanotis latifolia aquilegiæ folio, quæ 1.

est in Prodromo.

Seteli æthiopicum alterum, Cam.

VII. Ligusticum vulgare: an Libanotis fer-  
tilis Theophrasti?

Levisticum, Brunf. Lob. & Laserpitium Germa-

nicum, vulgare, Matth. Dod. Ad. Cæf.

V 3. Ligusti-

**Ligusticum**, Brunf. Cord. in Dioscor. Gef. hor.  
 Lon. Tab. sativum, Trag. Cord. hist. vulgare, Dod.  
 gal. Cam.  
**Libysticum** vulgare, Fuch. ico.

**Laserpitium**, Ang. Ger.  
**Smyrnum**, Lac. Fuch.  
**Hipposelinum**, Lugd.

## LIBANOTIS FERULÆ FOLIO

& *Panax Asclepias.*

**Λιβανotis** Dioscoridi l. 3. c. 87. duum est generum: unum secundum, cuius semen rotundum, angulosum, acre, linguam exurens, & ῥῆγος vocatur, foliis fœniculi, cui alterum consimile. semine lato, minimè exurente. Sterile illorum similitudinem refert, sed neq; caulem, neq; florem, neq; semen promitt.

I. Libanotis ferulæ folio semine anguloso.

Libanotis seu Rosmarinum, Matth. Lac. Lug.

Rosmarinum 1. Ang. Cast.

Libanotis 1. Dod. vel cachryfera, Cam.

Rosmarinum ferulaceum, fertile, Diosc. cuius semen Cachris dicitur, Ad.

Cachrys verior Libanotis Galeno, Lob.

Libanotis candida, Cæf.

II. Libanotis ferulæ folio & semine.

Panax Asclepium ferulæ facie, Ad. Lob.

Panaces Asclepium, Dod. Cæf. Tab.

III. Libanotis fœniculi folio semine foliaceo.

Rosmarin. alt. ferulaceum Dioscoridis, Lob. ob.

Panax Asclepium, Ang. Cam.

Libanotis 2. Dod. Tab.

Libanotis nigra, Cæf.

IV. Libanotidi secundæ similis seu Panax

Asclepium primum.

Panaces Asclepium, Matth. Lac. Cast. Lug.

V. Panax Asclepium umbella lutea.

Panax Asclepium alterum, Lug.

VI. Panax Asclepium semine folioso.

Panax Asclepium Apulum, Col.

VII. Libanotis minor umbella candida.

Libanotis Septentrionalium herbariorum, Ad.

Libanotis minima, Lugd.

VIII. Libanotis tenuif. German. major & minor.

Libanotis cap. Smeoni, major & minor, Thal.

## C A R U I.

**Κάριον** Dioscoridi l. 3. c. 66. ῥῆγος, ἄκτιον, ἡγεῖται Simeoni Sethi lib. de alim. Careum Plin. l. 19. cap. 8. à Caria regione in qua laudatiss. nascitur.

I. Cuminum pratense, Carui Officinarum.

Caros, Brunf. Trag. Dod. gal. Gef. hor.

Careum, Fuch.

Carum, Tur. Cord. in Diosc. Matth. Lac. Ang. Lob.

Dod. Cast. Lug. Tab. Ger.

Carui, Lon. Ad. Cæf. Thal.

II. Carui alpinum in prodromo descriptum.

III. Carui folia.

Cuminum equinum & syl. Trag.

Fœniculum erraticum alterum, Lon.

Peucedanum, Eid. ico.

Hippomarathrum, Bot. Franc.

Fœniculum syl. Loniceri, Lugd.

Alia latioribus, alia angustioribus foliis est.

IV. Podi farina seu flosculus quo flatus ventris exigunt: par. 4 Ind. or. 7.

## C O R I A N D R U M.

**Κορίανδρον** Diosc. l. 3. c. 71. dictum putant, quod folia & caules cimices redoleant. Κορίανδρον Theoph. hist. 1. & 4. caus. 3. cuius genera plura esse 4. bist. 7. dicit. Coriandrum Plinio l. 1. & cap. 20. quod inter sylvestria non inveniatur.

I. Coriandrum majus.

Coriandrū, Brunf. Trag. Fuch. Matth. Ang. Cord.

hist. Gef. hor. Lac. Lon. Ad. Lob. Cast. Cæf. Cam.

Tab. Ger.

Coriandrum, quod recens frigidum, exsiccatum

verò calefacit, Guilan.

Coriander, Tur.

Semina in calidioribus regionibus majora sunt.

II. Coriandrum minus testiculatum.

Coriandrum alt. minus odorem, Lob. Lug. sub

Coriandri alterius icone, Dod.

Coriandrum 2. inodorum, Tab.

III. Coriandrum sylvestre foetidissimum.

Coriandrum syl. Myconi, Lugd.

ANL



**A**nisum Diofc. l. 3. c. 65. Anisum, quidam auctore Plinio, l. 20. c. 17. quasi ἀνίσκω vocare, quia appetentiam cibi praestaret, & forsan sic dictum, ἐπὶ ἀνίσκω τὰς ἐμπιδομαλίας, quod seniores flatulentas interitus & externas remittat & laxet.

I. Anisum herbariis.

Abstinibium dulce, Roës.

Majore est semine & minore, hocq; apud Bohe-

mos habetur.

II. Anisum peregrinum.

Anisum Philippinarum Insularum, Clus. hist.

A M M I.

**A**mmi Diofc. l. 3. c. 70. quod κύμινον αἰθιοπικὸν & βασιλικὸν vocitant. Plin. l. 20. c. 15. Anami quod Graeci vocant, Cumino est simillimum: quidam Cuminum Aethiopicum esse existimant: Hippocrates regum appellat.

I. Ammi majus.

Ammi, Brunf. Trag. Tur. Cord. in Diofc. & hist.

Gefhor. Lon. Lugd.

Ammi commune sive vulgare, Dod. Cam. Ger.

Ammi vulgatus, Lob.

Ammioselinum, Tab.

Quibusdā Buboniū Hipp. aliis Bupleuron Plinii.

Variat foliis plurimū incisis & nonnihil teriis.

II. Ammi alterum semine apii.

Ammi majoribus & ferratis foliis semine apii,

Gefhor.

Ammi Creticum aromaticum, Ad. Lob.

Ammi 3. Creticum, Tab.

III. Ammi parvum foliis fœniculi.

Ammi, Matth. Ang. Lac. Cast. Cæf. Lag. Cam.

Ammi verum, Gefhor.

Ammi parvum, Dodon. gal. alterum parvum,

Eid. f.

Ammi perpusillum, Lob.

Ammium 1. Alexandriacum, Tab.

IV. Ammiodes.

Ammi pusillum, Cæf.

P I M P I N E L L A.

**P**impinella & Bipinella à recentioribus, à foliorum binis ordinibus, pennatim sive plumatim digestis, nominatae, veteribus nudita existimantur: quæ etiam Bipennula & Pampinella vocantur. Hæc duplex est, Pimpinella saxifraga, seu saxifraga, à facultate calculorum à venibus expellendorum: altera Pimpinella Sanguisorba, vel Sorbastrella, quod sanguineos fluxus sistat: quæ μυρσίνα Myrpesio, & quibusdā Sideritis 2. Diofc. censetur.

I. Pimpinella saxifraga major umbellâ candidâ.

Pimpinella, Brunf. Cord. in Diofc. Lon. Trag.

Fuch. Tur. Gefhor. Lob. Cast.

Pimpinella nostras communis major, Thal.

Bipinella, Saxifraga major, Ad.

Pimpinella saxifraga, Matth. Ger. major, Cam.

Bipennula, Lac.

Saxifraga major, Dod. gal. Saxifraga 1. Cæf.

Saxifraga, Cord. hist. magna, Dod. hircina major,

Gefhor. vulgaris major, Clus. pan.

Tragoselinum majus, Tab.

Folia in una atroviorentia, i splendentia: in altera minimè: invenitur & in lacinias divisa. Ad hujus radicem quibusdā in locis, grana reperiuntur, quorum quibullā in colore rubecum mutatur, cujus ad tincturam carmesini usus est, monentibus Lacuna & Anguillara, & Coccus radicum quibusdā dicitur.

Fragosus l. 3. c. 15. videtur Cocchenilla existimasse: Cocchinilla, inquit, quædam grani species adfertur ex Peru, quod nascitur in certis plantis parvis Pimpinellæ vulgari similibus, cujus radicibus adhæret, similitudine uvarum sylvestrium: quidā putarunt falsò, esse Coccognidium verum: alii esse Chermes Arabi, à Cocco Baphico Græcorum differens, quod manifestè falsum est. hæc ille. At Oniedus, ex arbore colligi vult, ut suo loco diceat.

II. Pimpinella saxifraga major altera.

Pimpinella 2. species, Trag.

Tragoselinum minus, Tab.

Bipinella sive saxifraga minor, Ger.

Cauliculi & foliorum venæ, interdum purpurascunt: hæc fervore & acrimonia primum genus superat.

III. Pimpinella saxifraga major umbellâ rubet. Saxifraga major in albis flore rubet, Gefhor. Pimpinella major umbellis purpureis, Geftra.

IV. Pimpi-

IV. *Pimpinella saxifraga minor.**Pimpinellæ* 3. *species*, Trag.*Pimpinella minor*, Fuch. Tur. Cam. ep.*Pimpinella saxifraga minor*, Lug. Cam.*Pimpinella nostras communis minor*, Thal.*Bipinella*, *Saxifraga hircina*, Ad.*Pimpinella*, *Saxifraga hircina minor*, Lob.*Saxifraga minor* alt. Dod. gal. *Saxifraga* 2. Czf.*Saxifraga hircina minor*, Gef. hor. Cam.*Saxifraga parva*, Dod.*Saxifraga vulgaris minor*, Clus. pan.*Saxifraga pimpinella Germanica minor*, Clus. hist.*Daucus Selinoides*, Cord. hist.*Dauci* 3. *genus*, Lugd.*Tragoel. num petraeum*, Tab.*Tragium Diotcoridis*, Col.

Folia interdum laciniata, interdum incisuris angustioribus &amp; oblongis divisa: aliquando foliis petroelinii.

V. *Pimpinella saxifraga tenuifolia*: in Prod. descripta.VI. *Pimpinella Sanguisorba major.**Pimpinellæ Italicae* 2. *genus*, Trag.*Pimpinella* seu *Sanguisorba major*, Matth. Cast. Lug. Cam.*Pimpinella major*, Dod. gal. syl. Dod.*Pimpinella Italica major*, Clus. hist. Thal.*Sanguisorba major*, Fuch. Cord. hist. Tab.*Sanguisorba altera major*, Ad. (live *Pimpinella*) Lob.*Pimpinella* syl. Ger.*Sideritis* 2. Diof. major, Col.VII. *Pimpinella Sanguisorba minor hirsuta.**Pimpinella Italica*, Trag. Lon. minor, Thal.*Pimpinella*, Ad. Lob. Czf. minor, Dod. gal. Lugd.*Pimpinella* syl. hirsuta, Gef. hor.*Pimpinella sanguisorba*, Dod. minor, Matth. Cast. Cam.*Pimpinella hortensis*, Ger.*Sanguisorba minor*, Fuch. Cord. hist. Tab.*Sideritis* 2. Ang. Guil. quæ *Pimpinella Italica*.*Sideritis* 2. Diof. minor, Col.an *Sideritis altera* Diof. l. 4. c. 34. & *Sideritis* Plinii l. 24. c. 17.

Hæc apud Montpelienfes minor &amp; valde pilosâ reperitur.

IX. *Pimpinella sanguisorba minor lævis.**Pimpinella sativa lævis*, Gef. hor.

Cultura solum à priore differre videtur, cum in usum acetariorum ab Italis in hortos teratur.

IX. *Pimpinella sanguisorba inodora*: in Prod. descripta.

## MYRRHIS.

**M**ύρρις, sive μύρρα. *Dioscoridi* l. 4. c. 116. *Myrrhis*, quæ aliis *Smyrthiza*, aliis *Myrrha* dicitur, Plinio l. 24. cap. 16.I. *Myrrhis major*, vel *Cicutaria odorata.**Myrrhis*, Matth. Cord. in Diof. Gef. hor. Lac. Ad.

Lob. Dod. Cast. Lug. sativa, Cam.

*Seteli Peloponensis*, Ang.*Cicutaria* 3. Czf.*Cerrefolium Hispanicum*, Tab.*Cerrefolium magnum* & *Cicutaria tenuifol.* Ger.II. *Myrrhis minor.**Myrrhis altera*, Ad. parva, Lob. Lugd.*Cicutaria* 2. Czf.*Myrrhis sativa minor*, Cam.*Myrrhis montana*, Tab.III. *Myrrhis* syl. feminibus lævibus.*Myrrhis*, Fuch. Dod. gal. Tur. Lug. syl. Cam.*Cicutaria*, Gef. hor. Lon.IV. *Myrrhis* syl. feminibus asperis.*Myrrhis* syl. nova æquicolorum, Col.V. *Myrrhis Broccenbergensis*, Thal. quid?

## CICUTA &amp; CUCUTARIA.

**K**ύττα Theophr. l. 8. & 6. ejusd. 2. *Dioscori* l. 4. c. 79. Etymologicus ita nominatum tradit, δὲ τὴν κύτταν ἐπὶ τῷ δὲ, ἐκ τῆς τοῦ κύττου. Quare Gal. lib. quod animi mores 3. quod cicuta epota stultitiam periat. ἡ δὲ κύττα διττή, desumpto nomine ab eo affectu, quia corpus ipsum torquetur. Plinio l. 25. c. 13. *Cicuta*, cujus caulem vident à plerisque, ediscribit: verum qui sapiunt, ab hujus usu, Socrateo exemplo moniti, abstineant.I. *Cicuta major.**Cicuta*, Trag. Matth. Ang. Fuch. Dod. Tur. Lac.

Ad. Lob. Lon. Cast. Lug. Czf. Tab. Ger.

*Cicuta major*, Cord. hist. Cam. vera, Gef. h. Thal.*Cicutaria vulgaris*, Clus. hist.

Variat foliis aliquando latioribus, aliquando tenuioribus.

II. *Cicuta minor petroselino similis.*

Petro-

Petroſelinū vitium, Trag.  
Cicuta minor, Cord. hiſt. Cam.  
Apii comes vitium, Gef. hor.  
Dauci inutilis genus, Gef. col.  
Siſon, Lon.  
Apium cicutarium, Thal.  
Cicutaria fatua, Ad. (quæ minus foetida) Lob.  
Petroſelinum caninum, Tab.  
III. Cicutaria latifolia foetida.  
Seiſeli Peloponenſe, Matth. Gef. hor. Lac. Caſt.  
Lon. Lug.  
Cicutaria latifolia foetidiffima, Lob. Lugd.  
Cicutaria, ſive Cicutaria Myrrhis, Thal.  
Cicutaria, Caſt. ico. foetida, Tab.  
Cicuta latifolia foetidiffima, Ger.  
IV. Cicutaria latifolia tertia.  
Cicutaria maxima Brancionis, Lob.  
V. Cicutaria paluſtris latifolia alba.  
Cicutaria alba, Lug.

Cicutaria paluſtris fl. candido, Cam.  
an Meum Sileſianum, Ejusd.  
VI. Cicutaria paluſtris latifolia rubra.  
Cicutaria rubra, Lugd.  
Cicutaria pal. fl. purpureo, Cam.  
VII. Cicutaria paluſtris tenuifolia.  
Ligüſticum ſyl. Trag.  
Fœniculum ſyl. Eid.  
Cicuta paluſtris, Cord. in Dioſcor. aquatica, Gef.  
hor. Thal.  
Cicutaria paluſtris, Lob. Tab. Ger.  
Cicutaria paluſtris alia, Cam.  
Phellandrium, Dod. Lugd.  
Silaus Plinii, Cæſ.  
Phellandriô eſt Plinii l. 28. c. 12. aliis Silaû l. 27. c. 8.  
IX. Cicutaria bulbosa.  
Cicutaria pannonica, Clus. pan. & hiſt.  
Bulbocaſtanum coniophyllum, Cam.  
Myrrhis cicutaria, Tab.

S E S E L I.

Σ ΕΨΑΙ: Dioſcorid. l. 3. c. 60. quatuor generum, μασσάριον. foliis fœniculi: αἰθριών, foliis hederae: π-  
λαπυρινανόν foliis cicute latioribus: κρητικὸν ſive πεδύλιον: Plin. l. 8. c. 32. ex Ariſtotele l. 9. hiſt. Cervæ  
ante partum purgari herba quadam quæ Seſeli dicatur, ſcribit: & l. 25. c. 8. Seſeli cervæ enixe à partu monſtra-  
vere: & l. 20. c. 22. Tordylium, eſt ſemen ex Seſeli.

I. Seſeli montanum Cicutæ folio glabrum:  
an Peloponneſiacum Dioſc.  
Ligüſticum alterum Belgarum, Lob. Lugd.  
Ligüſticum 2. herbariorum, Tab.  
Seiſeli mont. 1. vel alpinum, Clus. pan. & hiſt.  
Latiorib<sup>9</sup> foliis ex horto Cl. Côtareni habem<sup>9</sup>.  
II. Seſeli mont. Cicutæ folio ſubhirsutum;  
quod in prodromo deſcriptum eſt.  
III. Seſeli Creticum majus,  
Tordilion ſive Seſeli Cret. majus, Lob. Lugd.  
Pimpinellæ Romanæ alterum genus ſyl. Cæſ.  
Seſeli Cret. majus, Cam. 2. Tab.  
IV. Seſeli Creticum minus.  
Ordilion Nicandri & Tordylium Dioſc. Ang.  
Seſeli Cretici ſpecies, Eid.  
Caucalis, Bellonio, Gef. hor. Belli ep. 1. ad Clus.  
Tordylium & Gordilion, Dod. gal. Gef. hor. Lug.  
Seſeli Creticum, Lac. Ad. Lob. Dod. Caſt. Tab.  
Ger.  
Seſeli Creticum minus, Cam.  
Pimpinella Romana vulgo, Cæſ.  
Tordylium Creticum, Eyſt.  
V. Seſeli Creticum fructu majore.  
Tordylium majus al. luteum λυγιστὰ, Col.

VI. Seſeli Creticum minimum.  
Tordylium minimum Apulum, Col.  
VII. Seſeli Æthiopicum talicis folio.  
Seſeli Æthiopicum alterum, Matth. Gef. hor.  
Seſeli Æthiopicum, Ang. Ad. Lob. Caſt. Tab. ve-  
rum, Lug. Cam.  
Seſeli Æthiop. frutex, Dod. Ger.  
Herba quæ pro Seiſeli Æthiopico oſtenditur,  
Cæſ.  
IX. Seſeli Maſſilienſe ſerulæ folio.  
Seſeli Maſſilienſe ſerulæ aut Dauci Cretici facie,  
Lob. ob.  
Seſeli Maſſilienſe, Matth. Lac. Gef. hor. Lon. Caſt.  
Lugd. Tab. nuperorum, Lob. ico.  
Siler montanum Othſic. Ger.  
IX. Seſeli Maſſilienſe fœniculi folio, quod  
Dioſcoridis cenſetur.  
Seſeli Maſſil. Ang. Dod. Lugd. Cæſ. Seſeli Maſſi-  
lienſe fortè, Clus. hiſt. nonnullorum, Cam.  
Seſeli Maſſilienſe folio fœniculi craſſiore, Ad.  
Lob.  
Seſeli Maſſil. Dioſcoridis, Clus. hiſt.  
Fœniculum tortuoſum, Lugd.  
Fœniculum petræum, Tab.

Variat in foliorum crassitie, tenuitate, longitudine, brevitate & divisiura: in omnibus tamè glauca sunt. Aliàs nomine Seieleos Mafs. habemus, de quibus, cum adhuc dubitemus, ut & aliis umbelliferis, de iis in Theatro, si Deus volet.

X. Sefeli montanum fœniculi folio. Sefeli mont. 3. vel mont. angustif. Clus. pan. & hist. qui vult à Libanotide Dioic. altera fructifera, non multum differe.

XI. Sefeli palustre lætescens. Sefeli palustre, Cam.

XII. Sefeli pratense, Silaus fortè Plin. 1. 26. cap. 8.

Ligusticum Matthioli censet Gef. hor. Pastinaca pratensis Theoph. Cord. in Dioic. Pastinaca nigra syl. Cord. hist. Sefeli prat. Monspelienfium, Ad. Lob. Lug. Cam. Siler alterum pratense, Dod. Hippomarathrum 1. Tab. sub Fœniculo dulci, Ger. ico.

XIII. Sefeli prat. tenuif. sive Daucus pratensis tenuifolius: pro 2. in prodromo descriptus.

## LIGUSTICUM.

**Λιγυστικόν** (Galeno λιγυστικόν) ut plurimum in Liguria nascitur, quare à λιγυεία nomen traxit, in monte scil. Apenino dicto: incolis πανάκι. dicitur. Dioic. 1. 3. c. 58. Ligusticum sylvestre est in Liguria sue montibus: panacem aliqui vocant. Plin. 1. 19. c. 8. & 1. 20. c. 15. Siler nunc appellant nomine à Sile deducto, quia pro Sefeli semine utuntur, at Veteres ipsum Sefeli, etiam Sili & Seli vocabant.

I. Ligusticum quod Sefeli Officinarum. Siler montanum, Trag. Guil. Ad. Lob. Dod. Clus. h. Ligusticum, Matt. Lac. Cast. Lugd. verum, Dod. gal. Gef. hor. Tab. sub Levistico vulgari, Ger. ico. Sefeli Matilioticum, Cord. in Dioic. Sefeli, vulgò Siler montanum, cum nullo Sefeli conveniens, Gef. hor.

Sefeli Italicum, Cast. Ser montanum, Sefeli peloponense, Cæf. Semine latiore & breviori variat.

II. Ligusticum foliis cicutæ.

Siler Creticum, Cam.

III. Ligusticum five Siler montanum angustifolium: in Prodromo descriptum.

## BULBOCASTANUM.

**Βολβοκαστίον**, cuius Trallianus 1. 7. c. 2. meminit, à radice figura bulbosa, & sapore castaneas expriment. nomen habet. Bérion Dioic. 1. 4. c. 124. aliqui censent, cui ἀδιδόστιον seq. cap. subiungit.

I. Bulbocastanum majus folio apii. Oenanthe 1. Marth. Cast. Lugd. Bunium, Dod. gal. Lac. Gef. hor. Apios, Tur. Bulbocastanum, Gef. hor. Dod. Cast. Tab. Ger. Bulbocastanum grandius, Lugd. Bulbocastanum mas Tralliani, Lugd.

Nucula terrestris Septentrionalium, Ad. Lob. Panascæolus vulgo, Cæf.

II. Bulbocastanum minus.

Ornithogali species, Lon.

Bulbocastanum alterum, Cam.

Hoc ratione loci, foliorum incisuris variat: quod ex Anglia, ex Pyrenæis & mōte Calcaris habem.

## OENANTHE & FILIPENDULA.

**Οἷνάνθη** Dioicoridi 1. 3. c. 135. quasi flos vinosus, quod odore & quadantenus colore, non sint viri dissimiles: vel potius, quod cum vite floreat: & ἀδιδόστιον: à florum candore, quos producit: cuius radix magna, in multa rotunda capitula extuberans. Plinio 1. 21. c. 24. Oenanthæ radice magna numerosa &c. Recentiorum Oenanthæ subjungamus, ut & Filipendulas, quæ cum Oenanthæ viribus aliquantum conveniunt; Filipendula, à numerosis illis & rotundis in radice capitibus, quæ velut ex filo quodam pendere videntur, nomen habet.

I. Oenanthæ apii folio. Oenanthæ 2. Marth. Lugd. Oenanthæ angustifolia, Lob. species, Lugd. Filipendula, Cast. ico. 2. vel tenuifolia, Tab. Filipendula angustifolia, Ger. Cymium bulbosum Plinii, Col. (plicis.

II. Oenanthæ pastinacæ syl. folio semine atri-

Oenanthæ species altera, Lugd.

III. Oenanthæ chærophylli foliis.

Oenanthæ 3. Marth. Lugd.

Oenanthæ cicutæ facie, Ad. Lob. Lugd.

Filipendula altera species, Gef. hor.

Filipendula 3. Oenanthæ selinophyllos, Tab.

IV. Oenanthæ aquatica.

Oenan-

Oenanthe 4. Matth. Lugd.

Oenanthe aquatica, Lob. aquat. repens, Cam.

Laver minus, Lon.

Bulbocastanum femina, Lugd.

Silv. palustre, Lugd.

Petroelinum syl. vulgo, Cæf.

Filipendula aquatica vel palustris, Tab. Ger.

Juncus odoratus aquatilis, Dod.

Differentiæ ratione magnitudinis & parvitatis, multæ reperiuntur: sic aliquando bulbulis carens, quemadmodum Dod. pingit, & Lobelius duas alias icones subiungit: sic apud Montspelienses, capitulo est majore, per omnia hiupidiore: apud nos minore, nec hiipido.

V. Oenanthe hederæ foliis.

Oenanthe Myconi, Lugd.

VI. Oenanthe prolifera Apula.

Oenanthe Cretica, Ponz. in Bal. ital.

VII. Filipendula vulgaris, an Molon Plin.

l. 26. cap. 7.

Filipendula, Trag. Dod. Matth. Cord. hist. Ang. Gef. hor. Lon. Thal. Cast. Lug. Tab. (cui & Saxifraga rubra) Ger.

Oenanthe, Fuch. Lac. Cord. in Diosc. Lob.

Oenanthe vulgaris, Ad.

Filipendula vulgaris, Eyf.

IX. Filipendula minor: in prod. descripta.

IX. Filipendula montana fl. pediculariæ.

Filipend. mont. Dod. Tab. Ger.

Oenanthe five Filipéd. alt. mótana, Ad. Lob. Lug.

Alectorolophos 1. vel alpinus major, Cl. pan. & h.

Oenanthe alia Myconi, Lugd.

Crista quædam in alpibus, Cæf.

X. Filipendula montana altera.

Alectorolophos alpinus 2. Cl. pan. & hist.

Floribus est modò pallidis, modò purpureis.

## PEDICULARIS seu FISTULARIA.

**P**edicularis, ab effectu nomen habet, si enim à pecoribus inter cetera pabula devorata fuerit, pediculariū ingen-tem copiam procreat. Αλάνη péλαγος seu Crista apud Plin. l. 27. c. 5. censetur, cui folia similia gallinaceæ cri-tribuit. Imò ob florum congeriem, multiplicis & dense Gallinaceæ crista modo fastigiatam, sic posteriores dici putant: aliqui Fistulariam nominant, quod ad fistulas & sinuosa ulcera utilis esse credatur.

I. Pedicularis alpina lutea.

Filipendula alpina, Lugd.

an Oenanthe, Cæf.

II. Pedicularis alpina filicis folio major.

Pedicularis major alpina, Lugd.

In hac varietas occurrit.

III. Pedicularis alpina filicis folio minor.

Alectorolophus alpinus minor, Cl. pan. & hist.

IV. Pedicularis alpina folio ceterach.

Herba foliis aspleno persimilis, Gef. fr.

V. Pedicularis pratensis purpurea.

Pedicularia campestris prior, Trag.

Alectorolophus, Dod. gal. Thal.

Pedicularis, Lob. Cast. Tab. altera, Lon.

Fistularia, Dod.

Alectorolophi 3. genus, Cl. pan. & hist.

Crista galli altera, five Phthirion, Lugd.

Ruta pedicularis, Tab.

(didus.

Floris color vel purpureus, vel carneus, vel can-

VI. Pedicularis prat. lutea, vel Crista galli.

Pedicularis campestris 2. Trag.

Alectorolophos, Ang.

Crista gallinacea, Dod. gal. Lug. Cl. pan. & hist.

Crista galli, Lob. Dod. Thal. simplici caule, Cæf.

Pedicularia lutea, Tab.

Mimulus Plinii quibusdam: mimuli herba in prato pessima l. 18. c. 28. quamvis alii Nummulū legant, Nummulariam dictam censentes.

Variat magnitudine & foliorum latitudine, cau-  
lium numero: floribus luteis, rarius candidis:  
semine nigro, aut subluteo.

VII. Crista galli umbellata.

IX. Crista galli angustifolia montana: illa  
pro 1. hæc pro 2. in prodromo descripta.

## BARBA CAPRÆ.

**B**arba capræ, à florum figura, quæ barbam caprinam aliquo modo refert, nomen obtinuit: & prima Melan-  
dryon Plinii l. 26. c. 7. censetur, cujus descriptio talis: Melandryon nascens in segete ac prati flore albo, odora-  
to. Altera ejusdem l. 24. c. 19. Rhodora: herba, inquit, quam Galli Rhodoram vocant, caulē habet virga siculnea  
modo geniculatum, folia urtica, in medio exalbida, eadem procedente tempore tota rubentia, florem argenteum.

I. Barba capræ floribus oblongis.

Barbula capræ & barba caprina syl. Trag.

Barba capri, Fuch. Dodon. gal. ico. capræ, Lugd.

Eyf.

Barba caprina, Gef. hor. altera, Lon.

Potentilla 2. Ang.

X 2 Drymo-

Drymopogon 1. Tab.

II. Barba capræ floribus compactis.

Barbula caprina prior, Trag.

Barba capri, Dod.gal.dei.

Potentilla 1. Ang.

Medetisium (à Ger. Medisii) Cord.hift.

Barba caprina 1. Lon.

Barbi capra, Ad.Lob.

Regina prati, Dod.Ger.

Ulmaria (à foliorum forma) Gef.cat. Clus.pan.

& hift. Lug. Cam. Tab.

Argentilla major, Thal.

## SECTIO SEXTA.

### VALERIANA; NARDUS.

**V**ALERIANA Dioscoridi l. i. c. 10. εἰς δὲ ῥιζὸς ἀγρία. eo quòd radices cum quadam odori gravitate Nardum emulentur. imò & viribus Nardo similes, Galeno & Aegineta auctoribus. Plinio l. 12. c. 12. Nardum Creticum, aliqui agriam vocant, alii phu folio olusatris &c. & l. 21. c. 20. Nardus quod Phu appellavimus. Officinis & herbariis Valeriana, à multis quibus valet facultatibus: quare & Theriacaria dicitur.

Genera duo, una descriptione Dioscorides proposuisse videtur: folia namq. olusatris, majori Valeriana: folia Elaphobosci, media: radices priori, floris color, media convenit.

I. Valeriana hortensis: Phu folio Olusatris Dioscorid.

Valeriana vera, seu Nardus agrestis, Trag.

Phu magnum, Fuch. Matth. Tur. Lac. Lon. Lugd.

Phu majus Matth. Cord. hift.

Phu verum, Cord. in Dioscorid. Fuch. hortense, Gef. hor.

Phu ponticum, Tab.

Valeriana major, Ang. Ad. Lob. Cam. Eyf.

Valeriana optima, Cæs. hortensis, Dod. Ger.

Carpesium, Cast.

II. Valeriana foliis Calcitrapæ.

Valeriana annua seu æstiva, Clus. hift.

III. Valeriana peregrina purpurea albæ.

Valeriana Indica, Clus. hift.

Valeriana peregrina ocini folio, Col.

In Phytopin. sub 4. in prod. sub 6. & in Matth. figurâ additâ, descripsimus.

IV. Valeriana syl. major.

Phu similitudine Elaphobosci, Dioscoridi.

Valeriana, Brunf. Gef. hor. altera, Cæs.

Valeriana vulgaris, Trag. Cord. in Diosc. Lac.

Valeriana syl. Ad. Lob. Dod. Cam. Eyf. prima, Clus. hift.

Valeriana major, Dod. gal. Lug. Thal.

Phu Dioscoridis, Brunf. Col. vulgare, Fuch. Tur. Tab.

Phu Germanicum, Fuch.

Phu majus commune, Gef. hor.

Phu parvum, Matth. Lac. Cast.

Valeriana major, Tab. major syl. Ger.

V. Valeriana syl. major montana.

Valeriana 3. Trag.

Valeriana montana & 3. Tab.

VI. Valeriana palustris major: quæ 1. in Prod.

VII. Valeriana cærulea.

Phu græcum, Dod. gal. Lugd. peregrinum, Gef. hor.

Valeriana peregrina, Ad. Lob. Cam.

Valeriana græca, Dod. Tab. Ger.

Pseudovaleriana dici potest, nam præter foliorum similitudinem, nil cum Valeriana commune habet: flore est communiter cæruleo, aliquândo albo.

Valeriana Græca fl. cæruleo &

Valeriana Græca fl. albo, Eyf.

IX. Valeriana palustris minor.

Valeriana exigua vel. 4. Trag.

Valeriana min. five palust. Thal. Ger. minor, Ad.

Valeriana minor syl. Lob. Lug. minima, Dod. syl. five palustris min. Cam.

Phu parvum, Dod. gal. minus, Gef. hor. Lon. Tab. minimum, Matth. Cast. Lug. Cam. ep.

IX. Valeriana palust. media parum laciniata: quæ 2. in Prod.

X. Valeriana alpina prima: quæ pro 4. in phytop. pro 3. in prod. describitur.

XI. Valeriana alpina altera.

Phu saxatile seu petræum, Gef. hor.

Valeriana syl. alpina 1. latifolia, Clus. hift.

XII. Valeriana alpina scrophulariæ folio: quæ 6. in phytop. 4. in Prodromo.

an Va-

an Valeriana inodora 1. Cæf.  
 XIII. Valeriana montana subrotundo folio.  
 Valeriana montana, Lugd.  
 XIV. Valeriana montana inodora.  
 Valeriana inodora altera, Cæf.  
 Valeriana annua ex Ilva, Cam.  
 XV. Valeriana alpina Nardo celticæ similis.  
 Valeriana fyl. alpina 2. saxatilis, Clus. hist.  
 XVI. Valeriana alpina minor: quæ 5. in Prod.  
 XVII. Valeriana rubra.  
 Polemonii altera species, Dod. gal. Gef. hor.  
 Limonium Monspelienfium, Gef. hor.  
 Ocymastrum Valerianthos, Ad. Lob.  
 Valeriana rubra, Dod. Tab. Cam. Ger. Eyft.  
 Valeriana inodora 3. Cæf.  
 Phu peregrinum, Cam. ep.  
 Sunt qui Narcissum Virgilii & Columellæ in  
 hortis: alii Behen rubrum: alii Struthium: alii  
 Condurdum Plinii 1. 26. c. 5. velint.  
 XIX. Valeriana rubra angustifolia: quæ 7. in  
 Prod.  
 XIX. Valeriana campestris inodora major.  
 Bupleuron Hipp. apud Plin. 1. & c. 22. videtur.

### NARDUS MONTANA & Celtica.

**N**ardus montana, νάρδος ὄρεϊν & δολαχίτης, Diosc. 1. 1. c. 7. at Celtica, quæ Spica Celtica, vel Romana Of-  
 ficinum, Eid. cap. 8. νάρδος νάρδος & ὁ ἀλπίγγος sive Saliunca, & 1. 62. 19. ορεινὴ dicitur. Saliunca Plinio  
 1. 21. c. 7. & 20. & Nardus Gallica 1. & c. 12. & 1. 21. c. 20.

I. Nardus montana radice olivari.  
 Nardus montana, Math. Ang. Ad. Lob. Lug. Clus.  
 hist. Cæf. Cam. Tab.  
 Radices binas, ternas & quaternas asphodeli  
 modo, habet.  
 II. Nardus montana radice oblonga.  
 Nardus mont. longius radicata, Cam. ep.  
 III. Nardus Cretica filipendulæ radice.  
 Nardus Cretica Valerianæ simillima, Hon. Belli  
 p. 4.  
 Nardus Cretica Belli, Pon.  
 IV. Nardus Celtica Dioscoridis.  
 Nardus Celtica, Math. Cord. hist. Gef. hor. Tur.  
 Guilan. (cui & Saliunca) Ad. Lac. Lob. Cast. Cam.  
 Tab. Ger.  
 Nardus alpina seu celtica, Clus. pan. & hist.

Locusta quibusdam, Gef. hor.  
 Phu minimum alterum, Lob. Lugd.  
 Album olus, Dod.  
 Polypremum Calsiani: Chalceum Plinii 1. 26. c. 7.  
 à foliorum colore, Lugd.  
 Valeriana campestris, Cam.  
 Lactuca agnina, Tab. Ger.  
 Bupleuron, Cæf.  
 an Valerianella altera nudo umbilicato & brevi  
 femine, Col.  
 Variat magnitudine, foliis angustioribus, latio-  
 ribus & integris: quate figuræ duæ apud Taber.  
 & Ger. reperiuntur, & abortiva, floris explicatio-  
 ne ab insectis prohibita.  
 XX. Valerianella echinata.  
 Valerianella cornucopoides echinata, Col.  
 XXI. Valerianella femine stellato.  
 Phu minus petræum, Tab.  
 Valeriana petræa, Ger.  
 Valerianella altera tenuifolia femine Scabiosæ  
 stellato, Col.  
 XXII. Valeriana fyl. foliis tenuis. divisis.  
 Phu minimum, Ad. Lob. Lugd.

Nardum gallicum, Cæf.  
 Spica Celtica, Lugd.  
 V. Nardus Celtica altera.  
 Spica celtica, fastigiato floiculorum ordine, Cam.  
 ep.  
 Spica celtica, Tab.  
 Nardus celtica repens, Ger.  
 VI. Nardus ex Apulia.  
 Saliunca Neapolitana, Lugd.  
 Phu minus Apulum, Tab.  
 VII. Nardo celticæ similis inodora: in Pro-  
 dromo descripta.  
 IX. Nardo Celticæ similis hirculus.  
 Hirculus Ad. Lob. Cam. ep. Cæf. Tab. Ger.  
 Hirculus veterum, Clus. in Gar. Lugd.  
 Hirculus & Nardus Samphoritica, Ang.

# LIBER QVINTVS.

## SECTIO PRIMA.

*SOLANUM; MANDRAGORA; HYOSCYAMUS;*  
*Nicotiana; Papaver; Hypecoön; Argemone.*

### SOLANUM.

**SOLANUM**, *σπύρον* Græci vocant, quod vitem, vel acinum, aut tale quid signat. Theoph. 19. hist. 12. 14. & 2. *Sduo genera habet, ubi Gaza Vescariâ reddidit: ut Diosc. l. 4. c. 71. genera quatuor recensuit: 1. σπύρον 2. τέναν 3. Solanum hortenſe: 2. ελκισα 4. Coriâ 5. φουκιδία. halicacabum, aut vescicarium: 3. Strychni 4. somniferi: 4. usque manicum. Plin. l. 27. c. 13. Solanū, inquit, Græci Strychnon vocant: & l. 21. c. 31. Strychni genera quatuor enumerat.*

*Solanum bacciferum.*

#### I. Solanum Officinarium.

Solatrium, Brunf. vulgare, Trag. minus, Cæf.  
 Solanum, Lon. hortenſe, Matth. Fuch. Ang. Dod.  
 Gef. hor. Lob. Lugd. Cam. Ger. fativum, Tab.  
 Solanum nigrum, Cord. in Diosc. & hist. quod edendo est.

Cuculus & Cacubakum Plinii, Ang.

Solanum hortenſe, Circeæ aut Phaeoli folio, Ad.

Variat foliis magis laciniaſis, ut Fuch. figura: alia halicacabi, ut Lob. exprimit: acinis nigricantibus & fuscis: puniceis, quod Solanum puniceum Cord. hist. rubris, luteis, quod Solanum luteum Gef. hor. Sic in arenosis Michelfeldæ vix palmam excedens, reperitur.

II. Solanum vescicarium, quod folliculi vescicæ inflatæ similes: vel ut Plin. l. 21. c. 31. quoniam vescicæ & calculis proficit.

Saxifraga rubra & 4. Brunf.

Solanum halicacabum, Trag. Matth. Lac Ad. Lob. Lugd.

Halicacabum, Ang. Caſt. vulgare, Fuch. Tur. Eyſt.

Halicacab. vescicarium, Cam.

Vescaria, Cord. in Diosc. Gef. hor. Cæf.

Vescaria vulgaris, Dod. gal. prima, Caſt.

Solanum vescicarium, Gef. hor. Dod.

Halicacabum, sive vescaria, Cord. hist. Gef. hor.

Alkekengi, Lon.

#### III. Solanum vescicarium Indicum.

Halicacabum sive Solanum Indicum, Cam. Eyſt.

#### IV. Solanum *μανδραγόρα* &.

Solanum hortenſe nigrum, Trag.

Mandragora Theoph. Dod. gal. Ang. Guiland.

morian, Fuch. ico. Lon. tertia species, Cord. Diosc.

Solanum majus, Matth. Caſt. Cæf. Cam.

Solanum somniferum, Fuch. Tur. Ad. Lob. Lugd.

Solan. lethale, Dod. Cluſ. hist.

Solanum ſylvaticū, Gef. hor. ſyl. sive lethale, Thul. Belladonna. Cluſ. pan.

Duum est genus: 1. foliis amplioribus & flore majore: 2. foliis & floribus minoribus.

#### V. Solanum somniferum in bacciferum.

Solanum somniferum alterum, Matth. Gef. hor. Lugd. Cam.

Solani lethalis aliud genus, Dod.

Solanum somniferum, Lon.

Solanum de Hiericho, Caſt.

#### VI. an Solanum manicum ex Guinea.

Fruſtus minor 8. Paludani, Cluſ. ex l. 2. c. 20.

#### VII. Solanum somniferum verticillatum.

Solanum somniferum, Matth. Guil. Gef. hor. Lac. Cluſ. hiſp. & hist. Dod. Ad. Lob. Caſt. Lugd. Caſt. Cam.

Acini in folliculis hirsutis, per maturitatem nunc rubri, nunc ex rubro crocei ſunt.

IX. Herba à militibus ad civitatem Philippi evulſa & guſtata, eos prope ad furorē & inſaniam redegit, qui tamen affectus paulo poſt miſior reditus: par. 9. Ind. occid. addit. quid eſt?

#### IX. Solanum fruticosum bacciferum.

Strychnodendron, Gef. hor. Ad. Lob. ob. Eyſt.

Amomum, Gef. hor. Lob. ico. Plinii, Ger.

Solanum arboreſcens, Caſt. Cæf. Cam.

Solanum fruticosum, Gef. hor. Tab.

Solanum Americanum, Lugd.

Picudo-



Pseudocapsicum, Dod.

X. Solanum quadrifolium bacciferum.

After sed non Atticus, Trag.

Herba paris, Matth. Ang. Dod. Cast. Czf. Lugd. Thal. Ger. Eyft.

Paris herba, Lon. Cam.

Aconitum Pardalianches, Fuch. Tur.

Aconitum sive Pardalianches monococcon, Cord. in Diofc. & hist.

Solanum tetraphyllum, Gef. hor. Ad. Lob.

Aconitum salutiferum, Tab.

Folia habet communiter quatuor, aliquando tria, quinque, & sex.

XI. Solanum triphyllum Brasilianum : 3. loco in Prodomo describitur.

XII. Solanum Scandens seu Dulcamara.

Dulcis amara Trag. Dulcamara, Dod. Lugd.

Amarum dulce, Cord. in Diofc.

Amara dulcis, Gef. h. Ang. Lob. ico. Lō. Tab. Ger.

Vitis syl. Matth. Lac. Cast. Cam.

Solanum γαλαπυρι Thal.

Salicastrum Plinii, Guil. the. Czf.

Circæa Montpelienfium, Ad. Lob. ob. Cam.

Videtur quibusdā σμυλα & αζεία Diofl. 4. c. 183.

sed muscolum florem suæ Viti tribuit. Salicastrum Plinii 1. 22. c. 1. Aliis Cyclaminus altera Diofc. & Melotron Theophrasti.

Floris color communiter cæruleus, rarius albus est.

Dulcis amara flore pleno &

Dulcis amara fl. cæruleo vulgarior, Eyft.

XIII. Solanum tuberosum esculentum, sub 9. in Phytop. sub 1. in Prod. & Matth. descriptum.

Picnocomu Diofcoridis, Cortuso.

Papas radix ex qua edulium Chunno dictum conficitur : Joseph. Acofta 1. 4. c. 17. imò panis locouuntur, quem Chunno vocant : Eid. 1. 3. c. 20.

a Pape radices genus tuberum specie, sed exigui poris : par. 6. Ind. occid. c. 20.

arachidna Theoph. Papas Peruvianorum, Cluf. hist. apas Peruanorum, Eyft.

Huius aliud genus in calidioribus fundis, ex quo tracula Locro appellata parât : Jos. Acofta 1. 4. c. 17.

XIV. Solanum racemosum ceteriorum forma : ro 2. in Prod. descriptum.

*Solanum pomiferum.*

I. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli.

ycoperficon Galeni, Ang.

Poma amoris, Dod. gal. Ad. Lob. Cam. ep. Tab. Ger.

Pomum amoris, Lugd. Cam.

Malum & pomum aureum, Gef. hor.

Aurea mala, Dod. Cast.

Solani pomiferi generis aliud, Gef. hor.

Tumatle Americanorum, Guil. pap.

Mala infana, Czf.

Aliqui ad Solanum furiosum referunt : aliis Glaucium Diofcoridis est.

Fructus cōmuniter lutei, auricolores, aliquādo pulchre rubentes : rarius albi : est & surrectis cubitalibus cauliculis, quod per omnia minus est.

Poma amoris fructu luteo &

Poma amoris fructu rubro, & Mala Peruviana, Eyft.

I I. Solanum pomiferum fructu rotundo striato duro.

Solanum pomiferum, Lob. Lugd. Tab. Ger. Eyft.

Mala æthiopica, Dod. Lugd. Ger.

Capsicum rotundum Dalechampii, Lugd.

Folia magis minusve sinuosa : in caule aliquando ut & in foliis, modo infernè, modo superne, parvi aculei.

I I I. Solanum peregrinum fructu rotundo.

Hyoscyamus peregrinus Dalechampii, Lugd.

I V. Solanum pomiferum fructu oblongo.

Mala infana, Trag. Fuch. Dod. Lac. Lon. Tab. Ger.

Malum infanum, Gef. hor.

Melongena, Matth. Cord. hist. Ad. Eob. Cast. Lugd.

Cam. & Verengena Toletanorum.

Solanum hortense & Pyra infana, Czf.

Melanzana fructu pallido, Eyft.

Videtur Strychnon hort. Diofcoridis, urbanum.

Theoph. Esculentum Galeni, & tertium genus Plinii.

Variat flore purpureo, albo : fructu, albo, purpureo, luteo : figura quandoque oblonga, aliquando instar mali rotunda.

V. Solanum pomiferum fructu incurvo.

Melanzana, Arabum Melongena & Bedengian, Rauw. Lugd.

Variat colore fructus, qui flavus, cinereus, & purpureus.

*Solanum pomiferum fructu spinoso.*

I. Solanum pomiferum fructu nigro spinoso

Melanzana nigra, Bathlehihaia Æthiop. Rauw. Lugd.

Fructu est longo, rotundo : atro, subnigro.

II. Solanum spinosum fructu rotundo.

Pomum

*Pomum Hiericoticum*, Imper.

III. *Solanum pomiferum* folio rotundo tenui.  
*Cachos Indorum* Monardi, Lugd.

IV. *Solanum pomo spinoso rotundo*, longo flore.

*Stramonium* sive *pomum spinosum*, Trag.

*Nux metella*, Matth. Cast. Acost. Cam.

*Nux methel* Avicennæ, An. 3. Fuch. Gef. hor.

*Hyoscyamus Peruvianus*, Cord. hist.

*Tatula Turcarum*, Guiland. pap.

*Paracoccalon* sive *barycoccalon*, Græcis recentior. *Melospinus Venetis*: *Malus Peruviana* Gal-  
lis: *corona regia* quibusdam: *Solanum Romanū*,

Monspel. Guiland. l. c.

*Stramonium*, Fuch. Dod. Gef. hor. Lac. Lugd. Dod.

Cam. Eyf.

*Stramonium peregrinum*, Ad. (an *Solanum manicum*) Lob. Ger.

*Hippomanes Cratevæ*, Ang. Gef. hor.

*Solani pomiferi* genus 3. Gef. hor.

*Solanum spinosum*, Tab.

*Solani pomiferi* genus 3. Cæf.

*Malum spinosum*, Cæf.

V. *Solanum fetidum* pomo spinoso oblongo.  
an *Manicum Dioſc.* ex hoc Muslac fieri ajunt.

*Tatoula*, quæ *Nux Methel* Arabum: Græcis, *Solanum somniferum*, Bellon.

*Datura*, Garziz, Acost. Cast. Lugd. prima, Cast.

*Nuci metellæ* congener, Cam. ep. *Tatula*, Eid. hor.

*Solanum manicum*, Col.

*Stramonium spinosum*, Ger.

*Datura Turcarum*, Eyf.

*Dutroa*, Linsc. par. 2. Ind. or. c. 33. par. 3. c. 1. & par. 4. c. 17.

*Dutroa*, Hispanis. *Burlatoria*: Arabibus, *Marana*:  
Persis & Turcis. *Datula*. Palud. in Linsc.

Variat floribus colore: est vulgari flos albus magnus: alterius flavus: tertii. *Hyoscyami* floribus accedit: quare tres *Daturæ*, *Costæo*: nunc & purpureo habetur.

VI. *Solanum fetidum* pomo spinoso rotundo semine pallido.

*Datura Ægyptiaca* flore pleno, Pon. Ital.

*Stramonium Ægyptiaca* flore genuino altero alteri innato, C. Bauhini, du Bry.

Communiter duo flores alteri innascuntur.

VII. *Solanum Ægyptiacum* flore pleno.

*Stramonium Ægyptiaca* flore pleno extrinsecus purpurascens, intrinsecus albicans C. Bauhini, du Bry.

#### *Solanifolia.*

I. *Solanifolia Circæa* dicta major.

*Lappa* syl. Trag.

*Ocimum verrucarium*, Gef. hor.

*Circæa Luteriana*, Lob. Dalech. Lugd. Ger.

*Helxine sylvestris*, sive *fluviatilis*, Thal.

*Herba D. Stephani*, Tab.

*Circæa*, Eyf.

II. *Solanifolia Circæa alpina*.

*Circæa minima*, Col.

III. *Solanum Mexiocanum* flore magno.

*Magnæ admirationis herba Peruviana*, Lob. Cast.

*Marabilles*, del Peru & Hachal Indi, Clus. span.

*Admirabilis Peruviana*, Eid. hist.

*Gelleminum rubrum* & *Mandragora* Theoph. Cæf.

*Gelleminum* sive *Jasminum Indicum*, Cam.

*Jasminum rubrum* Dalechampii, Lugd.

*Viola Peruviana*, Tab.

*Mirabilia Peruviana*, Ger.

*Jasminum Indicum* seu flos mirabilis Peruanus, Eyf.

*Jasminum Indicum* flore rubro & variegato, Eid.

Flores purpurei seu Kermesini coloris, latericeii, flavi aut pallentes, obtoletè rubentes, exalbidis binis coloribus ex purpureo & luteo mixtis: sic ex rubro, luteo, albo, in uno flore magna varietas: nonnunquam albo & purpureo simul dimidiatim in eodem flore tingitur: sive inæqualibus vel latis, vel minutis maculis purpureis tam punctatim, quam virgatim album colorem intercurrentibus, quandoque radiis flavis per longitudinem flores distinguuntibus.

IV. *Solanum Mexiocanum* flore parvo: sub *Solano 4.* in Prodro. describitur.

V. *Solanum Indicum* hirsutum corymbiferum.

*Solani Indici* genus, Clus. exot. l. 4.

## MANDRAGORA.

**M**ΑΝΔΡΑΓΟΡΑ. ἢ ἀντρίμιον. ἢ κρυαία. Dioſcorid. l. 4. c. 76. *Mandragora*, quod ad mandras pecorum, aliamque speluncas proveniat. *Circæa*, nomine a *Circæ* deducto, quoniam radix ad amatoria conducere videatur.

Genera

3<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> sunt 1<sup>o</sup> bri, quæ  
Solanum  
Digitized by Google

Ranunculi tertii, tertium & quartum genus, Thal.

Flore est candido, aut ex purpura rubente, modo dilutiore, modo intensiore colore, subæruleo, carneo, roseo: hinc Tabernæres figuras habet, Ranunculi albi, purpurei, & ex rubro purpurei nomine. Et Thalius tertio generi quod flore est candido, species tres tribuit, foliis & floribus majoribus, minoribus & medio modo donatis: quarum è candido rubet, & ratione foliorum majus & minus est.

VI. Anemone nemorosa flore minore: hæc in prodromo 1. est.

an Ranunculi tertii generis species minor, Thal.

VII. Anemone nemorosa sterilis foliis punctatis.

Ranunculi tertii quintum genus, Thal.

## PULSATILLA

**A** Nemones alterum genus quæ Limonia vocatur, Plin. l. 21. c. 11. ex Theophr. 6. hist. 7. Anemone genus (Gaza Fre-munum vertit: Plin. l. 21. c. 23. Phenion habet) quod Lemonion vocant: hanc sunt qui Pulsatillam esse velint. Pulsatilla nominatur, quod seminum tremuli pappi levissimo flatu, huc atq, illuc agitentur, unde & Herba venti dicitur, quare *βεισηπον* dici potest.

I. Pulsatilla folio crassiore & majore flore.

Σκί θεισηπ / Brunf.

Herba venti, Trag. Lon.

Pulsatilla Matthioli. Gef. hort. Cast. Dod. Ad. Lug. Tab.

Pulsatilla vulgaris, Lob. Ger. recentiorum, Cæs. communis, Cam.

Pulsatilla vulgaris dilutior, Clus. pan. & hist.

Herba Sardoæ, Dod. gal.

Anemone syl. Fuch. communis, Tur. montana, Gef. hor.

Anemone species, Gef. hor. Thal.

Anemone 10. vel leptophyllum, Cord. hist.

Anemone limonia & Samolus Plinii, Dalech. in Plin.

Ranunculus. 2. Lac. Diosc. 2. species, Gef. hor.

Colore ut plurimum violæ nigrae purpureo, & obscuriore intensiore & remissione pro loci ratione: in umbrosis dilutior, in apricis coloratio repleto etiam flore reperiri significatum.

II. Pulsatilla folio tenuius inciso & flore minore, sive palustris: hæc in prodromo primo loco describitur.

III. Pulsatilla flore minore nigricante.

Pulsatilla altera, Dod. Lugd.

Pulsatilla flore clauso, Lob. ico.

Pulsatilla vulgaris, saturatione flore, Clus. pan. & hist.

Ranunculi nemorosi vitium *ακέρυμνος*, Cæs. Altorff.

II X. Anemone nemorosa flore pleno albo.

Anemone limonia plena albo flore, vel

Ranunculus sylvarum pleno albo flore, Clus. hist. Eyst.

IX. Anemone nemorosa flore pleno purpureo.

Anemone limonia pleno purpureo flore, vel

Ranunculus sylvarum pleno flore purpurascente, Clus. hist.

Ranunculus nemorosus flore pleno, Eyst.

X. Anemone nemorosa affinis peregrina 1. candido aut purpurascente flore.

Anemone *λεμονια* peregrina 1. Clus. hist.

XI. Anemone nemorosa affinis peregrina 2. flore herbacei coloris.

Anemone *λεμονια* peregrina 2. Clus. hist.

I V. Pulsatilla apii folio vernalis flore majore: quæ 2. in Prodomo.

V. Pulsatilla apii folio vernalis fl. minore: quæ 3. in Prodr.

VI. Pulsatilla apii folio autumnalis: quæ 4. in prodr.

VII. Pulsatilla folio Anemones secundæ, sive subrotundo: quæ 5. in prodromo.

II X. Pulsatilla flore rubro obtuso.

Pulsatilla rubra, Dod. Ad. Lob. Lug. Tab. Ger.

an Anemone 4. Cam. ep.

IX. Pulsatilla flore albo.

Anemone alpina, Gef. fra.

Anemone sylv. 2. Clus. pan. & histor. Lob. ad. par. 2.

Pulsatilla alba, Lob. Lugd. Tabern. Ger. flore candido, Dod.

Flos intus lacteus, exterius nonnihil purpurascens.

X. Pulsatilla lutea apii hortensis folio.

Pulsatilla 2. alpina, Lugd.

XI. Pulsatilla lutea pastinacæ syl. folio.

Pulsatilla lutea, Gef. hor. Ad. Cam. ep.

Pulsatilla 3. alpina, Lugd.

Anemone syl. tertia, Clus. hist.

XII. Pulsatilla lutea alpina hispidior,

Pulsatilla prima alpina, Lugd.

an Anemone lutea, Ang.

## ADONIS.

**A**donis floris meminit Ovidius 10. Metamorph. qui Anemone esse à multis creditur: alii huic sequenti tribuunt. Verum quia ratione capituli cum Ranunculus conveniat, inter Anemones & Ranunculos reposuimus. Quibus diom. φλῶξ Theoph. à floris flammeo igneoq; colore: & 6. hist. 6. inter vernos flores recenset.

## I. Adonis hortensis.

Anem. hort. Trag. Lugd. Anemone, Lon.

Argemone 3. Tab.

## II. Adonis flore majore.

Anthemis eranthemos Dalechampii, Lug.

## III. Adonis hort. flore minore atrorubente.

Adonis recentiorum, aut Adonium Poëtarum, species Anemone, Ad.

Adonis recentiorum, Lob. ob. flos Adonis, Eid. ico. Cam. Ger.

Flos Adonis vulgo, Clus. hist.

Eranthemum, Dod.

Adonium, Tab.

Flos habetur miniati, lutei coloris: hinc

Adonium &amp; Adonium luteum, Tab. (bus.

## IV. Adonis syl. fl. phæniceo ejusq; fol. longiori-

Anemone agrestis, Trag.

Anem. tenuifolia, Cord. in Diosc. Gef. hist.

Anem. tenuifolia, Cord. hist.

Adonis, Matth. Lug.

Chamæmelum eranthemum vel purpureum, Dod. gal. rubrum, Gef. hor.

Aculeata, Lon.

Ranuncul. arvensis flore rubicundo, Cæf.

Chamæmelum purpureum, Tab.

Variat floris colore phæniceo, luteo, pallido &amp; albo; hinc

Anem. tenuifol. alt. flore pallido, Cord. hist.

Adonis flore pallido, Cam. ep. Lugd. Tab.

Adonis 2. &amp; 3. inter legetes, Tab.

Eranthemum flore flammeo &amp;

Eranthemum fol. rubro, Eyf.

## SECTIO TERTIA.

## RANUNCULUS ejusq; SPECIES.

**R**ΑΤΡΑΨΙΟΝ Dioscorid. l. 2. c. 206. & ῥάνυον ἄγρον. Ranunculus & Apium agrestis. Ranunculus, quod Brantarum more humidis limitibus & apacis marginibus lætetur: aut quod rana, inter ejus frutices frequenter inveniantur. Apium, quod folijs apium æmuletur.

Genera complura Dioscoridi: 1. Coriandri folijs (& ad malva latitudinem accedentibus, Plinio) flore luteo, interdum purpureo: 2. Languinesius (foliosus Plinius) quod syl. apium: appellant: 3. minimum flore aureo: 4. huic simile flore lacteo. Idem habet Plin. l. 25. c. ultimo.

## Ranunculus nemorosus.

## I. Ranunculus nemorosus luteus.

Ranunculi syl. alterum genus, Trag.

Ranun. 3. species, Cord. hist. tertij genus 2. Thal.

Ranun. 4. species lutea, Fuch. Dod. gal. Lugd.

Ran. phragmites luteo flore, Gef. hor. nemorosus luteus, Lob. ico. Tab.

Ranun. 7. Tur. 9. Lon.

Ranunculus nemorosus fl. luteo, Ad. Eyf.

Anemone 6. Dod. Lug. mont. colore luteo, Cæf.

Anemone nemorum lutea, Ger.

Major est &amp; minor, Thal. Flore communiter unico, aliquando duobus &amp; tribus.

## II. Ranuncul. nemorosus vel sylvat. folio rotundo.

Ranunculus dulcis, sub syl. descrip. Trag.

Ranuncul. 1. species, Fuch. Tur. Lon. Lugd.

Ranun. auricomus, Dod. gal. Lob. ico. Thal.

Ranun. nemorosus, Ger. dulcis nemor. Tab.

Polyanthemum, Ang.

## III. Ranunculus nemorosus Thaliætri folio.

Ranunculus Thaliætri folio, Clus. pan. Cam.

Ranunculus præcox 2. Thaliætri folio, Eid. hist.

Aquilegia minor Dalechampii, Lug.

## IV. Ranun. nemorosus Muscatellina dictus.

Aristol. rotundæ concavæ similis herbulæ, Trag.

Aristol. vulg. alt. radice oblonga, Gef. hor.

Capnos Plinii, Tur.

Moschatella, Cord. hist. Thal. Cam.

Ranunculus minimus Septentrionalium herbido muscico flore, Ad. Lob. ico.

Denticulata, à radice forma, Lugd.

Fumaria bulbosâ tuberolâ minima, Tab.

Radix cava minima, Ger. ico.

## Ranunculus pratensis &amp; arvensis.

## I. Ranunculus pratensis erectus acris.

Ranunculus luteus, Trag.

Ranun. pratensis surrectis cauliculis, Lob.

Ranun. hort. 2. Dod. Lugd.

Ranun-

Ranunculus sylvestris & 2. Tab.  
 Ranunculus lævis, Cæf.  
 Ranunculus batrachoides, Ger.  
 Ranun. polyanthemus maculatus, Thal.  
 In foliis medio sæpè macula reperitur, & hic  
 Ranunculi alt. species maculis notata, Trag. quâ  
 communiter destituitur. Hic magis minùve hir-  
 sutus occurrit.

II. Ranun. pratensis erectus dulcis.  
 Ran. pratensis vel. 1. Trag.  
 Chrysanthemum simplex, Fuch.  
 Polyanthemum simplex, Dod. gal. Lugd.  
 Ranunculus 7. Lon. dulcis, Tab.  
 Ran. directis cauliculis, Ger.  
 Ranun. hortensis erectus flore simplici luteo, Eyst.  
 Hic cum latioribus quoque foliis reperitur, id-  
 circo apud Taber. & altera figura,  
 Ranunculi holeracei majoris nomine: & apud  
 Ger. sub titulo Ranunculi auricomi.

III. Ranun. pratensis repens hirsutus.  
 Ranunculus 8. species, Cord. hist.  
 Ran. pratensis reptante cauliculo, Lob.  
 Ran. polyanthemus 1. Dod. Thal.  
 Ran. hortensis 1. Dod. Lugd.  
 Ran. vinealis, Tab.  
 Ran. pratensis etiamque hortensis, Ger.  
 Variat magnitudine, nâ in hortis, quibus præ ce-  
 teris spontè tamen proveniens, familiarior, latio-  
 ribus multo quam in pratis foliis reperitur: & nō-  
 nunquam veluti quædam maculæ inalbescant.

IV. Ranunculus pratensis radice verticilli mo-  
 do rotunda.

Crus galli, Brunf. Coronopus parvus, Eid. 4.  
 Ranunculus exiguus & 1. Trag.  
 Ranunculus 5. Matth. Tur. Lac. Lon. Lugd.  
 Batrachion Apuleii, Dod. gal. (Tab.  
 Ran. minor vel 3. Fuch. vel 9. Cord. hist. minor,  
 Ranunculus flammula dictus, Gef. hor.  
 Ranunculus bulbosus, Ad. Lob. Cam. Thal. Ger.  
 Ranunculus tuberosus, Dod. Lugd.  
 Ranunculus lanuginosus 1. Cæf.

Magnitudine variat, nam in saxosis, vix duarum  
 triumve unciarum reperitur: contrâ in hortorum  
 treolis spontè nascens, cubitum excedit: in pratis  
 mediæ altitudinis reperitur.

V. Ranunculus arvensis parvus folio trifido.  
 Ranunculus minimus Apulus, Col.

Ranunculus hortensis flore pleno.

I. Ranunculus hortensis erectus flore pleno.

Ran. luteus vel 3. flore multiplici, Trag.  
 Ran. multiplex, Fuch. tertius, Tur. quartus, Lon.  
 Ranunculi 7. species coronaria, Cord. hist.  
 Ranunculus syl. 2. Dod. Lug.  
 Ran. polyanthemus, Ad. Lob. polyanth. 3. erectus,  
 Cam. at. 2. epit.

Ranunculus erectus hortensis fl. pleno luteo, Eyst.  
 Major & minor habetur: & ille dicitur  
 Ranunculus multiflorus maximus, Tab.  
 Ranunculus maximus multiplex, Ger.

Flores, Bellidum plenarum orbiculos imitan-  
 tur, sæpius geminatim combinantur, ac quandoq;  
 sobolem aliam ex se emittunt.

II. Ranunculus hortensis inclinans.  
 Ran. hort. reptante cauliculo, Lob.  
 Ran. repens flore multiplici luteo, Gef. hor.  
 Ran. polyanthos luteus repens, Cam.  
 Ranunculus hort. flore pleno, Eyst. cui major &  
 minor est.

III. Ranunculus dulcis flore pleno.  
 Ran. pratensis cultura multiplex, Trag.  
 Polyanthemum multiplex, Dod. gal. Lugd.  
 Ranunculus dulcis multiflorus, Tab.  
 Ranunculus maximus multiplex, Ger.

IV. Ranunculus bulbosus flore pleno.  
 Pes corvi flore pleno, Brunf. Coronopus, Eid.  
 Coronopus quorundam multiplici luteo flore,  
 Gef. hor.

Ranunculus radice bulbosa flore pleno, Cam.  
 Ranunculus bulbosus major, Eyst.

V. Ran. radice tuberosa fl. pleno & prolifero.  
 Ranunculus tuberosus flore multiplici, Dod.  
 Ranun. magnus Anglicus polyanthos, Lob. ico.  
 Ranunculus 3. Cam. ep.

Ranunculus tuberosus Anglicus vel 25. Tab.  
 Sæpius ex uno flore, unus & alter prodit.

VI. Ranunculus folio aconiti flore albo mul-  
 tiplici.

Ranunculus montanus magnus flore multiplici,  
 Gef. hor.

Ranunculus niveus polyanthos, Lob. Lugd.  
 Ranunculus pleno flore albo, Clus. hist. Eyst.

Ranunculus albus multiflorus, Tab. Ger.  
 Ranunculus leucanthemos flore pleno, Cam.

Ranunculus echinatus.

I. Ranunculus arvensis echinatus.  
 Ranunculus albus five echinatus, Dod. gal.  
 Ranunculus sativus, Tur. arvensis, Gef. hor. Tab.  
 Ranunculus arborum, Lob. ico. Ger.

Z 2 Ranun-

Ranunculus hortenſis ſimp. 1. ſpecies, Fuch. Lug. altera ſpecies, Fuch. ico. quinta ſpecies vel ſegetalis, Cord. hiſt.

Ranunculus ſyl. tertius, Dod. Lob. ob.

Folio eſt aliquando latiore, aliquando anguſtior, pro ratione folii pinguioris: hinc

Ranunculus arvenſis latifolius & anguſtifol. Tab.

II. Ranunculus ſtellatus echinatus Creticus.

Ranunculus echinatus Creticus, Pon. Ital.

III. Ran. rotundifolius repens echinatus.

IV. Ranunculus paluſt. echinatus: ille ſub 2. hic ſub 3. in prod. deſcriptus.

Ranunculus Apuleii quibuſdam, Cluſ. hiſt.

*Ranunculus paluſtris & aquaticus.*

I. Ranunculus paluſtris apii folio lævis.

Ranunculus & Sardonias, Dioſc.

Ranunculus, ſtrumea & apiaſtrum, Plin.

Scelerata, Apuleios.

Apium aquaticum, Trag.

Apiaſtrum, Cord. in Dioſc.

Ranunculus 1. Matth. Geſ. hor. Lac. Caſt. Lug. 4. Tur. 3. Lon.

Ranun. aquaticus, Fuch. ico. paluſtris, Cord. hiſt.

Dod. f. Lug. Thal. Cam. Tab. Ger.

Herba Sardoia, Guiland.

Ranunculus paluſtris rotundior folio, Ad. Lob.

Ranunculus alter hirsuto ſemine foliis apii, Cæſ.

Foliis & canibus eſt alibi niſtoribus, alibi minoribus, floribus luteopallidis; at Cordus, & purpureis obſervavit.

II. Ranunculus paluſtris apii folio lanuginofus.

Ranunculi 2. ſpecies, vel Sardonius Ranunculus, Cord. hiſt.

Ranunculus Sardonicus, Ang.

Ranunculus 2. Matth. Lugd.

Differt à priore, quod lanuginofus, plaribus foliorum incifuris ſpectetur.

III. Ranunculus aquaticus hederaceus luteus.

Ranunculus hederaceus Dalechampii, Lug.

IV. Ranunculus aquaticus cotyledonis folio.

Cotyledon aquatica, Dod. gal. paluſtris, Eid. f.

Herba rotundo folio, aliquib. Acetabulum, Cord. in Dioſcor.

Cotyledon aquatica acris Septentrionalium, Lob. Ranunculus aquaticus umbilicato folio, Col.

V. Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo.

Polyanthemum paluſt. aut aquaticum, Dod. gal.

Ranunculus 3. Geſ. hor.

Ranun. aquatilis, Dod. Ger. aquat. hepaticæ facie, Lob.

Ranun. in aquis naſcens folio parum ſciſſo, Cæſ.

Ranunculus ſtuviaſilis, Tab.

Hepatica aquatica, Lugd. paluſtris, Thal.

In noſtro duplicia folia obſervantur, quæ ſub aqua multifida, capillacea; quæ extra aquam rotunda & crenata: quare Cæſalp. folia alteri parvè ſciſſa, alteri in capillaceam tenuitatē ſiſſa tribuit: addens, ſe vidiffſe quoddam utrumq; genus foliorum habens, initio integrū, procedente tēpore capillacū: at in noſtro foliorū diverſitas ſimul conſpicitur.

VI. Ranunculus aquaticus capillaceus.

Ranunculus in aquis foliis in capillaceam tenuitatem ſciſſis, Cæſ.

Ranun. trichophyllō aquaticus medioluteus, Col.

*Ranunculus folio longo tam paluſtris quam montanus.*

I. Ranunculus longifolius paluſtris major.

Ranunculus inſectus 1. Cæſ.

Lingua Plinii, Lugd.

Ranunculus *μαύροφυλλος* Thal.

Ran. lanceolatus major, Tab. flāmeus major, Ger.

Folia prima aliquando ſubrotūda ſunt, ad Chelidoniz minoris, aut Cochleariz formam accedentia: quemadmodum Ranunculi latifolini nomine, hiſt. Lugd. exprimere videtur.

II. Ranunculus longifolius paluſtris minor.

Ranunculus 1. Ang. 12. Cord. hiſt.

Ran. flāmeus aquatilis anguſtifol. Ad. Lob. Lugd. Flammula ranunculus, Dod.

Ranun. aquaticus *δρυοχλωρόφυλλος* & major, Thal.

Ranun. lanceatus minor, Tab. flāmeus min. Ger.

Ægolethron Plinii l. 21. c. 13. quibuſdam aliis Enneaphyllon, Ejusl. 27. c. 9.

III. Ranunculus paluſtris ferratus.

Flammula, Dod. gal. aquatica, Lugd.

Flammula ranunculus folio ſerrato, Dod.

Ranunculus alter, Geſ. hor.

Ranunculus aquatilis anguſtifolius ſerratus, Lob.

Ran. lanceatus ſerratus, Tab. flamm. ſerratus, Ger.

IV. Ranunculus montanus foliis plantaginis.

Ranunculus Pyrenæus albo flore, Cluſ. hiſt. pap. an Ranunculus phœniceus Myconi, ob ſimilitudinem cum palmæ foliis, Lugd.

V. Ranunculus montanus folio gramineo.

Ranun. pumilus gramineis foliis, Ad. Lob. ico.

Ranunculus gramineus, Tab. Ger.

Hydropiper lanceolatum, Lugd.

## VI. Ran. montanus folio gramineo multiplex.

Ranunculus folio graminis, Dod.

Ranunculus gramineus 2. multiplex, Tab.

## VII. Ranunculus gramineo folio bulbosus.

Ranunculus leptomacrophyllon bulbosus, vel

Ranunculus bulbosus gramineus montanus, Col.

*Ranunculus grumosa vel etiam Asphodeli radice.*

I. Ranunculus lanuginosus angustifolius grumosa radice major.

Ranunculus Illyricus major, Clus. hist.

II. Ranun. lanug. angustif. grum. rad. minor.

Ranunculus Pannonicus, Clus. hisp.

Ranunculus grumosa radice 4. Eid. hist.

Ran. Illyricus, Dod. Lob. Tab. Cam. Ger. Eyf.

Ranunculus peregrinus alter, Cæs.

III. Ranunculus lanugin. apii folio asphodeli radice.

Ran. alter saxatilis mont. asphodeli radice, Col.

IV. Ranunculus grumosa radice folio ranunculi bulbosilic 4. est in Prodromo.

V. Ranunculus grumosa radice flore phœniceo minimo simplici.

Ranunc. Tripolitanus phœniceo flore, Clus. pan.

Ran. Asiaticus grum. radice 1. Eid. hist.

Floris foliola 3. aut 6. rarius 3. aut 4. foris phœnicei, internè miniati coloris flaminibus rubris.

VI. Ranunculus grumosa radice ramosus.

Ranunculus Asiaticus ~~montanus~~ sive grumosa radice 2. Clus. hist.

Ranunculus Asiat. grumof. rad. fl. phœniceo ruberrimo, Eyf.

VII. Ranunculus grumosa radice fl. flavovario.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore flavo rubris venis distincto, Clus. cur. post. Eyf.

VIII. Ranunculus grumosa radice flore albo.

Ranunc. peregrinus grumosa radice 1. Clus. hist.

Flos quinquefolius albus suaviter rubente colore per oras mixto.

IX. Ran. grum. rad. flore albo, leviter ctenato.

Ranunculus peregrinus grum. radice 2. Clus. hist.

X. Ranunculus grum. radice flore niveo.

Ranunculus peregr. grumosa radice 3. Clus. hist.

Ranunculus Creticus grumosa radice flore niveo, Eid. hist. ap. alt. &amp; Eyf.

XI. Ranunculus asphodeli radice Creticus.

Ranunculus Creticus latifolius, Clus. hist.

XII. Ranunculus latifolius bullatus asphodeli radice.

Clusius in hist. duas habet figuras, magno &amp;

parte flore, nulla in descriptione facta mentione: ille vocatur

Ranunculus grumosa radice 1. Clus. hist.

Ranunculus Lusitanicus Clusii, Lob. icon. Ger.

Ranunculus Lusitanicus 2. Tab. hic verò

Ranunculus autumnalis, Clus. hisp. Ger.

Ranunculus grumosa radice 1. species 2. Clus. hist.

Ranun. Lusitanicus autumnalis, Lob. icon.

Ranunculus Lusitanicus, Dod. Lug. primus, Tab.

XIII. Ranun. cherophylos asphodeli radice.

Ranunculus montanus leptophyllos Asphod. radice, Col.

*Ranunculus grumosa radice flore pleno.*

I. Ranunculus asphodeli radice flore sanguineo.

Ranunculus Constantinopolitanus, Clus. hisp. Dod. Lug. Cam.

Ranunc. polyphyllus flore coccineo, Clus. pan.

Ranunculus Asiaticus grum. radice pleno flore; Eid. hist.

Ranunculus sanguineus multiplex, Lob. Ger.

Ranunculus Turcicus sive sanguineus, Tab.

an Ranunculus primi generis purpurei floris apud Dioscorid. quem simplici flore etiam nasci verisimile est.

II. Ranunculus asphodeli radice flore subphœniceo rubente.

Ranunculus Asiaticus grum. radice pleno flore 2. Clus. hist.

Ranunculus pleno flore ruberrimo, Eyf.

Flos ex cœtum &amp; triginta foliis, foris subphœnicei, dein miniati, interioris elegantis rubri miniati ad coccineum tendentis.

III. Ranunculus asphodeli radice prolifer miniatus.

Ran. Asiat. grum. radice pleno flore 3. Clus. hist.

Ranun. Asiat. grum. rad. fl. pleno sanguineo prolifero, Eyf.

*Ranunculus montanus.*

I. Ranunculus rutaceo folio flore suaverubente.

Ranunculus præcox 1. rutæ folio, Clus. hist.

Ranun. alpinus Coriandri folio, Pon.

II. Ranunculus alpinus humilis rotundifolius flore minore.

Ranunculi montani primi species 1. Clus. pan. &amp; hist.

III. Ranunculus alpinus humilis rotundifolius flore majore.

Ranunculus montanus minimus, Ges. hor.

Ranunculi mont. primi species 2. Clus. pan. &amp; hist.

Z 3 Ranun-

Ranunculus montanus, Dod. ed. belg.

Flos interdum duplici foliorum serie constat.

I V. Ranunculus mont. hirsutus albus altior.

Ranunculus alpinus albo flore, Clus. pan.

Ranun. montan. 2. vel secundi species 1. Eid. hist.

V. Ranunculus montanus hirsutus humilior  
Nar cissi flore.

Ranunculi 2. alterum genus, Clus. pan.

Ranun. montani secundi species altera, Eid. hist.

VI. Ranunculus montanus hirsutus purpurascente flore.

Ranunculus montanus 3. Clus. pan. & hist.

Aconitum candidum *αχμυλον* Dalech. Lug.

• Multū cōvenit cum Caryophyllata alpina quinquifolia majore: verūm Caryophyllata radice est odora, flore pallide luteo in pappum abeunte.

VII. Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore.

Ranunculus 4. Matth. Lac. Gef. hor.

Aconiti 5. nomine Matth. & Lugd. exprimere videntur.

Ran. albus major, Gef. fr. syl. simp. fl. Gef. hor. ap.

Ranunculus maximus leucanthemon Thal. leucanth. folio aconiti, Cam.

Ranunculus montanus 3. Cæf. 4. Clus. pan. & hist.

II X. Ranunculus montanus, Aconiti folio albo flore majore.

Ranunculus flore albo vel Ran. 4. externus, Dod.

Ran. albus flore simplici, Lob. albus, Tab.

Ran. mont. albus, Lug. alpinus albus, Ger.

Ran. montani quarti species alt. Clus. pan. & hist.

Aconitum batrachoides, Ad. Lob. icō.

Ranunculus 4. Dioscor. esset, nisi magnitudo obstaret, Dod.

IX. Ran. montan. Aconiti folio flore globoso,

Ranun. textus, Matth. Lug.

Aconitum 3. Matth. Lac. Thal. Tab. cui & 5.

Aconitum lycoctonum 3. Lugd.

Anemone montana quædam, Gef. hor.

Trollius flos, Gef. fr. Clus. pan.

Ran. flore globoso, Dod. f. Lugd. Eyst. glomerato

flore, Clus. hist. globosus, Ger. live mōtanus, Cam.

Ran. mont. alp. glomeratus, Lob. mont. alter, Cæf.

Ranunculus alpinus luteus, Tab.

Major ampliore flore & quasi aureo: alter humilior, flore minore, colore ex viridi pallecente.

Albo reperiri scribit Tab.

Ranunculum alpinum album nominans.

X. Ranunculus mont. fol. Aconiti magno flore.

Ranunculus mont. major flore luteo, Eyst.

XI. Ranun. geranii tuberosi fol: qui 5. in prod.

XII. Ranun. mont. latissimo folio hirsutus.

Ranun. platyphyllos flore luteo, Clus. pan.

Ranunculus montanus 5. Eid. hist.

XIII. Ranun. mont. subhirsutus geranii folio.

XIV. Ran. mont. lanugin. foliis ranunculi pratens. repētis: ille pro 6. hic pro 7. in prod. describit.

*Ranunculus saxatilis.*

I. Ranunculus Saxatilis magno flore.

II. Ranunculus saxatilis foliis subrotundis: ille

pro 8. hic pro 9. in prodromo describitur.

III. Ranunculus saxatilis minimus hirsutus.

IV. Ranunculus villosissimus Monspelicius

ille pro 10. hic pro 11. in prodromo describitur.

## SECTIO QUARTA.

### ACONITUM; DORONICUM; HELLEBORUS

NIGER; HELLEBORUS ALBUS ET HELLEBORINE.

#### ACONITUM.

**A**KONITON Diosc. l. 4. c. 77. & 78. Aconitum Plinio l. 27. c. 3. dictum, quoniam in nudis cauitibus quas aconas nominant, nascatur. Alii hanc nominis rationem attulerē, quoniam vis eadem in morte esset, qua cotinus ad ferri aciem deterendam, statimq; adnota velocitas sentiretur. At Theoph. 9. b. 16. *ἀκόνιτον* appellatum ab Aconu, pago quodam Mariandynorum, quoniam ibi præcipue proveniat.

Genera duo Dioscoridi: alterum solius Cyclamini, aut Cucumeris, quod *παρδαλιαν*, οἱ 3 *ἐχμυρον*, οἱ 3 *ἐπιμυρον*, οἱ 3 *μυκτονον*, *ἐπιμυρον* vocent. Alterum solius effigie Platani, crebris divisuris, quod *κακκτόνον*, alii *κρόνον* appellent: cuius tria genera: unū quo venatores utuntur: alia duo qua Medici in suū usum vertēre, è quibustantum Ponticum nominatur. Theoph. l. c. Aconiti unius folio intubaceo, (sorsan pro *κακκτόνον*, legendū *κακκτόνον*) meminuit. Plin. l. 27. c. 2. & 3. de Aconito egit: describit foliis cyclamini aut cucumeris: cammaron dici, propter radicem cammarato marino simile (sorte rectius *ἐχμυρον*, quasi *κακκτόνον* perniciosū, ut est apud Homerū) aliis thelyphonō: aliquibus scorpion, quia radix scorpionum modo incurvetur: quibusdam mycōdonon, quoniam mures odore necet.

I. Aco-



I. *Aconitum unifolium luteum bulbosum.*  
*Bulbosus unifolius aut bifolius batrachoides, elle-*  
*boracea herbula, Ad.*  
*Bulbus parvus unifolius, aut bifolius batrachoi-*  
*des, Lugd.*  
*Aconitum lycoctonum luteum, min. Dod. Lugd.*  
*Aconitum hyemale Belgarum, Lob.*  
*Aconitum 3. & hyemale, Cam. ep.*  
*Aconitum hyemale & Ranunc. monophyllos, Cam.*  
*Aconitum aliud Dalechampii, Lug.*  
*Elleborine, Cæf.*  
*Aconitum hyemale Ponticum, Eyf.*  
 II. *Aconitum lycoctonum luteum.*  
*Luparia, Trag.*  
*Aconitum 2. Matth. Lac. Lug. Tab.*  
*Aconitum lycoctonon, Cord. in Diof.*  
*Aconitum 2. vel lycoctoni species 1. Gef. hor.*  
*Aconitum lycoctonum, Lon. luteum, Fuch. Tur.*  
*Cam. Thal. Eyf. majus, Dod. Lug. lycoctonum*  
*Ponticum, Dod. gal.*  
*Aconitum lycoctonum vulgatius, Cluf. hist.*  
*Aconit. luteū, Gef. fr. ponticum, Ad. Lob. Tab. Ger.*  
*Napelli 1. genus, Cæf.*  
 In montibus ampliore caule & foliis, alibi humilior ac foliis minoribus: flos ex pallido luteus, interdum etiam pallidior.  
 III. *Aconitum lycocton. albis pallidisve floribus.*  
*Aconitum 2. flore albo, Gef. hor.*  
*Aconitum 6. Cam. ep.*  
*Aconitum 6. Matth. Lugd. Tab.*  
 Matthiolo, flos purpureus: Camerario, albus, quibusdam pallidus, venulis livefcens.  
 IV. *Aconitum lycoct. fol. ferratis filiquis oblongis.*  
*Aconitum lycocton. ex Cod. Cæf. Dod. Lugd.*  
 V. *Aconitum cæruleum hirsutum flore confolidæ regalis.*  
*Aconitum cæruleum aliud, Gef. hor.*  
*Aconitum lycoctonum primum, Cluf. pan.*  
*Aconitum lycoct. fl. delphinii 1. Eid. hist. Cam. Eyf.*  
 VI. *Aconitum cærul. glabrum fl. confolidæ regalis.*  
*Aconit. genus floribus cæruleis, Gef. hor.*  
*Aconitum lycoctonum fl. Delphinii, Dod. Lob.*  
*Aconitum secundum, Cluf. hist.*  
*Aconitum lycoctonum cæruleum 1. fl. delphinii,*  
*lug. an Aconitum 4. Matth. Lac. Lugd.*  
 Matth. florem aureum; Cam. cæruleum tribuit.  
 VII. *Aconitum cæruleum napelli flore.*  
*Aconitum lycocton. cæruleum secundum, Dod.*  
*Aconitum lycoct. 7. vel autumnale, Cluf. pan. & hist.*

IIX. *Aconitum coma inflexa foliis angustioribus.*  
*Aconitum 7. Matth. Lugd.*  
*Aconitum lycoct. 4. vel Lynceanum, Cluf. pan. & hist.*  
 IX. *Aconitum inflexa coma maximum.*  
*Aconitum 9. Matth. Lugd.*  
*Aconitum lycocton. coma nutante 5. Cluf. pan. o-*  
*stavum, Eid. hist.*  
 X. *Aconitum cæruleum seu Napellus 1.*  
*Wienhüttin / Brunf. Trag.*  
*Napellus, Matth. Lon. Dod. Cast. Lugd. Cam. ar-*  
*borens, Eyf.*  
*Napellus verus cæruleus, Ad. Lob.*  
*Napellus major latifol. & angustifol. Tab.*  
*Napellus reticulatus, Cæf.*  
*Aconitum lycoct. cæruleum, Dod. gal.*  
*Aconitum 2. vel lycoctoni species altera, Gef. hor.*  
*Aconitum lycoctonum 6. Cluf. hist.*  
*Aconitum cæruleum, Gef. col. Thal.*  
 Foliis est latioribus, angustioribus, flore communiter cæruleo, aliquando purpureo, roseo, albo, & è cæruleo & albo colore variegatus, qui Napellus flore variegato, Eyf.  
 XI. *Aconitum violaceum seu Napellus secundus.*  
*Acon. lycocton. 2. vel præcox Tauricum, Cluf. pan.*  
*Acon. lycocton. 4. Tauricum, Eid. hist.*  
 XII. *Aconitum purpureum seu Napellus 3.*  
*Aconitum lycocton. 3. vel Neubergerense, Cluf. pan.*  
*Aconitum lycocton. 5. Neubergerense, Eid. hist.*  
 XIII. *Aconitum cæruleo purp. flore maximo,*  
*sive Napellus 4.*  
*Aconitum lycocton. 6. vel Judenbergense, Cluf. pan.*  
*Aconitum Judenbergense, Eid. hist.*  
*Acon. fl. cæruleo, Napellus serotinus, Cam.*  
*an Lycoctonum sativum pentacarpon, Cord. hist.*  
 XIV. *Acon. cærul. minus, sive Napellus minor.*  
*Aconitum lycoct. cærul. parvum, Dod. Lug. facie*  
*Napelli, Lob.*  
*Aconitum lycoctonum 10. Cluf. hist.*  
 Thora Italica, Eid. pan. Cam.  
 In editioribus locis exilius provenit.  
 XV. *Aconitum ramosum parvo flore.*  
*Aconitum 8. Matth. Lugd.*  
 Floribus est luteis: Matt. purpurascens nitens: at Camerario rubescens.  
 XVI. *Aconitum racemosum an Aetæa Plin. l. 27. c. 7.*  
*Christophoriana, Gef. hor. Dod. Ad. Lob. Cluf. hist.*  
*Tab. Cam. Ger. Eyf. & Costus niger quorundam.*  
*Barba capri quibusdam, Cæf.*  
*Napellus racemosus, Lugd.*

XVII. Aconitum salutarium, seu Anthora.

Anthora dicta quasi *ἀνθραξ*, quod Thora Alexipharmacū sit. Avicenna, Napellus Moysis & herba Napello similis, ejusq; veneno repugnans. Anthora, Matth. Gesl. hor. Lon. Cast. Cam.

Anthora, Ad. Lob. Dod. Tab. Ger. vulgaris, Clus. Aconitum salutarium, Gesl. hor. (hist.)

Flore est luteo: Taber. secūda meminit, quę solo floris colore caruleo à priore differt: habet & tertiam ex Pandectario, foliis asari crenatis, radice rotunda amara: sed quid est?

#### ACONITUM PARDALIANCHES.

I. Aconitum pardalianches i. seu Thora major. Pseudoaconitum pardalianches, Matth.

Aconitum i. seu pardalianches majus, Gesl. hor.

Aconitum Ghini, Ang.

Limeum Plinii, Ang. Lugd.

Herba thora, limeū vocari falso credi, Guil. pap.

Tora venenata, Gesl. lun.

Pthora Valdensium, Ad. Lob. ico. Clus. hist.

Thora Valdensis, Clus. pan. Cast. Lug. Cam. mas & femina, Tab. Ger.

Tora major, Cam. ep.

Foliorū exortu, situ & numero variat: enascitur enim uno folio, duobus, idque vel statim à radice, vel nullo à radice, sed in caule duobus masculis, vel tribus, vel quatuor, vel quinque ad summum: hinc Taber. feminam quatuor, marem duobus foliis magnis pingit.

II. Acon. pardaliāches alterū, sive Thora minor.

Aconitum primum minus, Gesl. hor.

Tora minor, Gesl. de acon. Cam. ep.

Thora Valdensis, Dod.

Thora Sabaudica & Thora mōtis Baldi, Tab. Ger.

Limeum pardal. genus unō folio, Lugd.

Ranunculus gramoia radice 3. Clus. hist.

Hujus folia breviora superne latiora & magis incitā, quā Thora Valdensis, vel è monte Baldo: hujus flos, Clusio quinis foliis, illorum, quaternis duntaxat foliis exprimitur.

III. Aconitum pardalianches Dioscoridis creditum Matthiolo.

Aconit. pardalianches, Matth. Lac. Dod. gal. Cast. Lug. Tab.

Aconitum Matthioli, an in rerum natura sit dubitat Gesl. hor. & lun.

In Lugd. hist. primum Matthioli figura exhibetur: dein in append. iconi prius propositā, ramulus floribus onustus adpingitur. Quod aliqui commentitii existimant: Lug. historiae anthor, plantā in Allobrogibus natē scribit: quid sit ignoramus.

*Herba venenata & earum antidota.*

I. Ourari.

I. Turara.

II. Aparaeo.

II. Wape.

III. Coraisi.

III. Cutarapama.

IV. Parapara.

IV. Macatto.

Hę solo nomine, par. 8. Ind. occid. proponuntur, sed quid?

#### DORONICUM.

**D**oronici vox ab Arabibus petita, qui Dorongi sive Durungi dicūt: hoc aliqui inter Aconita referūt. eò quod illi canes interficiantur: aliqui ab Aconito separat. siquidē sine noxa usi sint: & licet canes interficiat, dātur & aliis quæ brutis, nō tamē hominibus obsunt, ut vulpes, Aloe saluberrima & Amygdalis amaris necari. Plutarchus auctor ē.

I. Doronicum radice dulci.

Aconitum Pardaliāches Theophrasti, Matt. Lug. Taber.

Doronicum Austriacum alterū, Clus. pan. Cam.

Doronicum 3. Austriacum 2. Clus. hist.

Doronicum 2. longifolium, Tab. minus, Ger.

Doronicum radice repente, Eid.

II. Doronicum radice scorpionii brachiata.

Aconitum pardalianches Plinii, Matth. Dod. gal. Lug. Tab. alterum, Dod.

Doronicum brachiata radice, Lob. Lug. Ger.

an Doronicum radice nigra, Col.

III. Doronicum radice scorpionii.

Aconitū pardalianches minus, Matth. Lugd. Cast. primum, Dod.

Doronicum, Ang. Cord. hist. Gesl. hor. Lon. Cz. Eyflett.

Doronicum Romanum, Gesl. hor. Lug.

Doronicum alterum, Ad.

Doronicum primum, Tab. minus, Cam.

Doronicum majus, Ger.

Doron. latifolium, Clus. pan. & hist.

Doronici tertii varietas, Ad. Lob.

Ob triplicem hanc Aconiti pardalianchis diffrentiam, triplicem esse Doronici varietatem, non sine causā suspicari licet.

IV. Doronicum plantaginis folio.

Doronicum primum, Ad.

Doronicum minus officinarum, Lob. Lugd.

Doronicum angustifolium, Clus. hist.

V. Do

V. *Doronicum plantaginis folio alterum.*  
*Alisma, Matth. Cast. Cam. Eyst. alpinum, Gef. hor.*  
*Thal.*  
*Calcha alpina, Gef. hor. Tab.*  
*Calendula alpina, Ger.*  
*Nardus Celtica altera, Ad. Lob. Lugd.*  
*Chrysanthemum latifolium, Dod. Lug. Ger.*  
*Doronicum 5. Germanicum & 6. Pannonicum,*  
*Clus. hist.*  
*Damaſonium ſive Alisma, Lugd.*  
*Parmica montana, Lugd.*  
*Damaſonium 1. Dioſc. Tab. —*  
 Alii glabris, alii hirsutis foliis pingunt: hæc  
 magis minusve hirsutis, licet diverſis locis  
 natam obſervavimus: ſic floris color albus eſt  
 Matthiolo, ex pallido albicans, Caſt. aliis luteus

& rectè: in Styriæ pratis floribus cæruleis re-  
 peritur.

VI. *Doronicum longifolium hirsutæ aſperu.*  
*Doronicum 1. vel minus, Clus. pan.*  
*Doron. 2. Auſtriacum minus ſive 1. Eid. hiſt.*

VII. *Doronicum latifol. flore magno.*  
*Doronicum Auſtriacum 3. Clus. pan.*  
*Doronicum 4. ſtiriacum, Eid. hiſt.*

IX. *Doronicum maximum foliis cauſam*  
*plexantibus.*

*Doronicum Auſtriacum 5. ſive maximū, Clus. pan.*  
*Doron. 7. ſive Auſtriacum 3. Eid. hiſt.*

IX. *Doronicum Helveticum incanum.*

X. *Doronicum Helveticum humile, craſſis*  
*foliis: illud pro 1. hoc pro 2. in prodromo de-*  
*ſcribitur.*

## HELLEBORUS.

*E* *Αἰθερος secundum Etymologicum dicitur ὅδ' ἡ ἄρα τῆ βοτῆ quod eſu perimat.*

Genera duo ſunt Dioſcoridi l. 4. c. 150. & 151. albus, foliis plantaginū, aut beta ſylveſtris: niger qui & *μαλ-  
 ακτος* ( quoniam Melampus caprarum paſtor, ſurentes in ſe Prætiſilias, hoc primus purgaſſe & ſanaffeſcit ) ſo-  
 liū platani. Theoph. 9. h. 11. Elleborus niger & candidus æquivocè dicitur, cum aliis facie ſimiles, ſed radicis colore  
 candido & nigro inter ſe diſſerre ceſſant. Alii ſolium nigri laureum; candidi, porraceum reddiderunt, radices  
 autem ſimiles, colore excepto. Niger ubiq; naſcitur, ſed optimus Helicone: at candidus locis pauciſſimis exit: opti-  
 mus verò & uſuſtatiffimi quatuor ſunt, Oetum, Ponticum, Eleaticum, Maſſilioticum. Et quāvis formā conve-  
 niant, vires tamen proprias fortiuntur: nigrum, ab eo qui comperit & primo ſuccidit, Melampodium quidam  
 appellant. hæc Theophrastus. Plinio l. 25. c. 5. Genera prima duo ſunt, candidum & nigrum: hoc de radicibus tan-  
 tum intelligi tradunt pleriq;: alii folia nigri, platano ſimilia, ſed minora nigriatq; & pluribus diſiſſis ſiſſa: al-  
 bi, beta incipientis &c. Latini Veratrum quod mentem vertat.

### HELLEBORUS NIGER.

I. *Helleborus niger fortidus.*  
*Enneaphyllon Plinii l. 27. c. 9. quod longa folia*  
*novena habere videtur.*  
*Pedicularia fœtida 3. Trag.*  
*Elleb. niger ſyl. adulterinus, Trag. Fuch. Lugd.*  
*Lycostomum 1. Dod. gal.*  
*Conſiligo, Ruel. Gef. hor. Lon. Ger.*  
*Conſiligo ſylveſtris, Tur.*  
*Pulmonaria Vegetii, Gef. hor.*  
*Helleb. niger alt. vel Helleborine major, Cord.*  
*hiſt.*  
*Veratrum nigrum 3. Dod. Clus. hiſt.*  
*Sefamoides magnum Cordi, Lob.*  
*Helleboraſter, Ad. maximus, Lob. Ger.*  
*Helleboraſtrum magnum, Tab.*  
*Enneaphyllon Plinii, Cæſ.*

Magnitudine variat: hinc Helleboraſtrum ma-  
 gnum & minus, Tab. at Ger. ſub Conſilagine

Ruellii & Hellebor. maximo proponit.

II. *Helleborus niger hort. flore viridi.*

*Conſiligo Plinii l. 26. c. 7. videtur.*

*Helleborus niger, Brunf.*

*Elleborus niger adulterinus domeſticus, Trag.*

*Elleborus niger adulterinus horteniſis, Fuch.*

*Elleb. niger alter, Matth.*

*Elleb. niger vulgaris, Gef. hor. Cæſ.*

*Pſeudohelleborus niger, Dod. gal.*

*Conſiligo, Tur. minor, Lugd.*

*Helleb. niger noſtras, Cord. hiſt.*

*Veratrum nigrum, Cord. in Dioſc. ſecundū, Lac.*

*Dod. Clus. pan. & hiſt. Tab.*

*Elleb. niger 3. Dodonæi & Matthioli, Lugd.*

*Helleboraſter alter, Ad.*

*Helleboraſtrum, Lob. Ger.*

*Hujus radice multi in Medicina utuntur.*

III. *Helleborus niger horteniſis alter.*

*Veratrum nigrum 4. peregrinum, Clus. hiſt.*

A 2

Hujus

Hujus folia atriora, florum oræ ex purpura nigrescant.

V. *Hellevator niger* flore roseo.  
*Elleborum nigrum*, Matth. Cast. Lug. Cam.  
*Planta leonis*, Dod. gal.  
*Elleb. niger* fl. magno purpureo, Gef. hor.  
*Helleb. niger*, Ad. Lob. *niger* 2. *Dodonzi*, Lugd.  
*Veratrum nigrum* 1. *Dod. legitimum*, Clus. pan. *Stiriacum*, Tab.  
*Ellebori nigri alterum genus*, Cæf.  
*Elleb. niger annuus*, Ang. *niger legitimus*, Clus. *hifl. niger verus*, Ger.

Flore est purpureo, candido: sic flos initio albidus, dein purpurascens, postremo virens; & quia albo flore marcescens purpurascit: flos albescit cum aliqua diluta rubedine.

V. *Helleb. niger Saniculæ folio major*.  
*Oseritium montanum*, Trag.  
*Sanicula fœmina adulterina*, Eid.  
*Sanicula fœm.* Fuch. Gef. hor. Lugd. Clus. *hifl.*  
*Veratrum nigrum Dioscoridis*, Dod. Lac. *Eyft. nigrum* 2. Clus. pan.  
*Astrantia nigra*, Gef. hor. Ad. Lob. Ger.  
*Imperatoria nigra*, Tab.  
*Elleb. niger Dodonzi*, Lugd. verus *Dioscoridis Dodonæo*, sed fallitur, Gef. hor.

VI. *Helleb. Saniculæ folio minor*, in pro-dromo describitur.

VII. *Helleborine Saniculæ facie*.  
*Epipactis*, Matth. Lac.  
*Elleborine*, Matth. Lug. Tab.  
*Helleborine Matthioli commentitia*, Ad.  
*Elleborine alpina Saniculæ & Ellebori nigri facie*, Lob.

IX. an *Elleborinæ nigra species*.  
*Polyrrhizos Plinii Dalechampii*, Lugd.  
 IX. *Hellevator niger tenuifolius Buphthalmi flore*.

*Elleboris niger verus*, Trag. Lon.  
*Pseudoelleborum*, Matth. Lugd.  
*Buphthalmum*, Ang. *Dodon.* Clus. pan. & *hifl.* Lugd. Cam.  
*Helleborine tenuifolia*, Cord. *hifl.*  
*Elleborastrum nigrum*, Gef. hor. Cam.  
*Helleborus ferulaceus*, Ad.  
*Helleb. niger ferulaceus Theoph.* Ad. Lob.  
*Elleborum alterum*, Cast.  
*Helleborus Hippocratis*, Tab.  
*Sesamoides minus*, Cord. in *Diosc.* Gef. hor.

*Ellebori nigri species quibusdam*, Gef. hor.

### HELLEBORUS ALBUS.

I. *Hellevator albus flore subviridi*.  
*Elleborus albus*, Brunf. Trag. Fuch. Cord. *hifl.* Gef. hor. Ang. Lon. Lugd. Cam. Clus. *hifl.* fl. herbaceo, Eyft.  
*Helleborum album*, Matth. Ad. Lob. Cæf. Cast.  
*Veratrum album*, Dodon. gal. Tur. Lac. Cord. in *Dioscorid.*

*Helleborus candidus Græcorum*, est *Consiligo Vegetii*, *Abfyrti*, *Columel.* & *Plinii*, Guil.  
 Flore est in viridi albescente *Taber.* qui iconem sequentis habet: dein flore pallide flavescente, & alterum eodem colore, nisi quod flos racemi instar coactus sit, quem *Elleb. album fœminam*, *Hellebalbum præcoccem* Ger. nominat. Mas de-rrior, fœmina mollior.

II. *Helleborus albus flore atrorubente*.  
*Helleborum album floribus atrorubentibus præcox*, Lob.  
*Helleborus albus alter fl. nigricantibus*, Dod. flore ex purpura nigricante, Clus. *hifl.*  
*Ellebori albi alterum genus*, Cæf.  
*Helleb. albus*, Ger. flore atrorubescens, Eyft. max. Tabico.

Ex radicibus *Ellebori albi*, Hispani venenum conficiunt, de *Balestera* & de *jerva* vocatâ, quod idem quod *Pharicum dictum*, aut parum omnino ab eo differens. Et *Limeum* herbam à *Gallis* appellatam, ab *Elleboro* non discrepare, suspicari possumus, Guil. pap.

### HELLEBORINE.

I. *Helleborine latifolia montana*.  
*Satyrion octavum*, Trag.  
*Helleborine*, Dod. Ad. Lob. Lugd. Ger. 1. Tab. 10. centurionum 2. Clus. *hifl.*  
*Damaconium Calliphyllon*, Cord. *hifl.*  
*Epipactis sive Elleborine*, Cam. ep.  
*Sigellum Salomonis*, Cæf.  
*Epipactis latifolia*, Eyft.  
 Foliorum amplitudine (& quod altera foliis oblongis acutis, altera verò subrotundis est) & floris colore variat.

II. *Helleborine altera atrorubente flore*.  
 Alisma botryodes seu racemosum, Thal.  
 Variat foliorum amplitudine: florum colore atrorubente, rarius candido.

III. *Helle-*

III. Helleborine angustifolia palustris five pratensis.

Elleborine 2. Clus. pan. recentiorum 3. Eid. hist.

IV. Helleborine flore carneo.

Elleborine 3. Clus. pan. 4. Eid. hist.

Sigillum S. Mariæ alterum, Czf.

V. Helleborine flore albo, vel Damafonium montanum latifolium.

Alisma quorundam, Cord. hist.

Alisma cymbalanthemon, Thal.

Helleborine albo flore, Tab. Ger.

Epipactis angustis foliis, Eyf.

VI. Helleborine montana angustifolia spicata.

Elleborine 4. Clus. pan. 5. Eid. hist.

VII. Helleborine montana angustifolia purpurea, Cord. hist. (purpurea).

Elleborine 5. Clus. pan. 6. Eid. hist.

Alisma tenuifolium, Thal.

Damafonium alpinum, Lugd.

Sigillum S. Mariæ 3. Czf.

Helleborine angustifolia, Tab. Ger.

Flore luteo reperiri Lug. auctor est.

II X. Elleborine 7. Clus. hist.

IX. Helleborine flore rotundo, five Calceolus.

Alismatis species flore ferrugineo, Gef. hor.

Lonchitis prior, Dalech. in Diosc. Ama.

Damafonium nothum, Dod. gal.

Calceolus Marianas, Dod.

Pseudodamafonium, Clus. pan.

Calceolus Mariæ, Ad. Lob. Eyf.

Elleborine recentiorum 1. Clus. hist.

Elleborine ferruginea Dalechampi, Lugd.

Alisma *alvum* aut *receptum*, Thal.

Flore est luteo, sed folia adjuncta ferruginea: reperitur & albo & utriculo purpureo: apud Helvetios flore est duplo majore, quàm apud Noricos.

X. Helleborine Indica floribus candidis.

Elleborines fortè genus, Clus. exot. l. 4. c. 20.

## SECTIO QUINTA.

### GENTIANA; PLANTAGO; HOLOSTIUM;

CORONOPUS; PSYLLIUM.

#### GENTIANA.

**G**ENTIANA<sup>1</sup> Dioscoridi l. 3. c. 3. quæ ab inventore Gentio Illyriorum rege, qui primus in bello ejus vires reperit, denominata. Diosc. est foliis juglandi, plantaginive similibus: at Plinio l. 25. c. 7. foliis fraxini. Perùm Gentiana alia sunt radice perenni, alia fugaci: illa, flore & semine prolato, interire non solent, sed singulis annis ex eadem radice, nova germina produciunt: hæc verò, flore emarcido, & semine disperso, hyeme intereunt, & ex semine renascuntur.

*Gentiana alpina major.*

I. Gentiana major lutea.

Gentiana, Brunf. Matt. Fuch. Ang. Tur. Lac. Dod.

Cord. in Diosc. & hist. Gef. h. Lon. Czf. Cast. Lug.

Gentiana major, Matth. Gef. hor. ap. Ad. Lob. flore

luteo, Cam.

Gentiana veterum, Clus. hist.

Gentiana 1. species, Trag.

Reperitur quoque floribus flavis, imò & albis, nunc & carentibus cæpanulæ forma, in Pyrenæis.

II. Gentiana major purpurea.

Gentiana 2. species, Trag. Dod. gal.

Gent. punicea, Gef. fr. purpureis floribus, Lob. ob.

Gentiana major alia, Cam. ep.

Gent. major fl. purpureo & 1. Clus. pan. & hist.

III. Gentiana major flore punctato.

Gent. major pallida punctis distincta, Clus. pan. & hist.

Variat floribus colore pallido: reperitur & cæruleo, quæ

Gentiana major cæruleo flore, Clus. hist.

IV. Gentiana asclepiadis folio.

Gentiana 3. Trag. Dod. gal.

Gentiana foliis hirundinariæ, Gef. hor. five Asclepiadis, Clus. pan.

Gentiana 2. cæruleo flore, Clus. hist. Tab.

Gentiana minor altera, Dod.

Vincetoxicum 1. Czf.

Flore est cæruleo saturato, nunc purpureo, nunc delicatior & velut cinerei coloris.

*Gentiana alpina minor five Gentianella.*

I. Gentianella alpina latifolia magno flore, quæ in prodomo descripta est.

II. Gentianella alpina angustif. magno flore.

Gentiana 4. Trag.

Gentianella alpina, Gef. hor. pumila, Gef. car.

A 2

Gentia-

Gentianella campanulæ flore purpureo, Ad.  
Gentiana 5. & Gentianella verna major, Clus.pan.  
& hist.

Gentianella Helvetica, Lob.ico.  
Gentianella minima latifolia, Lugd.  
Helleborine Dalechampion ad Diic.

### III. Gentianella alpina verna major.

Hippion, id est, Viola equina, Cord.ob.Ges.hor.  
Calathiana verna, Ges.hor.

Gentianella verna minor, Clus.hisp.& hist.

Gentiana 6. Clus.pan.

Gentianella alpina, Lob. Bavarica, Cam.hor.

Gentianella angustifolia, Lugd.

Gentianella minima verna fl. cæruleo, Eyf.

Vincetoxici species pusilla, Cæf.

Flos pleriq; cæruleus, quibusdam candicans.

### IV. Gentianella alpina verna minor.

Gentianella minor, Cam.hor.

an Gentianella purpurea minima, Col.

V. Gentianella alpina æstiva centaureæ minoris foliis.

Gentiana fugax 5. seu Gentiana 11. Clus.pan.& hist.

Gentiana minor, Tab.

Calathiana verna Dalechampi, Lugd.

### VI. Gentianella brevis folio.

Gentiana minima, Ad.Lob.Cast.

Gentiana fugax 4. vel Gent.10. Clus.pan. & hist.

Vulneraria herba, Cast.ico.

### VII. Gentianella cærulea oris pilosis.

Gentianella cærulea fimbriata angustifolia autumnalis, Col.

IIIX. Gentianella omnium minima: in prodromo descripta.

#### Gentiana pratensis.

### I. Gentiana cruciata.

Herba fullonum, Brunf.

Cruciata, Trag. Fuch. (cui & Gentianæ species)

Dod. Ang. Ges.hor. Lac. Lon. Lug. Eyf.

Gentiana cruciata, Ges.hor.

Gentiana minor, Matth. Ad.Lob.Cast. Tab. media, Cam.

Gentiana 3. quæ duplex, Clus.pan. & hist.

Cruciata gentianella, Thal.

Vincetoxicum alterum, Cæf.

- Altera est procumbens & minor: altera erecta & major: alterius fl. intensè cærulei: est & tertia radice non pertusa.

### II. Gentiana autumnalis ramosa.

Gent. fugax five annua 1. vel Gent. 7. Clus.pan. & hist.

Gentiana 7. Tab.

Viola calathiana altera, five polyanthemus, Thal.

Gentianella multiflora autumnalis è cæruleo purpurascens, Eyf.

Flore est cæruleo purpurascēte, rarius candido.

### III. Gentiana pratensis flore lanuginoso.

Gent. fugax alt. five Gent. 8. Clus.pan. & hist.

IV. Gentiana pratensis flore breviorē & majore.

Gent. fugax 3. five Gent. 9. Clus.pan. & hist.

### V. Gentiana utriculis ventricosis.

Gentianella cærulea cordata, Col.

VI. Gentiana angustifolia autumnalis major. Pneumonanthe, Lob.

Calathiana viola autumnalis minor, Ges.hor.

Calathiana autumnalis, Ges.cat.

Campanula autumnalis, Dod. Eyf.

Gentiana 4. five angustifol. 2. Clus.pan. & hist.

Flore est cæruleo dilutiore: est nigro: rarius albo.

VII. Gentiana angustifolia autumnalis minor, floribus ad latera pilosis.

Pneumonanthe, Cord. hist. def. Ad.

Viola calathiana autumnalis prima, Thal.

Gentianella autumnalis foliis centaureæ minoris fl. cæruleo, Eyf.

#### Gentiana palustris.

### I. Gentiana palustris angustifolia.

Gentiana minima, Matth. Cast. def.

Calathiana viola in pratis udis, Dod. gal. Lugd.

Calathiana viola autumnalis, Ges.hor.

Pneumonanthe (in humentib. ericetis) Lob.ob. Tab. Ger.

Gentiana angustifolia, vel 4. Clus.pan. & hist.

Cruciata five Gentiana minima, Lugd.

Campanula pratensis, Lugd.

Floris color cæruleus, violaceus, purpureus.

II. Gentiana palustris latifolia flore punctato.

Gentiana 12. & punctata, Clus.pan. & hist.

Alisma folio glabro, in Phytopinace.

Floribus est subcæruleis, purpureis, violaceis punctis aspersis.

**P**lantago ἀνύδραμος Dioscor. lib. 2. cap. 153. à forma, id est, lingua agnina dicitur: à τὸν ἀνύδρα & multi-  
nervia & τὸν ἀνύδρα & septinervia. Latinis plantago, à planta ducto nomine.

*Plantago latifolia.*

I. Plantago latifolia glabra: quæ 1. in Prod.

II. Plantago latifolia sinuata.

Plant. rubra, Brunf. Trag. (vel major & 1.) Lon.  
Plant. major, Matth. Fuch. Tur. Gesl. h. Dod. Cast.  
Tab. Cam. major latifolia, Ang.

Plantago latifolia, Cord. in Diosc. Ger. latifol. læ-  
vis, Ad. Lob. ico. vulgaris latifol. Eid. obs. Lugd.

Plantago & Centinervia, Cæf.

Plantago ἀνύδρα & major sive rubra, Thal.

III. Plantago latifolia incana.

Plantago major, Brunf. Matth. Lon. Lugd. Cam.

Plant. latifolia, vel media & 2. Trag.

Plant. media, Fuch. Dod. Gesl. hor. Thal.

Plant. major incana, Ad. Lob. Clus. hist.

Plant. minor, Tur. minor Dioscoridis, Tab.

Plantago incana, Ger.

Cynoglossa quorundam, Lugd.

IV. Plantago latifolia rosea, flore expanso.

Plantago rosea, Cam. Ad. Lob. ico. Eyf.

Plantagini majori florem addidit, Cam. in Matth.

Plantago rosea exotica, Ger.

V. Plantago latifolia rosea, floribus quasi in  
spica dispositis.

Plantago rosea, Ad. Lugd.

Plantago multiplex, Tab.

Plantago rosea spicata, Ger. Eyf.

Hujus spicam, Cam. in Matth. Plantagini majori,  
& Lob. in icon. Plantagini roseæ adjecit.  
Unam esse, & differentiam in flore diu solum  
tempore consistere, censuimus.

VI. Plantago latifolia spica multiplici sparsa.

Plantago major altera, Dod. gal.

Plantago major spica multiplici, Dod.

Plantago paniculâ sparsâ Sarothrodes & Core-  
matophora, sive Scoparia, Gemmæ, Lob.

Plantago rosea Lobelii, Lugd.

VII. Plantago Indica.

Payco, herba ex Peru, Monar. Lugd.

IX. Plantago peregrina sinuosa.

Plantago umbilicata, latifol. & convoluta, Lob.  
ad. par. 2.

IX. Plantago latifolia incana spicis variis.

Plantago peregrina latifolia Gazetti, Clus. hist.

Capitula varia: quædam rotam æmulantur,

quædam spicam: quædam ex media rosa brevem  
spicam producant: in aliis ex spicæ parte infima,  
alia capitula dependent.

X. Plantago villosa, seu incana lanuginosa.

Plantago Salmaticensis, Cynoglossum fortè  
Diosc. Clus. hisp. & hist.

XI. Plantagini Hispanicæ similis.

Planta quæ Alexipharmacum est: in Epist. ad.  
Monard.

XII. Plantago latifolia glabra minor.

Plantago latifolia minor, Tab. Ger.

XIII. Plantago latifolia hirsuta minor.

Plantaginis media genus minimum, Thal.

*Plantago angustifolia.*

I. Plantago angustifolia major.

Plantago minor, Brunf. Fuch. Dod. Gesl. hor. Lac.  
Lon. Lugd. media, Cast.

Plantago lanceolata, Trag. Ang. Tab.

Plantago longa, Matth. Lugd.

Plant. quinquenervia, Ad. Lob. Ger. ἀνύδρα &,  
Thal.

Lanceola major, Cæf.

Variet. spicis aliquando bifidis: aliquando loco  
spicarum sunt capitula, mirè variantia.

II. Plantago angustifol. major, caulium sum-  
mitate foliosâ.

Plantago quinquenervia rosea, Ger.

III. Plantago angustifolia prolifera.

Plant. angustifol. Gazetti, vel exotica, Clus. hist.

IV. Plantago angustifolia serrata Hispanensis.

Plant. angustifolia altera, Clus. cur. post.

V. Plantago angustifol. fruticans, Clus. cur. po.

VI. Plantago angustifolia minor, Tab. Ger. ff.

Plantago pentaneuros minor, Thal.

Lanceola minor, Cæf.

VII. Plantago pilosâ bulbosâ.

Plantago Apula laciniata bulbosâ, Col.

IX. Plantago angustifol. paniculis lagopi,  
quæ 4. in Prod.

an Plantago peregrina plantagini acutæ similis, quæ  
Græcis ἀνύδρα dicitur, Rauw. Lugd.

Variat, modo paniculis lagopi est: modo capitu-  
lis rotundis, hirsutis, albis.

IX. Plantago trinervia fol. angustissimis: 3. in  
Prod.

X. *Plantago trinervia montana*.  
*Plantago altera minima trinervia montana* inca-  
 na, Col.

*Plantago aquatica.*

I. *Plantago aquatica latifolia*.  
*Plátago aquatica*, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod.  
 Tur. Gef. h. Lon. Ad. Lob. Cast. Thal. Cæf. Lugd.  
 Tab. Ger.  
*Limonium*, Ang.  
 An huc referendum  
*Alisma* siue *Damafonium*, quæ *Fistula pastoris* &

*Plantago aquatica Germanis*, Cord. in Diosc. Lon.  
 II. *Plantago aquatica angustifolia*.  
*Plant. aquat. humilis angustif. & longifolia*, Lob.  
*Plantago aquatica minor*, Cæf. Tab.  
*Plantago aquatica humilis*, Ger.  
 III. *Plantago aquatica stellata*.  
*Alisma pusillum angustifoliū muricātū*, Lob. obl.  
*Plantago aquatica minor altera*, Lob. ico.  
*Damafonium stellatum*, Lugd.  
 IV. *Plantaginella palustris*.  
*Plantago aquatica minima*, Cluf. hist.

# H O L O S T E U M.

**O**λόστον *Dioscorides lib. 4. cap. 11. descripsit : & Plinius lib. 27. cap. 10. inquit, Holosteum sine duricia est herba ex adverso à Grecis appellata, sicuti fel dulce.*

I. *Holosteum hirsutum albicans majus*.  
*Holost. Salmanticum prius*, Cluf. hist. majus, Eid.  
 hist. Lob.  
*Holost. Salmanticense Clusii*, Lugd. Cam. Ger.  
*Holosteum majus*, Tab.  
*Holosteum quorundam*, Cam. in Matth.  
*Plantago angustifolia albida*, Dod.

II. *Holosteum hirsutum albicans minus*.  
*Holosteum Salmanticense minus*, Cluf. hist.  
*Holosteum parvum Monspelienfense*, Ad. Lob. Ger.  
*Holosteum Monspelianum*, Tab.

III. *Holosteum hirsutum nigricans*.  
*Holosteum quorundam*, Lugd.  
 an *Lanceola montana*, Gef.

IV. *Holosteum, siue Leontopodium Creticū* :  
 in Phyt. & Prod. descriptum  
*Leontopodium Creticum*, Cluf. hist.  
*Leontopodium legitimum, quod Catanance* cre-  
 dūm, Imperato.  
*Leontopodium, Catanance non est*, Belli ep. 1. ad  
 Cluf.

V. *Holosteum Creticum alterum*.  
*Leontopodium Creticum aliud*, Cluf. hist.

*Habbures*, Cam.  
*Gotne albi catartici nomine Alpinus misit*  
 an *Planta Plantagini similis*, Lugd. ap.  
 VI. *Holosteum strictissimo folio majus*.  
*Coronopus siue Serpentina*, Matth.  
*Coronop. syl. Matth. Gef. h. Lob. Lugd. Cast. Tab.*  
*Serpentina*, Dod. Ad.  
*Plantago marina*, Cam.  
*Coronopus, Ger. ico. montanus*, Cæf.  
 VII. *Holosteum strictissimo folio minus*.  
*Serpentaria onium minima*, Lob. Dod. Lugd.  
*Coronopus altera*, Cæf. minor, Tab.  
*Coronopus siue Serpentina minima*, Ger.  
 IIX. *Holosteum Mafsilienfense*.  
*Coronopi & Sedi montani media planta Mafsi-*  
*lientium*, Ad. Lob.  
*Coronopus Mafsilientium*, Lugd. Tab.  
*Coronopus siue Serpentaria minor*, Ger.  
 IX. *Holosteo affinis, Cauda muris*.  
*Coronopus sylvestris*, Trag.  
*Myofuros*, Dod. gal. Lob. ico. quorundam, Thal.  
*Cauda muris*, Dod. Ad. Lob. Lug. Tab. Cam. Ger.  
*Holosteon*, Lon. Lugd. Cam. Thal.

# C O R O N O P U S.

**K**ορνόπος *Dioscoridi lib. 2. cap. 158. & Theophrasto 7. hist. 9. ubi Gæza Silaginem vertit : Plinio lib. 21. cap. 14. & l. 22. c. 19. Coronopus dicitur. Latinus, pes cornicis à foliorum forma : & cornu cervi, nominatur.*

I. *Coronopus hortensis*.  
*Coronopus*, Trag. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac.  
 Lon. Ad. Tab. Eyf.  
*Coronopus lativus*, Cord. hist. Cast. Cæf. Cam. ve-  
 nus, Cord. in Diosc. Gef. hort.  
*Pseudocoronopus*, Dod. gal.  
*Cornu cervinum*, Lob. Ger.

*Herba stella, siue cornu cervinum*, Dod.  
 II. *Coronopus sylvestris, hirsutiore*.  
*Coronopus sylvestris*, Cæf.  
*Coronopus Prochyta*, Col.

III. *Coronopus maritima major*.  
*Plantago marina*, Dod. gal. Ad. Lob. Tab. Ger.  
*Plantago maritima*, Gef. hor. Lugd.

Plan-



V. *Coronopus maritimus minimus hirsutus*:  
in Prod. descriptus.

an Kaly 3. Alpini, minus rectè pictum.

*Pyrola* 3. vel frutescens, Clus. pan. & hist.

Digitized by Google

**B**istorta dicitur, quod radice in se consorta & convoluta conficit: quam alii Limonii, alii Britannica alii Behen rubri speciem faciunt. Huius Plinius l. 2. c. 16. & l. 25. c. 31. inter Dracontia meminisse videtur: sortem ejusdem l. 25. c. 13. Molybdana, id est Plumbago, quod plumbum, oculi vitium tollat.

I. Bistorta major radice minus intorta.  
Colubrina & Dracunculus major, Brunf.  
Bistorta femina, Eid.  
Bistorta major, Trag. Dod. gal. Ang. Gef. col. Ad.  
Thal. Tab. Ger. Cluf. hist.  
Bistorta, Cord. in Dioic. & hist. Matth. Dod. Cz. f.  
Cast. Lugd.  
Bistorta Britannica, Lob.  
Serpentaria femina & Colubrina, Fuch.  
Colubrina, Lon.  
Limonium, Gef. hor.  
Bulapathum seu Bistorta, Fracast.  
II. Bistorta major radice magis intorta.  
Colubrina & Dracunculus minor, Brunf.  
Bistorta mas, Eid.  
Colubrina minor, Trag.  
Serpentaria mas seu Bistorta, Fuch.  
Bistorta, Lon. minor, Dod. gal. Gef. hor. Lac. Tab.

Bistorta media, Ang.

Bistorta larifolia, Ger.

Bistorta major, Eyst.

In foliis & radice differentiae: folia alteri majora & rugosa: alteri minora & lœvia: & huius radix magis intorta: illius major, minusque complicata.

III. Bistorta alpina maxima: in Proder. & Schwenck.

IV. Bistorta alpina media.

Limonii species minor, Gef. hor.

Bistorta minor, Ad.

Bistorta minor seu alpina, Cam. in Matth.

V. Bistorta alpina minor.

Bistorta minor, Ang. Cluf. pan. Ger.

Bistorta alpina minor, Cluf. hist.

Bistorta minima alpina alia, Cam.

## LIMONIUM.

**L**ιμονιον & βελανδρις Dioscoridi l. 4. c. 16. quod & λεμονιον in palustribus (quamvis & in palustribus) provenit Plinio l. 20. c. 8. Beta sylvestris, quam Limonium vocant, alii neuroides.

I. Limonium maritimum majus.  
Limonium, Matth. Lac. (cui & Been rubrum) Ad.  
Lob. Cz. f. Cast. Lugd. Ger.  
Been rubrum, Limonio seu Bistortae cognata,  
Gef. hor.  
Behen rubrum officinarum, Guil.  
Valerianae rubrae similis, Dod.  
Limonium primum, Tab. Cam.  
II. Limonium alterum, Matth. Lugd. Tab. cui  
& Pyrola: quid est?  
Limonium Matthioli secundum, Ad.  
III. Limonium maritimum minus oleae folio.  
Limon. parvum Narbonense oleae folium, Ad.  
Lob. ico. Tab.  
Limonium parvum Narbonense, Lugd. Cam.  
Limonium alterum exiguum, Cz. f.

Limonium parvum, Ger.

In hoc magna varietas occurrit.

IV. Limon. parvum bellidis minoris folio.

Limonium pumilum, Cluf. hist.

V. Limon. maritim. minus foliolis cordatis: quod Lin. Prod.

VI. Limon. maritim. minimum: quod Lin. Prod.

VII. Limonium peregrinum foliis asplenii.

Limonii elegans genus, Rauw. & Lugd. ap.

Limonium peregrinum, Cluf. cur. post.

Limonium Syriacum, Eyst.

Cichorium globulare, Imper.

IX. Limon. peregr. foliis forma flor. Aristolochiae.

Limonio congener, Cluf. hist.

## POTAMOGETON.

**P**οταμογετον, quasi fluminibus vicina, quod palustribus & aquis nascatur, Diosc. l. 4. c. 101. & Aetiam l. 4. c. 46. quo herinaceum interfici scribis, & τρυγίς, quasi spicata, ob caulem, quem floribus & fructibus ne spicatum ex se mittit. Plinio lib. 26. cap. 8. Potamogeton foliis Betae &c. subjungit: Castorem hanc aliter natus tenui folio veluti equini salis, thyrsi longo & levi, in aquis nascentem: hoc Myriophyllum aquaticum videtur.

I. Pot.

- I. *Potamogeton rotundifolium*.  
*Potamogeton*, Trag. Matth. Fuch. Ang. Lac. Lon.  
 Cæf. Calt. Lugd. Tab.  
*Potamogeton*, Dod. gal. latifolium, Ger.  
*Potamogeton* *Λιόφυλλον*, Thal.  
*Potamogetoni* similis rotundiore folio, Cord. in  
 Diof.  
 II. *Potamogeton*, Salicis folio.  
*Phyllitis lacustis*, Cord. hist.  
*Potamogeton*, Dod.  
*Potamogeton*, sive fontalis & spicata, Ad. Lob.  
 ico.  
*Potamogeton* 2. *Dalechampii*, Lugd.  
*Potamogeton* *ἰπιδρύλλον*, Thal.  
*Potamogeton* angustifolium, Tab. Ger.  
 III. *Potamogeton* longo serrato folio.  
*Lapathi* genus sylvestre, Gef. hor.  
*Orylaphum aquaticum*, Lugd.  
 IV. *Potamogeton* foliis latis splendidibus.  
*Potamogeton* altera, Dod.  
*Potamogeton* *μαλακιδρύλλον*, Thal.  
 Habetur major & minor species.  
 V. *Potamogeton* foliis angustis splendidibus.

*Potamogeton* alterum, Dod. ed. belg. & post.

VI. *Potamogeton foliis crispis*, sive *Lactuca ranarum*.

Alga 2. Trag.

*Fontilapathum pusillum*, Ad. Lob. ico.

*Tubulus aquaticus minor*, Clus. pan. & hist.

*Potamogeton* *ἰ λειφύλλον* seu crispus, seu fimbriatum, Thal.

an Alga *Hydrolapathi* folio, Gef. col.

Hæc duplex: altera fermentis planis, altera rotundis, & hæc brevioribus, mucronatis, & minime in ambitu ferratis: utriusque Clusius nominat.

VII. *Potamogeton ramosum angustifolium*.

*Tribuli* aquatici minimi nomine, D. Francus misit: quod 2. in Prod.

IX. *Potamogeton gramineum ramosum*.

*Fontilapathi* graminei nomine, à D. Bursero ex Austria: quod 2. in Prod.

IX. *Potamogeton* minimum capillaceo folio: quod 3. in Prod.

X. *Potamogeton* capillaceum capitulis ad alas trifidis: hoc 4. est in Prod.

## N Y M P H A E A.

*Ντρυαία* Theophrasto 9. hist. 13. *Dioscoridi* l. 3. c. 148. cui sic dicta, quoniam aquosa amet. At *Plinio* l. 25. c. 7. natam tradit ex *Nymphæ Zelotypia* erga *Herculem*, unde quibusdā *Heracleon* dicatur. Officinæ *Nenuphar*. Genera duo *Dioscoridi* & *Plinio*: altera flore albo, radice nigra: altera flore luteo, radice alba.

### *Nymphæa alba.*

- I. *Nymphæa alba major*.  
*Nenuphar album*, Brunf.  
*Nymphæa alba*, Brunf. Matth. Ang. Dod. Cord.  
 hist. Lon. Ad. Lob. Tab. Thal. Ger. Clus. hist.  
*Nymphæa candida*, Trag. Fuch. Tur. Cæf.  
*Nymphæa major alba*, Lugd. Cast. Eyst.  
*Lotus Ægyptia*, Alpini.  
*Nymphææ folia* D. Sigfridus Helmstadio ad me misit, quæ latissima, tenuissima, pallide virentia: an talia sint prima *Nymphææ folia*, & quæ sub aqua latent, quæ dein extra aquam duriora & crassiora reddantur, ut cum maritimis sit, considerandum.  
 Addit *Eyster aliam* quæ nullatenus primi sit dissimilis, nisi quod omnia minorata habeat.  
*Nymphæa alba minor* Eyst.  
 II. *Nymphæa alba minor*.  
*Nymphæa parva*, Matth.  
*Nymphæa altera lutea minor*, Lugd. ico.

*Nymphæa alba minor*, Ad. Tab. Ger.

III. *Nymphæa alba minima*.

*Morsus ranæ*, Dod. Ad. Lob. ico. Cast. Tab.

*Nymphæa minor alba*, Lugd.

*Nymphæa parva*, Cæf.

Florem ex tribus foliis subrotundis & glabris observavimus: at hist. Lugd. florem ex quinque foliolis oblongis & subhirsutis compositum, pingit.

IV. *Galum radix* aquatica in Sunda valde refrigerans: par. 4. Ind. or. 8. quid?

### *Nymphæa lutea.*

I. *Nymphæa lutea major*.

*Nenuphar luteum*, Brunf.

*Nymphæa lutea*, Trag. Matth. Fuch. Ang. Tur. Dod. Lon. Lob. Cast. Tab. Ger. Eyst.

*Nymphæa lutea major*, Lugd. Clus. hist.

*Nymphæa altera*, Cord. in Diof. flore ex toto luteo, Cæf.

*Nymphæa citrina*, Cord. hist.

II. *Nymphæa lutea minor magno flore*.

Bb

Nym-

Nymphæa lutea minor, Lugd. Ger. Dod. ed. belg.

Nymphæa secunda, Tab.

III. Nymphæa lutea minor parvo flore.

Nymphæa lutea minor Septentrion. Ad. Lob. ico.

Nymphæa altera lutea, Lugd.

an Nymphæa parva alia, Cam. in Matth.

IV. Nymphæa lutea minor flore fimbriato.

Nymphæa alia minor, Lugd.

## TRIBULUS AQUATICUS.

**T**ΡΙΒΥΛΟΣ ΕΝΤΑΡΟΣ Diofcoridi l. 4. c. 15. Theophrasto 4. hift. 11. (id est Tribulus aquaticus) à triplici cuspide, ad similitudinem machinularum ferrearum, quæ forma trigona sunt, dicitur.

Genera duo Diofcoridi & Theoph. 6. hift. 5. alter terrestris foliis effigie portulacæ, vel ut Theoph. ciceris folio: alter palustris vel aquaticus. Plinio l. 22. c. 10. Tribuli unum genus in hortis, alterum in fluminibus tantum: qui l. 21. c. 16. scribit Tribulum non nisi in palustribus nasci, folio ad Ulmi effigiem: at in reliquo orbe genera duo, uni Cicerule folia, alteri aculeata esse.

Tribulus aquaticus: & Trag. Matth. Dod. Ang.

Lac. Cord. in Diof. Gef. hor. Lon. Ad. Lob. Cæf.

Cast. Lugd.

Butomos Damocratis, Ang.

Tribulus lacustris, Cord. hift.

Tribulus aquaticus major, Cluf. pan.

## SAGITTA.

**S**AGITTA, à foliorum forma tricuspidi, supernè in unam, infernè in duas desinentium, nomen habet. Phleum Theophrasti 4. hift. 9. & 11. esse volunt: Notandum tamen apud Theophrastum Phleum & Phleon differre: nam Phleum genere neutro, palustris planta est: at Phleos & Stæbe 6. hift. 1. idem sunt, & fortè Poterium erit. Plinio lib. 21. cap. 17. Magopisthanum dicit à Græcis vocari, quam inter ulvas Sagittam vocamus.

I. Sagitta aquatica major.

Sagitta major, Matth. Dod. Cast. Tab.

Pistana Magonis sive Sagittaria aquatica Plinii,

Ad. (cui an Stæbe femina) Lob.

Phleos mas latifolia, Lugd.

Barba sylvana recentioribus, Cæf.

Sagittaria major, Ger.

II. Sagitta aquatica minor latifolia.

Sagitta minor, Matth. Dod. Ad. Lob. Lugd. Cast. Tab.

Pistana Plinii, Ang.

Sagitta & Sagittalis, Cord. hift.

Sagittaria minor, Lob. ico. Ger.

III. Sagitta aquatica minor angustifolia.

Phleos sive Stæbe Theoph. angustifolia, Lugd.

Sagitta minor angustifolia, Tab. Ger.

## DRACUNTIVM.

**Δ**ΡΑΚΟΝΤΙΟΝ Diofcoridi lib. 2. cap. 196. à maculis purpureis, quæ in caule visuntur, ita ut anguem plane, ut Diof. loquitur, referat: sic & Theoph. 7. hift. 11. & 9. ejusd. 22. At Plinius lib. 24. cap. 16. de Dracunculo & Dracuntio egit.

Genera: in quibusdam vetustis Diofcoridi codicibus majoris minorisq; Dracunculi historia. speciatim divisis capitibus, adnotata, reperitur: Major quidem foliis rumicis sibi invicem implicitis, caule bicubitali, versicoloribus, draconum maculis notato, purpureis tamen eminentibus. Minor vero, folio est hederaceo magno, candidis notis insignito, caule versicolore anguis effigie, maculis purpureis resperso. Verùm Galenus, Aegineta & Serapio, qui in simplicium materia Diofcoridem secuti sunt, unius tantum meminere, quare prius caput aliqui ut supposititium remonent. Plinius tria fecit: primum, foliis Beta Aro simili: alterum radice longa articulosa: tertium, folio majore quam cornu radice arundinacea nodis geniculata: at lib. 25. cap. 3. aliud Dracunculum, versicoloribus viperarum maculis notatum proponit: de quo sic Theoph. sunt qui genus quoddam Dracunculi Arum vocent, quod ejus caulis varietatem quandam habeat.

I. Dracunculus bistortæ folio.

Dracunculus major, Matth. Dod. gal. Cast.

Dracontium majus, Tab. Ger. Eyst.

Serpentaria major, Lugd.

Hunc

Hunc nec dum vidimus, de quo Dod. edic. lat. an in rerum natura sit dubitat. & si sit Bistortę speciem esse: at Adversaria inveniri negant. Guilandinus in suo Theo. quaesito pretertextu, ut doctior videretur, Matthiolum: errasse scribit.

II. Dracunculus polyphyllus.

Dracontium majus, Brunf. Dod. Ger. Eyf.

Dracunculus, Fuch. Tur. Gef. hor. Czf.

Dracunculus major, Trag. Lac. Fuch. Tur. Cord. in Diosc. Lon. Cam.

Dracunculus minor, Matth. Cast. Tab.

Dracunculus polyphyllus, Cord. hist.

Serpentaria Dracuncul. major verus, Ang.

Anguina draconia, Ad. & Serpentaria colubrina, Lob.

Dracunculus sive Serpentaria major, Lugd. cui & Serpentaria minor Matthioli.

III. Dracunculus sive Serpentaria triphylla Brasiliensis, in Prod. descripta.

IV. Dracunculus palustris, sive radice arundineae, Plinii.

Dracunculus Plinii 3. Fuch.

Hydropiper rubeum, Eid. ico.

Dracunculus aquaticus, Matth. Dod. Cast. Cam. Ger. Eyf. syl. Tur.

Dracunculus palustris, Dod. gal. Lugd. minor, Lon.

Aron palustre, Gef. hort.

Anguina aquatica sive Dracunculus, Ad. Lob.

Dracontii genus in palustris Germaniæ, Czfi.

## A R U M.

**A**RON apud Syros *Αρουρα* vocatum, foliis est Dracunculi Dioscoridi lib. 2. cap. 197. Aron cui folium cum latitudine cayum atque cucumeracium (de vulgo dicta Colocasia intelligendus) Theophrasto 7. hist. 12. Verum Plinius lib. 24. cap. 16. scribit, quosdam Aron eandem cum Dracontio dixisse. Glancias satum discrevit, Dracontium sylvestre Arum pronuntiando: aliqui radicem, Aron appellaverunt, caulem vero, Dracontium. Aron sexminam in cibis pretulerunt, quoniam mas durior sit & in coquendo lentior. At lib. 19. cap. 5. inter bulbi genera esse ait, quod in Aegypto Aron vocent Scilla proximum, amplitudine folii lapathi, &c. radice mollioris natura quæ edatur & cruda. Observavi in Aron vulgatum, communiter nullis maculis notatum: aliquando litura nigricantibus vel purpureis signatum. Sic aliud folio majore & acutius, aliud rotundius, durius, per totam ætatem vivente, Aron folia aliquando maculis albis asperguntur, aliquando foliorum vena omnes albicant. Ex pistillis colore variat, alteri purpurei, alteri ex albo lutei coloris est.

I. Arum venis albis.

Arisarum, Matth. Dod. gal. Ad. Cast. majus, Gef.

hor. prius Matthioli, Lon. Lugd.

Arisarum latifolium Matthioli, Tab. Ger.

Dracunculus alter, seu henicophyllos, Cord. hist. delc.

Dracunculus minor, Gef. ap. Lac.

Dracontium minus, Dod.

Arum maculatum, Cord. schol.

Aron aliud folio maculato, Thal.

Arum majus Veronenf. Lob.

Caliz primum genus Plinii, Dalech. in Plin.

II. Arum maculatum, maculis candidis, vel nigris.

Aristetium genus, Trag.

Arum nigricantibus licuris signatum, Dod.

Arum, Matth. Lugd. Eyf. majus foliis albis maculis notatis, Cast.

Arum offic. Lob. quoad ico.

Arum maculatum, Tab.

Gickerum sive Gigarum vulgo foliis maculosis,

maculis candidis vel nigris, Czfi.

III. Arum vulgare non maculatum.

Aron, Brunf. Gef. col. Eyf.

Ari primum genus, Trag.

Arum, Fuch. Tur. Cord. in Diosc. & hist. Gef. hor.

Lac. Lon. Thal. Tab. vulgare, Cam.

Arum Dioicoridis, Ang.

Arum majus, Ger.

IV. Arum minus, Matth. Cast. Lugd. Tab. Ger.

V. Arum Byzantinum, Clui. hist.

Variat foliis quibusdam, maculis nigris exilibus distinctis, aliis minimè: flores etiam colore variat: nam quod foliis est maculatis, penicillum folliculo inclusum habet, alia candicantem.

VI. Aron maximum Ægyptiacum, quod vulgo Colocasia.

Arum Ægyptium, Matth. Gef. h. Dod. Lob. Cast. Lugd. Cam. (qui vult hodie Ægyptiis Colocasia dici) Col.

Colocasia, Gef. hor. Tur. Lugd. Clui. hisp. & hist. Eyf.

Faba Ægyptia, Bellonio, cui & Lotus & Faba Ægyptia.

Colocasiam quæ faba Ægyptia non est, Ang. Colocasia, an Aron Ægyptium putatum, Ad. Culcas, Faba Ægyptia, Alpi.

Aron magnum, Colocasiam vulgo. Pampina Paradyfi, Cæf.

Talasse, Javanensibus: Lolade, Malayce: Colcaz, par. 4. Ind. or. c. 6. fig. 15.

Nec fructum nec florem ferre Bellonius asserit: at Lugd. ex Mycone cum flore pingit, qui imaginarius potius, ut rectè Doctis. Columna: Horti Pisani olim præfectus Casu bonus florem observavit, qui odoratissimus fuit, cum aliarum Aaronis specierum flores fœteant.

VII. Colocasiasive Faba Ægyptia veterum, Dioscor. l. 2. c. 128. *Κύμας αἰγυπτίαν* Faba Ægyptia, quam aliqui ponticam vocant, folium habet amplum instar petali florem roseum: radix harundinis radice crassior, quæ *καρναδα* vocatur, &c.

Et Theophrastus 4. hist. 10. inter cætera scribit, fabam Ægyptiam in paludibus, caput super caulem esse sævo orbiculato vesparum non absimile, inque singulis celis singulas fabas contineri, paulo super id eminentes, multitudine plurimum terdenas: radicem habere validam spinis subhorrentem, &c. Et Plinius l. 21. c. 15. in Ægypto nobilissima est Colocasiam, quam cyamon aliqui vocant. Hanc à Nilo metunt, &c. foliis latissimis, etiam si arboreis comparentur, ad similitudinem eorum, quæ Personata in nostris amnibus vocamus: adcoque Nili sui dotibus gaudent, ut implexis Co-

locasiz foliis in variam speciem vasorum, potius gratissimum habeant.

Ex his liquet, Fabæ Ægyptiacæ radicem, Colocasiam veteribus dictam fuisse, & minimè à Faba hac Colocasiam separandam: dein radicem non fuisse bulbosam, qualis est Colocasiz recentiorum, sed arundinaceam & asperam. Quare rectè Doctis. Columna, Aron Ægyptium (sive Colocasiam recentiorum) non est Colocasiam, seu Faba Ægyptia veterum: Et Cordus in Dioscor. rectè, dum Fabæ Ægyptiacæ radicem, Colocasiam dicit. At dum Anguillara, Colocasiam, Fabam Ægyptiam non esse asserit, de Colocasiam recentiorum intelligendus est. Verum Matthiolum ne videretur (ut rectè Columna) Fabam Ægyptiam ignorasse, quàm aliàs rectè ab Aron Ægyptio diversam fecit, ex idæa affabre depictam iconem historiz accomodatam proposuit, non animadvertens vesparum favum minimè rectè fuisse expressum, ut Ciborion (*κίβωρον ἢ κίβωτον* quasi loculamentum Dioscoridi) exprimeret, quod etiam genus vasculi & poculi esse apud antiquos, Athenæus refert. Huc secuti sunt Lac. Lugd. Castor Durantes, Fabam Ægyptiam vocantes & pingentes: Lonicerus item & Durantes sed Colocasiam nominantes. Et Guilandinus vult Matthiolum pro Faba Ægyptia, Arigenus, quod in multis Italiz locis frequens, perperà proposuisse.

IX. Fabæ Ægyptiacæ Dioscoridis affinis: Fructus peregr. an Faba Ægypt. Diosc. Clus. exor. lib. 2. cap. 13.

Fabæ Ægypt. fruct. peregr. Clus. belli respondet. Col.

## ARISARUM.

**A**'PI'ΣAPON Dioscoridi lib. 2. cap. 198. exigua herbula est, cujus radix olivæ magnitudinem implet: majoris quam Aron acrimonia. Plinio lib. 24. cap. 16. Arisarum simili Aron, minor tantum, minoribusq. foliis & utriusque radice, quæ tamen olivæ grandis magnitudinem implet.

Genera duo Plinio: alba, inquit, geminum caulem: altera unum tantum emittit: utraque medetur ulceribus manantibus, &c.

I. Arisarum latifolium majus.

Arisarum latifolium alterum, Clus. hisp. & hist.

II. Arisarum latifolium alterum.

Arisarum alterum, Ang.

Arisarum Norbonense, Ad. an idem sit cum latifolio Clusii, dubitat Lobel.

Arisarum latifol. Clus. hisp. Dod. Lob. Tab. Ger.

Arisarum primum, Clus. hist.

Arisari alter. genus Cæf. an potius Aron parvum:

ejusdem.

Callæ alterum genus Plinii, Dalech.

III. Arisarum, Thal. in sua Herculynia recenset, quod ab aliis Arisari speciebus à Matthiolo exhibitis, diversum sit: quid sit ignoramus.

IV. Arisarum angustifolium, Dioscoridis fortè.

Arisarum, Ges. ap. Lac. Cæf.

Arisarum primum, Ang. alterum, Matth. Dod. gal. Lon. Lugd.

Arisa-

Variat foliis latioribus aliquando: corniculo item purpurascente, aliquando viridi, vel ex purpureo virefcente.

**A** "ΣΑΡΟΝ Dioscoridi l. c. g. quod in coronas non addatur Plinio l. 21. c. 6. nionente: quibus & ἡ ἀρὸς ἀνὰ τὴν Νάρδα συλῆστρη, ἐδ' ὅτι οὐδὲ Νάρδα ἀμυλῆται: vel, ut Plinius quod Nardi vim habeat.

icio quam verum, Gef. hor. & Camerario, Afarum aliud multo majus uſitato & odoratius ju-  
Einfideli/ Geinero teſte.  
II. Afarina foliis aſari.  
Aſarina, Matth. Caſt. Lugd. Tab. Ger.  
Tuſſilaginem alpinam, Cluſ. in hiſt. ſuſpicatur.

**R**H'XION Dioscoridi l. 5. c. 126. quod tussi medetur: unde Latinis Tussilago dicitur. Plinio l. 26. c. 6. Bechion, Aqua & Tussilago.

I. *Tuſſilago vulgaris*.  
*Ungula caballina*, Brunt. Trag.  
*Ungula afinina* & *Laſuca uſtularia* Germano-  
 rum, Ericio Cord.  
*Tuſilago*, Matth. Ang. Fuch. Tur. Cord. in Dioſc.  
 (& Farfarella) Lac. Gei. hor. Lon. Dod. Ad. Lob.  
 (& Farfara) Czf. Caſt. Lug. (& Tiphii Theoph.  
 quibuidam) vulgaris, Cam.  
 Bechion. Dod. gal. Cord. hiſt.

Tuſiſilago montana minima, Lob. ( qui hanc & ſequentem ſub uno titulo pinxit ) Lugd.  
 III. Tuſiſilago alpina rotundifolia canefcens.  
 Tuſiſilago, Gef. fræc.  
 Tuſiſilago alpina 1. deſc. 2. ico. Cluſ. pan.  
 Tuſiſilago alpina 1. flore aperto, Cluſ. hiſt.  
 Tuſiſilago alpina 1. flore candido, Eid.  
 Tuſiſilago altera alpina Cluſii, Lugd.  
 IV. Tuſiſilago alpina folio oblongo : in Phytopinaceæ & Prod. deſcripta.

**P**ΕΤΑΣΙ' ΤΗΣ Dioscoridi l. 4. c. 108. a forma folii, quod πατάς. galeri modo amplum. Plin. l. 24. c. 15.  
Chamaeleucen appellasse videtur: his verbis: Chamaeleucen apud nos farranum. five farfugium vocant: Νά-  
σις secus fluvios folio populi, sed ampliore: At l. 26. c. 6. asserit, quod si putare Bechion alio nomine Chamaeleucē dici.

1. *Petasites major & vulgaris*.  
*Petasites* (costi genus, *Galerita*) Trag. Fuch. Ang.  
Tur. Dod. Cord. hist. Ger. hor. Lac. Ad. Lon. Lob.  
(cuius Perfonata & Perfolata Plinii) Cæf. Lugd.  
Tab. Ger. Clus. hist.  
*Petasites flore punicante*, *Thal. mas. Cam.*

Tusilago major, Marth. Cast.  
 II. Petasites minor.  
 Petasites flore albo, Cam. ep. Clus. hist. candido,  
 Thal.  
 Petasites odoratus, Lugd.  
 Petasites foemina & Leucanthemos, Cam.

[illegible]

in quo semen, quod non margaritis simile, sed oblongum, latet, nunc de nostra intelligendi sint, dubitamus: nisi volumus assentiri Dalechampro, qui in florum umbilico, granum rotundum niveum, margaritis simile prominere (cu rectè Plinius comparavit) quod excusso flore nudum, nudumq, dependeat, scribit.

I. *Cacalia tomentosa*: in Phytop. & Prod. descripta.

II. *Cacalia foliis crassis hirsutis*.

*Cacalia Ghini*, in def. Pilati Lugd. du Choul.

*Cacalia* 1. & vulg. incano folio, Cluspan. & hist.

*Cacalia*, Ang. Cæf. Lugd.

III. *Cacalia foliis cutaneis acutiorib. & glabris*.

*Cacalia*, Dalech. in Diof. Ad. Lob.

*Cacalia* 2. vel *Cacalia glabro folio*, Clus. hist.

*Tussilago alpina*, sive montana, Dalech. Lug. cujus flores luteos dicit.

IV. *Cacaliæ cōgener planta*, Cl. pan. & hist. quide

## LAPPA sive ARCIUM.

**A**ΡΚΕΙΟΝ sive *αρκεύς* aut *αρκεύς* (id est *Personata*, quasi *Larva*) folia habet cucurbita, majora tamen, duriora, nigriora, & hirsuta &c. Dioscoridi l. 4. c. 107. *Perfolata* Græci *Arcium* vocant, folia balis majora, cucurbitinis hirsutiora, nigriora & crassiora, &c. Plin. l. 25. c. 9. Genera duo Galeno 6. simp. primum *Verbascum* simile, quod Diosc. l. 4. c. 106. *Ἀρκύον* & *Ἀρκύον* vocat, & Plinio l. 27. c. 5. *Arction*: Alterum foliis cucurbita, quod Dioscoridi est *Ἀρκύον* & Plinii *Perfolata*, & etiam *Personata*, cui folio nullum sit latius, & grandes lappa fert. At vulgo alia est major, quæ & *Arciū* & *Arctiū* est Dioscoridi: alia minor, quæ Diosc. l. 4. c. 138. *Ἄρκιον* (quod flavos capillos reddat) dicitur, & *Ἄρκιον*, quasi *strumarū perniciēs*: hinc quibusdā *Strumaria* nominatur.

I. *Lappa major*, *Arcium* Diosc.

*Lappa major*, Brunf. Trag. Tur. Cæf.

*Perionata*, Lac. Lon. Ad. Lob. Lugd.

*Perionata major*, Matth. Cast.

*Perionata*, Fuch. Fracast.

*Bardana* sive *Lappa major*, Dod. desc.

*Arcium*, Ang. Dod. gal. Cord. in Diof.

*Arction perionata*, Thal.

II. *Lappa rosea*: in Prod. descripta.

III. *Lappa major montana*, capitulis tomentosis, sive *Arctium* Dioscoridis.

*Personata* seu *Lappa major altera*, Matth. Lugd.

*Bardana* sive *Lappa major*, Dod. ico.

*Arction montanum* an *Perfolata* Plinii, Ad.

*Arctium mont.* & *Lappa minor* Galeni, Lob.

*Arctium*, Cæf.

IV. *Lappa montana altera lanuginosa*.

*Arctium* quorundam, Lugd.

V. *Arctium* ex cod. Cæf. Dod. Lugd. quid?

VI. *Lappa minor*, *Xanthium* Dioscoridis.

*Lappa minor*, Brunf. Trag. Ericio Cordo.

*Xanthium*, Matth. Ang. Dod. ut: Fuch. Tur. Cord.

in Diof. & hist. Gel. h. Lac. Lon. Thal. Cæf. Call.

Tab. Lugd.

*Xanthium* sive *Strumaria*, Ad. Lob.

*Bardana minor*, Ger.

## LIBER SEXTVS.

### SECTIO PRIMA.

#### VIOLA; LEUCOIUM; HESPERIS; LYCH-

#### NIS & SAPONARIA.

#### VIOLA MARTIA.

**V**IOLA. ION Dioscoridi l. 4. c. 122. alius, *ἰὼν πορφυρεὺς*, *Viola purpurea*, à floris colore. Theophrastus l. hist. 15. *ἰὼν*, & l. hist. 21. *ἰὼν μέλας* & *μαύριον*. *nigram violam*, à florum colore nigricantis purpurea, vocat. Plin. l. 21. c. 6. Ex *Violis* quæ spontè apriciæ & maris locis proveniunt purpureæ, latiore folio statim ab radice castroso exeunt, solèq, Græco nomine à cæteris discernuntur, appellata *Ia*, ut ab his *Lanthina* vestis. *ἰὼν* Græcis vocatum in Geoponicis Nicander credidit, Hermolao referente, quod *Nympha* quadam *Ionia*. florem eum Jovi primum munere dederint. Alii *ἰὼν* volunt dici, quod cum Jupiter puellam Io adamatam in vaccam converterisset, terra flore hunc pabulo ejus produxerit, qui propter ipsâ factus, ab ipsa nomen acceperit. Hinc Latinis *Viola*, quasi *viola*.

Genera plura Plinio, purpureæ, luteæ, albæ: sed de purpureis primum, quarum unum genus apud Dioscoridem & Plinium.

*Viola*



*Viola Martia rotundifolia.*

I. *Viola Martia* purpurea flore simplici odoro.  
*Viola* sativa, Brunf.  
*Viola Martia* odorata nigra seu purpurea, Trag.  
*Viol. purpurea*, Fuch. Matt. Lac. Ad. Cef. Cast. Lug.  
*Viola nigra*, Dod. Cord. in Diof. Ger. Cluf. hist.  
*Viola*, Lon. & *Viola nigra*, Gef. hor.  
*Viola Martia* purpurea, Tab. præcox purpur. Lob.  
 Flos communiter coloris in cæruleo subnigro  
 purpurei: qui cultura grandior fit: quandoq; foliis  
 latioribus *Calthæ æ mulis*, quæ  
*Viola Matronalis* fl. purpureo, Eyst.  
 II. *Viola Martia* inodora sylvestris.  
*Viola* syl. Brunf. Ang. inodora, Dod.  
*Viola purpurea* syl. live canina, Trag.  
*Viola nigra* syl. species, Gef. hor.  
*Viola canina*, Lon. Tab. syl. Ger. desc.  
*Viol. canin. cærulea* inodora syl. ferotina, Lob. ico.  
*Viola Martia* syl. Thal. martia canina, Eyst.  
 Flos cæruleus, aliquando pallidus: duplex est,  
 altera major foliis majoribus & rotundioribus:  
 altera minor, foliis mucronatis oblongis ac stri-  
 atioribus: & Gesnerus in monte fracto meminit  
 montanæ, quæ solum foliis minoribus & soli-  
 dioribus à vulgari differat: est &  
*Viola martia* flore rubro purpurascente, Eyst.  
 III. *Viola Martia* alba.  
*Viola* alba, Brunf. candida, Dod. Cæf. fl. albo, Ger.  
*Viola Mart. candida*, Trag. alba, Tab. Eyst.  
*Viola* syl. albo flore, Gef. hort.  
*Viola martia* alba hort. & cæpest. odora, Lob. ico.  
 Hæc aliquando odora: aliquando nullo aut lan-  
 guido odore: & hæc foliis est gracilioribus.  
 IV. *Viola Martia* multiplici flore.  
*Viola nigra* flore pleno, Dod. gal.  
*Viola* dasy podion, dasyphyllum malim, Ger. hor.  
*Viola martia* purpurea, Lob. ico.  
*Viola* purp. & alba multiplex, Tab. Ger. Eyst.  
*Viola* flore multiplici, Dod. fl. pleno, Cast. Cam.  
*Viola cærul. fl. numerosis* foliis constantibus, Cef.  
 Variat floris colore purpureo, rubello, candido,  
 ex purpureo & albo variegato: hinc  
*Viola martia* alba, fl. multiplici albo: flos albus,  
 exterius purpurascens, ut *Viola variegata* dici pos-  
 sit, Eyst. est & biflora. *Viola* species Byzantii colitur,  
 Martiæ similis. sed flore infinitis foliolis con-  
 structo, & Rosam Damascenam æquantem, non so-  
 lum magnitudine sed & odore nostrates superante:  
 Colitur in Messem, & Cam.

V. *Viola alpina* folio in plures partes disse. to.  
 an *Viola montana* laciniato folio, Cluf. hist.

VI. *Viola alpina* purpurea exiguis foliis.  
*Viola montana* 2. Cluf. pan. & hist.  
 an *Viola Martia* folio minore & solidiore, Gef. de  
 Lunar.

VII. *Viola alpina rotundifolia lutea.*  
*Viola luteola* minore flore, Gef. hort.  
*Viola montana* fl. luteis, Lob. obs.  
*Viola mont. 1.* Cluf. pan. & hist.  
*Viola lutea*, Lob. ico. Cæf. Cast.  
*Viola Martia lutea* inodora alpina, Cam.  
 Gramen Parnassii aliud, Lugd.

*Viola Martia folius oblongis.*

I. *Viola montana* pumila angustifolia flore  
 niveo inodoro.

*Viola mont. pumila*, Cluf. cur. post.

II. *Viola Martia* arborefcens purpurea.  
*Viola arborefc.* Matth. Cast. Tab. vel potius re-  
 cta, Cam.

*Viola fruticosa*, Gef. hor.

Mater Violarum, Dalech. Lugd.

*Viola elatior*, Cluf. hist.

*Viola erecta* fl. cæruleo &

*Viola erecta* fl. albo, Eyst.

Flore est ex cæruleo purpurascente, vel ex cya-  
 neo albescente.

III. *Viola tricolor erecta*, an Jovis flos Theo-  
 phr. 6. hist. 6.

*Viola assurgens* tricolor, Dod. Ger.

*Violæ purpureæ* varietas, Ad.

*Viola martia* surrectis cauliculis, Lob.

IV. *Viola montana tricolor* odoratissima.

*Viola montana* 3. five tricolor, Cluf. pan. & hist.

*Viola flâmæa* major violaceo colore mixta, Eyst.

V. *Viola tricolor hort. repens*: an *φωδὲ καὶ φά-  
 ρον* Theoph. 6. hist. 6.

Herba Trinitatis, Brunf. Fuch. Lon. sativa, Trag.  
 jacea five flos Trinitatis, Matth.

Jacea major five *Viola tricolor*, Cast.

*Viola flâmæa*, Dod. gal. Cæf.

*Violæ nigra* persimilis, flos trinit. vel heptachrû,  
 Gef. hor.

*Viola tricolor*, Dod. Cluf. Ger.

*Viola flâmæa*, coloria calida, Ad. Lob.

*Viola flâmæa* seu tricolor major, Lugd.

*Viola Trinitatis* 1. Tab.

Flos colore & magnitudine variat: est flore pur-  
 pureo & cæruleo: albo & luteo: cum pallido cæ-  
 ruleo

rulco, purpureus & luteus etiā permiscetur: quādoque lituris quibuldam notatur: raro flore penitus albo, reperitur, quæ est Viola trinitatis 2. Tab.

Datur quæ duplo majore flore est coloris unius, nigra purpuræ, & instar holoserici nitente, vel pallido, hinc

Flos trinitatis major violaceus &

Flos trinitatis pallidus major, Eyft.

VI. Viola bicolor arvensis.

Herba Trinitatis syl. Trag.

Jacea altera, Matth.

Jacea minor, Cast.

• Viola nigra similis arvensis minor, Gef. hor.

Viola sylvestris, Lob. ico.

Viola flammea minor, Lugd.

Viola trinitatis minor petræa, Tab.

Viola tricolor petræa, Ger.

Hactenus triū colorum non observavimus, sed candido & luteo, cæruleo & luteo, cæruleo & candido: aliquādo tamē vel totus luteus, vel totus albus occurrit: Alia est valde parva, Augusto florēs.

VII. Viola montana lutea grandiflora: & Cæ.

Viola nigra perisimilis mont. lutea, Gef. hor.

Viola mont. 3. aliud genus, Clus. pan. & hist.

Viola flammea lutea, Lugd.

Viola Martia arborescens lutea, Tab.

Viola flammea major pallido colore mixta, Eyft.

Flore est luteo, sed magna ex parte lineis purpureis intermixtis: aliquando sine lituris: rarius flore albo reperitur.

IX. Viola montana lutea foliis non crenatis.

Viola syl. longifolia, Tab.

Viola Martia lutea, Ger. desc.

## LEUCOIUM NON BULBOSUM.

**Λ**ΕΥΚΟΪΟΝ Dioscoridis l. 3. c. 138. id est, Viola alba, non ratione florum, sed potius à canitie cinericijs foliorum colore: quāvis differentiam in floribus ostendat, siquidem aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei reperiuntur. Plin. l. 21. c. 6. Violas luteas & albas agnoscit,

*Leucoium incanum folio hortense.*

I. Leucoium incanum majus.

Viola candida, Trag.

Leucoium album, Matth. Lob. ob. Lug. Tab. Ger.

Leucoion, Dod. gal. Gef. hor. Ad.

Viola matronalis alba, Fuch. Tur.

Viola domestica, Ang.

Leucoium candidum majus, Dod.

Viola alba, Lob. ico.

Viola alba, quæ & matronalis, Cæf.

Leucoium album hortense fruticosum, Cam.

Leucoium flore albo simplici, Eyft.

Flore est albo, vel cinericæo.

II. Leucoium purpureum vel rubrum.

Viola purpurea, Trag. Lob.

Viola matronalis purpurea, Fuch. Tur.

Leucoium purpureum, Matt. Dod. gal. Lug. Tab.

Leucoium rubrum & purpureum, Cam.

Viola matronalis floribus rubentibus, aut ad purpuram inclinantibus, Cæf.

Leucoium flore rubo simplici, Bry. Eyft.

Flore est rubente, ex purpura puniceo, violaceo, ex cæruleo purpureo, in summa ob colorem dilutiorem & saturatiorem differentiæ aliquot sunt: hinc

• Viola matronalis purpurea, alia punicea, Fuch. Tur. Lugd.

Leucoium purpureum, & aliud violaceum, Tab.

At cærulei coloris in hoc genere hactenus non vidimus, licet Dioscorides author sit, nisi forte id verbum superfluum fuerit.

III. Leucoium incanum minus.

Viola alsiola & minor, Trag.

Leucoium candidum minus & annuum, Dod.

Floribus est candidis, rubentibus, puniceis, à prioribus magnitudine differentibus, & quod hoc annuum sit.

IV. Leucoium incanum majus multiplex.

Leucoion duplis floribus, Ad.

Leucoium five Viola purpurea, fl. pleno, Lob. ico.

Leucoium multiplici flore, Dod.

Flos est vel saturatioris, vel dilutioris purpureæ, vel purpuroviolacei, vel albi: hinc

1. Leucoium flore rubro pleno, Eyft.

2. Leucoium flore purpureo pleno, Eyft.

3. Leucoium five Keyri purpuroviolaceum pleno flore, Swer.

4. Leucoium flore albo pleno, Bry. Eyft.

V. Leucoium incanum majus variegatū simplici flore.

Hoc varium est & permixtum maculis in albo rubris, vel purpureis, aut quasi striis inæqualibus notatum: hinc

1. Leucoiū varieg. alb. rubris maculis, Bry. Eyft.

2. Leu

2. Leucoium variegat. purpureis maculis, Eyst.

VI. Leucoiū incanū majus variegat. pleno flore.

Leucoium sive Keyri viola purp. variegata, Swer.  
Et hoc varium est.

1. Leucoium purpureum variegatum sanguineis maculis signatum, Bry.

Leucoium purpureū variegatū flore pleno, Eyst.

2. Leucoium sive Keyri violaceo purpureum pleno flore, lineis viridibus distinctum, Swer.

3. Leucoium pleno flore album, sanguineis maculis signatum, Eyst.

4. Leucoium pleno flore album purpureis maculis signatum, Eyst.

VII. Leucoium livide rubente colore.

Leucoium melancholico colore, Eyst.

*Leucoium incanum maritimum.*

I. Leucoium maritimum latifolium.

Tripolium, Ang.

Leucoium marinum alterum latifoliū, Lob. Lug.

Leucoium marinum cæreleo purpureum, Tab.

Leucoium marinum latifolium, Ger. marinum alind, Cam.

an Leucoium maritum. minus, Hesperis quorundam, Lugd.

II. Leucoium maritimum sinuato folio.

Leucoium marinum purpureum, Gef. hor. Ger.

Leucoium maritimum majus, Ad. Lob. ico. Clus. hisp. & hist. desc. Lug. Cam.

Leucoium marinum majus purpureum, Tab.

Flos dilutioris purpureæ, ad vini rubri faciem tendente.

III. Leucoium maritimum angustifolium.

Leucoium marinum minus, Clus. hisp. & hist. Ad. Cam. Tab. Ger.

Leucoium angustifolium, Lob.

Leucoium syl. angustifolium, Dod.

Flores sunt dilute purpurei, quandoque rubri: & luteos reperiri Lob. & Tab. scribunt hinc

Leucoium marinum minus luteum, Tab.

Leucoium marinum minus, Ger.

IV. Leucoium maritimum repens.

Viola marina repens, Eyst. ico.

An ex semine prioris in horto natum: cum in hortis satum longioribus quidem sit cauliculis, sed in terram reflexis, folio latiore, flore purpureo, tota quæ ætate floreat.

V. Leucoium maritimum candidum.

Keiri marinum flore candido, Lob. ico.

Leucoium marinum majus, Clus. hist. ico.

VI. Leucoium maritimum minim. quod 6. est in Prod.

VII. Leucoium saxatile thymi folio hirsutum cæreleo-purpureum.

Lithoreoleucoion minimum supinum, Col.

*Leucoium Creticum.*

I. Leucoium Creticum thlasipifolium.

Leucoium marinum Creticum 1. Clus. hist.

Flos rubet mox ex cæreleo purpurascit.

II. Leucoium Creticum foliis oblongis crenatis.

Leucoium marinum Cret. 3. Clus. hist.

III. Leucoium Creticum floribus minoribus.

Leucoium marinum Creticum 2. Clus. hist.

In hoc flores prioris dimidio minores, prorsus albi, paulatim purpureum contrahentes.

IV. Leucoium Creticum spinosum incanum luteum.

Leucoium Creticum spinosum, Clus. hist.

Glastivida Cretensium, Belli, ep. 3. & 4. ad Clus. Clus. hist. ap. alt. ad.

Glastivida prima Cretica, Ponz.

V. Leucoium Creticum minimum folio subrotundo.

an Leucoium Creticum, Ponz. Ital.

Hæc quinto loco in Prod. describitur.

*Leucoium luteum folio hirsuto.*

I. Leucoium alyssoides clypeatum majus.

Lunaria aspera, Gef.

Alysson Dioicoridis, Dod. Cam. Lugd. cui &

Alyssum Dalechampi fig. duplici.

Alysson Dioic. putatum, Lob.

Alyssos, Gef. hor. & Lunariæ Græcæ similis.

Lunaria Græca 3 Cæf.

Leucoium montanum lunatum, Col. (nit. Minoris & congeneris plantæ Columna memi-

II. Leucoium alyssoides clypeatum minus.

Leucoium peltatum Romanum minus, Col.

III. Leucoium incanum filiquis rotundis.

Eruca peregrina, Clus. hisp. & hist. Lugd.

Leucoium marinum Patavinum, Lob.

Leucoium marinum luteum majus, Tab. Ger.

IV. Leucoium luteum erucæ folio.

Leucoium terrestre majus, Col.

V. Leucoium luteum syl. hieracifol. quod 3. in Prodromo.

Leucoii lutei syl. species, Thal.

Leucoium syl. inodorū fl. parvo pallidiore, Eyst.

VI. Leucoium luteum montanum serrato folio.

Leucoium luteum mont. Ponz. Ital.

C c

LEN-

*Leucoium folio viridi.*

I. *Leucoium album* odoratissimum folio viridi: quarto loco in Prod. descriptum.

*Leucoium rarius* fl. albo odorato, Cam.

*Leucoium fruticosum* fol. viridi, flore albo odorato Camera: ii, Eyft.

II. *Leucoium luteum* max. foliis tuberculis obstitis.

Flos Cheyri Eyfsettenfis maximus, Eyft.

Flores amplitudine thalerum Philippicum superant.

III. *Leucoium luteum* mag. flore 1. loco in Prod. desc.

Flos Cheyri simplex medius, Eyft.

IV. *Leucoium lut. serrato folio fl. grandiore:* 2. in Prod.

V. *Leucoium luteum* vulgare.

*Leucoium*, Brunf. Cord. in Diosc. Lac.

*Viola lutea*, Trag. Fuch. Dod. gal. Cæs. Ger.

*Viola petraea lutea*, Tab.

*Leucoium aureum*, Matth. Lugd.

*Leucoium luteum*, Fuch. ico. Dod. Ad. Lob. Cast. Cam.

*Leucoium sativum luteum*, Clus.

Keiri vel Cheiri, Ges. hor. Lon.

Flos Cheiri simplex minor, Eyft.

Quibusdam *φωσφός* Theophr. quod totus flos flammeus, id est lutei coloris sit: luteum enim colorem flammæ dici, ex Plin. l. 22. c. 8. colligunt.

VI. *Leucoium luteum* pleno flore majus.

*Viola lutea multiplex*, Lugd. Ger.

*Leucoium* flore luteo pleno majus, Eyft.

VII. *Leucoium* pleno flore minus.

*Leucoium* five Keiri duplici flore, Ad. Lob. ico.

*Leucoium luteum* flore multiplici, Dod.

*Viola petraea lutea multiplex*, Tab.

*Leucoium* flore luteo pleno minus, Bry, Eyft.

IX. *Leucoium luteum* syl. angustifolium.

*Viola lutea* syl. Trag.

*Leucoium* syl. minus, Ges. hor.

*Leucoium* syl. Clus. pan. & histor. Cam. Taber. Ger.

*Leucoium* syl. flore luteo, Bry.

IX. *Leucoium palustre* flore subcæruleo.

*Gladiolus palustris*, Clus. eur. post.

## VIOLA MATRONALIS SIVE HESPERIS.

**V**IOLA MATRONALIS, quod à Matronis in hortis colatur dicta, apud Plinium l. 21. c. 7. Hesperis censetur, cum hac Viola noctu magis oleat, quod sua Plinius tribuit, addens, inde nomen invenisse.

I. *Hesperis hortensis*.

*Viola alba*, persica Hermolai, Trag.

*Leucoium & Viola purpurea*, Fuch.

*Leucoium* Diosc. album, purpureum, Fuch. ico.

*Viola alba*, Tur.

*Viola matronalis*, Ges. hor. Dod.

*Viola purpurea & alba*, Lugd.

*Viola matronalis* five Damascena, Ad. Lob.

*Viola* syl. alba & purpurea, Cæs.

*Hesperis* 3. Clus. hist. ico. nostra, Cam.

*Viola Damascena* flore purpureo, Swer.

Variat colore floris, candido, dilute purpureo, rubro: habetur & tota minor floribus albis & suavisissimi odoris: hinc

1. *Viola hyemalis* fl. purpureo, Tab. Ger.

*Viola matronalis* flore purpureo, Eyft.

2. *Viola hyemalis* alba, Tab. Ger.

*Viola matronalis* flore albo, Eyft.

II. *Hesperis hort.* flore viridi: hæc magnitudine, quo ad omnes sui partes, à vulgata differt, flore est viridi & inodoro.

III. *Hesperis montana* pallida odoratissima.

*Hesperis prima & montana*, Clus. pan. & hist.

*Viola* syl. species, Cæs.

*Hesperis pannonica*, Cam.

Variat ex semine nata, nonnulli flores maternum colorem retinent, alii aut dilutius pallefcunt, aut magis obsoletum acquirunt, crebris venis ex atro purpurascensibus discurrentibus.

IV. *Hesperis* syl. inodora.

*Hesperis* 2. vel altera pannonica, Clus. pan.

*Hesperis* 3. Eid. hist. desc.

V. *Hesperis* syl. flore parvo: 1. in Prod.

VI. *Hesperis peregrina* filiquis articulatis.

*Hesperis Syriaca*, Cam. Clus. hist.

*Leucoium Syriacum*, Cam.

*Leucoium melancholicum* quibusdam.

*Hesperis Syriaca* Rauwolfii, ab hac non videtur aliter differe, quam quod strigosior sit, quod fortè loci ratione contingit.

VII. *Hesperis* filiqua corniculata fl. obsoleto.

*Leucoium corniculatum laxatile*, Col.

IX. *Hesperis villosa* flore obsoleto filiqua brevi.

IX. *Hesperis sylvestris* hirsuta foliis Hieracii 2. in Prod.

## VIOLA LUNARIA.

**V**IOLA ratione florum, LUNARIA verò à filiquarū forma dicitur, quæ lata, plana & propemodū rotūda sunt, & Lunā non falcata, sed propè completā referunt: vel à filiquarū splendore, quæ per siccitatem nitent.

I. Viola Lunaria major filiqua rotunda.

Viola latifolia, Dod. Clus. pan. Lugd.

Bulbosa foliata, Officinarum Bolhanac, Ad.

Lunaria Græca, Lō. Cæf. Lob. Cast. rotūda, Gef. h.

Lunaria major, Cam.

Bolbonach (à radicibus bulbosis) Gef. hor.

Viola lunaris 1. Tab. Ger.

Thlaspi montanum, Gef. hor.

Lunaria Græca annua, Eyst.

Thlaspi alterum Cratevæ quibusdam.

Variat florum colore & odore: colore purpureo, subæruleo: odore, uni flores odorati, alteri inodori sunt.

II. Viola Lunaria major altera: & Cam.

Viola latifolia altera, Dod. Lugd.

Præcedente minor & flore albo est.

III. Viola Lunaria major filiqua oblonga.

Lunaria Græca filiquis longis, Gef. hor. Thal.

Lunaria Græca filiquis oblongioribus, Thal.

Lunaria odorata, aliis Lunar. Græca major, Gef. hort.

Lunaria Raphanitis, sive Bolbonac, radice rediviva, Lob. ico.

Lunaria Græca altera, Cæf.

Viola latifolia, Clus. hist.

Viola lunaris 2. Tab. longioribus filiquis, Ger.

Lunaria Græca perennis, Eyst.

Flores ex albo subærulei: filiquæ longiores, laminosæ, ita ut aliquando tres membranulæ separatae suis feminibus annexæ divelli possint.

## LYCHNIDES.

**Λ**ΤΧΝΙΣ, id est, Lucernula. Dioscoridi l. 3. c. 11. 4. & 115. duæ species, altera λυχνίς σποραμακῆ, Lychnis coronaria: altera λυχνίς ἀγρία. Lychnis sylvestris dicitur. Primam, Lychnidem coronariam à recentioribus nominatam, videtur Theophrastus 6. hist. 7. Lychnidem vocasse: & Plinii l. 21. c. 4. Lychnis & Rosa Græca censetur: cuius Lychnis agria, Antirrhinum est. Recentiores, Lychnidis nomen plurimis imposuere, de quibus ordine.

Lychnis flore coccineo.

I. Lychnis hirsuta flore coccineo major.

Ocymoides peregrinum, Gef. hor. vel flos Hierosolymitanus, aliis Creticus: vel Croceus, Eid. ap.

Flos Constantinopolitanus, Dod. Lugd. miniatus, Eyst.

Lychnis Chalcedonica sive Constantinopolitana

miniata, Ad. Lob. (Cæf.)

Lychnis fortè aliquorū coccineo colore splendens,

in flos Scarlati, Lon.

Lychnis Chalcedonica, Tab. Ger.

Lychnis Constantinopolitana, Cast. ap. Cam.

Lychnis byzantina minito flore, Clus. hist.

Colore variat, communiter coccineo colore

splendet: vel croceo est floris Calendulæ colore,

vel lilii purpurei, subinde candidi: etiam incarnatus: hinc

Flos Constantinopolitanus albus, &

Flos Constantinopolitanus incarnatus, Eyst.

aliquando variegato: rarius flore pleno. Alia est

flore ex puniceo purpurascēte, foliis lævibus ac

mollibus: est & miniato, quæ

Lychnis Chalcedonica colore orengiaca, Swer.

Flos Constantinopolitanus miniatus, Eyst.

Hæc quibusdam veterum est λυχνίς: aliis ολῆς Theoph. 6. hist. 6. Aliis πῶς apud Theoph. 6. hist. ult. cuius duo genera: unū cui flos hyacintho similis: alterū decolor, album. Idem & Plin. l. 21. c. 6. habet: sunt etiā qui Rosam Græcā Plinii velint.

II. Lychnis flore coccineo minor.

Ocymoidis peregrini species minor, Gef. hor.

Flos Constantinopolitanus minor, Dod.

Flos coccineus, Lugd.

Lychnis coronaria.

I. Lychnis coronaria Diosc. sativa.

Rosa mariana sativa, Trag.

Lychnis, Matth. Lac. Cam.

Verbascum montanum, Cord. in Diosc.

Lychnis sativa, vel coronaria, Dod. gal. Gef. hor.

Lychnis coronaria, Lon. Ad. Lob. Dod. Cæf. Lug.

Flamma vel Flammula Jovis, Gef. hor.

Jovis flos Theoph. Eidem.

Flos colore variat: est rubro veluti flammeo fulgens, est dilutè rubente: habetur & albositem floribus albis, lineis vel punctis rubris variegatis: & incarnatis punctatis: hinc

1. Lychnis candida, Lob. ico.

Lychnis coronaria alba, Tab. Ger.

Cc 2

Lych-

*Lychnis coronaria fl. albo simplici*, Eyft.

2. *Lychnis coronaria rubra*, Tab. Ger.

*Lychnis coronaria flore rubro simplici*, Eyft.

*Lychnis rubra*, Lob. ico.

3. *Lychn. coronaria fl. incarnato pūctato*, Eyft.

4. *Lychn. coron. fl. incarnato nō pūctato*, Eyft.

II. *Lychnis coronaria fativa multiplex*.

*Lychnis altera rubra*, Lob. ico. flore pleno, Cam.

*Lychnis coronaria floris foliolis multiplicatis*, Dod.

*Lychnis flore rubro pleno*, Bry.

*Lychnis*, Swert.

*Lychnis coronaria flore rubro pleno*, Eyft.

Solum eam quæ flore rubro est multiplicem nominamus.

III. *Lychnis coronaria sylvestris*.

*Lychnis sylvestris*, Matth.

*Lychnis coronaria ruri nata*, Ad.

*Lychnis sylvestris* similis, Cast.

Jovis florem syl. reperiri ait Matth. Gef. hor.

Hanc in Rhætia alpibus, flore hortensi odoriore inveniri, Gef. hort. meminit.

IV. *Lychnis sylvestris alba simplex*.

Rosa marianæ similis tertia, Trag.

*Ocymastrum* ieu *ocymoides*, Matth. Lac. Tab. Cast.

*Ocymoides*, Gef. hor.

*Ocymoides majus*, Cæf. Lugd.

*Lychnis syl. alba*, Dod. gal. Cam.

*Lychnis syl. altera*, Ad.

*Struthio* similis *Waldftraut* / Lon.

*Basilicum sylvestre*, Cast. ap.

V. *Lychnis alba multiplex*.

*Lychnis syl. multiflora*, Ad.

*Lychnis multiflora Anglica*, Penæ, Lugd.

*Lychnis alba syl.* Lob. ico.

*Ocymastrum multiflorum*, Ger. Tab.

*Lychnis flore albo*, Bry & Swert.

*Lychnis syl. flore pleno albo*, Eyft.

VI. *Lychnis prolifera flore viridi*.

*Lychnis agrestis abortiva*, multiplici viridi flore, Lob. ico.

*Ocymastrum fl. pleno viridi*, Cam. ep. Matth.

VII. *Lychnis syl. sive aquatica purp. simplex*.

Rosa marianæ similis quarta, Trag.

*Ocymoides purpureum*, Gef. hor. rubrum, Thal.

*Ocymastrum rubrum*, Tab.

*Lychnis syl. purpurea*, Dod. Lugd. rubra, Cam.

*Lychnis syl. rubello flore*, Ad. Lob.

*Melandryum Plinii genuinum*, Clus. hist.

*Lychnis sylvestris*, Eyft.

Mas in hoc genere, cui apices è medio flore prominent: fœmina cui nulli, idque in utroque colore: nam & mas albus purpureusque reperitur, & fœmina similiter, Gef. hor.

IX. *Lychnis purpurea multiplex*.

*Lychnis syl. in hortis plantata flore pleno*, Dod. & Gef. in *Ocymoides*.

*Lychnis agrestis multiflora*, Ad. Lob. ico.

*Ocymoides flore pleno*, Cam. ep. Matth. & hort.

*Lychnis flore rubro pleno*, Swert.

*Lychnis syl. flore pleno rubro*, Eyft.

*Lychnis segetum*.

I. *Lychnis segetum major*.

*Nigella*, Brunf. vulgaris, Lac.

*Githago Rosa marianæ* 6. genus, Trag.

*Lolium*, Fuch.

*Loliū quibudā flore parvæ rosæ*, Cord. in Diof.

*Anthemion*, Dod. gal.

*Pseudomelanthium*, Matth. Lac. Lon. Ad. Lob.

Cast. Lugd. Thal. Ger.

*Nigellastrum*, Dod.

*Lychnis alia inter triticum*, Cæf.

*Lychnis arvensis*, Tab.

Flore est communiter rubefcente, rarissimè albo: hinc

*Pseudomelanthium fl. rubefcente* &

*Pseudomelanthium fl. albo*, Eyft.

Nec *Lolium*, nec *Melanthium* est: quibusdam

ἀνθρακω φωνάσθαι Theoph. 7. hist. 9.

II. *Lychnis segetum minor*.

*Alfene corniculata*, Clus. hisp. & hist. Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

III. *Lychnis segetum rubra foliis perfoliata*.

*Polygonaton sive Lychnis* / Trag. ico.

*Thamecnemon*, Cord. hist.

*Vaccaria*, Dod. Gef. hor. Ger.

*Lychnis quibusdam*, nonnullis perfoliata rubra, Gef. hor.

*Glastum*, Ang.

*Glasto* similis inter segetes, Cæf.

*Isatis syl. Vaccaria dicta*, Ad. Lob. Lugd.

*Vaccaria rubra major & minor*, Lugd.

*Myagrum*, *Vaccaria* quorundam, Tab.

*Condurdum Plinii* quibusdam, l. 26. c. 5.

Variat magnitudine: foliis item latioribus & angustioribus: floris colore rubro, pallido: hinc tres figuræ apud Lugdunenſem.

*Lychnis*

*Lychnis sylvestris.*

I. *Lychnis* syl. quæ Been album vulgo.  
*Lupinus* & *Smilax hortensis*, Brunf. ico.  
*Polygonaton* & *Rosa mariana* 5. Trag.  
*Polemonium*, Dod. gal. Lac. Cast. Lugd. Thal.  
*Polemonia*, Cæf.  
*Polemonium pratense nostrum*, Gef. hor.  
*Been album*, Gef. hort. Dod. Ger.  
*Lychnis* syl. Lon. Eyst. ico.  
*Papaver spumeum* (propter asperginem sputo similem) Ad. Lob. (cui & *Ocymastrum alterum*) Cam.  
*Herba articularis*, Tab.

*Melandrium* Plinii quorundam, Clusf. hist.  
 Duum generum: 1. in pratis albicante flore: 2. in montibus, flore ex viridi purpurascente. Est etiam alia foliis latioribus, alia angustioribus & acutioribus.

II. *Lychnis* syl. latifol. caliculis turgidis striatis.  
*Lychnis* syl. 3. Clusf. pan. at 2. in hist.  
*Lychnis* syl. 3. caliculis striatis, Lob. Lugd. Tab.  
*Lychnis cauliculis striatis*, Ger.

III. *Lychn.* syl. angustifol. caliculis turgidis striatis.  
*Lychn.* syl. altera incana cauliculis striatis, Lob. Lugd.

IV. *Lychnis* flore obsoleto autumnalis caliculis turgidis.

V. *Lychnis* frutescens myrtifolia, Been albo similis.

*Ocymoides fruticosum*, Cam.

*Lychnis* syl. semper virens, sive *Ocymoides arboreum* semper virens, Clusf. hist.

VI. *Lychnis* noctiflora.

*Ocymoides noctiflorum*, Cam. quod noctu tantum florem odorum explicet per ætatem: autumnum verò inodorum.

*Ocymastrum noctiflorum*, flore albo, Eyst.

VII. *Lychnis* syl. pluribus foliis simul junctis.  
*Lychnis* sylv. prima, Clusf. hisp. Lob. Lugd. Tab. Ger.

*Lychnis* syl. octava, Clusf. hist.

IX. *Lychnis* maritima repens.

*Lychnis marina* Anglica, Ad. Lob. Lug. Tab. Ger.

*Lychnis viscosa.*

I. *Lychnis montana viscosa alba latifolia.*  
 floris cuculi syl. genus, Trag.  
*Heber-Etelbrecht* id est, *Saxifraga elatior*, Lon.  
*Polemonium petrcrum*, Gef.

*Lychnis* syl. 2. vel albo flore 1. Clusf. pan. at syl. 9. in hist.

*Lychnis* syl. Tab. flore albo, Eyst.

*Ocymoides minus sive album*, Lugd.

*Lychnis* album, Thal.

*Odontis* quorundam flore candido, Cam.

II. *Lychnis viscosa alba angustifolia major.*

*Caryophyllus minimus humilis alter exoticus*, flore candido ameno, Lob. ico.

*Lychnis* syl. 3. vel albo flore 2. Clusf. pan. at syl. 10. in hist.

III. *Lychnis viscosa alba angustifolia minor.*

*Lychnidis* syl. æteriæ secunda species, Clusf. pan. vel 10. alba species, Eid. hist.

IV. *Lychnis* syl. viscosa rubra angustifolia.

*Lychnis* syl. 1. vel flore rubro, Clusf. pan. syl. 4. Eid. hist.

*Lychnis* syl. purpurea, Tab.

*Lychnis* syl. *Hesperis* quorundam, Thal.

*Lychnis viscosa* syl. flore incarnato, Eyst.

V. *Lychnis* syl. viscosa rubra altera.

*Muscipula*, Ad. Lob. cui & *Silene* Theoph. Al-droando.

*Lychnis* syl. 4. Clusf. hisp. Lugd. Tab.

*Lychnis* syl. 3. Clusf. hist.

*Viscaria*, Cast.

*Viscago major*, Cam.

*Lychnis* syl. incana, Ger. ico.

VI. *Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis.*

*Flos Constantinopolitanus alter minor*, Gef.

*Armerius flos* 3. Dod. 8. at in folio 4.

*Lychnis* syl. 2. Clusf. hisp. Lugd.

*Lychnis* syl. 1. Clusf. hist.

*Muscipula*, sive *Armoraria altera*, Lob. Lugd.

*Alsine purpurea*, Lugd.

*Lychnidis* fortè antiquorum 3. genus, Cæf.

*Muscipula*, Cam.

*Viscaria fativa*, Tab.

Aliis Been rubrum: aliis *Centaurium minus purpureum viscosum*: restè ad *Lychnidem* refertur, cū *Diosc.* l. 3. c. 9. *Centaurium* dicat flore *Lychnidis*.

Variat floris colore, communiter est purpureo; rarius albo reperitur: hinc

*Muscipula* flore rubro &

*Muscipula* flore albo, Eyst.

VII. *Lychn.* viscosa foliis brevi lanugine aspersis.

*Lychnis* syl. 1. ex femine nata, Clusf. hist.

IX. *Lychnis viscosa* floribus foris purpurascen-tibus, intus albis.

*Lychnis* syl. 2. ex femine nata, Clus. hist.

IX. *Lychnis* viscosa fol. lanuginosis, fl. carneis.

*Lychnis* syl. 3. ex femine nata, Clus. hist.

X. *Lychnis* viscosa flore muscoso.

*Muscipula* sive *Viscaria* altera flore muscoso, Ad.

*Muscipula* altera flore muscoso, Lob. Lugd.

*Muscipula* sive *Armoria* altera, Lob. ico.

*Sesamoides* magnum *Salmanticum*, Clus. hisp. &

hist. Tab. Cam. Ger.

*Κεχροφύλλον*, Thal.

*Viscago*, Cæs. major, Cam.

*Orites*, *Lychnidis* syl. genus, Tab.

Eodem semine duæ nascuntur: 1. flore majusc-

ulo, quæ sterilis: 2. seminitera, minore flore.

XI. *Lychnidi* præcedenti affinis foliis lini.

*Sesamoides* *Salmanticum* parvum, Eyst.

an *Sesamoidis* *Salmantici* secundum genus, quod

Behen floris parvi appellatione accepit, Clus. hist.

XII. *Lychnis* plumaria Tab. quid? an *Muscipu-*  
*la* flore muscoso.

XIII. *Lychnis* auriculæ Ursi faciei: in Prod.

*Lychnis* syl. latifolia, Clus. hist.

*Lychnis hirsuta*.

I. *Lychnis* syl. campanulæ flore.

*Lychnis* syl. species *Myconi*, Lugd.

II. *Lychnis* syl. lanuginosa major.

*Lychnis* syl. 5. Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

*Lychnis* syl. hirta, Lob. Ger.

III. *Lychnis* hirta angustifolia Cretica.

*Lychnis* syl. 7. Clus. hist.

*Ocimoides* minus flore rubro Cádiç à Casabona.

IV. *Lychnis* syl. lanuginosa minor.

*Lychnis* syl. 6. Clus. hisp. & hist. Lugd.

*Lychnis* syl. hirta minima, Lob. Ger.

*Lychnis* syl. minima, Tab.

V. *Lychnis* syl. minima exiguæ flore: pro 2. in  
Prod. describitur.

VI. *Lychnis* incana repens.

*Ocimoides* *Lychnitis*, Col.

*Lychnis alpina*.

I. *Lychnis* vel *Ocimoides* repens montanum.

*Cneoron*, Matth. cui & *Cneoron* album.

*Cneoron* aliud Theoph. Matth. Lugd.

*Myuros* Aëtii, Ang.

*Ocimoides* alpinum, Gesl. hor.

*Ocimoides* repens, Cam. polygoni folio, Ad.

Lob. Lugd.

*Ocimoides* alterum genus parvum, Cæs.

*Saponaria* minor, Dalech. Lugd.

II. & III. *Ocimoidis* angustifolia flore rubel-  
lo: & alterius flore suaverubente, ex monte Arba  
meminit Cam. sed quid?

IV. *Lychnis alpina* pumila folio gramineo, sive

*Muscus* alpinus *Lychnidis* flore.

*Muscus* floridus, Gesl. epist. & Fract.

*Caryophyllus* pumilio alpinus, vel 7. Clus. panat.  
in hist. syl. 9.

*Ocimoides* muscosus, Ponæ.

Flos colore variat, est carnej sive rubri dilutio-  
ris: reperitur & rotus niveus.

## SAPONARIA.

**SAPONARIA** dicta, quod Saponis vicem praebeat ad pamos purgandos: Quibusdam Struthium Diof. l. 2. c. 193. qui vulgo norum scribit, quo sullones purgandi lanis utantur. Plin. l. 9. c. 3. Radicula Lavandis lanis succum habet, mirum quantum conferens candore mollietq; addit Struthion Græcos vocare, florere est late, gratam aspectum sine odore, spinosam, & caule lanuginoso: semen ei nullum esse (cui Columella versus repugnat: a Syriis, venit quæ femine radix) radicem magnam, quæ concidatur ad dictum usum. Et l. 24. c. 11. tingentibus & Radicula ramis præparat, quam Struthium vocari diximus à Græcis. Hæc Saponaria quartæ convenient, nisi spinosam diceret. Nonnulli urceolaris Plinii l. 22. c. 16. Sani qui Alisma Diof. l. 3. c. 169. conseant, cum multas Alisnatis notas habeat.

I. *Saponaria* major lævis.

*Saponaria*, Trag. Lac. Gesl. hor. Dod. Ad. Lob. Cæs.

Tab. Cam. Ger. Eyst.

*Viola* agrestis, Trag.

*Struthium*, Fuch. Lon. Thal. Lug. sativum, Fuch. ico.

*Saponaria* major, Lugd.

Floris color communiter dilute purpureus, ali-  
quando ex roseo rubet: nonnunquam candidus  
est: interdum pro floribus sunt copiosiores ramu-  
li foliacei, paucis floribus intermixtis.

II. *Saponaria* cōcava Anglica: in Prod. descripta.  
*Gentiana* concava, Ger.

III. *Saponaria* frutescens oleæ folio.

*Saponaria* altera fruticosior ex Sicilia, Cæs.

an *Saponaria* Apula, Claudino.

IV. *Saponaria* *Lychnidis* folio flosculis albis,  
an Conditum Arabum.

*Struthion* Diof. sive *Radicula* & *Lanaria* vulgo

Neapoli, quia succo foliorum & radicum ad lani-  
purgandas utuntur, Imperato, qui ad nos misit.

SECTIO



## SECTIO SECUNDA.

## DE CARYOPHYLLEIS FLORIB. SIVE ARMERIIS.

**CARYOPHYLLEUM** florem ab odore *Caryophyllorum*, recentiores nominarunt: Hunc alii *Cantabricam* Plinii l. 25. c. 8. quæ in Hispania à *Cantabris* Divi Augusti tempore reperta fuit, esse volunt. Aliis est *Vetonica* sive *Betonica* altera, inter notha *Dioscoridis*: nec fortè inepte. Aliis herba *tunica*; quibusdam *Iphium* Theoph. 6. hist. 2. & 7. ejusdem 12. sed malè. Quidam inter *Saxifragias* numerant, præsertim sylvestre genus quam Gal. 5. suend. sanat. *Saxiphagon* appellasse videtur: nam & sylvestris nostra calculum frangit & educit, quod Galenus de *Cestri* seu *Betonica* in Gallia proveniente, testatur, *Hermolao* notante. Fortè & Theoph. 6. hist. 1. & 6. per Jovis florem, inter coronarios frutescens minutis foliis conditum, cujus flos sine odore tantum in coronatum usu, sylvestrem *Caryophyllam* intellexit. *Armerii* flores dicuntur, à Gallico nomine *Armoires* & *Armoiries*.

Genera sexma duo sunt: *Altilis* & *Sylvestris*. *Altilis* species multa, magnitudine, colore & foliorum numero differentes: flores namq. sunt vel minores, vel medi, vel majores, vel maximi: vel multiplici, vel simplici florum textura, majoribus vel minoribus foliis constantes. Sunt colore nivei, dilutè purpuræ candicantes, croceo rutilantes, immixti: aut versicolores, ut candidi & crocei, candidi & rubei, candidi rubri punctulis aspersi: rubentes, aut violaceo admixto purpurei, aut rubei lacteis notis aspersi, sicq. guttati, aut rosea sylvestris colore. Sic ex uno caule duo florum genera, partim candidi, rubrug, maculis aspersi, partim crocei: sæpè etiam uno pediculo, flores diversi colores videas: aliquando unus ex alio medius excrevere conspicitur: aliquando in una planta flores trium colorum: in summa mangonia & arte in his floribus magna varietas fit. *Sylvestrium* quoque magna diversitas existit, & in magnitudine, & coloris, & floris, & calycis figura, pleriq. tamen simplici flore sunt.

*Caryophyllus flore pleno.*I. *Caryophyllus maximus ruber.*

*Caryophyllus maximus plenus flore rubro*, Eyft.

II. *Caryophyllus maximus variegatus.*

*Caryophyll. major rub. & albicans flore pleno*, Lob. ico.

*Caryophyllus multiplex maximus*, Tab. Ger.

*Caryophylli*, Cast. Ap.

*Caryoph. multiplex max. variegatus*, Eyft.

In hoc varietates.

1. *Caryophyllus maxim. & plenissimus*, colore mixto carneo, quibusdam corniculis lacteis, Bry.

2. *Caryophyll. max. & pleniss. colore vario* in diversis foliis, Scarlatino, dilutius rubente, albo, Bry.

3. *Caryophyll. max. & pleniss. colore rubro* auratiore, staminulis tribus niveis in medio, Bry.

III. *Caryophyllus altalis major:*

*Caryophyll. 2a*, Trag.

*Betonica altalis*, Fuch. Ges. col. coronaria, Lac.

*Betonica altalis*, Dod. gal. coronaria, Ges. hor.

*fiola flammæa* Scaligero, Ges. hor.

*Cantabrica*, Tur.

*Caryophyllus domesticus*, Matth. Cam. Cast.

*los caryophyllorum*, Lon.

*caryophylli nostrates*, an *Cantabrica* Plinii, Ad.

*Caryophyll. Lob. multiplex*, Lob. ico. Tab. Ger.

*Caryophyllus altalis*, Lugd.

*Flos Gariofilus*, aliis *Viola Damascena*, Cæs.

*Caryophyllus flore majore*, Eyft.

*Caryophylli flores etiam in Senarum regione*, sed non ita odore grati, Garz.

Herba tunica quibusdam.

Varietas multiplex.

1. *Caryophyllus multiplex flore albo*, etiam rubro & carneo, Eyft. & apud Swert.

*Caryophyllus totus albus*.

*Caryophyllus rubeus & sanguineus*.

*Caryophyllus incarnatus*.

2. *Caryophyllus pleno flore coloris albi*, mista & sparsa rubedine, Bry.

*Caryoph. albus lineis & notulis rubris distinctus*, Swert.

3. *Caryoph. alb. flammulis ruberrimis*, Swert.

4. *Caryophyll. albus lineis rubris subtilissimè distinctus*, Swert.

5. *Caryoph. multiplex flore ex purpura rubescente*, Eyft.

6. *Caryoph. flore majore partim carneus partim albus*, rubris striis ac punctulis variegatus, Eyft.

7. *Caryoph. multiplex singulis florum foliis è rubro & albo colore dimidiatim divisis & punctatis*, Eyft. qui

*Caryo-*

Caryoph. hororum multiplex major, Lob. ico.

8. Caryoph. plenus colore umbilicatenus rubescens instar florum Persici, mali, foliis latioribus, Eyft.

9. Caryoph. plenus purpurascens, punctatis foliis, Eyft.

10. Caryoph. purpureus punctulis intensè purpurei coloris, Swer.

11. Caryophyllus subviridi flore, Swer.

IV. Caryophyllus altilis medius.

1. Caryoph. albus lineis cremesini coloris, & Caryophyl. minor albus lineis purpureo violaceis distinctus, Swer.

2. Caryoph. miniatus medio albescens, Eyft.

3. Caryoph. pleno flore colore violaceo, Bry.

V. Caryoph. pleno flore mali arantii colore.

Caryoph. pleno fl. Silefiacus miniatus, Clus. hist.

Caryoph. plenus miniato colore, Eyft.

Varietas.

1. Caryophyllus dimidia parte arantii colore, altera candida & permixta, Bry.

2. ex semine libenter provenit, sed alii flores nativum eumque saturatiorem aut dilutiorem retinent: alii albi, alii rubri sunt: nonnulli simplici quoque foliorum serie constant, Clus. hist.

VI. Caryophyllus pleno flore minor.

Caryoph. hororum multiplex minor, Lob. ico.

Caryoph. pleno flore species exigua, coloris carnei, Bry.

VII. Caryophyllus supinus flore pleno rubro argenteis micis aspersis.

Caryophyllus 7. pleno flore, Clus. hist.

Caryophyllus flore minore pleno rubescens punctatus, Eyft.

VIII. Caryophyllus multiplex laciniatus.

Caryophyllus purpureo flore multiplici profundè laciniato, Lob. ico.

Varietas.

1. Caryophyl. multip. laciniat. flore incarnato, Eyflett.

2. Caryoph. purpureo flore multiplici profundè laciniato, Eyft.

3. Caryoph. purpureo flore multiplici laciniato, Eyflett.

Caryoph. purp. fl. multiplici, Bry. & Swer.

*Caryophyllus hortensis simplex.*

I. Caryophyllus hort. simplex flore majore.

Caryoph. syl. major vulgator, Lob. ico.

Caryophyllæ flos simplex, Dod.

Caryophyllus simplici flore, Swer.

Varietas magna in colore: est enim simplex miniatus, est pallidè purpurascens, vel incarnatus: est verticolar ob guttarum & rubrarum macularum asperginem: est variegatus, cujus folia albescencia stigmatibus rubris aspersa sunt: duo posteriores in Eyft. proponuntur, nomine:

Caryophylli simplices hortensis verticolaris, Caryophylli majoris syl. variegati.

II. Caryophyl. arborecens Cret. 1. in Prodr. descriptus.

III. Caryophyllus simp. fl. minore pallidè rubente.

Caryophyllus sylv. 3. flore pallido suaverubente, Lob. ico.

Caryophyllus hortulanus, Tab.

Caryoph. syl. simplex suaverubens, Ger.

IV. Caryoph. simp. minor flore punctato.

Caryoph. alter minimus, flore simplici micis aureis asperso, Lob. ico.

Habetur & repens flore parvo punctato.

V. Caryoph. simplex supinus latifolius.

Caryophyll. minimus pulchellus supinus, maculis aureis argenteisve aspersus, Lob. ico.

Caryophyllus syl. 7. Clus. hist.

VI. Caryoph. simp. supinus angustifolius.

Caryophyllus virgineus, Tab. Ger.

*Caryophyllus barbatus & prolifer.*

I. Caryophyllus barbatus flore multiplici.

Armeria alba & rubra multiplex, Lob. ico. Bry. Swer.

Armerius pleno flore, Clus. pan. & hist.

Caryophyllus Carthusianorum 3. Tab.

Armeria rubra latifolia, Ger.

Armerius pleno rubro flore, Eyft.

Duplex est: vulgator rubro flore, rarius albus: Hujus præter rubrum & album adhuc differentia apud Swertium, quæ

Armeria alba multiflora.

II. Caryophyllus barbatus flore roseo.

Armeria multis & separatim positis floribus duplicibus & magnis, coloreque ruberrimis, Swer.

III. Caryophyllus barbatus hortensis latifolius. Lychnis monachorum, Gesl. hor.

Armeria altera, multis in latum orbiculum congestis floribus, Lob. ico.

Viola barbata latifolia, Lugd.

Caryophyllus Carthusianorum 1. Tab.

Armeria suaverubens, Ger.

an Lych-

an *Lychnis* fortè antiquorum altera, Cæf.

Flos *Scarleti*, Lon. Geſ. ap.

Flore eſt communiter rubro, habetur albo maculis lactei coloris notato: eſt & diverſicolor, ex albo rubro & medio: hinc

1. *Armeria ſimplex flore rubro*, Bry, & Swer.

Flos *armerius ruber*, Eyſt.

2. *Armeria flore albo*, Bry, Swer.

Flos *armerius albus*, Eyſt.

3. Flos *armerius variegatus*, Eyſt.

I V. *Caryoph. barbatus hortēſis anguſtifolius*.

*Armeria altera ſuaverubente flore*, Lob. ico.

*Armerius flos alter*, Dod.

*Armerius ſimplici flore pannonicus*, Cluſ. hiſt.

*Caryophyllus Carthufianorum* 2. Tab.

*Armeria rubra*, Ger.

Hujus differentiæ quinque: 1. eleganti eſt flore, eod; aut planè rubro, aut lactei candoris maculis alperſo, aut niveo, oris carnei coloris: 2. omninò niveo: 3. flores pauciores dilutius rubentes & carnei coloris: 4. flos purpuraſcens, oris albis: 5. flores die primo & ſecundo quo aperti ſunt, lactei prorfus candoris, ſequentibus paulatim albedine evaneſcente, tandem omninò purpuraſcunt, ſic ut in eadem umbella flores lacteos, alios exalbidos, & media ex parte purpuraſcentes, alios omnino purpureos conſpicere liceat.

V. *Caryophyllus barbatus ſylveſtris*.

*Armeria ſyl. altera*, Lob. ico.

*Viola barbata anguſtifolia*, Lugd.

*Caryophyllæ ſyl. 1. Thal.*

Flos *Gariofilus ſyl. minimi floris ſaturatæ purpureæ*, Cæf.

VI. *Caryophyllus ſyl. proliſer*: & Eyſt.

*Caryophyllæ ſyl. 4. Thal.*

*Armeria proliſera*, Lob. ico.

*Armerius flos proliſer*, Cam.

*Caryophyllus ſyl. minimus*, Tab.

*Viſcaria*, Ger. ico.

Huic ex capitulo, ſæpè ſeptem, octo, aliquando novem flores prorumpunt.

VII. *Caryophyllo proliſero affinis, unico ex quolibet capitulo flore.*

*Caryophyllæ ſyl. quartæ, alia ſpecies*, Thal.

*Caryophyllus ſylveſtris*.

1. *Caryophyllus ſyl. vulgaris latifolius*.

*Dondernægelin*, Brunſ.

*Caryophyllæ ſyl. Trag.*

*Caryophyllæ ſyl. Matth. Lugd. Caſt.*

*Betonica ſyl. 1. Fuch.*

*Vetonica*, Dod. gal.

*Cantabrica ſyl. Tur.*

*Tunica ſyl. Lon.*

*Caryophyllæ ſyl. 3. Thal.*

*Armerius flos 1. Dod. Lugd.*

*Armeria ſive Caryophyllus minor ſyl. minimus* dorus foliis latoribus, Ad. Lob.

Flos *gariofilus ſyl. Cæf.*

*Caryophyllus montanus 1. Tab.*

*Armeria alba*, Ger. ico.

*Caryoph. minor ſyl. flore ſimplici*, Eyſt.

Flore eſt odoro & inodoro purpureo: ſimplici & pleno: hinc

*Caryophyllus minor ſyl. flore pleno*, Eyſt.

*Caryophyllus montanus multiflorus*, Tab.

*Caryophyllus montanus purpureus*, Eid.

II. *Caryophyllus ſyl. vulgaris anguſtifolius*.

*Caryophyllus montanus albus*, Tab. Ger.

III. *Caryophyll. ſyl. biſlorus*: 3. in Prod.

IV. *Caryoph. pumilus latifolius*: 4. in Prod.

V. *Caryoph. ſyl. flore magno inodoro hiriſuto*.

*Caryophyllus ſyl. 2. Cluſ. pan. & hiſt.*

VI. *Caryophyllus ſyl. humilis flore unico*.

*Armerius flos 3. Dod.*

*Caryophyllus repens humilis minimus vulgarisſimus rubellus*, Lob. ico.

*Caryophylli ſyl. Caſt. ico.*

*Caryophyllus ſyl. 1. Cluſ. pan. & hiſt.*

Singuli cauliculi unicum ſtorem, diluta purpura rubentem odorem ſuſtinent.

VII. *Caryophyllus albus parvus repens*, Cam. Osteocallon Aſyrti Italis, Eidem.

IX. *Caryophyllus cæruleus Monſpelienſis*.

*Aphyllanthes Monſpelienſium*, Ad. Lob. ico.

*Caryophyllus cæruleus*, Tab. Ger.

Rarius flore niveo reperitur.

IX. *Caryoph. ſyl. repēs multiflorus*: 2. in Prod.

X. *Caryophyllus ſyl. Carinthiacus ruber*.

*Caryophyllus ſyl. 4. vel Tauricus*, Cluſ. pan. & hiſt.

XI. *Caryoph. alpinus calyce oblògo hiriſuto*.

*Caryophyllæus pumilio Tauricus*, ſive 8. Cluſ. pan. ſyl. 7. Eid. hiſt.

*Caryophyllus montanus 3. Tab.*

*Caryophyll. mont. Cluſii*, Ger.

*Caryophyllus ſimplex laciniatus*.

I. *Caryophyllus flore tenuiſſimè diſſecta*.

*Superba*, Trag. Lon. Thal. Cam.

*Dioſanthos Theophraſti*, Ang.

D d

Vetoni-

Vetonica altilis minor, Dod.gal.

Vetonica fyl. 3. Gef.hor.

Betonica fyl. altera, Fuch.

Caryophyllaræ fyl. genus, Gef.col.

Caryophyllæ minor, Dod.

Superba recentiorum, Ad.

Superba alba media corollâ purpureo violacea,

Bry: obsoleta cinctâ, Lob.ico.

Armeria, Vetonica coronaria, Lugd.

Caryophylli fyl. 5. species 3. Clus.pan.& hift.

Caryophyllus pulmarius albus, Tab.Ger.

Caryophyllus fyl. flore albo picto, Eyf.

Superba alba, corollâ purpureo rubrâ, Swer.

Flos nunc albus, nunc dilutius rubê & carneus.

II. Caryoph. fyl. flore laciniato albo inodoro.

Superba major flore albo, Lob.ico. Swer.

Caryophyllus fyl. plumarius albus, Tab.Ger.

III. Caryophyll. fyl. alter fl. laciniato odorati-  
Armerius flos 4. Dod. (fimo.

Caryophyllus minor alter, Eid.

Caryophyllus 6. Clus.pan.& hift.

Superba Austriaca, Lob.ico.

Carioph. fyl. flore laciniato carneo, Eyf.

Caryoph. species altera flore carneo, Bry.

Carioph. fyl. flore purpurascens, & alter flore  
incarnato, Eyf.

Flos aut cædus, aut purpurascens, suavis odoris.

IV. Caryoph. fyl. tertius flore laciniato, stam-  
inulis corniculatis odoratis.

Caryophyllus 5. vel fyl. 1. albo flore, Clus. pan.  
fyl. 5. Eid. hift. (doro.

V. Caryoph. fyl. fl. laciniato, sine corniculis, o-

Caryophyllæ fyl. 3. fl. rubro, Clus. pan. & hift.

Caryoph. fyl. fl. simplici, laciniato rubro, Lob.ico.

VI. Caryoph. fyl. floribus lanuginosis hirsutis.

Superba altera & suaverubens, Lob.ico.

Caryophyllæ fyl. 5. species alt. Clus. pan. & hift.

Caryoph. plumarius purpureo cæruleus, Tab. Ger.

Caryophyllus fyl. flore albo, Eyf.

Flos candidus est: alterius flores purpurascens  
lanugine hirsuti.

VII. Caryophyllus pratensis flore laciniato  
simplici, five Flos cuculi.

Flos cuculi prat. Trag. Flos cuculi, Lon. Gef. col.

Vetonica fyl. Dod.gal. (Tab.

Odontitis Plinii, Gef. hor. quorundam, Cam.

Odontitis simplici flore, Clus. hift.

Armerius fyl. Dod.

Armeria prat. fyl. Lob. 2. fyl. Lugd.

Armoraria fyl. pratensis, Ad.

Cariophyllus pratensis, Tab.

Armeria prat. mas & fœmina, Ger.

1<sup>a</sup> *Ergon* altera, Thal.

Flore est rubello, rarius albo.

IX. Caryophyllus prat. flore pleno.

Odontitis flore pleno, Cam. Clus. hift.

an Caryophyllus mont. multiflorus, Tab.

Odontitis Plinii, Eyf.

*Caryophyllus holostius arvensis.*

I. Caryophyllus arvensis hirsutus fl. majore.

Caryophyllus holostius, Lob.ico. Ger.

Holostium caryophyllæum, Tab.

II. Caryophyllus holostius tomentosus lat-  
folius: qui 9. in Prod.

III. Caryophyllus holostius tomentosus an-  
gustifol. hic 10. in Prod.

IV. Caryoph. arvensis umbellatus folio glabre.  
Holostæum caryophyllæum arvensis, Tab.

Caryophyllus holostius arvensis, Ger.

Altine verna Dalechampii, Lugd.

Caulis aliquando rubet, aliquando viret, ramu-  
lis aliquot erectis, aliquot verò cū florib. reflexis:  
cōmuniter flos albus, aliquando subpurpurascens.

V. Caryophyllus arvensis glaber flore majore.

Euphrasia gramen, Trag.

Cratægonum forte, Dod.gal.

Gramen, Fuch. Lac. leucanthemon, Dod. Thal.  
Lugd. Ger.

Gramen alterum, Matth.

Holostæum Diosc. fl. albis vel *ἀλβὸν* Æginetz, Ad.

Holostium Ruellii, Lob.

Euphrasia major, Lon.

Gramen floridum, Cam. in Matth. majus, Tab.

VI. Caryophyllus arvensis glaber fl. minore.

Holostii Ruellii diversitas, Lob.ico.

Gramen floridum minus, Thal. Tab.

Gramen leucanthemum alterum, Ger.

Quâdoq; è medio florū, staminula rubra exsūt.

VII. Caryophyllus arvensis glaber minimus  
hic 11. est in Prod.

*Caryophyllus holostius alpinus.*

I. Caryoph. holost. alpinus latifol: 5. in Prod.

II. Caryophyll. holostius alpinus angustifo-  
lius purpurascens: 6. in Prod.

III. Caryoph. holost. alpinus gramineus: 7.  
in Prod.

IV. Caryophyllus holostius montanus an-  
gustifolius alter: 8. in Prod.

*Caryophyl-*

*Caryophyllus montanum.*

I. Caryophyll. mont. major flore globofo.

Gramen polyanthemum majus, Dod.

Gramen marinum majus, Clus. pan. Tab.

Caryophyllo marino fimilis, Ad.

Caryophyll. montan. Lob. mediterraneus, Ger.

Statice, à fistendo sanguine, Lugd. Cam. cui videtur Britannica, Ang.

Armerius mont. tenuifol. major, Clus. hist.

II. Caryophyllus montanus minor.

Pseudomoly, Dod. gal. Gef. hor. Lugd.

Gramen polyanthemum minus, Dod.

Gramen marinum minus, Clus. pan. Tab.

Caryophyllus marinus minimus, Ad. Lob. Ger.

Armerius montan. tenuifol. minor, Clus. hist.

Hic caule est aliquando prolifero.

*Caryophyllus saxatilis.*

I. Caryophyllus saxatilis foliis gramineis, umbellatis corymbis.

Symphytū petræū, sive Gypsophyton majus, Th.

II. Caryoph. saxatilis foliis gramineis minor.

Symphytū petræū sive Gypsophyton minus, Th.

III. Caryophyllus saxatilis siliquosus: qui

Caryophyllus 14. in Prod.

Gypsophyti siliquosi nomine à D. Fürero accepit.

IV. Caryophyllus saxifragus. (mus.)

Saxifraga magna, Matth. Lob. Lugd. Cam.

Saxifraga 5. Cast.

an Saxifraga Bavarica, Cam. Ponz.

V. Caryophyllus saxifragus strigosior, vel

Caryophyll. syl. flore minimo.

Saxifraga sive Saxifraga antiquorū, Ad. Lob. ico.

VI. Caryophyllus saxatilis Ericæfolius umbellatis corymbis: 12. in Prod.

VII. Caryophyllus saxatilis Ericæfolius ramosis repens: 13. in Prod.

IX. Caryophyllus saxatilis floribus rubris:

13. altera species in Prod.

IX. Caryophyllus minimus muralis.

Tunica minima, Lugd.

## SECTIO TERTIA.

## ANTIRRHINUM; LINARIA; LINUM; POLY-

GALA; ONOBRICHIS; GLAUX; STOECHAS;

Lavendula; Rosmarinus.

## ANTIRRHINUM.

**L**YCHNIDEM agrariam Plin. l. 25. c. 10. ipsum Antirrhinum ex Galeno (cui λυχνίς ἀγρία & βουκερίον) vocavit, quia flore sit Leucoii, minore tamen ut Diosc. l. 4. cap. 133. loquitur. Quare post Lychnides & Caryophylleos flores, Antirrhinum (cum & ipsum flore placeat) subungere volumus.

Κυνοκέφαλον, ἀντίρρινον Dioscoridi l. 4. c. 133. dictum, quod fructu sit vituli narium simili. Theophrasto 9. hist. 21. ἀντίρρινον, fructum tanquā naves vituli parit. Plinio loco citato Antirrhinon sive Anarrhinon, sive Lychnis agraria. Sunt qui velint ab eodē l. 30. c. 2. Cynocephalum herbā dici, id est canis caput, quod seminis conceptaculū canis calvæ cute & carne exuitā representet. Veteres unius tantū meminisse videntur, at recentioribus plures sunt differentia.

I. Antirrhinum majus rotundiore folio.

Cynocephalus Plinii, Lugd.

Antirrhinum majus flore roseo, Cam. hor.

II. Antirrhinū majus alterum folio longiore.

Antirrhinum 2. Matth. Lugd.

Antirrhinum magnū, Dod. gal. Lug. majus, Cam.

Antirrhinum, Gef. hor. Dod. Ad. (vulgo caput canis &amp; caput vituli) Lob. Tab. cui Antirrhinum &amp;

Antirrhinum album: at Ger. purpureum &amp; albū.

Os leonis vulgo, Cæf.

Antirrhinum flore rubro &amp; flore albo, Eyst.

Flore habetur roseo, rubente, aliquando maculato, ex candido dilutē purpurascēte: candido:

in hoc, quod flore est albo, sit

Antirrhinum 4. Matth. Lugd.

Est &amp; flore albo, oris tantum rubris, vel rubentibus, vel luteis, &amp; dicitur

Antirrhinum fl. albo oris rubentibus, &amp;

Antirrhinum fl. albo oris rubris.

Antirrhinum fl. albo oris luteis, Eyst.

Foliis quoq; variat latioribus &amp; angustioribus.

III. Antirrhinum luteo flore.

Antirrhinum flore luteo, Gef. hor. Ad. Lob. ico.

subluteo, Dod. luteo grandi, Cam.

Antirrhinum luteum, Tab. Ger.

Hoc à priore &amp; floris colore &amp; folio variat:

quod verò flore est albo non item.

IV. Antirrhinum folio dissecto: hoc inter plantas

Dd 2

plantas siccas Monfpeſſuli collectas apud fratrem  
Joh. Bauhinum p.m. vidimus.

V. Antirrhinum arvenſe majus.

Antirrhinum, Eric. Cord. (cui & Rhinoceros)  
Tur. Lac. Lon.

Antirrhinum 1. Matth. 4. Lugd. Cam. ep. Matth.

Orontium, Dod. gal.

Antirrhin. Cynocephala & Bucranion, Cord.  
in Dioſc.

Antirrhinum minus, Geſ. hor. (vel foliis hyſſopi  
Eid. col.) Tab. Ger.

Antirrhinum minimum, Ad. (forſan Archigenis  
Orontium, vel Aurantium) Lob. medium, Cam.

Antirrhinum parvum, ſive caput Simiæ, Lugd.

Antirrhinum iyl. (ſive Phyteuma) Dod. Eyſt.

Phyteuma *χαμόμηθος* Cydoniæ, Belli ep. 12. ad Cl.

Os leonis alterum. Cæſ.

Antirrhinon rubrum arvenſe, Thal.

Hoc quibuſdam Phyteuma Dioſcoridis l. 3.  
cap. 130. aliis Orontium Archigenis, quaſi Au-  
rantium, quod auriginem morbum levet: quod  
aliquando procerius, aliquando brevius pro  
ratione ſoli reperitur.

VI. Antirrhinum arvenſe minus.

Antirrhinum 3. Matth. Lugd.

Antirrhinum arvenſe, Geſ. col.

Antirrhinum minimum, Thal. Cam.

Antirrhinum alterum minimū repens, Lob. jo.

Antirrhinum ſyl. Caſt.

Os leonis in vineis, Cæſ.

VII Antirrhinum ſaxatile, foliis ſerpylli:  
quod in Prod. deferibitur.

## L I N A R I A *εἰς* S P E C I E S.

Cum L I N A R I A quibuſdam Antirrhini ſpecies videatur, & an Antirrhinum Plinii ſit quidam dubite-  
re proponemus. Quibuſdam Oſyris cenſetur, ex qua, Galeni ſeculo, ut & nunc in Italia, ſcopa conſuebat  
tur. C. ex. foliis eſt lini initio nigri, dein ruſcentibus, &c. Dioſcoridis l. 4. c. 143. & Plin. l. 27. c. 12. Oſyris ſola  
eſt nigriſſa cen lini, ſemine initio nigro, dein ruſcente &c. Linaria latinis quod ſolis lini ſit.

*Linaria erecta latifolia.*

I. Linaria latifolia Dalmatica magno flore:  
quæ 1. in Prod.

II. Linaria Americana, parvo flore luteo:  
quæ 2. in Prod.

III. Linaria latifolia triphylla major: 3. in  
Prod.

Linaria Cretica latifolia, Cluſ. hiſt.

IV. Linaria triphylla minor lutea.

Linaria Valentina, Cluſ. hiſp. Dod. Lob.

Linaria Hispanica 1. Cluſ. hiſt.

V. Linaria triphylla cærulea.

Linaria cærulea Apula, Col.

VI. Linaria tenuifolia, æruginæi coloris.

Linaria Hispanica 2. Cluſ. hiſt.

VII. Linaria bellidis folio.

Linaria odorata, Cluſ. hiſp. & hiſt. Dod. Lugd.

Linaria purpurea, Ad. odorata, Lob. Ger.

Oſyris odorata purpurea, Tab.

*Linaria erecta anguſtiſolia.*

I. Linaria ſcoparia.

Belle videre, Geſ. hor.

Scoparia, Geſ. hor. Ad. Lob. Lugd. Ger.

Oſyris, Ang. Dod. Caſt. Cam.

Linaria magna, Lugd.

Herba ſtudioſorum, Tab.

Oſyris græcorum quibuſdam: aliis id neganti-  
bus, quamvis hodie in Græcia *αἰθέρις* nominetur:  
alii an Chamæcypariſſus Plinii ſit dubitant.

II. Oſyris fruteſcens baccifera.

Caſia poëtica Monſpelienſium, Ad. Lob. Cam. ep.

Caſia quorundam, Cluſ. hiſp. & hiſt. Tab.

Caſia lignea, Cæſ.

Caſia lignea maritima, Lugd.

Polygonum 4. Plinii quibuſdā, Dalech. in Plin.

Variat: communiter atrovirens, aliquando to-  
ta rubet & ramis & foliis, ideo quidam

Geniſtam rubeam vocant, Cæſ. l. 1p.

Oſyris Plinii l. 27. c. 12. videtur, quæ ut habet, re-  
mulos fert nigros, tenues, lentos, & in iis folia ni-  
gra cen lini, ſemenq; in ramulis nigrum initio,  
dein colore mutato, ruſcens: ſineg. mulieribus  
faciunt ex his Galenus 8. ſimp. ex Oſyride *αἰθέ-  
ρις* fieri tradit, quæ alii interpretantur ſinegma-  
ta, at Plinius, alii ſcopas, alii *καὶ οὐκ ἔστιν ἡ καὶ οὐκ ἔστιν*  
*μαία*.

III. Linaria vulgaris lutea flore majore.

Linaria (& Pleudolinū) Brunſ. Ger. 1. Dod. Lon.

Linaria vulgaris, Trag. Cam. Eyſt. vulgo, Geſ.  
hor. Cæſ.

Oſyris, Matt. Fuch. Dod. gal. Cord. in Dioſc. Tur.  
Lac. Ad. Lob. Lug. Caſt. major, Tab.

Floris

Floris color luteus, luteo pallidus, rarius albus: flore minore etiam, in agris reperiri Tragus asserit.

IV. *Linaria lutea montana* Genistæ tinctoriæ folio: hæc ad montem S. Bernhardi, floribus aureis, mediæ magnitudinis, reperitur.

V. *Linaria lutea* flore minimo: hæc in agris Provinciæ Galliæ, brevibus & angustis foliis & minutissimis flosculis luteis, occurrit.

VI. *Linaria folioso capitulo luteo* major.

*Linaria* 3. & *Heliochrysos*, Trag. quarta, Lon.

*Linaria aurea* Tragi, Lob. Lugd. Tab. Ger. Eyf.

*Linaria Austriaca*, Cam.

*Olyris Austriaca*, Clus. pan. & hist.

*Chrysocome Diof.* & *Plinii*, Guil. Col.

*Linofyris nuperorum*, Lob. recentiorum, Lugd.

VII. *Linaria folioso capitulo luteo* minor.

*Linaria aurea* minor, Tab.

*Olyris purpureo cærulea*, Ger. ico.

II X. *Linaria* flore pallido rictu aureo.

*Linaria pannonica* 1. Clus. pan. & hist. Tab.

*Linaria purpurea altera*, Ger. ico.

an *Olyris alba*, Lob. ico.

IX. *Linaria* flore pallido rictu purpureo.

*Linaria* flore albicante inodoro, Cam.

*Linaria* flore albicante, Eyf.

X. *Linaria purpurea* major odorata.

*Olyris altera*, Dod. gal.

*Linaria altera purpurea*, Dod.

*Linariæ purpureæ* varietas, Lob.

*Linaria cærulea*, Cast. Lugd. Cam.

*Linaria purpurea elatior*, Eyf.

Variat flosculis purpureis, purpureo violaceis, albis & cæruleis: foliis etiam magis minusve angustis.

XI. *Linaria capillaceo folio* odora, quæ 4. in Prod.

*Linaria caryophyllata*, Cam.

Flore est albicante: ex cæruleo & albo mixtis, rictu linea flavescente distincto.

XII. *Linaria capillaceo folio* altera.

*Linaria tenuifolia*, Lugd.

Flos priusquam hiet, rubet; cum apertus est ex rubro albicat: est & coloris varii ex albo, cæruleo & luteo mixtis.

XIII. *Linaria foliis angustis ex viridi canescentibus.*

*Linaria Hispanica* 3. Clus. hist.

Flos utcumque odoratus: externè ex albidis, internè purpureus, rictu ex flavo albicante, labio purpureo.

XIV. *Linaria arvensis cærulea*: 5. in Prod.

Flore est cæruleo, est & violaceo.

XV. *Linaria montana flosculis albicantibus.*

*Anonymos tenuifolia*, Clus. pan. & hist.

*Anthyllis montana*, Lugd.

*Linaria montana* sive *syriatica*, Thal.

*Linaria adulterina*, Tab.

*Linofyris nuperorum*, Ger. ico.

XVI. *Linaria quadrifolia* exiguis flosculis cinereis.

*Linaria Cretica angustifolia*, Clus. hist.

XVII. *Linaria quadrifolia lutea.*

*Linaria tetraphylla lutea* minor, Col.

XIX. *Linariæ aureæ* affinis: quæ 6. in Prod.

*Linaria pumila seu repens.*

I. *Linaria pumila supina lutea.*

*Linaria pumila*, Clus. hisp.

*Linaria Hispanica* 5. Clus. hist.

*Olyris flava* syl. Lob. ico.

*Olyris minor*, Tab.

*Linaria Valentina*, Ger. ico.

II. *Linaria pumila foliolis carnosis, flosculis minimis flavis.*

*Linaria* 2. Moravica 1. Clus. hist.

III. *Linaria foliis carnosis cinereis.*

*Linaria Hispanica* 4. Clus. hist.

Flos cærulei dilutionis ad cineraceum tendentis, rictu flavo.

IV. *Linaria cærulea repens.*

*Olyris purpureo cærulea repens*, Ad. Lob. ico.

*Linaria altera floribus purpurascens*, Cæf.

*Linaria minor Dalechampii*, Lugd.

*Linaria parvo flore cæruleo*, Cam.

*Linaria* 4. Moravica 2. Clus. hist.

Floris color cæruleus, ex violaceo purpurascens.

V. *Linaria quadrifolia supina.*

*Linaria alpina*, Gef. hor. & ep.

*Linaria pannonica* 2. Clus. pan.

*Linaria alpina pumila*, Tab.

*Linaria* 3. Styriaca, Clus. hist.

*Linaria Styriaca repens*, Eyf.

## LINUM ejusq. SPECIES.

**A**NON Dioscoridi 1.2.c.125. Theoph. 8. hist. 7. qui 3. cauf. 21. in Lolium mutari scribit. Linum Plinio 19. l. 1. cujus generis ratione loci natalis recenset.

## Linum latifolium.

## I. Linum sativum.

Linum, Brunf. Matth. Fuch. Cord. in Diosc. Tur.

Lac. Lon. Cæf. Lugd. Cast.

Linum sativ. Trag. Dod.

Linum vulgare cæruleum, Ad. Lob.

## II. Linum arvenfe.

Linum sylvestre, Trag. Tur.

Caulibus & folliculis crassioribus à priori differt, & inter avenam reperitur.

## III. Linum syl. latifol. hirsutum cæruleum.

Linum syl. 1. Clus. pan. Dod.

Linum syl. latifol. Lob. ico. Clus. hist.

Flos cæruleus, aut vegetior, aut dilutior.

## IV. Linum syl. latifol. hirsut. candidum, purpureis venis distinctum.

Linum syl. latifol. 1. Clus. hisp. at 2. in hist.

Linum syl. latifol. foliis hirsutis Tithymalli helioscopii, Lugd.

## V. Linum fruticosum niveum.

Linum syl. fruticosum, vel 3. Clus. hisp. at in hist. 7. fruticosum.

Linum syl. 2. flore albo, Lugd.

VI. Linum syl. latif. caule viscoso flore rubro: ex montibus Bononiensibus & Sumano habemus, quod & circa Ingolstadtium reperitur.

VII. Linum syl. cæruleum flore aureo: quod 2. in Prod.

## VIII. Linum syl. latifolium luteum.

Linum syl. 2. Clus. pan. at 3. in hist.

Linum syl. pannonicum, Tab.

Linum sativum, Ger. ico.

## IX. Linum syl. luteum foliis subrotundis.

Campanula lutea linifolia, Ad. Lob. Lugd.

X. Linum luteum ad singula genicula floridum.

Linum luteum syl. latifolium, Col.

XI. Linum fruticosum subflavum: quod 1. est in Prod.

## XII. Linum maritimum luteum.

Linum syl. Matth. Dod. Cæf. Cast. Lugd. Cam.

Linum marinum luteum, Ad. Narbonense, Lob.

## XIII. Linum Virginianum.

Linum sponte prodit, ab Anglico caule & foliis di-

versum, materia tamen perinde bona; in descr. Virgin.

## Linum syl. angustifolium.

## I. Linum syl. angustifolium flore magno.

Linum syl. 4. Clus. pan. syl. 5. angustif. 2. Eid. hist.

Linum syl. 3. Dod. Tab. Cam. ep.

Linum syl. floribus albis, Lob. Ger.

Linum syl. 2. floribus albis, Lugd.

Linum syl. tennifolium, Cam.

Flore est cæruleo intenso, violaceo, albo, albolis neis purpureis distincto. Reperitur colore cæruleo in candidum languescens & veluti cinereo, capitulis etiam longè amplioribus, quod Lini syl. angustifol. albi aliud genus, Clus. pan. & hist.

II. Linum syl. angustifol. floribus dilute purpureis, vel carneis.

Linum syl. angustifol. vel 2. Clus. hisp. Dod.

Lini syl. 4. species 3. Clus. pan. at 6. in hist.

III. Linum syl. angustis & densioribus foliis flore minore.

Linaria 4. Trag.

Linum syl. 3. Clus. pan. Lugd.

Linum syl. tenuifolium, Lob. Tab. Ger.

Linum syl. cæruleo flore, Cam. ep. Eyst.

Linum syl. 4. angustifol. 1. Clus. hist.

Flos ex diluta purpura albicat, & quasi cæneus.

IV. Linum syl. angustifol. foliis rarioribus.

Linum syl. 2. Tab. syl. tenuifolium, Ger.

Flore est cæruleo; reperitur & albo.

## V. Linum syl. minus,

Linum syl. 5. Clus. pan. at 8. in hist.

Chamælinum, Lob. Lugd. cæruleum, Tab.

Chamælinum perpallidum, Ger.

Linum pusillum candicantibus floribus, Cam.

Flore est candido, vidimus & luteo.

VI. Linum minimum stellatum: quod 3. in

Prodromo, & quibusdam dicitur

Passerina minor saxatilis.

## VII. Linum pratense flosculis exiguis.

Linum syl. pusillum candicantibus floribus, Cam.

Linocarpos, Thal.

Linum syl. exiguum, Cam. ad Thal.



## POLYGALA ejusq̃ SPECIES.

**ΠΟΛΥΓΑΛΟΝ** frutex brevis est. palmi altitudinem petens, foliis Lenticulae, gustu subacervo (astricho Plinio) potius lactis abundantiam sacere creditur (facit Plin.) unde nomen habet. Dioscoridi l. 4. c. 142. Plinio l. 27. c. 12. Sunt qui nostram intellexisse velint, cum nostra potius ad Onobrychidem Dioscoridis referenda videatur.

I. Polygala major.

Polygala vulgaris major, Clus. pan. & hist.

Polygala major, Tab.

Variat flore, qui modo dilutioris purpuræ, modo cæruleus, modo albus, hinc tres figuræ

Polygala major alba : cærulea : purpurea, Tab.

Polygala purp. flore cæruleo : rubris florib. Ger.

II. Polygala vulgaris.

Polygalon, Trag.

in Thesion, Ang.

Polygala, Dod. gal. Tur. Lon. Thal. Cam. Tab. Ger.

Polygala recentiorum, Ad. Lob.

Onobrychis vera Dioscoridis, Eid.

Flos ambervalis, Dod.

Amarella, Gef. ep.

Crucis flos, Eid. coll.

Polygala vulgaris minor, Clus. hist.

Floribus est cæruleis, violaceis, dilutioris pur-

puræ seu rubris, vel berisilici, vel sanguinei coloris : rarius niveis albisque : hinc tres figuræ

Polygala recent. rubris floribus : albis florib. Lob.

Polygalæ cærulea : purpurea : alba, Tab.

Polygala obsoleto flore : albis floribus, Ger.

Polygalon flore rubro purpurascente : & flore cæruleo, Eyf.

Est & alia foliolis circæ radicem rotundioribus, flore cæruleo, sapore admodum amaro, qui in cæteris non ita insignis animadvertitur, Thal.

III. Polygala acutioribus foliis Montpeliciæ.

Onobrychis 3. Lugd.

IV. Polygala latea.

Polygala, Ang. Cam.

V. Polygala repens nivea.

Polygala, Cast. repens, Lob. Lugd. Tab. Ger.

VI. Polygalæ affinis.

Chamæmyrsine quorundam, Lugd.

## ONOBRYCHIS.

**ΟΝΟΒΡΥΧΙΣ** folia habet Lentis serè longiora, caulem dodrantalem, florem puniceū, radicem exiguan, Dioscoridi l. 3. c. 170. Alii Polygalæ vulgaræ, non adeo male : alii Capri gallinaceo, de quo inter Vitia agatur : alii sequentibus tribuunt, & ab affini ruditu nomen habere volunt.

I. Onobrychis quarta lutea, Dalech. Lugd. quid ?

II. Onobrychis arvensis : vel Campanula arvensis erecta.

Onobrychis, Dod. gal. prima, Lugd.

Aricularia Syloii, Gef. col.

Viola anonymos inodora, Eid.

Campanula parva 3. Dod. 8.

Campanula arvensis minima, Dod.

Onobrychis altera Belgarum, Lob. Eyf.

Elatine, Cæf.

Speculum Veneris, Ger.

Foliis ludit, superioribus latioribus caulem amplexantibus, inferioribus longioribus, nullis cre-natis, sed quibuidam crispatis : hinc apud Tab. duæ figuræ, nomine

Violæ arvensis, & Violæ pentagoniæ.

## GLAUX.

**ΓΛΑΥΞ** foliis Cyrtiso aut Lenticulae similis est. supernè virens, inversa candicans : ramulis quinis sensivo à terra, tenuibus, à radice dodrantalibus : flores violæ alba, purpurei exeunt, at minores : nascitur juxta mare : in forbitione lactis ubertatem intermissam restituit, Dioscorid. lib. 4. cap. 141. Plinius lib. 27. cap. 9. cui Glaux antiquitus euglacton. Fortè γλαῦξ quasi γλαῦξ lac. Glaucis nomen, Tragus Polygalæ flore rubro tribuit : at eam qua flore est albo, Polygalam Dioscor. facit. Sunt qui Glaucis nomen cuidam leguminofo, de qua suo loco, tribuant.

I. Glaux maritima.

Glaux, Dod. gal. Lugd. Cam.

Glaux exigua maritima, Ad. Lob. Ger.

Glaux marina minor, Tab.

II. Glaux latiore folio Thuringiaca.

Glaux, Cord. in Diof. altera, Cam.

Varie-

Varietas in hac: alia enim major, foliis modolatoribus, modo angustioribus: alia minor densis cespitibus, cauliculo inferius ob folia dela-

pla, ceu geniculato: qualis circa Egram loci nitrosi provenit: Similem ex Scotia habemus.

## STOECHAS ARABICA.

ΣΤΙΧΑΞ, ab Insulis ejusdem nominis, è regione Massilia, ubi nascitur, cognomen tum accepit, teste Dioscoride l. 3. c. 32. Plin. l. 28. c. 12. Sunt qui rectius Stachyn, quasi spicam, dici existiment.

### I. Stoechas purpurea.

Stoechas, Trag. Matth. Gesl. Lac. Ad. Lob. Lon. Cast. dei. Lugd.

Stichas, Fuch. Dod. gal. Tur.

Stichas arabica, Cord. in Diosc. & hist.

Stoechas arabica, Cam.

Spica Italica syl. Cæf.

Stoechas brevioribus ligulis, Clus. hist.

Variat: nam ea quæ ex Arabia adfertur, densioribus est ramulis.

### II. Stoechas cauliculis non foliatis.

Stoechas, Cast. ico. Dod. 8. in Belgio nata, Eid. fol.

Stoechas nudis cauliculis summis, Lob.

Stoechas capitulis foliatis, Lugd.

Stoechas longioribus ligulis, Clus. hist.

### III. Stoechas latifolia flore albo.

Foliis est Lavendulæ flore magno albo: in Morena Castiliæ D. Albinus legit.

### IV. Stoechas folio serrato: & Dod. Ger.

Stoechas 2. Clus. hisp.

Stoechas folio serrato & crispo, Lob.

Stoechas serrata, Tab.

Stoechas crispo folio, Clus. hist.

Succudus Avicennæ Myconi, Lugd.

Ex horto Clarissimi Contareni accepimus.

### V. Stoechadi ferratæ affinis.

Tragium alterum Dioscor. Secudus & Succudus Avicennæ, Rauwolf. & Lugd. ap.

## LAVANDULA.

LAVANDULA, quod lavacris expetatur, huc refertur, & propter formam & propter nomen, cum Stoechas Arabica à Mesueo dicatur. Pseudonardus Plinii l. 6. c. 12. censetur. Alii Stoechadi veterum cognatam faciunt: alii Cneorum, five Cassiam albam Theophrasti volunt: quidam Iphym Plinii suspicatur.

### I. Lavandula latifolia.

Spica Nardus Germanica, Trag.

Nardus Italica, Matth. Lob. Germanica, Lon.

Lavandula, Ang. (cui & Cneorum Theoph.) Gesl.

hor. Dod. Ad. fœmina, Dod. gal.

Lavandula major, Cord. in Diosc. & hist.

Pseudonardus, Matth. Cast. mas, Fuch. at. in ico. fœmina.

Lavandula mas, Lugd. latioribus foliis, Cam.

Lavandula altera longiore folio & spica, Clus. hist.

Cassia alba Theophrasti, Dalech. in Plin.

Flore est cæruleo: habetur & albo, & purpureo:

hinc figuræ duæ apud Tab. Ger. & Eyst. sub

Lavandula 1. & spica hortulana fl. albo, Tab.

Lavandula fl. cæruleo: & Stoechas five Spica hortulana, Ger.

Lavandula flor. cæruleo: & Lavandul. flore albo, Eyst.

Quæ flore est albo, folia vulgari paulo latiora habet.

### II. Lavandula angustifolia.

Lavendula Trag. (cui & Cassia Germanica) Matth.

Lac. Lon. vulgaris, Cord. in Diosc.

Lavendula minor, Cord. h. fœmina, Lugd.

Pseudonardus fœmina, Matth. Fuch. (at in ico mas) Cast.

Stachys, Ang.

Nardus vulgo dicta, Gesl. hor.

Lavandula mas, Dod. gal. altera, Eid.

Spica, Ad. Lavendula, Lob.

Spica Italica & domestica, Cæf.

Spica Nardi, Cam.

Lavandula brevior folio & spica, Clus. hist.

Flore est cæruleo: habetur & albo: huic duæ figuræ apud Lob. Tab. Ger.

Spica lavendula, & Lavendula alba, Lob. ico.

Lavendula alba, & Spica alba, Tab.

Lavandula flore albo, & Lavandula hort. minimi Ger.

Spica vulgaris fl. cæruleo & fl. albo, Eyst.

### III. Lavandula folio dissecto.

Lavendula multifido folio, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd.

Lavandula 2. Tab.

Stoechas multifida, Ger.

## ROSMARINUS.

**ΛΙΒΑΝΤΟΣ** Dioscoridi lib. 3. cap. 89. ab odore Thurii nomen habet, Galeno 7. simpl. *καρωτὸς σκαρομακκὰ*. id est, Libanotis coronaria, quod ea *ὁ σκαρομακκὰ* coronarii, ad corollas utantur.

Genera tria fecit Dioscorides & Galenus: umbelliferi genera duo, unum secundum, alterum sterile: tertium non umbelliferum à coronariis expetitum. Theoph. 9. hist. 12. duo genera proposuit, fructiferum folio helioselinifemine & radice candidis: & sterilem folio Lactuca. Plinio lib. 24. cap. 11. genera duo: alterum sterile: alterum cui & caulis & semen refinaceum, quod *Cachrys* vocatur: folii odor thuris. At lib. 19. cap. 12. Rosmarinum coronarium, cum aliis speciebus confundit.

Hic de coronario agimus (de aliis inter umbelliferas dictum fuit) quem aliqui *Cneoron nigrum* Theoph. & Casiam Hygini volunt.

I. Rosmarinus hortensis angustiore folio. Rosmarinus, Brunf. Trag. Fuch. Tur. Lon. Rosmarinum coronarium, Matth. Ang. (cui & Cneoron Theoph. & Casia Latinorū) Dod. gal. Lac. Ad. Lob. Cæf. Lugd. Cam. Eyst. Libanotis coronaria, Cord. in Diosc. Gef. hor. Rosmarinus minor sive tenuifolius, Gef. hor. Catia nigra Theophrasti, Dalech. in Plin. Hyssopus Hebræorum quibusdam.

Floribus est cōmuniter subcæreuleis, rarius albis. II. Rosmarinus spontaneus latiore folio.

Rosmarinus syl. seu major, Cord. hist.

Rosmarinus alter ignobilior, Gef. hor.

Rosmarinum syl. Cæf.

Hic sponte Monipessuli cum Epirosmarino reperitur.

Est & alius Rosmarinus syl. de quo inter Ledi genera.

## SECTIO QUARTA.

**HYSSOPUS; SATUREIA sive THYMBRA; THYMUS; EPITHYMUS; CUSCUTA; SERPILLUM; POLIUM; AGERATUM;**

*Pulegium; Dielamnus; Origanum; Tragoriganum; Sampsuchus sive Amaraeus; Marum sive Majorana; Clinopodium & Acinos; Erinus; Ocimum sive Basilicum.*

## HYSSOPUS.

**ΥΣΣΟΠΟΣ** Dioscoridi lib. 3. cap. 30. sic dici volunt quasi *ύσσανον* (pro *χουσανον* ὅτι τὸν ὄμι. quia super vultus effundatur: quam Dioscorides inter umbelliferas stirpes retulit: communis verò spicata est.

Genera duo Dioscoridi, *ὑσσωπὸς*, montana: & *κνπδτὴ*, hortensis: Verum Græcorum Hyssopus, ab Arabum & officinarum Hyssopo differt, qui à nonnulli *Symphytum petraeum* Diosc. 1. 4. c. 9. esse videtur: alii *Polium*, Hyssopus Dioscoridi est. Plinius Hyssopi lib. 26. cap. 680. vires proposuit: & 1. 4. c. 16. Hyssopi ex Cilicia ad vini consecrationem, meminit, multis planta notis additis.

I. Hyssopus officinarum cæreulea, sive spicata. Hyssopus, Brunf. Trag. Tur. Cord. in Diosc. Lac. Lon. Tab. Cam. flore cæreuleo, Eyst. Hyssopum, Matth. Cæf. Cast. Hyssopus hortēsis, Fuch. cōmunis, Ang. Dod. gal. Hyssopus vulgaris, Gef. hor. Dod. Clui. hist. Hyssopus fativa, Cord. hist. Lugd. Hyssopus Arabum, Ad. Lob. Ger. Floret aliquando ex una, aliquando ex utraque parte, quæ

Hyssopus utrique florifera, Dod.

Alia odore moschum redolente à priore differt, quæ facili in vulgatam degenerat.

Hyssopus moschata vel de Cilissā, Gef. hor.

Meminit Gein. & crispæ: habetur & foliis diffusis: item communiter est foliis atrovirentibus: est & pallidè luteis: spica quoque brevi & rotunda à priore variat: circa vulgatum & Epihyssopum reperitur.

II. Hyssopus rubro flore.

Hyssopus Arabum fl. rubro, Lob. Lug. Cam. Ger. Eyst.

Hyssopus Arabum, Tab.

Flores sæpius uno tantum, aliquando utroque ordine digesti: satiatione quoque in colorem cæreuleum degenerare solet.

Ec

III. Hyss.

III. *Hyssopus vulgaris alba.**Hyssopus albis floribus utrinque digestis, Lobico.**Hyssopus flore albo, Lugd. Cam. Eyfl.*IV. *Hyssopus Anglica.**Hyssopus ab una parte alba, altera viridis, Ad. Lugd. Tab.*V. *Hyssopus minor angustifolia.**Hyssopus alter, Dod. ut:**Hyssopus parva angustis foliis, Lobico.**an Hyssopus Hispanicus minor, Clus. hist.*VI. *Hyssopus hirsuta: in Prod.*VII. *Hyssopus umbellata.**Hyssopus vulgaris comosus, Clus. hist.*II X. *Hyssopus latifolia, in Prod. descripta.**IX. Hyssopus rotundifolia spicata, forte Dioscoridis.**Hyssopus folio Origani Dalechampii, Lugd.**X. Hyssopus latifolia coma rotunda conferta.**Hyssopus ex codice Cæsar. Dod. Lugd. Col.*XI. *Hyssopus angustifolia spicata.**Hyssopus angustifolius spicato flore, Clus. hist.*XII. *Hyssopus angustifolia montana alpera.**an Hyssopus syl. & montana, Trag.**Hyssopus montana, Matth. Lugd. Cast.**an Hyssopus montana odora, Cam.*XIII. *Hyssopifolia.**Grasse poley, Cord. ob.**Gratiola minor, Ges. col.**Hyssopoides, Cam.*

Est major latioribus foliis, minor angustioribus: floribus est cæruleis minoribus, rarissime albis: et ex Hispania habemus, floribus oblongis, saturatoris cærulei coloris.

## S A T U R E I A.

**Q**UAM BONA Dioscoridi lib. 3. c. 45. *ῥύμαρον* Theoph. 7. hist. 1. (forte *ῥοῦ τοῦ ῥοῦν ob fragrantiam*) dicitur ipsa *Satureia*. At *Satureia*, aliis à saturando dicta, quod eibus loco condimenti addatur: alii à *Satyr* nomen traxisse putant, eò quod coitus marcescentes stimulet.

Genera duo Dioscoridi: *sylvestris* & *fativa*. Theoph. 7. hist. 6. *sylvestris urbana* affecta vicina: at 6. hist. 1. plura genera esse monet. Plinio l. 19. c. 8. *Thymbra*, quæ *Cunila* quæ & *Satureia* dicta in condimentario genere: & l. 20. c. 16. *Cunila* præter sativam, plura sunt in medicina genera: est quæ bubula appellatur, alia *gallinacea*, quæ *Origani*, *Heracleoticum*, &c.

I. *Satureia hortenfive Cunila fativa, Plinii.**Hyssopus agrestis, Brunf.**Satureia, Trag. Lac. Lon. Dod. Lob. Cæs. (cui &**Cunila & Thymbra agrestis) Tab. Cam.**Satureia altera, Matth. vulgaris, Dod. gal.**Thymbra 2. species, Ang.**Satureia fativa, Fuch. Tur. hortensis, Ges. hor. Ad. Lobico.**Thymbra vera, Ges. hor.*

(hist.)

*Satureia sive Thymbra fativa, Cord. in Diosc. &**Satureia vulgaris hortensis, Lugd.**Satureia syl. altera, Cast.**Satureia hortensis activa, Ger.**Satureia domestica, Eyfl.*

Flosculis est candidis, aut dilute purpureis: aliquando caule & foliis subcæruleis. Addit Tab.

*Satureiam Romanam 2. quam sub**Hyssopo albo flore Ger. pinxit, quid est?*II. *Satureia montana.*

(Eyfl.)

*Thymbra, Dod. Cord. in Diosc. & hist. Lug. Fab.**Thymbra syl. Ang. agrestis, Ges. hor.**Satureia altera, Lac.**Satureia hortensis, Lob. ob. Cæs.**Satureia sive Thymbra altera, Ad. Lobico.**Saxifraga 2. Cam. ep. Matth.**an Satureia perennis, Cam.*

Flosculis est purpureis, aut candidis: in hortis foliis est latioribus, ut Lob. in sylvestribus angustioribus, ut Dod. & Lugd. pingit; utramque Cam. in Matth. expressit. Huic *Cutcuta* etiam innotatur, quam

*Epithymbrium sive Cuscutam thymbraedactam, Cord. in Diosc.**Epithymbrium Æginetæ, Cord. hist.**Epithymbrium bron. cast. vocat.*III. *Satureia spicata.**Saxifraga 1. Matth.*

(ficus)

*Thymbra S. Juliani, sive Satureia vera, Ad. Lob.**Saxifraga vera, Diosc. Lugd.**Clinodidymum, Cæs.**Thymbra vera, Lugd. Tab.**Satureia S. Juliani, Ger.*

Duplex est: quæ in monte S. Juliani, foliis est angustissimis: quæ verò Romæ & Neapoli in tectis & parietibus provenit, foliis est latioribus:

IV. *Satureia Cretica.**Thym-*

Thymbra Cretensis, Alpi.

Thymbra legitima, Clus. hist.

Thymbra Bellonii, antiquorum legitimam censet Belli ep. ad Clusium.

Satureia legitima Dioscoridis, Ponz.

Hanc Thymbra legitima nomine, & quæ vulgo *ῥέγι* & *ῥίμει* dicatur, ab Honorio Belli ex

Creta accepimus.

V. Satureia thymi folio.

Satureia Dioscoridis, Matth. Cast. Lugd.

Polium feminam recentiorum esse volunt, Ad.

Thymum vulgatorem folio tenuiore, dicit Eysf.

Hanc ex horto Clarissimi Contareni Thymbre nomine habemus.

## T H Y M U S.

**Θ**ΥΜΟΣ Dioscoridis l. 3. c. 44. & Theoph. 4. hist. 7. & 6. ejusd. 2. & 1. caus. 5. *ὅτι τὸ θυμὸν, quod iis qui animi deliquitum patiuntur adhibeatur, alii δὲ τὰς θυμάριας, ἃς τὰς θυὰς deducunt, quod hoc veteres in sacris, quæ igne accenso fiebant, primum usi sunt, ut apud Rhodiginum l. 3. c. 23. legere est.*

Genera: Dioscorides l. c. capitatum descripsit: at l. 4. c. 179. Thymi durioris meminit. Ex Theoph. 6. hist. 2. duo genera, Plinius l. 21. c. 10. & 21. candidum & nigricans, proposuit.

I. Thymus vulgaris folio tenuiore: & Eysf.

Thymus, Brunf. Trag. Fuch. Tur. Cord. h. Lon.

durior, Cam.

Thym<sup>us</sup> nostras, Cord. in Diosc. vulgaris, Gef. bor.

Thymum durius, Dod. gal.

Serpillium hortense, Dod. ico.

Pepolina, Cæf.

Foliorum colore variat: alteri virentia & suaveodorata: alteri candida & graveolentia, qui ratio est.

II. Thymus vulgaris folio latiore.

Thymum durius, Dod. Lob. ico. Clus. hisp. Ger.

Thymum vulgare, Lugd.

Thymus niger, Tab.

Thymus alter durior, Cam.

Flore est purpureo, nunc albicante.

III. Thymus capitatus, qui Dioscoridis.

Thymū, Matth. Ad. Lob. Creticū, Cord. in Diosc.

Dod. gal. Lugd. Cæf. legitimum, Clus. hisp. & hist.

Thymum cephaloton, Dod.

Thymus, Ang. Lac. Cast. 2. Alp.

Thymus capitatus, Cord. hist.

Thymus verus capitatus sive Creticus, Cam.

IV. Thymum inodorum, in Prod. descriptum.

## EPITHYMU M & CUSCUTA.

**Ε**ΠΙΘΥΜΟΝ Dioscoridis l. 4. c. 179. & Plinius l. 26. c. 8. flos est à Thymo duriore. Satureia simili. Verum non solum Thymo, sed & Thymbra, Polio, Diclamno, Chamædri, Hyssopo, Serpillo, Majorana, Origano, Stæbe, Ebulo aliq. Cuscuta modo circumnasci observavimus.

CUSCUTA, recentioribus Græci *κισκὺς*, quam aliqui Androsacen Dioscoridis l. 3. c. 150. alioqui Cadytam Theoph. 2. caus. 3. & Plinius l. 16. c. 44. esse volunt. Sed ad Orobanchen Theoph. 5. caus. 22. referri potest. Nonnullis podagra lini, quod linum amplexatur: *ἀνιδόσμαν*, Gesnero.

I. Epithymum sive Cuscuta minor.

Epithymum, Matth. Lac. Ad. Cast. Lugd. (qui & Matth. & Lob. figuram habet) Cæf. (qui Thymo Italico innasci scribit) Alp. Tab.

Epithymum Græcorum & Arabum, Lob.

Cassutha minor, Dod.

Epithymum vulgare; si ex Thymo simili ablatū, verum Dioscoridis Epithymum est, Col.

II. Epithymum capitulis Platani crinitis.

Epithymus, peculiaris planta à Thymo & Cuscuta, quæ in Sclavonia provenit foliis Thymbrae viridis, in cauliculorum summis capitula hirsuta rotunda, Platani pilulis similia, ex cujus flosculis capillamenta rufescentia prodeunt: radicem habet cassam, nigram, intus albā, quæ exsiccata nō levis

quam capillamenta purgat: & apud Sclavonios Verduun Xeglie, id est, Herba coleram purgans: hæc Anguil. Sed quid est?

III. Cuscuta major.

Androsaces, vulgo Cuscuta, Trag.

Androsace Dioscoridis, si legatur *ἀνδρῶς*, id est, sine foliis, Ang.

Cuscuta, Matth. Ang. (cui & Cuscuta) Lac. Lon. Cast. Cæf. Clus. pan. & hist. Ger.

Cassutha, Dod. gal. Gef. hor. Ad. Lob. Tab.

Cassutha, Fuch. Tur. Dod. Lugd. Thal.

Hæc passim herbis & fruticibus adnascitur, potissimum Urticæ majori, lino, trifolio corniculato, lupulo, rubo & vepribus: colore vel albo vel rufo.

**ΕΡΠΥΛΛΟΣ** Dioscoridi lib. 3. cap. 16. *ἄνθος ἔρπυλλον* à serpendo dictum: quia aliqua ejus particula terren-  
tangente, ab earadices demittantur: Sic & Plinio lib. 20. cap. 22.

Genera duo Dioscoridi sunt: primum hortense, odore Sampfuchi: alterum sylvestre Zygi dictum, quod non fer-  
pat, sed in altitudinem excrestat. Theophrastus 6. hist. 7. duo genera agnovisse videtur, cum dicat Serpylli sylvestre  
quoque genus esse. Plinius & sativi & sylvestris nominis, & hoc serpere tradit: quod non intelligendum de eo Ser-  
pyllo, quod lib. 16. c. 44. arboribus se circumdare scribit.

I. Serpyllum majus latifolium.  
Thymum latifolium, Lob. ico.

II. Serpyllum latifolium hirsutum: quod 1.  
in Prod.

III. Serpyllum sativum.  
Serpyllum, Matth. Lac. Lugd. Tab.  
Serpyllum domesticum, Cast.  
Serpyllum foliis amaraci, Ger.

IV. Serpyllum vulgare minus.  
Serpyll. majus fl. purpureo, & aliud candido, Cam.  
Ger.

Serpyllum album 1. & 2. Tab.  
Flore est albo, est & purpureo.

V. Serpyllum foliis citri odore.  
Serpyllum alterum citratum, Matth. citrum olens,  
Ges. hor. Thal. citratum, Tab. Eyf.  
Serpyllum syl. 1. citratum, Cast.  
Serpyllum referens planta, odore citri, Cæf.  
Serpyllum pannonicum 1. Clus. pan. & hist.  
Thymum latifolium, Ger. ico.

VI. Serpyllum vulgare minus.  
Serpyllum, Brunf. Trag. Fuch. Ang. Ges. hor. Tur.  
Lac. Lon. Ad. Lob. Cæf. Lugd.  
Serpyllum vulga. Dod. Ger. & vulgare flore albo.

Serpyll. syl. Matth. Cord. in Diosc. syl. alterum, Cast.  
Serpyllum minus fl. albo, & flore purpureo, Tab.  
Serpyllum vulgare repens, Clus. hist.

Aliud foliis est rotundis, aliud acuminatis &  
angustioribus: flos subpurpureus, roseus, candi-  
dus: pro cæli & loci diversitate odorem mutat &  
inodorum reperitur: aliquando Thymum durum  
in Serpyllum degenerat: sic Theoph. 5. caus. 2.  
Ocymum in Serpyllum transire, scribit.

Hoc quandoque cum capitulis lanuginosis oc-  
currit.

VII. Serpyllum angustifolium glabrum.  
Serpyllum pannonicum 2. Clus. pan. & hist.

Aliquando inodorum est: aliquando odorem  
foliorum Nucis refert.

IX. Serpyllum angustifolium hirsutum: vel  
montanum repens hirsutum.  
Serpyllum pannonicum 3. Clus. pan. & hist.

X. Serpyllum folio Thymi.  
Serpyllum alterum, Dod.  
Serpyllum Narbonense foliis & facie perpusilli  
angustifolii Thymi, Lob. Lugd.  
Serpyllum syl. Zygis Dioscoridis, Clus. hist.  
Serpyllum Creticum, Tab. Ger.

## POLIUM.

**ΠΟΛΙΟΝ** Dioscoridi lib. 3. cap. 124. sic dictum propter caniciem, quæ in capitulis, secundum Dioscoridem,  
at secundum Plinium, in foliis apparet: *πολὶς* namque canissem & canum significat.

Genera duo Dioscorides agnovit, *ποδὸν* montanum, alterum fruticosius: *Γαλένιος* 8. simpl. majus & minus.  
Plinius lib. 21. cap. 7. campestre majus, & sylvestre minus proposuit.

### Polium montanum.

I. Polium Lavandulæ folio.  
Polium alterum, Matth. Ges. hor. Lac. Lugd. Cam.  
Polium majus, Cord. hist. campestre, Lon.  
Polium recentiorum fœmina Lavandulæ folio,  
Ad. Lob.  
Polium pannonicum 1. vel majus, Clus. pan.  
Polium 7. flore albo, Clus. hist.

Variat foliis latoribus & angustioribus, hinc  
Polium fœmina, & Polium campestre, Tab.

Hujus speciem per omnia majorem, cana lan-  
gine candicantem, magis odoratam & aromati-  
cam, Cordus in sua historia notavit,  
Polium minus nominans.

II. Polium montanum luteum.  
Polium, Tur. Dod. ico. at 5. descr.  
Polium luteum, Ad. Lob. Lugd. Clus. pan.  
Polium 3. Clus. hisp. montanum 3. Eid. hist.  
Polium montanum luteum, Tab. Ger.

Flos modo luteus, modo pallidus, interius  
palescens & foris exalbidus: interdum ex luteo  
vire-

virescens: Ex huius semine natum, flore ex albo purpurascens, quod Polium 4. Clus.hist.

### III. Polium montanum album.

Polium montanum, Ang.Lob.Tab.Ger.

Polium minus & mediterraneum, Ad.

Polium alterum seu parvum, Dod.gal.

Polium tenuius & 2. Dod.

Polium mont. 1. Clus.hisp. & hist.

Polium mont. alterum, Cæf.

Polium minus, Cord.in Diosc. & hist.

Est duplex: alterum cauliculis humi sparsis, foliis incanis & denticulis vix conspicuis: alterum cauliculis erectis, foliis angustioribus, capitulis longioribus, quod

Polium mont. 2. flore albo, Clus.hist.

### IV. Polium montanum repens.

Polium 4. & repens, Dod.

Polium 6. Clus.hisp. montanum 8. Eid.hist. &

pannonicum minus, Eid.pan.

Polium mont. supinum minimum, Lob.Lugd.

Polium montanum 3. Cæf.

Polium mont. minimum, Tab.Ger.

*Polium maritimum.*

I. Polium latifolium incanum Creticum: in Prod.defc.

II. Polium angustifolium Creticum.

Polium erectū Cret. & fortē frutescēs Diosc.Ponz.

III. Polium maritimum erectum Monspelicum.

Polium 1. Matth.defc. at 2. ico. Clus.hisp.

Poiium, Lac.Matthioli,Lugd.

Polium 1. five montanum Diosc.Gef.hort.

Origani 3. species Dioscoridis, Quadramio.

Hoc & locis maritimis, & diversis collibus, & arenosis littoribus, ut ad Cetium montem, & Magalonam insulam Narbonensis Gallie fruticat, ita ut & maritimum & montanum dici possit: in quo Epipolium notavimus.

I V. Polium maritimum supinum Venetum.

Polium 1. Dod.gal.

Polium repens 3. Dod. ico at 4. defc.

Polium Venetum, Ad.

Polium 4. Clus.hisp.Lugd.

Polium montanum, Cæf.

Polium mont. purpureum, Lob.Tab.Ger. 5. purpureum, Clus.hist.

Origanum 3. genuinum Dioscoridis, Quad.

Hyssopus Apulus Diosc. & Serapionis, Col.

Illud erectum est, & omnibus partibus crassius: hoc vero repit, tenuius & candidius est: utrumq; loco natali legimus.

V. Polium montanum supinum alterum.

Polium 5. Clus.hisp. 6. albo flore, Eid.hist.

Sola teneritate & floris colore à priore differt.

VI. Polio affinis Guacatane.

Guacatane plantula Polio montano haud absumilis, sed inodorum, Monard. & ex eo, Lugd. Cast. Guacatane pilosellæ comparare possumus, Frag.

## AGERATUM.

**A**ΓΗΡΑΤΟΝ Dioscoridi l. 4. c. 59. cui nomen inditum, διὰ τὸ ἔμμελόν τὸ ἀνθος ὁμοιοῦντες τοῦ ἀγρίου, quoniam flos in sua coloris specie diutissime conservetur: quasi dicas senectutis expertus, quod ἀγρίον & dicitur: vel ut Plinius l. 27. c. 4. quoniam diutissime non marcescat.

I. Ageratum foliis serratis.

Eupatorium Mesuæ, Trag.Gef.hor.Matth.Lon.

Ageratum, Matth.Gef.hor.Lac.Cast.defc. Lugd.

Cam.Tab.Col.Eyft.

Ageratum Septentrionalium, Ad.Lob.Eyft.

Mentha corymbifera minor, Cord.hist.

Costus minor hortensis, Gef.

Herba Julia, Ang.Gef.col.

Salvimita minor, Dod.

Salvimita foemina, Ger.

Symphorata, Cæf.

Floribus est luteis: rarius candidis, & hoc

Ageratum floribus candidis, Ad.Lob.Tab.Cam.

Ageratum 2. Matth.Lugd.

Hoc etiam majus est & minus: nam quod in Hetruria provenit multo minus est, quod

Ageratum minus, Cam.in Matth.

Circa Monspelii etiam Corymbis longioribus & magis compactis reperitur.

II. Ageratum foliis non serratis.

Ageratum 3. Matth. Lugd.

Ageratum minus, Lob.Cam.Tab.

III. Ageratum serratum alpinum.

Ageratum purpureum & Moschatella cærulea Germanis quibuidam, Lugd.





## O R I G A N U M.

**O'PI'TANOZ** Dioscoridi l. 3. c. 32. *ὄριανον* dicitur, Eustachio volente, qui ab *ὄρι* & *ἄν* derivat: alii *ὄριανον* *ὄριανον*, quia visus claritati conducit, deducunt.

Genera quatuor Dioscoridi: *ἡγελαστικός*: *ὄνιτις*, quasi asinis pabulo gratum sit: *ἀγροίανον*, & *παραίανον*: Theophrastus 6. hist. 2. duorum tantum meminit: nigri sterili, & candidi fructuosi. Plinius l. 20. cap. 16. *Origanum Heracleoticum* Græcorum, quod *Cunilam* gallinaceam Romani appellant, refert: at c. 17. *Onitidis*, quod *πράσιον* appellant *Hyssopo* non dissimile, & *Tragoriganum* Heraclei, cuius tria sunt genera (Dioscoridi utrumq; *Tragoriganum* intelligens) *Cretici*, *Smyrni*, tandē *Heracleotici*, quod *Oniten* vocent, historiam sed confusiorē tradit.

I. *Origanum* syl. *Cunila* bubula Plinii.

*Origanum*, Brunf. Ang. Tur.

*Origanum* vulgare, Trag. Matth. Lon. Lugd. Eyf.

*Origanum* syl. Dod. Cord. in Dioic. Fuch. Gef. hor. Lac. Tab. Cam.

*Origanum onitis* majus, Ad.

*Agrioriganum* sive *Onitis* major, Lob.

*Origanum Italicum*, Cæf. Anglicum, Ger.

Folii langioribus, rotundioribus variat: floribus ex cādido rubentibus, phœniceis, sanguineis.

*Tragoriganum* Dioscoridis quibusdam.

II. *Origanum* syl. album.

*Origanum* syl. Cam.

*Origanum* album, Tab. Ger. deif.

III. *Origanum* syl. humile: in Prod. descriptū.

IV. *Origanum* *Heracleoticum*: *Cunila* gallinacea Plinii.

*Origanum peregrinum* 1. vel 6. Trag.

*Origanum* *Heracleoticum*, Matth. Gef. hor. Lac.

Ad. Lob. Lugd. Cast. Cam. Ger. 1. & 2. Tab.

*Origanum* *Græcum*, Ang.

*Origanum alterum*, Cæf.

Est flosculis ex albo purpurascens: est & cādidi.

V. *Origanum* *Creticum*.

*Origanum* *Heracleoticum* in Creta, Cord. in Dioscorid.

*Origanum* *Creticum*, Gef. hor. Cæf. Cam.

*Origanum* Anglicum, Dod.

*Hyssopus* Dioscoridis, Ang.

*Origanum* Syriacum sylvestre, Ad.

VI. *Origanum* *Onites*: & Matth. Gef. hor. Lac. Lon. Cast. Lugd.

*Origanum* *Heracleoticum*, Ruel.

*Marum* quibusdam, Dod. gal. Lac. Lugd.

*Hyssopus* gemina Græcorum, Ad. Lob.

*Hyssopus* legitimus & *Meluzi*, *scarapepe* *Hetruscis*, Cæf.

*Majorana* major Anglica, Tab. Ger.

*Origanum* syl. potius quàm *majorana*, Col.

VII. *Origanum* *Onites* fl. albicantibus.

*Origanum* *Onites*, aliud à *Matthioli*, Cam. hor.

*Origanum* *onites* dictum, Eyf.

IX. *Origanum* folio subrotundo.

*Origanum* *onitis* Galloprovinciæ minus.

*Origanum* *Montpelicium*, Cam. ep. Matth. & hor. Tab.

IX. *Origano* cognata *Zatarendi*: quid?

*Zatarendi*, Alpino, quod siccum, instar *Origani* pro obionio comedunt.

## T R A G O R I G A N U M.

**T'PAΓOPI'TANOZ** Dioscoridi l. 3. c. 35. (*Origani* 2. genus eidem, quod aliqui *hircinum* interpretantur, tam sic dictum videatur, quasi capri gratum sit, quod pro locorum ratione variat: quoddam speciosum latioribus foliis: alterum g. acilium, foliis exalioribus, quod aliqui *παραίανον* vocant. Plinio l. 20. c. 17. *Tragoriganum* fœculum est *Serpyllo* syl. 1. *Tragoriganum* differentias à *Dioscoride* propositas, sub *Origano* *Heracleotico* recenset.

I. *Tragoriganum* *Serpyllifolium*.

*Tragoriganum*, Matth. Lac. Cast. Lugd. Ger. 1. Tab.

II. *Tragoriganum* latifolium.

*Marum*, Matth. Cast. Lugd. Tab.

*Tragoriganum*, Dod. Lugd.

*Tragoriganum* alterum, Gef. hor. Ad. Lob.

*Thymum* *Creticum*, Ger. ico.

III. *Tragoriganum* angustifolium.

*Tragoriganum* 2. Clus. hisp. & hist. Dod. Lugd. Cam. ep. Tab.

*Tragoriganum* flore albo, Lob.

IV. *Tragoriganum* *Creticum*.

*Tragoriganum* *Cretense* apud Venetos, Ad. Lob.

*Tragoriganum* 2. altera species, Clus. hisp.

*Tragoriganum* Hispanicum 3. Eid. hist.

*Thymum* magnum, Alp.

S A M.

*SAMPSUCHUM, five AMARACUS; MA-  
RUM, five MAJORANA.*

**Σ**ΑΜΨΥΧΟΝ in *Cyzico* & *Cypro* laudatissimum. secundum locum sibi vendicat *Aegyptium*: vocatur à *Cyziceni* & *Siculis* *ἡ ἀμάρων*. *Dioscorides* l.3.c.47. Et *Theophrasto* l.1.hist.15.6.hist.1. & 7. *Amaracum* (vel ut *Gazar* reddit *Sampsuchum* vel *Sampsuchum*) suffrutex est & coronaria herba minutis foliis condita ut *Serpyllum* &c. *Amaracum*, *Diocles* medicus & *Sicula* gens appellaverunt. quod *Aegyptus* & *Syria* *Sampsuchum*. *Plinius* l.21.c.11. & 12. *Sampsuchum* five *Amaracum* in *Cypro* laudatissimum & odoratissimum, ex quo oleum, quod *Sampsuchinum* & *Amaracinum* &c. Μαρόν ἡ ὀσὶς. οὐ *Dioscoridis* l.3.c.49. *Majoranam* esse volunt.

Genera duo *Plinio* l.12.c.24. *Maron* in *Aegypto* nascitur pejus quam *Lydium*, majoribus foliis ac variis: illa brevior ac minuta & odorata.

I. *Sampsuchus* five *Marum*, *Masticchen* redolens.

*Clinopodiū*, *Dod.gal.* *Gef.hor.* (cui & herba *Sampsucho* cognata) *Cam.*

*Heleniū*, *Theoph.* fortè *Tragoriganū* *Diosc.* *Ang.*

*Marum*, *Gef.hor.* *Cast. Tab. Ger.* *peregrinū*, *Eyst.*

*Marum*, *Mastic Gallorum* & *Anglorum*, *Ad.*

*Marum*, an *Helenium* odorum *Theoph.* *Lob.*

*Marum* verum, vulgo *Mastic*, *Lugd.*

*Marum* vulgare five *Clinopodium*, *Dod.*

*Tragoriganum* l. *Clus. hisp.* & *Tragoriganum*

*Hispanicum* l. cuius semen *Ambræ* dulcis nomine missum, *Eid.hist.*

Ludit foliis nunc longioribus, nunc rotundioribus, modò angulosos & hederaceis.

II. *Marum* repens verticillatum.

*Sampsuchus* *Diosc.* five *Amaracus* serpens, *Ad.*

*Marum* supinum, *Lob.*

*Marum* ex *Sicilia* allatum, *Sampsuch.* *Diosc.* *Cæf.*

*Marum* repens, *Tab.*

*Pulegium* angustifolium, *Ger.ico.*

III. *Majorana* *Syriaca* vel *Cretica*.

*Marum* *Syriacum*, *Ad.Lob.* *Lugd.* *Tab. Ger.*

*Marum* *Cretense*, *Alp.*

IV. *Majorana* tenuifolia.

*Majorana* nobilis, *Brunf.* *Ang.* *fativa*, *Trag. Lon.*

*Majorana* gentilis, *Tur.* *tenuifolia*, *Tab. Ger.*

*Amaracus* five *Majorana* *tenuif.* *Matt.* *Cast. Lug.*

*Amaracus*, *Sampsuchum*, *Gef.hor.*

*Majorana* tenuior & minor, *Dod.*

*Amaracus* tenuior, *Ad.Lob.* *tenuif.* *urbana.* *Cam.*

Hæc apud nos in *Majoranam* vulgarem degenerat: & huic *Cuscuta* circumnascitur, quæ

*Epimajorana*, *Tab. Ger.*

V. *Majorana* vulgaris.

*Majorana*, *Brunf.* *Dod.*

*Amaracus*, *Matth.* *Fuch.* *Lugd.* qui *Matt.* & *Fuch.*

iconem proponit.

*Sampsuchus* five *Amaracus*, *Latinis* *Majorana*.

*Cord.* in *Diosc.* & *hist.*

*Amar. vulgarior.* *Ad.Lob.* *ico.* *Eyst.* *major.* *Cast.*

*Amaracus*, *Majorana*, *Sampsuchum*, *Gef.col.*

*Sampsuchus*, *Lac.Lob.*

*Majorana* vulgo, *Maron.* *Diosc.* *Cæf.*

*Majorana* five *Amaracus* *major*, *Gef.h.* *Tab. Ger.*

*Amaracus* *syl.* *annua.* *Cam.*

Hanc latis admodum foliis & capitulis rotundioribus sub *Majorana* *latifolia* *Eyst.* proponit.

VI. *Majorana* *syl.* *perennis*: & *Cam.*

*Majorana* *syl.* *Trag.* *Gef.hor.*

*Origanum* cognata *majorana* *major*, *Eid.*

Hanc *Londino* foliis sublevis accepimus.

VII. *Majorana* *syl.* *latifolia.*

*Amaracus* *syl.* foliis latioribus, *Cam.*

*Majorana* *syl.* *Eid.*

Hanc ex horto *Sprégeri* *Heidelberga* habemus

*CLINOPODIUM & ACINOS.*

**Κ**ΛΙΝΟΠΟΔΙΟΝ *Dioscoridis* l.3.c.109. quod flores habeat &c. *κλινος ποδις* &c. *Et Plinio* l.24.c.11. quod orbiculato florum ambitu speciem pedum lecti præbeat, ex intervallis *Marrubii* modo disposita: quæ sane *Clinopodio* primo pulchro convenit. Verum ab aliis *Orymoides* nominari monet, & *Serpyllo* similem, sicut *losam* *palma* altitudine: quæ de secundo dici rectè possunt, propter foliorum formam cum *Serpyllo*, & odorem cum *Ocimo*. *ἡ ὀσὶς* & *ἡ κλινος* herba coronaria *ocimo* similis, sed his superior aq. odorata, *Diosc.* l.3.c.50.

I. *Clinopodium* *Origano* simile.

*Origanum* 4. & minus, *Trag.*

*Clinopodiū*, *Cord.* in *Diot.* *Gef.h.* *Lac.* *Cast. Tab.*

*Clinopodium* vulgare, *Matth.* *majus*, *Cam.*

*Betonia*

Betonica Pauli, Guil.  
 Pulegium montanum, Lon.  
 Origanum syl. Eid. verticillatum, Thal.  
 Calamintha i. Tur.  
 Acynus sive sterilis, Ad.  
 Acinos, Lob. Ger.  
 Acinos, sive Clinopodium syl. Lugd.  
 Clinopodium i. Matth. Clus. pan. Lugd.  
 Herba origano vulgari similis, Cæf.  
 Duplex est: elatius majore folio: humilius alterum, minore: flore communiter purpurascens, rarius albo.  
 II. Clinopodium arvense Ocimi facie.  
 Basilicum 3. Trag.  
 Calaminthum montanum, Eid.  
 Pseudoclinopodium, & Clinopod. alterum, Matt.  
 Acinos, Dod. gal. Fuch. ico. Lac.  
 Ocy-mastrum, Fuch. Lugd.  
 Pulegium petraeum, Gel. hor.  
 Ocimum parvum, Lon.  
 Ocimum syl. sive Acinos, Dod. Ger.  
 Clinopodium, Ang. Tur. Cæf. majus, Thal.

Clinopodium alterum Matthioli, Lugd. Tab.  
 Clinopodium aut Ledipes, Ad.  
 Clinopod. vulgare, Lob. Clus. hist.  
 Foliis est modò latioribus, modò angustioribus, ratione loci: modò erecta, modò repens: aliquando hirsutissima, aliquando penè lævis: floribus cæruleis, rarius albis.  
 Hanc Matth. ut ex ejus descriptione patet, Marnardum secutus, & hist. Lugd.  
 Acinos nomine exhibuere.  
 III. Clinopodium Ocimi facie alterum.  
 Acinos Anglicum, Clus. pan.  
 Acinos Dioscoridis fortè, Eid. hist.  
 IV. Clinopodium montanum.  
 Clinopodium Austriacum, Clus. pan. & hist.  
 Flore est purpureo intenso sed violaceo: rarius albo.  
 V. Clinopodium alpinum hirsutum.  
 Clinopodium alpinum, Ponz.  
 VI. Acinos laetifolia.  
 Acinos, Urticella olitoribus, Col. (mus.  
 Acinos Dioscoridis nomine ab Imperato accepti-

## ERINUS.

**E**RPINOΣ Dioscoridi l. 4. c. 29. foliis est Ocimi minoribus, & lacteo succo turget, &c. Plinio l. 23. c. 7. Herba quam Græci Erineon vocant &c.

Erini nomine quatuor à recentioribus plantæ proponuntur.

1. Erini seu Ocimi aquatici nomine à Matth. quem sequuntur Lac. Lon. & Lugd. hist. Basilicum aquaticum, Cast. cujus folia incisuris carent: pro hac Hieracium Sabaudum latifolium, Guilandinus nobis ostendit.
2. Erinus Dalechampii, in hist. Lugd. sed quid?
3. Erinus Cæf. & Columnæ: est Rapunculi minimi species.
4. Erinos vel Caprificus, Nicandro & Plinio, fortè Esula dulcis, Tragie vel altera Esula syl. ejusdem, Adversar.

## OCIMUM.

**O**KIMON Dioscoridi l. 2. c. 171. Theophr. 7. hist. 3. cui ut & Varroni & Plinio l. 19. c. 7. à celeritate proveniendi dicitur. Recentioribus Græcis βασιλικόν. id est, regale: unde ab Aetio δίκτυον βασιλικόν appellatur.

Genera plura recentioribus, quæ potissimum differunt magnitudine foliorum, quæ latiora, angustiora, plana vel crispæ: colore eorundem quæ viridia, nigricantia, maculata: florum, qui candidi, vel purpurascens: & odore, cum in aliquibus caryophyllos, in aliis citrum redoleant.

- I. Ocimum latifolium maculatum vel crispum. Est majus & minus.
- Ocimum latifolium, Cæf.
- II. Ocimum viride foliis bullatis.
- Basilicum Indicum, vel potius Hispanicum, Cam.
- Ocimum aut Basilicum crispum exoticum aut Hispanicum, Cam. ex Matth.
- Ocimum crispum Hispanicum, Tab.
- Ocimum Indicum, Clus. hist.
- Basilicum Indicum maculatum, Eyst.
- III. Ocimum foliis fimbriatis viridibus.
- Ocimum crispum viride, Eyst.
- Odore est inter Camphoram & Citrum confuso.
- IV. Ocimum caryophyllatum maximum.

Ff

Ocy-

Ocy mus in viridariis Alexandria, Alp.

Ocimum latifolium magnum, Eyst.

Foliis est oblongis colore rubro suffusus eximie odoratis.

V. Ocimum caryophyllum majus.

Basilica major, Trag. Lon.

Ocim. majus, Matth. Fuch. Dod. gal. Lac. magnū,

Ocimum maximum, Dod. Lugd. (Tur.

Ocimum nigrum, Cord. in Diofco. & hist.

Ocimum maximum caryophyllum, Ad. Lob.

Ocimum caryophyllum, Gef. hort.

Hoc cum magis minusve hirsutum sit, ab aliis hirsutum, ab aliis laxe pingitur: color tam foliorum, quam florum, in alio albus, in alio niger est.

VI. Ocimum citri odore.

Ocimum citratum, Gef. hor. Czf. Eyst.

Ocimum maximum citratum, Lob.

Ocimum medium five citratum, Ad. Tab. Ger.

VII. Ocimum vulgatius.

Basilicum five Ocimum, Brunf.

Ocimum medium vulgatius, Ad. Eyst.

Basilica minor, & Baccharis Germanica, Trag.

Ocimum medium, Matth. Cast. Cam. Lugd. qui

Matth. & Fuch. figuram exhibet.

an Ocimum Nabathæum, Cord. in hist.

Ocimum mediocre, Fuch. 3. & medium, Czf.

Ocimum five Basilicum medium vulgatius, Lob.

Ocimum magnum, Tab. Ger.

IX. Ocimum minus angustifolium foliis serratis.

Ocimum minus angustifolium flore albo, Eyst.

IX. Ocimum anili odore.

Ocimum anilatum, Eyst.

Medio vulgatori, figurā respōdet, odore Anili.

X. Ocimum minimum.

Ocimum criptum, Brunf. Lon.

Ocimum garyophyllum, vel minus, Matth.

Ocimum exiguum, Fuch. minus, Dod. gal. Tur.

Basilicum minus, Cast.

Ocimum minus garyophyllum, Cord. in Diofco.

Tab. Ger.

Ocimum minimum Amaraci figura garyophyllum, Lob. Eyst.

Ocimum parvum, & Ocimum garyophyllum,

Lugd. deæ figuræ.

Ocimum alterum tenuifolium, Czf.

XI. Ocimo affinis.

Albahaca herba, quæ odoris gratia in nova Hispania excolitur, Joseph. Acosta l. 4. c. 27.

## SECTIO QUINTA.

MENTHA; MENTHA SYLVESTRIS five MENTASTRUM; MENTHA AQUATICA, seu SISTYMBRIUM; MENTHA CATARACTA;

Calamintha; Melissa; Marrubium; Galeopsis five Lamium & Urtica mortua;

Urtica; Alysson; Sideritis; Euphrasia; Melampyron & Cratægonon;

Betonica; Serratula; Scrophularia & Ruta canina; Stachys.

### MENTHA.

MENTHA veteribus Græcis. Plinio l. 19. c. 8. auctore, πίνθη dicebatur: at odoris suavitas nomen apud Græcos mutavit, & ἡνίκω ab ἡνός & ἰσμός, id est, suavis odor, vocatur. quæ voce Dioscorides l. 3. c. 21. usus est. Hydrosini Theophr. 7. hist. 7. ubi Gaza Mentastrum convertit: at Menta (forte Mentastrum intelligēs) 6. hist. 7. meminit.

Genera: Dioscoridi sativa est & sylvestris, quam Mentastrum dici, volunt interpretes, Plinium secuti. Galeno 6. simpl. Menta est odorata, quæ Dioscoridi sativa est. & altera inodora, quam Calamintham vocent. Ex Plinio, l. c. & l. 20. c. 14. Menta genus ejus sylvestre Mentastrum est. Sic l. 20. c. 14. Nepere mentionem facit, ex qua, ut & Mentastro, Origano, Cuscuta, Serpillo, Marrubio vinum confici, l. 14. c. 16. ostendit.

Menta sativa.

I. Menta hortensis corymbifera.

Balsamita, Brunf. major, Dod. gal.

Alisma, Trag.

Menta Sarracenicæ, Nicolao in Martiat. Ang.

Cord. in Diofco. (qui Chrysocome cognatâ vult)

Lac. Lon. Cam. Eyst.

Menta Græca, Matth. Gef. hor. Cast.

Menta Romana, Lac.

Menta corymbifera major, Cord. hist.

Costus hortorum, Gef. hor. Ad. Lob. Lugd.

Ovaria, Gef. hor.

Herba S. Mariæ vulgo, Czf.

Hæc quibuidam Lepidium Dioscoridis: at Crætal-

*Cæfalpino* Melilotus Dioſc. Plinii & Avicennæ.

II. *Mentha corymbifera anguſtifolia.*

*Menthe* Sarraceniæ ſpecies altera, Myconi, Lugd. in *Menthe* Sarrac. ſpecies ſyl. in ſylva Mattia, Cam.

III. *Mentha hortenſis verticillata ocimi odore.*

*Mentha hortenſis* 4. Fuch. Tur.

*Mentha ſativa* 4. Dod. Lugd.

*Mentha* 3. Gef. hor. 4. Lon.

*Mentha Romana anguſtifolia*, Ad. Lob.

*Mentha cardiaca*, Cam.

*Calamintha ocyroides*, Tab.

*Ocyroides repens*, Gér. ico.

IV. *Mentha criſpa verticillata*: & Eyſt.

*Mentha ſativa* 1. Fuch. Dod. gal. Lac.

*Mentha ſativa*, Tur. ſativa criſpa, Lugd.

*Mentha vulgata ſerpens rotundiore folio*, pulegii flore, Ad. Lob.

*Mentha cruciata*, Lob. ico. titulo tranſpoſito.

*Mentha altera*, Cam. ep. Matth.

V. *Mentha rotundifolia criſpa ſpicata.*

*Mentha ſativa ſeu criſpa*, Trag. Cord. in Dioſc.

*Mentha ſativa altera*, Matth. Fuch. Dod. Tur. Lac.

*Mentha criſpa*, Lon. Cam. ſive Baſſamita.

*Mentha rotundifolia altera flore ſpicato*, ſive cruciata *mentha*, Lob.

*Mentha vulgata*, ſive ſuſca ſacra, Lob. ico. tit. trāſp.

*Mentha hortenſis rotundifolia*, ſeu *Romana*, Cæſ.

*Mentha ſativa minor*, Caſt. (hibet.

*Mentha ſpicata*: quinq; varietates *Lobelii* ex-

VI. *Mentha rotundifolia ſpicata altera.*

in *Mentha rubra*, Trag. Lon.

*Sifymbriū* 1. Ang. hortēſis, Matth. Lac. Caſt. Lugd.

*Mentha hortenſis altera*, Gef. hor.

*Sifymbria mentha agreſtis*, Lob.

VII. *Mentha anguſtifolia ſpicata.*

*Mentha*, Brunf. Ang.

in *Nepeta aquatica*, vel *Mentha agreſtis* 3. Trag.

*Mentha* 1. Matth. Caſt. hortenſis 1. Gef. hor.

*Mentha ſativa*, vel hortenſis 3. Dod. Fuch. Tur.

*Sifymbrii* 1. altera ſpecies, Cord. in Dioſc.

*Mentha acuminata*, Lon. acuta, Tab. Cam. in Matt.

*Mētha* Rom. ſive *plāntior anguſtifolia*, Ad. Lob.

*Mentha ſativa*, Lugd. cruciata, Ger.

*Mentha hortenſis oblongo folio*, Cæſ.

*Mentha odorata anguſtifolia*, Cam.

*Latoribus aliam, aliam anguſtiſimis & longiſſimis foliis in hortis obſervavimus.*

IX. *Mentha ſpicata folio variegato.*

*Mentaſtrum alterum*, Dod.

*Mentaſtrum Anglicum cinereum & niveum*, Ad.

*Mentaſtrum niveum Anglicum*, Lob. Lugd. Eyſt.

cujus ſolum nomen apud *Tabernæ montanum*.

Interdum in eodem ramo folia quædam nivei coloris, quædam partim nivei partimque viridis, in quibuſdam nihil nivei.

*Mentha ſylveſtris ſive Mentaſtrum.*

I. *Mentha ſyl. rotundiore folio*: & Gef. hor.

*Mentaſtrum*, Cord. in Dioſc. Tab.

*Mentaſtrum foliis orbiculatis*, Gef. ap.

*Mentha aquatica*, Ger.

II. *Mentha ſyl. longiore folio*: & Gef. hor.

*Mentha equina*, Brunf.

*Mentaſtrum*, Trag. (vel *mentha agreſtis altera*)

Matth. Fuch. Dod. Cord. hiſt. Lac. Ad. Lob. Caſt.

Cluſ. hiſt. ico.

*Mentaſtrum ſyl. Eyſt. vulgare*, Lugd.

*Sifymbrium campeſtre*, Ang.

*Mentha ſyl. Tur. Lon. ſyl. altera*, Cæſ.

III. *Mentha ſyl. longioribus nigrioribus & minus incanis foliis.*

*Mentaſtrum aliud*, Lob.

*Mentaſtrum Campenſe*, Lugd.

IV. *Mentha ſyl. anguſtifolia.*

*Pulegium aquaticum*, ſeu paluſtre ſpicatum, Eyſt.

V. *Mentha montana verticillata.*

*Mentaſtrum montanum*, & 1. Cluſ. pan.

*Mentaſtrum montanum pannonicum*, Eid. hiſt.

*Mentaſtrum pannonicum*, Cam.

VI. *Mentaſtrum caruleum*, Cam. quid?

VII. *Mentha tuberoſa radice.* (Cam.

*Mentaſtrum tuberoſa radice*, Cluſ. pan. & hiſt.

IX. *Mentha radice geniculata*: quæ 2. in Prod.

*Mentha aquatica, ſive Sifymbrium.*

Σ *Ιούκερον. ἑρμινος ἄζρον*: *Sifymbrium*, alii *Serpillum ſyl.* vocant, *Mentha hortenſis ſimilitudine*, ſed *l*-*atoribus foliis atque odoratis*, Dioſcoridi l. 2. c. 155.

Genera duo ſecit: alterum *Mentha ſimile*: alterum quod *Cardamine* dicitur: & Plinius l. 20. c. 22. *Sifymbrium* il. a quibuſdam *thymbræum* appellatum, pedali non amplius altitudine: quod in rigui naſcitur ſimile *Naſturtio* R. & l. 9. c. 8. *Sifymbrium* latiffimè naſcitur in piſcinis & ſlagna.

I. *Mētha* rotūdifol. paluſtris, ſeu aquatica major. | *Menta rubra*, Brunf.

Eſſ

Balfa.

Balsamina agrestis & Nepeta 3. Trag.  
 Sifymbrium syl. Matth. Lugd.  
 Sifymbrium, Fuch. Dod. primum, Thal.  
 Sifymbrii 1. species prima, Cord. in Diosc.  
 Calamentum 3. Ang.  
 Calamintha aquatica, Gef. col. Tab.  
 Sifymbrium agreste aquaticum, Gef. hor.  
 Mentha syl. altera, & Mentha aquatica, Lon.  
 Mentha syl. 1. Cæf.  
 Aquatica, five Sifymbria mentha, Ad. Lob.  
 Sifymbria mentha, Ger.  
 Balsamita officinarum, Eyst.

Hæc aliquando toea rubet: magis minúsve hirsuta existit.

II. Mentha rotundifolia palustris minor, five flore globofo: pro 5. in Prodomo descripta.

III. Mentha palustris folio oblongo.

Menthastrifolia aquatica hirsuta, Ad. Lob. Lugd.

Calamintha 3. Dioscoridis, Lob. ico.

Menthastrum minus spicatum, Lugd.

Menthastrum aliud hirsuto folio, Cam.

#### *Mentha cataria.*

I. Mentha cataria vulgaris & major.

Mentha non odorifera, Brunf.

Nepeta vulgaris, Trag.

Nepeta fruticosa, Cord. in Diosc.

Herba cattaria, Matth. Cast.

Calaminthe 1. genus, Fuch. 3. genus, Dod. gal. Tur. Thal.

Calaminthæ species quibusdam, Gef. hor.

Calamintha montana, Lon.

Balsamita major, Lac.

Cattaria herba, Dod.

Cattaria, five Mentha catti, Ad.

Mentha cataria, Lob.

Cattaria vulgò, Calamintha 3. Dioscoridis, Cæf.

Herba felis, Lugd.

Mentha felina, Tab. Ger. Eyst.

Nepeta Germanica, Cam.

Alii Calaminthæ, alii Melissæ, alii Nepetæ, alii Urticæ, quæ Herculaneæ Plinio, speciem faciunt: alii inter Calamintham & Melissam mediam volunt.

II. Mentha cataria minor.

Cattaria minor, Clus. pan.

Cattaria tenuifolia Hispanica, Eid. hist.

Nepeta minor, Cam.

III. Mentha cataria minor alpina: pro 4. in Prodomo descripta.

Nepetella, Eyst.

IV. Mentha cataria latifolia.

Mentha cataria peregrina latifolia, Lob. Lugd.

Mentha felina sativa Latifolia, Tab.

Mentha cattaria altera, Ger.

Nepeta peregrina, Eyst.

V. Mentha cataria angustifolia major.

Mentha cataria peregrina angustifolia, Lob. Lugd.

Cattaria folio longiore, Dod.

Mentha felina sativa angustifolia, Tab.

Salvia Romana, Ger. ico.

VI. Mentha cataria angustifolia minor: sub 3. in Prodomo descripta.

## CALAMINTHA

**K**AAA'MI'N'OH, quasi bona & utilis mentha; nidore enim suo, ut habet Aristophanes, serpentes, vel accensæ, vel substrata, ait Dioscorides 1. 3. c. 43. fugare solet.

Genera tria Dioscoridi: 1. foliis Ocimi, moribus familiaris: 2. pulegii similis, sed major, quam ἀγρία πούλεγιον syl. Romani *νάρταρ* vocant (& Plinius 1. 20. c. 14. *Nepeta* obiter meminit) 3. *Mentha sylvestris* cognata est, foliis oblongis, caule & ramis, quam superiora majoribus, sed viribus inefficacior.

I. Calamintha incana ocimifoliis.

Calamintha 2. incana, Lob. Lugd.

Calamintha Cretica, Cam.

Calamintha montana incana minor, Tab.

Calamintha montana vulgaris, Ger.

II. Calamintha pulegii odore, five Nepeta:

Calamintha altera, Matth. Lugd. (fortè pulegium

Diosc.) Lac. ico. Lugd. (duplici figura) Cam.

Nepeta agrestis, Cord. in Diosc.

Calamintha Italica pulegii odore, Gef. hor.

Calamintha altera odore gravi Pulegii, foliis

maculatis, Ad. Lob.

Pulegium syl. five Calamintha altera, Dod.

Calaminthum, quod vulgo Nepeta, Cæf.

Calamintha arvensis 2. Tab.

Calamintha montana præstantior, Ger. ico.

Calamintha angustis foliis, Eyst.

III. Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ.

Calamintha, Matth. 2. Thal. vulgaris, Cam.

Calaminth. montana, Gef. hor. Lac. Dod. Cast. Lugd.

Calamintha montana vulgaris, Lob. Tab. Eyst.

Nepeta

Nepeta montana, Cord. in Dioſc.

Calamintha 3. Dioſcoridis Dalechampia, Lugd.

Mentha ſativa rubra, Ger. ico.

IV. Calamintha magno flore.

Calamintha montana preſtantior, Ad. Lob. Lugd.

Cam. Tab. Eyſt.

Calamintham 1. Ang.

Calamentum montanum, Cæſ.

Scordonia five Salvia agreſtis, Ger. ico.

V. Calamintha vulgaris exiguo flore : quæ in Prodomo deſcribitur.

VI. Calamintha arvenſis verticillata.

Mentaſtrum, Brunſ.

Nepeta agreſtis, vel 4. Trag. Lugd.

Mentha aquatica exigua, & Pulgium ſyl. Eidem, & floris colore ſolum differt.

Calamintha aquatica, Matth. Lugd.

Calamintha aquatica Belgarum, an Polycnemon, quaſi multicibia, Ad. Lob.

Calamintha altera, Dod. gal. Fuch. Tur.

Calamintha arvenſis, Geſ. hor. Tab.

Nepeta, Lon.

Polycnemon Lobelii, Lugd.

VII. Polycnemon Dalechampii, Lugd. quidæ

## MELISSA.

**M**ΕΛΙΣΣΟΨΥΛΛΟΝ & ΜΕΛΙΤΤΑΙΝΑ. id eſt, Apiaſtrum, quod hac αἰνίδα τὰς ἀπὲς δὲλεῖνται, Dioſcoridi l. 3. c. 118. Plinio l. 21. c. 20. Meliſſophyllon five Melittus: & prius l. 21. c. 9. Meliſſophyllon quod Apiaſtrum. Latini Meliſſa ab apibus, quæ etiam μελιτταῖον dicuntur.

I. Meliſſa hortenſis: & Lon.

Meliſſa, Brunſ. Ang. Dod. Cæſ. Ger. officin. Eyſt.

Meliſſa domeſtica, vel 1. Trag. deſc. noſtræ, Cam.

Meliſſophyllum, Matth. Geſ. hor. Caſt. Lug. Tab.

Meliſſophyllum vulgare vel adulterinum, Fuch.

Apiaſtrum, Matth. Cord. in Dioſc. Lac. Tur. Ad. Lob.

Citrigo, Geſ. hor.

Hanc in montibus ſpontæ naſci Matth. aſſerit, quam Meliſſophyllum i ſyl. genus Matthioli, Geſ. hor. nominat.

II. Meliſſa peregrina folio oblongo.

Meliſſa Moldavica, Matth. Caſt. Lugd.

Meliſſa vel Cedronella, id eſt, Citrigo Turcica, Geſ. hor.

Meliſſophyllon Turcicum, Ad. Lob.

Meliſſæ genus ex Oriente, Cæſ.

Meliſſa Turcica Dalechampii, Lugd. Cam. Tab. Ger.

Variat magnitudine: hinc duæ figuræ in Lugd. hiſt. colore quoque flores, qui cæruleus, purpureo cæruleus, & albus.

Meliſſa Moldavica flore cæruleo, & flore albo, Eyſt.

III. Meliſſa Moluccana odorata.

Meliſſa Conſtantinopolitana, Matth.

Cardiaca Melica, five

Molucca Syriaca, Ad.

Molucca lævis, Dod. Ger.

Cardiaca melica, five Molucca minus aſpera, Lob.

Molucca five Meliſſa Conſtantinopolitana, Cam. 1. Caſt.

Molucca 1. Cæſ.

Molucca five Meliſſa Turcica Dalechampii, Lug.

Meliſſophyllum Conſtantinopolitanum, Eid.

Cardica Syriaca, Tab.

Molucca odorata ſpinofa, Caſt. Eyſt.

Alteram lævem, alteram aculeatam Matthioli dicunt aculeis carentem nullam vidimus.

IV. Meliſſa Moluccana ſætida.

Melica, vel Molucca aſperior, Ad. Cam.

Molucca aſperior Syriaca, & Maſeluc Turcorum, Lob.

Molucca ſpinofa, Dod. Lugd. Ger.

Molucca altera, Cæſ.

Molucca, vel Meliſſa Conſtatinopolitana 2. Caſt.

Cardiaca Syriaca aſpera, Tab.

Molucca lævis inodora, Eyſt.

Utramque Moluccam Alyſſo Galeni congenerem, ut & Dioſcoridis & Plinii Cæſalpinus voluit.

## MARRUBIUM.

**M**ΑΡΡΑΣΙΟΝ Dioſcorides l. 3. c. 119. id quod Marrubium album dicitur, nominat: at quod nigrum, Βαλλορὴ ὀνόματι, l. 3. c. 117. vocat. Plinius l. 20. c. 22. Marrubium, quod Græci Praſium vocant: & l. 27. c. 8. Βαλλορὴ, alio nomine Melampreſion Græci vocant.

Genera duo Theophr. aſt. 6. hiſt. 1. & 2. propoſuit: aliud folio herbido, incifuris profundioribus, quo unguentarii

Et 3. un-

utitur: alterum rotundius squallens, incisuras habens obscuriores ( *Praefum innuere videtur.* ) Et Plinio l. 20. c. 21. duo genera, ex Castoris sententia, nigrum, & quod magis probat candidum.

*Marrubium nigrum.*

I. Marrubium Cardiaca dictum, fortè primū Theophrasti.

Marrubium mas, Brunf.

Melissa syl. Trag.

Cardiaca, Matt. Dod. gal. (& Sideritis 1.) Ges. hor.

Lac. Lon. Ad. Lob. Cæf. Thal. Cast. Lug. Tab. Ger.

Lycopsis, branca lupina, Ang.

Cardiaca, vel Lycopus, Fuch.

Alysson Galeni & Aëtii esse, Cæsalpinus censet.

II. Marrubium palustre glabrum.

Marrubium aquaticū, Trag. Ad. Lob. Dod. Thal.

Lugd.

Marrubium palustre, Dod. gal. Lon.

Sideritis 1. Matth. Ang. Ges. hor. Lac. Lugd. Cast.

Cam. 2. Lon.

Lancea Christi, Ges. hor.

Verbenæ alterum genus, Cæf.

III. Marrubium palustre hirsutum: quod 1. in Prodomo.

IV. Marrubium nigrum fœtidum, Ballote Diofcoridis.

Marrubium majus, vel 1. Trag. nigrum, Ges. hor.

Lon.

Ballote, Matth. Fuch. Tur. Cord. in Diof. Lac.

Dod. Lob. Cæf. Cast. Lugd.

Marrubium nigrum fœtidum, Ad.

Marrubiastrum, Tab.

Marrubium aquaticum, Ger.

Variat foliis majoribus & minoribus.

V. Marrubium nigrum rotundifolium.

Ocimastrum Valentinum, Clus. hiip. & histor.

Lugd.

*GALEOPSIS sive LAMIUM vel URTICA MORTUA.*

**Γ**ΑΛΙΨΙΣ & ΓΑΛΕΟΒΔΟΛΟΝ, toto frutice, cum caule & foliis urticam refert: at folia levius & trita graviter olent: flores tenues sunt ac purpurascetes, Diofcoridi l. 4. c. 95. Et Plinio l. 27. c. 9. Galeopsis aut Galeobdolon &c. Urtica mortua & iners, quod foliis innoxia sit, quam Plinius l. 21. c. 15. inter Urticas recensens, Lamium vocavit eam quæ innoxia sit & morsu careat: & l. 22. c. 14. addit album habere in medio folio, &c.

I. Lamium purpureum fœtidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Diofcoridis.

Urtica labeo mas, Brunf.

Lamium, Trag. (vel Urtica 2. 9. 10.) Fuch. Dod.

gal. Lugd.

Galeopsis Ericio Cord. Cord. in Diof. Lon. Cæf.

2. Tab.

Galeopsis vulgaris fœtens purpurea, Ad. sive Ur-

Marrubium Hispanicum odore Stœchados, Lob.

Marrubium Hispanicum, Tab. Ger.

VI. Marrubium nigrum longifolium.

Herba venti Monipeliensis, Ges. hor. Lob. Lugd.

Sideritis Monspeliensis, Lugd.

Parietariam Monspeliensem à Cordo vocari,

Lob. & Lugd. asserunt.

*Marrubium album.*

I. Marrubium album vulgare.

Marrubium fœmina, Brunf. candidum, Trag.

Marrubium, Matth. Cord. in Diof. Fuch. Dod.

Tur. Lac. Cæf. Cast. vulgare, Clus. hist. Eyf.

Marrubium album odorum, Ad.

Marrubium, Ges. hor. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Praefum, Ang.

II. Marrubium album villosum, an Praefum

Diofcoridis: quod 2. in Prodomo.

III. Marrubiū albū crispū: quod 3. in Prodr.

IV. Marrubium album latifolium peregrinū.

Marrubium candidū, Dod. Ger. Hispanicū, Tab.

Marrubium cādīdū alterum Hispanicum, Lob.

Marrubium alterū pannonicum, Clus. pan. & hist.

Marrubium Creticum, Cam.

V. Marrubium albū angustifoliū peregrinū.

Marrubium Creticum angustiore folio, Ad. Lob.

Eyftett.

Marrubium Creticum, Dod. Ger. Tab. Lugd. qui

à priori non distinguit.

Marrubium Creticum aliud, Cam.

VI. Marrubium album peregrinū brevibus

& obtusis foliis.

Marrubium Creticum angustis foliis inodorum,

Eyftett.

*GALEOPSIS sive LAMIUM vel URTICA MORTUA.*

**Γ**ΑΛΙΨΙΣ & ΓΑΛΕΟΒΔΟΛΟΝ, toto frutice, cum caule & foliis urticam refert: at folia levius & trita graviter olent: flores tenues sunt ac purpurascetes, Diofcoridi l. 4. c. 95. Et Plinio l. 27. c. 9. Galeopsis aut Galeobdolon &c. Urtica mortua & iners, quod foliis innoxia sit, quam Plinius l. 21. c. 15. inter Urticas recensens, Lamium vocavit eam quæ innoxia sit & morsu careat: & l. 22. c. 14. addit album habere in medio folio, &c.

I. Lamium purpureum fœtidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Diofcoridis.

Urtica labeo mas, Brunf.

Lamium, Trag. (vel Urtica 2. 9. 10.) Fuch. Dod.

gal. Lugd.

Galeopsis Ericio Cord. Cord. in Diof. Lon. Cæf.

2. Tab.

Galeopsis vulgaris fœtens purpurea, Ad. sive Ur-

tica non mordax, Lob.

Galeopsis purpurea, Lugd. Cast.

Urtica mortua, Ges. hor.

Urtica iners altera, Dod.

Urtica non mordax vulgaris fœtens purpurea,

Lob. ico.

Lamium, sive Urtica non mordax vulg. & fœtidi,

Clus. pan.

Habe-



Habetur major & minor: flore quoque purpureo, scite, vel rubro communiter: rarius albo, luteo, & vario: est & reptilis magis humique procumbens.

II. *Lamium purpureum* vel album non fœctens folio oblongo.

*Urtica* labeo *sermiana*, Brunsf.

*Galeopsis*, Trag. (vel 5. 6. 7. *Urtica*) Matth. Lac. Lugd.

*Lamium* sive *Archangelica* fl. albo, Ad. Lob. Lug.

*Urtica* iners sive *Lamium* 1. Dod.

*Galeopsis* flore verticillato, Thal.

*Leucas* 3. Cæs.

*Lamium* purpureum & album, Tab. rubrum, Ger.

*Galeopsis* vera *Dioscoridis*, Clus. hist.

Tres species flore tantum differentes: est purpureo, vel ex rubro albôve purpureo ente, labelis albis venis notatis: albo: luteo & croceo.

III. *Lamium* folio oblongo luteum.

*Galeopsis* flore croceo, vel *Urtica* 6. Trag.

*Urtica* iners 3. sive *Lamium* flore luteo, Dod.

*Lamium* luteum, Ad. Lob. ico. Tab. Ger.

*Leucas montana*, Cæs.

*Galeopsis* flore luteo, vel *Urtica* labeo, Cam.

Flores majore ex parte & non nihil rubicundi & crulei coloris, quare

*Urtica fatua* aquaticâ, sive *Lamium* *μαυροσπορον*, aut *μαυροσπορον*, Thal.

IV. *Lamium* maculatum.

*Urtica fatua* *μαυροσπορον*, Thal.

*Galeopsis* 1. Tab.

*Lamium* album, Ger.

*Urtica* mortua maculis albis respersa, Col.

V. *Lamium* alba linea notatum.

*Urtica lactea*, Matth.

*Lamium* Plinii. Ang. Cam.

*Milzadella* vulgo, *Leucas* *Dioscoridis* fortè, Cæs.

*Lamium* Plinii montanum *Campoclairente*, Col.

Huic linea semper per medium folii decurrit: ejus altera species foliis brevioribus, profundius incisis & linea angustiore, &

*Lamium* *Æquicolum*, Col. dicitur.

VI. *Lamium* foliis caulem ambientibus majus.

*Lamium* 3. vel peregrinum, Clus. pan.

*Lamium* pannonicum 3. Clus. hist.

*Ballote* crispâ major, Lugd.

*Marrubium* *ποικιλον*, Thal.

*Alfines* species, Tab.

*Alfina* *hederula* altera, Ger.

VII. *Lamium* folio caulem ambiente minus.

*Mortius* gallinæ folio *hederulæ* alterum, Lob. ico.

*Leucas* 4. Cæs.

*Ballote* crispâ minor, Lugd.

IX. *Lamium* maximum sylvaticum fœctidum.

*Heraclea* vel *Urtica* 11. Trag.

*Urtica* sylvana, Lon.

*Urtica* fœctida maxima *μαυροσπορον*, Thal.

*Urtica* *Heraclea*, Lugd. *herculea*, Tab.

an *Sideritis* alia, Lugd.

*Galeopsis* legitima, vel vera *Dioscoridis*, Clus. histor.

Huic simile aliud, foliis non ita amplis, sed inferius incanis & lanuginosis, (*Lamium* incanum dici poterit) Thal.

IX. *Lamium* maximum sylvaticum alterum.

*Galeopsis* maxima pannonica, Clus. pan. & hist.

X. *Lamium* montanum *Melissæ* folio.

*Melissa* 1. Trag. ico. syl. Lon.

*Melissophylli* species, Dod. gal.

*Melissophyllum* verum, Fuch. syl. Cord. obs.

*Melissophyllum* Fuchii, Get. chor. Lob. (& *Herba sacra* *Agrippæ*) Lugd.

*Melissa* Fuchii, Lob. ico. Cam. Eyft.

*Herba sacra* quorundam *Dalechampi*, Lugd.

*Melissa* altera, Cæs.

Variat floribus communiter pallidè purpureo: reperitur & albis & verticoloribus, hinc

*Lamium* pannonicum 1. verticolore flore, &

*Lamium* pannonicum 1. albo flore, Clus. hist.

Est & altera caulibus infirmioribus & frequentioribus, & foliis paulò angustioribus, &

*Lamii* pannonici 1. species altera, Eid. dicitur.

XI. *Lamium* peregrinum, sive *Scutellaria*: in

*Prodromo* descripta.

*Betonica* syl. Pauli, *Quadramio*.

*Scutellaria*, Cortuso.

*Caisida*, Colum.

*Scordotis* 2. Plinii, Ponz.

Floribus est purpureis, rarius albis.

## U R T I C A

**A** ΚΑΛΤ' ΦΗ *Dioscoridi* 1. 4. c. 94. Et *Theoph.* 7. hist. 7. ὅτι τὸ αὐτὸ καλεῖται ἀπὸ τοῦ, ὅτι injuncto sit tactu. & prurit cicat, *Athenæo* dicitur & αἰδὴν, quasi pruriginosa, & πύξιν, quod pugnat & suo mor su sensu lacessat.

*Lamio*

Latinis *Urtica* ab urendo dicta, quod pruritur & pustulas igni similes excitet. Plinio.

Genera duo *Dioscoridi*: una agrestior, altera non aere aspera & : ut Plinio l. 21. c. 15. plures sunt differentie: sylvestris, quam feminam vocant, mitior: & in sylvestri qua dicitur *Canina*, acrior: quae vero odorem fundit, *Heraclea*: quae innoxia morsu carens, *Laminium* vocatur. Vide etiam l. 22. c. 13. & 14. Distingimus in pungentes & non pungentes: pungentes in majorem & minorem: non pungentes in satidas & non satidas, & has in maculatas, & non maculatas: quae floris colore purpureo albo, luteo variant.

#### *Urtica urens.*

I. *Urtica urens maxima.*

*Urtica major*, Bruff. Fuch. Dod. gal. Lō. Thal. Tab.

*Urtica vulgaris urens* 1. Trag.

*Urtica* 2. Matth. Lac. Cæf. Lugd. Cast.

*Urtica*, Cord. in *Diosc.* urēs, Ger. urēs altera, Dod.

*Urtica* syl. major, Gei. hor. syl. asperior, Lob.

*Urtica communis*, sive major & femina, Ad.

Hujus & caulis & radix aliquando parum rubent, & dicitur

*Urtica rubra*, Tab. Ger.

II. *Urtica urens altera.*

*Urtica vulgaris urens altera*, Trag.

*Urtica oligophyllos* (à foliorum paucitate) Lug.

III. *Urtica urens minor.*

*Urtica minor*, Brunn. Fuch. Dod. gal. Cord. hist.

Lon. Thal. Tab. Ger. syl. minor, Gei. hort.

*Urtica* 3. Trag. Matth. Lac. Lugd. Cast.

*Urtica exigua*, Cæf. urens minima, Dod.

*Urtica minor* sive *Cania* Plinii acrior, Ad.

*Urtica minor acrior*, Lob.

IV. *Urtica urens pillulas ferens*: 1. *Dioscoridis* semine lini.

*Urtica*, Ang. legitima, Clus. hist.

*Urtica Romana*, Trag. Fuch. (& vera) Tur. Gei. hort. Eyft.

*Urtica* syl. sive *Romana offic.* semine Lini, Ad.

*Urtica Romana* vel mascula, Lob. Cam. Tab. Ger.

*Urtica* 1. Matth. Lac. Cæf. Cast. Lugd.

*Urtica* 1. quae in Alexandria Angiar dicitur, Alp.

*Urtica sylvestris*, Dod. gal.

*Urtica urens prior*, Dod.

#### *Urtica fatua aculeata.*

I. *Urtica aculeata foliis serratis.*

*Cannabis* syl. Trag. Lugd. spuria, Ger.

*Cannabis* syl. spuria altera, Lob. ico.

*Cannabina alba*, Tab.

Floribus communiter purpureis: rarius candidis.

II. *Urtica aculeata foliis serratis altera.*

*Cannabis* syl. spuria tertia, Lob. ico.

an *Sideritis* Cordi, Thal.

*Alyssum arvense album*, Tab.

*Urtica mortua* 4. Dod. post.

III. *Urtica aculeata foliis non serratis.*

*Sideritis altera* Matthioli, ipsi Lugd.

*Cannabis spuria facie Urticae*, Lob. ico.

*Urtica fatua* syl. aculeata, Thal.

## ALYSSON.

**A**LYSSON Galeno 2. de Antidosis, herba est Marrubio similis, orbes habens in furculorum summitatibus asperiores & magis spinosos: flores ad caeruleum vergentes: sic dicta eidem. 6. simpl. quod demorsos à cane tabido mirifice jacet. sed haec à *Dioscoridis* l. 3. c. 105. quae foliis est rotundis, & fructu duplicium scutulorum effigie, plantae diversae: ut & Plinio l. 24. c. 11. licet eandem nominis rationem assignet, cui & alia est, & ad Rubiam levem referenda.

I. *Alysson verticillatū foliis profundè incisis.*

*Alysson Galeni*, Clus. hisp. & hist. Dod. Lob. Cast.

Ger.

*Alysson Galeni aliud*, Cam.

*Alyssum Galeni Hispanicum*, Tab.

*Moluccam* spinosam Clusium pro *Alyssopinge-*

re suspicatur, Lugd.

*Planta Hispanica Marrubio similis*, Col.

Ex horro clarissimi Contareni.

II. *Alysson verticillatum foliis crenatis.*

*Sideritis Alysson*, & *Sideritis Heraclea* *Dioscoridis*, *Alysson Antonii* Coi ex Galeno, Col.

## SIDERITIS.

**S**IDERITIS (secundum Dioscoridē ferro, ob vim vulnera glutinantem) *Dioscoridi* l. 4. c. 33.

Genera: *Dioscoridi* triplex est: 1. aliquibus *Heraclea foliis Marrubii*: 2. folia longis pediculis heremum silicis, utring, numerosa: quae *Heraclea Crateva*, foliis *Coriandro* similibus. Plinius l. 25. c. 5. sub *Achillae* sex differenter recensuit: prima *Achillaea*, quae & *Dioscoridis*: altera est *Myriophyllum* *Diosc.* tertia est *Sideritis Heraclea* 1. *Diosc.* quarta & quinta *Sideritis* *Heraclea Crateva* & tertia *Diosc.* sexta est *Sideritis* secunda *Dioscoridi*.

Sider

*Sideritis hirsuta.*

- I. *Sideritis foliis hirsutis profunde crenatis.*  
*Sideritis herbariorum* 5. Tab.  
*Sideritis Monspelica Scordiodides*, Ad. floribus  
 luteis, Lob. Lugd.  
*Tragoriganum Prassoides*, Peninii.  
 II. *Sideritis hirsuta procumbens.*  
*Sideritis Heraclea*, Clus. hisp. at 3. in hist.  
*Tetrahit herbariorum*, Lob. Lugd.  
*Herba judaica*, Dod.  
*Sideritis Herculea Dioscoridis*, Cæf.  
*Sideritis* 1. *Herculea*, Cam.  
*Sideritis herbariorum* 4. Tab.

III. *Sideritis hirsuta procumbens altera minimum crenata.*

*Sideritis* 4. & 5. Clus. hist.

- IV. *Sideritis vulgaris hirsuta erecta.*  
*Sideritis* 1. Fuch. Tur. Cord. in Diosc. Gef. h. Thal.  
*Sideritis vulgaris*, Cam. in Matth. vel. 2. Clus. hist.  
*Sideritis quarta*, Lon.  
*Sideritis Heraclea*, Cord. hist. Tab.  
*Sideritis sive ferruminatrix*, Ad. Lob. ico.  
*Sideritis Herculea altera in vineis*, Cæf.  
*Herba judaica*, Gef. col.  
*Tetrahit*, Lugd.

V. *Sideritis hirsuta vulgaris humilior.*

*Sideritis* 2. Clus. pan. & hist.

Illius flos candidus, rictu sanguineis notis aspersus: hujus flos amplior, albus luteo pallescens paucis rubris punctis aspersis.

VI. *Sideritis hirsuta pallido flore.*

*Sideritis pannonica* 3. Clus. pan. at 6. in hist.

VII. *Sideritis montana parvo varioq; flore.*  
*Sideritis montana parvo flore nigro purpureo*, Col.  
 Caput purpureo nigrescit, umbilico luteo & collo candicante, à D. Columna accepimus.

## EUPHRASIA.

**E**UPHRASIAM olim *Euphorbium* dictam aliqui volunt, eo quod oculos eorum caliginem discutiendo, delectet: hinc nonnulli *Ophthalmica* & *Ocularia*: que cum paulo supra ducentos annos inventa fuerit, veteribus indistincta videtur. Fortè hæc vox à Buglossa mutuata, quæ etiam in *Euphorbia* dicitur: quod eo modo quo Buglossa in vinum confecta, animi letitiam faciat, sic & Euphrasia quam primo loco proponimus, oculos juvet: hinc *terranis, oculorum solarium*.

I. *Euphrasia officinarum.*

*Eufragia alba*, Brunf. vulgaris, Col.

*Eufragia*, Matth. Ang. Cæf. Cast. defc. altera major, Thal.

*Euphrasia* & *Eufrafia*, Fuch. Dod. Lac. Gef. Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger. vulgaris, Lon.

II. *Sideritis alpina Hyssopifolia.*

*Sideritis montana*, Ad. Lob. ico. Lugd.

*Sideritis herbariorum* 6. Tab.

*Sideritis* 7. Clus. hist.

Variat foliis quandoque angustioribus, quandoque latioribus & in summitate crenatis, qualem ex Pyrenæis habemus.

IX. *Sideritis querno folio*, Dalech. Lugd.

Huic similem Britannicæ nomine, anno 1578. in horto Patavio legimus.

X. *Sideritis alpine Trixaginis folio*: quæ 2. in Prod.

*Sideritis glabra.*

I. *Sideritis arvensis latifolia glabra.*

*Sideritis* 2. Matth. quamvis hist. Lugd. vel esse Cannabinam spuriam Lobelii: alii *Marrubium pannonicum* Clusii.

*Sideritis Heraclea altera*, Cæf.

*Sideritis arvensis flore pallido*, Cam.

*Sideritis* 1. *arvensis species altera*, Thal.

*Alyssum majus*, Tab.

*Alyssum Germanicum*, Ger.

II. *Sideritis glabra oblongo splendente folio*: quæ 1. in Prod.

III. *Sideritis arvensis angustifolia rubra.*

*Sideritis alia in vineis flore purpureo*, Cæf.

*Sideritis arvensis flore rubro*, Cam.

*Sideritis* 1. *congener secunda*, Thal.

*Ladanum segetum* Plinii, & *Tetrahit angustifolium aliis*, Lugd.

*Alyssum Galeni flore purpureo*, Tab.

Plinius lib. 26. cap. 8. inquit, *Ladano sistitur alvus utroque quod in segetibus nascitur contuso & cribrato*: hæc ille. Flore est purpureo, rarius albo.

*Euphrasia Argentinensium*, vel 2. & 6. Trag. *Ophthalmica* sive *Ocularia*, Eric. Cord.

Alter major est & ramosior, foliis minoribus: altera minor foliis latioribus, & in montibus ferè semper unicaulis, quandoque in alpinis Helvetiorum parva, luteis floribus: floris colore

G g variat,

variat, communiter ex luteo albicat, aliquando eleganter ex cæruleo purpurascit: hinc Euphrasia ramosa pratensis flore albo, & Euphrasia minus ramosa, flore ex cæruleo purpurascente, Eyst.

II. Euphrasia foliis sinu angustioribus.

Eufragia linifolia, Col.par.2.

Hæc flore, fructu, semine ac sapore congener & dodrantem non excedit.

III. Euphrasia pratensis rubra.

Eufragia altera, Dod.Lob.Lugd.Col.

Sideritis pratensis rubra, Lugd.

Ericoides rubrum, Thal.

Cristæ alterius generis prima, Cæf.

Odonites, Tab.

Cratægonon Euphrosyne, Ger.

Habetur brevis & palmaris.

IV. Euphrasia pratensis Italica latifolia.

Eufragia 3. non scripta, sive media, Col.

Brunellæ Italicæ nomine in Phytopinace: ac in Prod. sub Euphrasia purpurea minore descripta: quæ floribus colore purpureo, vel candido variat.

V. Euphrasia Italica latifolia altera.

Eufragia major syl. purpurea latifolia, Col.

VI. Euphrasia pratensis lutea.

Sideritis pratensis lutea, Lugd.

Ericoides luteum, Thal.

Cristæ alterius generis altera, Cæf.

Odonites 2. flore luteo, Tab.

Eufragia syl. major lutea angustifolia, Col.

VII. Euphrasia lutea alfinefolia, radice squamata: pro 1. in Prod. descripta.

Anonyma radice dentaria, Col.par.2.

## MELAMPYRUM.

**M**ELAM'ΠΥΡΟΝ, id est *Triticum nigrum*, Galeni 1. aliment. ult. quod ex tritici mutatione generari sensetur: & Theophrasto, 8. hist. 5. de nostro 1. & 2. intelligere oportet: quod quibusdam Plinii 1. 21. c. 17. *Stelephuros*, aliis ejusdem *Alopecuros*, cui nomen a spica molli & lanugine densa, vulpium caudis non dissimili, cui proxima *Stelephuros*, nisi quod illa particulatim floreat: hæc Plinius. Auferre *Aera* Plinii 1. 18. c. 17. *Triticum* simili modo enecat *aera*: quamvis hoc nomen & jam *Lolium* tribuatur.

I. Melampyrum purpurascens coma.

Trifolium majus, Brunf.ico.

Triticum vaccinum, Trag.Dod.Lon.Lugd.

Melampyrum, Dod.gal.Ad.Lob.Cam.Tab.5. Thal.

Parietaria syl. 3. Clus.pan.& hist.

Variat floribus colore: flore est infernè superneq; puniceo, medio candido, foliis laciniatis: sic infernè puniceo, supernè luteo, foliis minoribus: flore luteo in summo albicante: infernè candido supernè luteo: sic ex albo viriditq; mixto.

II. Melampyrum cærulea coma.

Parietaria Lipsensium, Trag.

Parietaria syl. Cam. syl. 1. Clus.pan. & hist.

Coma, coloris est, modo violacei, modo purpurei, nunc dilutioris, nunc saturatoris: modo cadidi.

III. Melampyrum lanuginosum Boeticum.

Parietaria montana Boetica, Clus.cur.post.

IV. Melampyrum luteum latifolium.

Parietaria syl. 2. Clus.pan.& hist. syl. Eyst.

Cratægonon, Ad.Lob.Lug. rubrum & album, Ger.

Satureia lutea Dalechampii, Lugd.

Hyssopus nemorensis & lutea, Lugd.

Melampyrum, 1. Thal.

Crista 1. Cæf.

Milium sylvaticum 1. & 2. (solo colore floribus differunt) Tab.

*Κεράτρυον* Dioscorides 1. 3. c. 139. foliis Melampyro similibus describit &c. quæ notæ huic conveniunt. At Plinio 1. 27. cap. 8. Cratægonon duplex, alterum Dioscoridis respondens, alterum fortè Pericaria erit.

V. Melampyrum luteum angustifolium: quod sub Melampyro 4. in Phytopinace, & pro Melampyro luteo linearis folio, in Prod. describitur.

an Melampyrum 6. Thal.

VI. Melampyrum luteum minimum

Melampyrum perpusillum luteum, Ad.Lob.ico.Lug.

Melampyrum luteum, Tab.

## BETONICA.

**K**ΕΣΤΡΟΝ à remedium copia & varietate: *Συζυγέος*, quod frigidis locis inveniatur: Romanis *Betonum* Dioscoridi 1. 4. c. 1. Vetonica quæ dicitur in Gallia, in Italia *Serratula*, à Grecis *Cestron*, aut *Ψευδοτροphon*, Plinio 1. 25. c. 8.

I. Betonica

I. *Betonica purpurea.*

*Betonica*, Brunf. Trag. Matth. Ang. Fuch. (purpurea, Eid. ico.) Dod. Gef. hor. Tur. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæf. Thal. Lugd. Caſt. Tab. Ger. *Betonica vulgaris*, Cluſ. hiſt.

*Veronica*, Cord. in Dioſc. & hiſt.

Duplex eſt: altera ſpica brevior, altera longior, mollior, ſerius florent, & altius excreſcente.

II. *Betonica alba.*

*Betonica alba*, Brunf. Tab. *Betonica albo flore*, Dod. Cluſ. pan. & hiſt. Cam. *Betonica candida*, Trag. Lob. *Veronica alba*, Cord. hiſt.

III. *Betonica folia capitulo Alopecuri.*

*Alopecuri genus*, ſive *Alopecuros montana*, Lugd.

## SERRATULA

*SERRATULA à foliis minutim ſerratis nomen accepit.*

*Serratula*, Matth. Dod. Ad. Lob. Cluſ. hiſt. Lugd. Caſt. Cam. Ger.

*Serratula tinctoria*, Tab. tinctoris, Eyſt.

*Cerretta* ſive *Serretta*, Cæf.

*Centauroides*, vel *Centaurium majus* ſyl. Germanicum Thal. qui vult *Schartam* ſeu *Tinctoriū* ſorem à Trago nominari: quod ego, ſed malè, à *Solidago Serracena* 4. Lon. ico. (liàs credidi.

Differentia in foliis ratione inciſuræ quadruplex eſt, ut rectè Thalius:

1. Foliis omnibus ſerratis, ſed inciſura carentibus, etiam flore candido, quæ *Serratula tinctoria* 1. Tab.

*Serratula purpurea*, Ger.

2. Foliis ad radicem integris, reliquis profundè inciſis, quæ

*Serratula* 2. Tab.

*Serratula flore albo*, Ger.

3. Primum folium ad radicem integrum habet, reliqua omnia diſſecta, quemadmodum *Loebelius* 1. figurâ pinxit.

4. Folia utroque latere omnia ſimilibus diſſiſionibus diſſuſa ſunt, quæ

*Serratula* 3. Tab. Ger. & 2. apud Lob.

*Serratula tinctoris*, Eyſt.

Majorem & minorem Cæſalpinus agnoſcit.

## BEHEN ALBUM &amp; RUBRUM.

*Serratula* affinis capitulo ſquammoſo luteo ut & flore.

*Behen* abiad Arabum: id eſt *Behen albū*, nam rubrum *Behen Ackmar* incolæ appellant, *Rauwolfſſ.* & Lugd. ap.

*Behen* Arabibus, ut *Serapioni* ſunt radices paſtinacæ radicibus ſimiles: quare *Haliabbas* ſcribit *Behen* & *Paſtinacæ* ſyl. radices, nullum inter ſe diſcrimen habere. Equidem in officiis radices duæ nomine albi & rubri oſtenduntur, ſed quid ſint

controvertitur: *Album* aliqui *Polemonia* ſive *Lychnidis*, quæ *Papaver ſpumeum* & *Behen album* *Monſpeliciſibus* dicitur eſſe exiſtimant: *Ben* verò rubrum, alii *Limonii* maritimi, alii *Valeriana* rubræ, alii *Biſtoræ* eſſe autumant: aliqui verò, *Garzia* & monente & reprehēdente, *Zerumbeth* eſſe ſtatuit. Quare aliqui in deſcriptionibus Arabū, ſubſtituunt *Eryngiū*, alii *Tormentillā*, alii *Angelicā*, alii deniq; *Garyophyllatā*. Licet *Aquarius* & *Myreſius* *Behen Hermodactylos* eſſe velint.

## SCROPHULARIA

*SCROPHULARIA & à radice nodofa & ab effectu, quod ad Scrophulas prædeſſe credatur, nomen accepit. Alia tamen radice eſt nodofa, alia fibroſa nodis carens.*

I. *Scrophularia nodofa foetida.*

*Scrophularia major*, Brunf. Gef. hor. Tur. Lon. Ad. Lob. Cæf. Thal. Lugd. Cam. Tab. Ger.

*Scrophularia*, Matth. Lac. Dod. Caſt.

*Ocimaſtrum alterum*, Trag.

*Galeopſis*, Dod. gal. Fuch. cui minor, in ico.

*Climenum mas*, Gef. hor.

Sunt qui *Galeopſin*: alii *Clymenum* *Plinii* 1. 25. c. 7. cui *hederæ* tolia tribuit: alii *Chryſſipeam* e-

juſdem 1. 26. c. 9. (cujus tamen notas nullas addidit) velint. Alii *Millemborbia*, *Ficaria*, *Ferraria*, ſive *Caſtranguſa*.

II. *Scrophularia paluſtris* nō foetida, ſive *aqua-Scrophularia ſœmina*, Cæ. ep. Matt. (tica minor. *Betonica aquatica* ſeptentrionalium ſpecies minor, Lob. obſc.

III. *Scrophularia aquatica major.*

*Ocimaſtrum majus*, Trag.

Gg 2

*Galeopſis*

Galeopsis 2. Dod. gal.

Scrophularia majoris altera species, Gef. hor.

Clymenon femina, Eid.

Clymenon, five Betonica aquatica, Tur.

Betonica aquatica, Dod. Ad. Lob. Lug. Tab. Ger.

Scrophularia major aquatica, Thal.

IV. Scrophularia folio Urticæ.

Galeopsis, Ang.

Scrophularia peregrina, Cam.

an Scrophularia Cretica 2. Clus. hist.

V. Scrophularia flore luteo.

Lamium pannonicum, 2. Clus. pan. alterum five exoticum, Eid. hist.

Scrophularia montana maxima, Col.

In Phytopinace Matthiolo & Prod. descripta.

VI. Scrophularia foliis laciniatis 2. quæ 2. in Prod.

VII. Scrophularia foliis filicis modo laciniatis, vel Ruta Canina latifolia.

Scrophularia Cretica 1. Clus. hist.

IIIX. Scrophularia, Ruta canina dicta vulgaris, Sideritis 3. Matth. Cam. qui addit forte à pictore non rectè expressam.

Sideritis altera Diosc. Lac. Cast. Tab. prima, Lon.

Galeopsis 3. Dod. gal.

Ruta canina, Ad. Lob. Lugd. Tab. Clus. hist.

Scrophularia similis planta major : Sideritis 2. Dioscoridis, Cæf.

In Matthioli figura folia inferiora cum Tanacetum referant, aliqui Tanacetum inodorum esse suspicantur : at Rutam caninam ipsum exprimere voluisse non dubitamus, cum à Nobilitis. Corrufo Sideritidis 3. nomine, Rutam hanc accepimus, qui eam Matthiolo communicaverat.

## STACHYS.

**ΣΤΑΧΥΣ** frutex est Marrubio similis, sed longior, foliis subirsutis, duris, odoratis, candidis, Dioscoridis l. 3. c. 120. At Plinio l. 24. c. 15. Stachys porri similitudinem habet, longioribus & pluribus foliis, odoris juvenilis, coloris in luteum inclinati. Stachys id est spica.

I. Stachys major Germanica.

Marrubium agreste vel 3. Trag.

Stachys, Matth. ed. prim. Fuch. Dod. gal. Cord. in

Diosc. & hist. Tur. Lac. Lon. Ad. Cast. Lugd. Tab.

Ger. Dioscoridis, Lob.

Sphacelus aliis Stachys, Guil.

Stachys Germanica, Gef. ap. minor, Cam.

Pseudostachys, Matth. Lugd.

Salvia sylvestris, Cæf.

Marrubium montanum alterum, Thal.

Sideritis Heraclea, Col.

Floribus est purpurascens, rarius albis.

II. Stachys Cretica : pro Pseudostachyde 1. in Prodomo describitur.

III. Pseudostachys alpina,

Marrubium montanum 1. Thal.

Aspernauti forte Sphacelus Theophrasti, Lon.

Salvia syl. nigrior, Cæf.

Salvia alpina, Tab. Ger.

Hujus altera species gravi odore carens : utraq; sub Pseudostachyde 2. in Prodomo descripta.

IV. Stachys minor Italica.

Stachys, Matth. Dod. Lug. Tab. Ger. minor, Cam.

Stachys floribus gravioris odoris, Gef. ap.

Stachys spuria Flandrorum, Ad. Lob. ob.

Stachys lychnitis, Eid. ico.

Salvia sylvestris 3. Cæf.

V. Stachys Lusitana, Lob. Lugd.

VI. Stachys spinosa Cretica.

Stachys spinosa & Gaidertymo, id est Asininum

Thymum, Clus. ap. 1.

Gaidertymum Creticum, Hon. Belli ep. 5. ad Clus. Ponæ Ital.

VII. Stachys palustris foetida.

Stachys palustris Gesneri, Cam.

Betonica foetida, Gef. col.

an Herbæ Judaicæ cognata, Eid.

Sideritis 1. gravis odoris, Thal.

Clymenon minus, Lugd.

Tertiola, quod tertianas sanet, Cæf.

Marrubium aquaticum acutum, Ger.

Lyfintachia galericulata adulterina, Eyf.

## SECTIO

## SECTIO SEXTA.

*SALVIA; HORMINUM; VERBASCUM; BLATTARIA; AETHIOPIS; VERBASCULUM* five *PRIMULA VERIS;*

*Sanicula Alpina vel Auricula Urſi; Pinguicula; Digitalis; Ephemerum.*

## S A L V I A.

*SALVIA*, quod ad multa praefertim ad ſecunditatem, ſalutaris ſit: cum ſteriles, huius uſu frequenti graviora reddantur: quare Agrippa ſacram herbari vocavit, Aëtio auctore. *ἡ ἀλὶς φάρα* Dioſcoridi lib. 3. cap. 40. (quaſi in tabernaculum redacta, cum herba ipſa ſemper retortida & exucca videatur: id enim *ἰσχυρὸς* & *ἰσχυρὰ* ſignificat: folia enim attritis veſtibulis comparantur) & *ἡ ἀποκόσμος* & *ἡ ἀγρὸν* dicitur. Plinius lib. 22. cap. 25. Lenti ſylveſtris annumerat, putans Eleiſſiſhacon à Lente dictum, ab alio Phacon. Eſt, inquit, & ſylveſtris Eleiſſiſhacon à Gracis dicta, ab aliis Phacos: Eſt ea ſativa lente levior & folio minore atque ſiccior & odoratiore (quibus Sphacelum Theophraſti reſpondit.) Eſt & alterum genus ejus ſylveſtris, odore gravi: hac mitior: folia habet Cotonii mali effigie, ſed minor: & candida (hæc eſt apud Dioſcoridem hiſtoria *Salvia*, quam cum Phacæ & Aphacæ confundit) ſubjungit: noſtri, qui nunc ſunt barbari, Eleiſſiſhacon Græcè, Latine *Salviam* vocant, uenta ſimilem canam, odoratam (majorem haud dubie intelligit.) At lib. 26. cap. 6. *Salvia* meminit: an verò de hac, vel *Stachy*, vel *Sphacelo* Theophraſti, vel *Hormino* vulgari, vel *Aethiopide* loquatur, ambigitur.

Genera: Dioſcorides unus meminit: quæ major vulgaris eſt: at Theophraſto 6. hiſt. 1. *Salvia* plura ſunt genera: ſubjungens Sphacelum & *Salviam* inter ſe diſtare, quaſi alterum urbanum alterum ſylveſtre genus dixerit.

I. *Salvia* major, an Sphacelus Theophraſti?  
*Salvia* latifolia, Brunf. def. Trag. Gef. hor. Lon.  
Cluſ. hiſt. Cam.

*Salvia* major, Matth. Fuch. Dod. Tur. Lac. Lugd.

Caſt. Tab. Ger.

*Salvia* hortulana, Eric. Cord.

*Salvia*, Ang. Cord. in Dioſc. domeſtica, Cæſ.

*Salvia* major ſcabrior Dioſcoridis, Ad. Lob.

*Salvia* major latifolia fl. cæruleo, Eyſt.

Varietas in foliis & floribus meminit: foliis eſt viridibus, iſis; criſpis & non criſpis, purpureiscentibus, verſicoloribus: ſic vel totis, vel partim albidis: floribus communiter cæruleis, rarius candidis.

II. *Salvia* nigra.

*Salvia* major alba, Dod.

Foliorum pediculi, ac nervi, & recens emata folia atro rubent.

III. *Salvia* minor aurita & non aurita.

*Salvia* nobilis, Brunf. Gef. hor.

*Salvia* anguſtifolia & minor, Trag.

*Salvia* minor, Matth. Fuch. Dod. gal. Cord. in Dioſc. Lac. Tur. Lob. Cæſ. Tab. Ger. pinnata, Ad. Eyſt.

*Salvia* acuta, Lon.

*Salvia* anguſtifolia, Cluſ. hiſt.

*Salvia* tenuifolia auriculata, Cam.

Sphacelus verus Theophraſti, Lugd.

Variat foliis auritis, vel pinnatis, & non auritis: foliis aliquando Lavandulæ concoloribus, ſed latioribus, & gravioris odoris: rarius luteolis: flore cæruleo, rarius albo

IV. *Salvia* minor altera: hæc odore & ſapore eſt Abſinthii, floreque rubente: quam primum Baſileæ in horto Pharmacopæi Johannis Heitzmanni: dein in horto Montebelgardiano, legimus.

V. *Salvia* folio tenuiore.

*Salvia* Hiſpanica odoratiſſima, Cam.

*Salvia* Indica, Tab. Ger.

*Salvia* Hiſpanica fl. albo, Eyſt.

VI. *Salvia* latifolia ſerrata: quæ 1. eſt in Prodromo.

VII. *Salvia* anguſtifolia ſerrata.

*Salvia* Cretica anguſtifolia, Cluſ. hiſt.

IX. *Salvia* anguſtifolia lanuginofa: quæ 3. in Prodromo.

IX. *Salvia* baccifera.

*Salvia* fructum inſtar gallæ ferens, Matth.

*Salvia* Græca, quæ hodie *φασαμπύδια*, Ang.

*Salvia* Cretica, Dod. Tab.

*Salvia* coccifera ſive baccata Cretenſis, Ad.

*Salvia* Cretica baccifera, Lob. ico. Lugd. Cam. ep. Matth.

Hujus folia aliquando aurita, nonnunquam

Gg 3 appen-

appendicibus carentia: subinde quædam cauliculorum pars inter genicula in crassitudinem extuberant ut gallarum (sunt excrementæ quædam) magnitudinem & similitudinem, seu baccharum & pomorum orbiculatorem, in Creta assequan-

tur. At in regionibus frigidis nulla profert: hinc duæ figuræ apud Clus. hist.

Salvia Cretica pomifera, & non pomifera.

X. Salvia folio subrotundo: quæ 2. in Prodromo.

## H O R M I N U M.

**O**PMINON herba est foliis Marrubio similis, caule quadrangulo, &c. Dioscoridi l. 3. c. 145. dictum videtur. *ἡ ὀπμινὸν, quod ut & τὸν οὐνοῖα παρὰ ποταμῶν, ad Venerem stimulet, ut Dioscorides loquitur. Theophrastus Hormini (Gaza Geminalem vertit) inter fruges meminit 8. hist. 1. & 7. Galeno 8. simpl. 26 p. Cuius: Aeginaea de quibus & ὀπμινὸν dicitur. Plinius l. 18. c. 7. Horminum à Græcis dictum. Cumino simile scribit.*

Genera duo Dioscoridi: sativum & sylvestre: in sylvestri semen rotundum ac fuscum, in altero nigrum & oblongum reperitur. Et Plinio l. 22. c. 25. Horminum Cumino simile. &c. duorum generum, alteri semen nigrum & oblongum, alteri candidius & rotundius: qui vires à Dioscoride prius propositas subiungit.

### I. Horminum sativum.

Horminum, Math. Ang. Lac. Dod. Ad. Lob. Cæf.

Lugd. Tab. Cast. sativum, Dod. gal. Cæf. Cam.

Orminum verum. Gef. hor. minus, Lon.

Horminum syl. foliis purpureis. Ger.

II. Horminum Syriacum: & Eyst. in Phytopince Matthiolo & Prodromo descriptum.

Biermas. Cam. Aman quibuldam.

### III. Horminum Sclarea dictum.

Gallitricum sativum. Trag.

Gallitricum, Dod. gal. Lugd. Cam. Ger.

Sclarea, Math. Cast. Cam. Tab. vulgo & Centrum

galli. Guiland. pap.

Sclarea hortenſis, Gef. ap.

Sclarea Æthiopis, Ang.

Orminum sativum, Fuch. Tur. Cord. in Dioſc.

Horminum & Orminum minus, Gef. hor.

Scarlea, Ad. Lob.

Sideritis Heraclea, Fracast. cui & Alyſſon Galeni.

Scordium alterum Plinii, Dalech. in Plin.

Orvala, Dod. Cast.

Horminum syl. 1. Clus. hist.

Horminum hortenſe, Eyst.

Matritſalvia major, Col.

Quibuldam ſcopa regia Plinii, inter Sideritides

l. 25. c. 5. & Tuſiſilago altera, quæ quibuldam Salvia,

Plinii l. 26. c. 6. cum qua in multis convenit: aliis

Phorbion Galeni: aliis Baccharis Dioſcoridis

l. 3. c. 51. aliis Scordium alterum Plinii l. 25. c. 6.

quibuldam Aleærolophos Plinii l. 27. c. 5. in cuius

descriptione ſeminis forma & uſus, cum Sclarea ſemine convenit: aliis Horminum ſativum

Dioſcoridis.

### IV. Horminum luteum glutinoſum.

Orvala 3. Dod.

Colus Jovis, Ad. Lob. Cluſ. Pan. Lugd. Cam. Eyst.

Melinum, Cæf.

Galeopsis lutea Dalechampi, Lugd.

Horminum ſyl. 2. Cluſ. hist.

Camphorata quibuldam, quia ſummitas Camphoram redolet: Sphacelus aliis, quod ejus ſuccus in ulceribus malignis valeat. Stachys Plin.

quibuldam.

V. Horminum ſyl. latifolium verticillatum.

Horminum ſyl. 1. vel ſyl. latifolium alterum, Cluſ.

pan.

Horminum ſyl. 3. Eid. hist.

VI. Horminum pratense foliis serratis.

Salvia agrestis, Brunf. flore purpureo, Eyst.

Salvia ſyl. vera, Trag. ſyl. Gef. hor.

Horminum ſyl. Fuch. Dodon. gal. Tur. Cord.

Dioſc. Gef. hor. Lon. Ad. Lob. Lugd. Cam. majus

Thal.

Horminum ſyl. 2. vel ſyl. 4. flore violaceo, Cluſ.

pan.

Hormini quarti species 1. Eid. hist.

Orvalæ ſyl. species 4. Dod.

Sideritidis Heracleæ species, Fracast.

Gallitricum vulgo, Cæf.

Sclarea ſyl. Tab.

Colus Jovis, Ger. ico. Eyst.

Quibuldam Verbenacæ rectæ genus: aliis Aleærolophos Plinii.

Hujus differentiarum plures, florum colore non

nihil differentes: ut flore cæruleo, violaceo, rubro

cundo: Sic Camerarius absque ullo flore peragat

statem, sed hyeme cæruleo, lupuli odore, obdu-

vavit.

VII. Horminum pratense niveum foliis

canis.



Horminum syl. 4. niveo flore, Clus. pan.

Hormini syl. 4. altera species, Clus. hist.

Horminum syl. Ger.

Salvia syl. 4. flore albo, Tab.

Salvia agrestis flore albo, Eyst.

II X. Horminum syl. majus foliis profundius incis.

Hormini syl. 4. altera species, vel dilutioris flore,

Clus. pan. syl. 4. species 3. Eid. hist.

Pars externa non purpurascit, sed virescit: folia inferiora quasi laciniata: flos dilutioris coloris, aliquando quasi cinereus. Hoc etiam flore est minore & rubro, quod

Hormini syl. quarti species 4. Clus. hist.

IX. Horminum syl. Lavandulae flore.

Hormini syl. secundi species 3. Clus. pan. 4. species Eid. hist.

Salvia Hispanica, Tab.

Salviticum alterum, Ger.

X. Horminum syl. salvifolium majus, vel maiusculum.

Horminum syl. Matth. Cæs. Cast. Lugd.

Verbasum salvifolium, Lob. ico.

Verbasum nigrum salvifolium, Ad. Lob. ob. Lugd.

Orvala altera, Dod.

Hormini syl. tertii altera species, Clus. pan.

Hormini syl. quinti altera species, Eid. hist.

XI. Horminum syl. salvifolium minus.

Horminum syl. 3. vel Horminum syl. 5. salvifolio, Clus. pan.

Hormini syl. quinti species prior, Eid. hist.

Flos ex caeruleo purpurascens & quasi violaceus, interdum colore dilutioris, nonnunquam quasi cinereo.

XII. Horminum minus supinum.

Horminum syl. 6. sive minus supinum Creticum, Clus. hist.

XIII. Horminum angustifolium laciniatum: quod 2. est in Prodomo.

Folia inferiora aliquando in profundas lacinias divisa: aliquando Scolopendriae folia referunt.

XIV. Horminum minus album Betonicae facie: quod 3. in Prodomo.

XV. Horminum tenuifolium angustis foliis Erythrodani sylvestris longioribus, Thalii, quid?

## VERBASCUM.

VERBASCUM ΦΛΟΜΟΣ Diofcoridi lib. 4. cap. 104. ἀ φλῶ υῖο, quasi φλόγος flamma, quia huius pro elychnis usus est.

Genera summa duo Diofcoridi: album & nigrum: in albi genere mas est & femina: mas foliis albis, oblongis, angustis: femina folia brastica latiora, candida flores candidi aut ex luteo pallescentes. Nigrum foliis est albo-latiobus & nigrioribus. Est sylvestre foliis Salviae flore verticillato luteo. Sunt & Phlomisides duae hirsutae, humiles, rotundi foliis. Tertia praeter has est quae Lychnitis & Thryallis, foliis crassius ad lucernarum elychnia aptis. Et Plinio lib. 25. cap. 10. Verbasum Graeci Phlomon genera habet prima duo: album in quo mas: alterum nigrum in quo femina: tertium, non nisi in sylvis reperitur. sunt folia brastica latiora pilosa, &c. Sylvestri folia Eleliphaci alba, tenuis lignosis. Sunt & Phlomisides duae hirsutae, rotundi foliis humiles. Tertia Lychnites vocatur, ab alia Thryallis, tam ad lucernarum. lumina apta.

I. Verbasum mas latifolium luteum.

Verbasum 1. Matth. Cord. in Diof. Lugd. Cæs.

Verbasum mas, Ang. Ad. Cast. Tab.

Verbasum candidum mas, Lac. Lon. albi mas, Thal.

Verbasum latius, Dod. latifolium mas, Eyst.

Verbasum mas & Candela regia, Lob.

Verbasum aut Phlomos vulgaris mas, Lob.

hapius barbatus, Ger.

II. Verbasum mas angustioribus foliis flos pallidis.

Verbasum 2. Matth. Lac. Cast. Lugd.

Verbasum syl. majus, Lon.

III. Verbasum femina flore luteo magno.

Verbasum sive candela regia, Trag.

Verbasum nigrum, Fuch. Lon.

Verbasum album femina luteo flore, Dod. gal. Lugd.

Verbasum album mas, Ang.

Verbasum maximum album femina flore subpallido, Lob. ico.

Verbasum alterum flore aureo, Cæs.

Verbasum luteum, Tab.

Verbasum lychnite minus, Ger.

IV. Verbasum femina flore albo.

Verbasum sylvestre, Trag.

Verbasum candidum mas, Fuch. Dod. gal. Tur.

Gei. hor.

Verbasum 3. flore candido, Cæs.

Verta-

Verbasum album fœmina, Ang. Lon.

Verbasum angustius, Dod.

Verbasum flore albo, Tab.

Thapsius barbatus maximus odoratus Septentrionalium, Ad. fœmina flore albo, Lob. ico.

Thapsius barbatus flore albo, Ger.

Varietas in foliis observatur, quam notarunt nomine

Verbasci albi 2. Tab.

Verbasci albi, Ger.

V. Verbasum Lychnitis flore albo parvo.

Verbasum 1. Brunf.

Verbasum lychnite, Matth. Lac. Tab. Ger.

Verbasum candidum fœmina, Fuch. Gef. hor.

Verbasum albi fœmina, albo flore, Dod. gal. Lugd.

Verbasum fœmina, Ad. Lob. obl. Lugd.

Verbasum 4. Cæf. Eyst.

Phlomos mas alter, Lob. ico.

Phlomos lychnitis, Lugd.

Verbasci 3. altera species, Cast.

VI. Verbasum nigrum folio papaveris corniculati: & Cam.

Verbasum aliud, Matth.

Verbasum laciniatum, Lugd.

Verbasum syl. 3. Dod.

Verbasum syl. salvisoliu, fruticosum, lignosum, Ad.

ubi legendum Verbasum purpur. Erucæfolium.

Verbasum syl. Salviflorum laciniatum, Lob. ob.

Verbasum Intubaceum, Tab.

VII. Verbasum nigrum flore ex luteo purpurecente.

Verbasum nigrum, Trag. Dod. Lob. ico. Tab. Ger.

Verbasum 3. Matth. Lac. Cast. Lugd.

Verbasum syl. Fuch. Tur. Gef. hor. syl. minus, Lon.

Verbasum nigrum salvisolium purpureo flore, Ad. Lob.

Verbasum nigrum latifolium, Thal.

Blattaria Plinii, seu Verbasum nigrum, Eyst.

## BLATTARIA.

**B**LATTARIAM Plinius l. 25. c. 9. sic expressit: Est similis Verbasco herba, quæ sæpe fallit pro ea capta, foliis minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abjecta blattæ in se contrahit, idcoq; Romæ Blattariam vocant, hæc ille. Hoc Dioscorides l. 4. c. 104. Verbasco sylvestri cui flos est aureus tribuit.

I. Blattaria lutea folio longo laciniato.

Blattaria, Trag. Matth. Ang. Fuch. Dod. Gef. h. (&

Verbasci nigri species) Lon. Lug. Cast. Tab. Ger.

Chrysogonum, an potius Blattaria Plinii, Ad.

Blattaria, Lob. Plinii, Eid. ico.

Blattaria flore luteo, Eyst.

Flore variat: alterius ex citrino purpurecente: alterius ex flavo cædus: alibi flore prorsus candido.

IX. Verbasum foliis subrotundis flore Blattariæ: in Phytopinacæ & Prodromo describitur.

IX. Verbasum humile Creticum laciniatum.

Arcturus Creticus, Belli ep. i. ad Clus. Ponæ.

Verbasum Brasicæ folio, Col.

Verbasum fruticosum auriculatum, Ponæ Ital.

Variat: nam illud foliis est latioribus, capitulis rotundis: est & alterum, longioribus & angustioribus foliis, capitulis oblongiusculis, & hoc est Arcturi secunda species, Ponæ Ital.

Verbasum Salvifolium.

I. Verbasum latis Salviæ foliis.

Verbasum syl. Matth. Ang. Lac. Gef. hor. Lugd. Clus. hiip. & hist. Cast.

Verbasum syl. alterum, Dod.

Verbasum syl. Salvifolium fruticosum lignosum, Ad.

Verbasum salvisoliu fruticosum, luteo flore, Lob.

Verbasum syl. foliis Salviæ, Cam.

Verbasum 4. Lob. ico. 7. Cæf.

II. Verbasum angustis Salviæ foliis.

Verbasum syl. Dod. Gef. hor. Lugd. Cæf.

Verbasum syl. Salvitenuifoliu Norbonensiu, Ad.

Verbasum syl. foliis Salviæ tenuifoliæ, Lob.

Phlomis lychnitis, Clus. hiip. & hist. Lugd. duplici figurâ.

Salvia syl. Monspeliensium, Gef. hor.

Hæc Angarathaliquibus dicitur.

III. Verbasum acuto salviæ folio.

Phlomis lychnitis altera Syriaca, Lob.

Verbasum syl. folio Salviæ tenuifoliæ, Lugd.

IV. Verbasum subrotundo Salviæ folio.

Verbasum syl. Salvifolium exoticum, Lob. Lug.

Hoc Verbasci cistioidis nomine exhorto clarissimi Contareni habemus.

Verbasum leptophyllum, Cord. hist.

Verbasum nonum, Cæf.

Dnplex est: altera quatuor cubitorum, tria, quatuor, quinque & plura vascula conjuncta habens: altera humilior, singula vascula proferens, foliis multo viridioribus.

II. Blat-

II. *Blattaria alba.**Blattaria flore albo, Lob. ico. Cam. Eyst.**an Verbaſcum 5. Cæſ.**Ad Verbaſcum lychnitis referri poteſt. Variat flore parvo, coq; albo vel viridi, vel viridi purpu- raſcente & magno flore, quare hæc**Blattaria altera: illa verò**Blattaria flore viridi,**Blattaria flore ex viridi purpuraſcente dicitur, Lob. ico.*III. *Blattaria magno flore: & Lob. ico.*IV. *Blattaria purpurea.**Blattaria flore purpureo, Gef. hor. Lob. ico. Lugd. Cam. Ger.**Blattaria phœnicea, Tab.**an Verbaſcum octavum, Cæſ.**Foliis eſt nigrioribus non laciniaſis, parumque ferratis: flos modo dilute rubet, obſoleto colore purpuraſcit: quandoque nigræ violæ colore eleganti nitet.*

## ÆTHIOPI S.

**A**ῬῬΙΟΝΙΣ *Dioſcoridi lib. 4. cap. 105. folia Verbaſco ſimilia. perquam hirsuta habet, &c. Et Plinio lib. 27. cap. 4. Aethiſpis folia habet Phlomo ſimilia. magna, multa & hirsuta, &c. à loco natali forte nomen habet. quia Plinio l. c. ex Aethiopia eximia venit: hæc, inquit lib. 26. cap. 4. clauſa omnia taſtu apperiri. At lib. 24. cap. 17. Aethiopida an Meroë naſcitur, ob id Meroidum appellarunt folio Laſtuce, &c. hic ſane aliam quàm Dioſcorides intelligit.*

I. *Æthiſpis foliis ſinuſis.**Æthiſpis, Matth. Ang. Lac. Dod. Gef. hor. Lon. Cæſ. Lugd. Caſt. Tab. Ger. Eyſt.**Æthiſpis ſive philomitis, Ad. Lob.**An potius Verbaſcum lychnites Dioſcoridis: am hujus Æthiſpidis vaſcula, non ſolùm bina**ſemina nec ervi magnitudine contineant, nec radicem viſcidam habeat, neque in exiccata cornu durities ſentiat, quæ à Dioſcoride ſuæ tribuntur.*II. *Æthiſpis foliis in profundas lacinias diviſis: quæ in Prodromo deſcribitur.*

## VERBASCULUM ſeu PRIMULA VERIS.

**P**RIMULÆ VERIS, *quod primo Vere floreant, Dioſcoridi lib. 4. cap. 104. ῬῬΙΟΝΙΣ & Plinii lib. 25. cap. 10. Phlomidis conſentur. Alii verò Plinii lib. 25. cap. 4. & lib. 26. cap. 11. Dodecantheon, cui ſunt folia ſeptem, Laſtuce ſimilima, à luteæ radice exeuntia. Verum apud Plinium lib. 25. cap. 10. alterum genus Alifmatis in ſylvis, nigrius, majoribus foliis, videtur.*

*Verbaſculum flore ſimplici.*I. *Verbaſculum pratense odoratum.**herba Paralyſis, Brunf. Caſt. deſc.**herba Paralyſis vulgaris, Trag. altera, Cæſ.**Dodecantheon. Ang.**Primula veris, Matth. Lugd. Tab. hortensis, Thal.**Primula veris major fl. luteis odoratis, Dod.**Primula pratensis, odora lutea, Ad. Ger.**Primula veris flore luteo, Eyſt.**Primula pratensis, Lob.**Primula veris flavo flore elatior, Cluſ. hiſt.**Verbaſculum odoratum, Fuch. Dod. gal.**Arthritica, Gef. hor. ſimplex luteo flore, Cam.**Alifma pratorum, Col.*II. *Verbaſculū pratense vel ſylvaticū inodorū.**herba Paralyſis alba, Brunf. ſyl. Trag.**Primula veris altera, Matth. Lugd.**Verbaſculum non odoratum, Fuch.**Verbaſculum album, Dod. gal.**Primula veris major, (fl. albidis inodoris) Dod.**Primula pratensis pallida, Ad.**Primula pratensis inodora luteo pallida, Lob.**Primula veris, Paralyſis ſyl. Thal.**Primula ſyl. 3. Tab.**Primula veris pallido flore elatior, Cluſ. hiſt.*III. *Verbaſculū ſylvarū majus ſingulari flore.**Verbaſculum minns, Dod. gal.**Primula veris minor, Eid. Lugd. Ger.**Primula ſylvarum, Ad. Lob. Lugd.**Arthritice ſpecies flore ſingulari, Gef. hor.**Herba Paralyſis, Cæſ.**Primula veris pallido flore humilis, Cluſ. hiſt.**Alifma ſylvarum, Col.**Primula ſyl. 2. Tab.**Primula veris ſyl. flore pallido, Eyſt.**Arthritica caule exiguo vel nullo, Cam.**Flore eſt pallido, reperitur etiam niveo, quæ**Sylvarum primula alba, Ad.*IV. *Primula veris montana incana lutea.**Paralytica rotundifolia montana, Col.*

Hh

Fet.

*Verbasculum flore multiplici.*I. *Verbasculum hortense multiplex.*

*Arthriticæ genus dasypodium, sive densifolium, Gef. hor.*

*Arthritica pleno flore, Cam.*

*Primula hortensis Anglica flore pleno, Ad. Lob. Lugd. Ger.*

*Primulæ veris flos multiplex, Dod. multiflora, Tab.*

*Primula veris Anglicana fl. pleno, Eyst.*

II. *Verbasculum syl. magno plenoq; flore.*

*Primula veris sylvarum fl. pleno specioso, Ad. Lob. ico. Eyst.*

*Primula veris sylvarum flore multiplici, Lugd.*

*Primula veris multiflora syl. Tab. veris fl. pleno, Ger.*

III. *Verbasculum syl. minus singulari flore.*

*Primula sylvarum fl. obicure virentibus simbratis, Ad. Lob. Lugd.*

*Primulæ veris minoris altera species, Dod.*

*Primula syl. flore viridi, Tab. Ger.*

IV. *Verbasculum proliferum.*

*Primula veris flore gemino altero alteri innato, Lob. Lugd.*

*Primula veris prolifera, Tab.*

*Primula veris flore geminato, Ger. Eyst.*

*Verbasculum alpinum.*I. *Verbasculum umbellatum alpinum minus.*

*Majele, Cord. obs.*

*Ærthymbium: Gesnero, monente Cam.*

*Verbasculus alpinus sive cæruleus, Lugd.*

*Sanicula alpina minor sive media, Lob. Lugd.*

*Primula veris flore rubro, Clus. pan. & hist. Ger.*

*Arthritica flore purpureo, Cam.*

*Primula alpina media, Tab.*

*Primula veris angustifolia rubra & alba, Eyst.*

*Flore est subcæruleo, aut carnei coloris, aut dilutior purpurâ nitente, interdum saturatius rubente: raro candido & exalbido, omnes tamen circa umbellicum luteoli sunt.*

II. *Verbasculum alpinum umbellatum majus.*

*Sciscirum Simlero de alpinis.*

*Paralitica alpina, Sanicula angustifolia major, Lob. Lugd.*

*Primula veris albo flore, Clus. pan. & hist. Ger.*

*Primula alpina angustifolia, Tab.*

*Variat floris colore: est albo: rubro: rubore & candore confuso.*

*SANICULA ALPINA vel AURICULA URSI.*

**SANICULA** à sanandis vulneribus: *Auricula ursi* à forma foliorum dicitur: an Ἀσσυρία sive Δαμασκίου foliis Plantaginis sed angustioribus, & in terram convexis, &c. Dioscoridis lib. 3. cap. 169. Et Plinii lib. 25. cap. 10. *Alisma* sive *Damafonium* foliis Plantaginis, sed angustioribus, magisq; laciniosis, convexisq; in terram, &c.

*Sanicula alpina foliis serratis.*I. *Sanicula alpina lutea.*

*Sanicula sive Auricula Urfi, Matth.*

*Arthriticæ genus alpinum, & Sanicula alpina, Gef. hor.*

*Lunaria arthritica, Eid. delun. & fracto.*

*Auricula urfi, Dod. Cast.*

*Auricula urfi 1. vel luteo flore, Clus. pan. & hist.*

*Paralytica alpina, Sanicula sive auricula urfi, Lob. flore luteo, Ad.*

*Auricula urfi seu lupi, Cæf.*

*Primula veris pachyphyllas, Lugd.*

*Auricula urfi floribus luteis, Cam. Tab. Eyst.*

*Alisma sive Damafonium Dioscoridis, Col.*

*Variat foliis & floribus: foliis laxibus & viridibus, interdum incanis vel canescentibus: densioribus, tenuioribus: majoribus & minoribus: floribus pallidis, luteis, aureis, rariisimè candidis vel cæruleis, iisque modò majoribus, modò minoribus, modò denis, vicanis, tricenis, hinc*

*Auricula urfi floribus pallidis & candidis,*

*Auricula urfi floribus luteis,*

*Auricula urfi fl. aureis & cæruleis, Tab.*

II. *Sanicula alpina purpurea.*

*Britannica, Ang.*

*Arthriticæ species flore purpureo, Gef. hor.*

*Paralytica alpina, Sanicula flore purpureo, Ad.*

*Auricula urfi, Cast. ico. flore purpureo, Lob. ico.*

*Auricula urfi suaverubens, Ger.*

*Auricula urfi 2. Clus. pan. & hist.*

*Primula alpina latifolia, Tab.*

*Sanicula alpina rubra, Eid.*

*Flore est purpurascens, rubescens sanguinis modo, & atro colore.*

III. *Sanicula alpina foliis rotundis.*

*Auricula urfi 5. Clus. hist.*

*Hæc etiam minoribus foliis reperitur, quæ Auriculæ urfi 5. similis, Clus. ap. alt. auct.*

IV. *Sanicula alpina flore variegato,*

*Auricula urfi 3. Clus. pan. & hist.*

Auri-

*Auricula urfi floribus guttatis*, Tab.  
*Floribus est rubris, albis maculis aspersis.*  
 V. *Sanicula alpina angustifolia.*  
*Auricula urfi* 5. Clus. pan. 7. in hist. at 8. in cur. post.  
*Auricula urfi* 8. Tab. flore purpureo, Ger. Eyf.  
 Flores dilutè rubent: huic similis brevioribus tamen foliis, cujus Clus. in cur. post. meminit.  
 VI. *Sanicula alpina foliis quasi farinâ aspersis.*  
*Auricula urfi* 7. Clus. cur. post.  
 Flores exalbidi carnei colore perfusi.  
 VII. *Sanicula alpina minima carnea.*  
*Arthritica cæreuleis flosculis*, Gef. hor.  
*Sanicula alpina minima*, Lob. Lugd. Tab.  
*Auricula urfi* 6. Clus. pan. 8. Eid. hist. 10. cur. post.  
*Auricula minima*, Ger.  
 IX. *Sanicula alpina minima nivea.*  
*Auricula urfi minima flore niveo*, Clus. pan. & hist. Tab. Ger.  
*in Auricula urfi flore albo*, Eyf.  
 Folia palleſcunt & flos omnino niveus, cum illius viridia folia & flos dilutè rubens sive carneus.  
 IX. *Sanicula alpina foliis borraginis villosa.*  
*Auricula urfi Myconi*, Lugd.  
*Auricula urfi ex Pyrenæis*, Clus. hist. ap. alcanct.  
*Auricula urfi* 9. Eid. cur. post.  
*Sanicula foliis non serratis.*  
 I. *Sanicula alpina rubescens, folio non serrato.*  
*Auricula urfi* 4. Clus. pan. & hist. 7. Tab.  
*Auricula urfi rubescens*, Ger.  
 II. *Sanicula alpina alba foliis non crenatis.*  
*Auricula urfi* 6. Clus. hist.  
 Similis flore pallido, quæ  
*Auricula urfi pallido flore*, Clus. cur. post.  
 III. *Sanicula alpina minima pilosâ: quæ pro in Prodomo descripta.*

*Sanicula rotundifolia.*

I. *Sanicula montana latifolia laciniata.*  
*Cortusâ*, Matth. Cast. Lugd. Cam.  
*Caryophyllata Veroncentium fl. Saniculæ urfinæ*, Ad. Lob.  
*Sanicula montana*, Clus. hist. altera, Eid. pan.  
*Sanicula alpina*, Tab. Ger.  
 Duplex figura apud Clusium, Taber. & Gerardum.  
 1. *Sanicula montana*, Clus. hist.  
*Sanicula alpina* Clusii, Tab. Ger.  
 2. *Cortusâ Matthioli*, Clus. hist. & cur. post.  
*Saniculæ alpinæ icon verior*, Tab.  
*Cortusæ rarior icon*, Ger.  
 In figura *Saniculæ* Clusii malè averſa parte puncta aspersa sunt,  
 Flore est elegantè rubro, & ad purpureum tendente: habetur & violaceis, rariùs albis floribus.  
 II. *Sanicula montana rotundifolia major.*  
*Sanicula alpina alia*, Gef. hor.  
*Garyophyllata*, sive *Geum alpinum recentiorum folio hederaceo*, Ad. Lob. ico, Lugd.  
*Sanicula montana* 1. Clus. pan. altera, Eid. hist. Eyf.  
*Sanicula alpina*, Cam. ep. guttata, Eid. hort.  
*Cortyledon* 3. Dalechampii, Lugd.  
 III. *Sanicula montana rotundifolia minor.*  
*Sanicula montana minor*, Clus. pan.  
*Saniculæ montanæ alterius species* 2. Eid. hist.  
 IV. *Sanicula montana longifolia serrata.*  
 V. *Sanicula montana flore calcarî donato.*  
*Pinguicula (vel Liparis) Gef. hor. Clus. pan. & hist.*  
*Cucullata, quibusdam Criâs Apuleii*, Lugd.  
*Pinguicula vel idem*, Viola humida aut palustris: *Dodecatheon* Plinii, Gesnero, Cam.  
 Variat floris colore, qui albus, purpureus & cæreuleus.

## DIGITALIS.

**D**IGITALIS quod flores digitale referant, nomen habet. Sunt qui ad *Verbascum*, alii ad *Alismati* genus alterum Plinii referant. At Doſiſ. Fabius Columna, *Ephemorum Dioſcoridis lib. 4. cap. 85. cenſet.*

*Digitalis folio Verbaſci.*

I. *Digitalis purpurea folio alperio.*  
*Carpanula ſyl. Trag.*  
*Digitalis rubra*, Dod. gal. purpurea, Fuch. Ang. ret. hor. & ap. Lon. Dod. Ad. Lob. Lugd. Cam. ab. Ger.

*Aralda Bononiensis*, Gef. hor.

*Verbascum digitale*, Coſtæo.

*Virga regia major flore purpureo*, Cæſ.

*Ephemeri alia species major*, Col.

Flos purpureus, nigris punctulis insignitus, ruber, incarnatus, sive ex purpureo candidus intus

Hb 2 pun-

punctatus: aliquando flores in rotundam spicam in gyrum coli effigie in summo dispositi rufescunt ex luteo, intus guttis purpureis asperis, hinc Digitalis flore rubro, & flore incarnato, Eyst.

I. Digitalis alba folio aspero.

Digitalis 2. Dod. alba, Lob. Lugd. Eyst.

Virga regia major flore pallido, Cæf.

Ephemer altera species major candida, Col.

Flos nivei candoris, intus nigris punctis intercurfantibus.

*Digitalis folio virecente.*

I. Digitalis lutea magno flore.

Campanula syl. flore luteo, Trag.

Digitalis lutea, Fuch. Ang. Lon. Thal. Lugd. Cam.

Tab. Ger. flore luteo, Eyst.

Digitalis minor, Gef. hor. flore minore, Eid. col.

Digitalis lutea flore amplo, Ponæ.

Digitalis 3. Dod.

Calathiana viola Plinii, Dalech. in Plin.

Ephemerum Dioscoridis, Col. (vario.

Flore est luteo: pallido, rarissime albo: & intus

II. Digitalis major lutea vel pallida, parvo flore.

Digitalis major, Gef. hor. 4. Dod.

Digitalis flore minore albidior, Gef. col.

Digitalis lutea, Ad. parva, Lob. ico. sub ramo minore exprimitur.

Virga regia: Alisma & Damasonium Dioscoridis, & Fistula pastoris Avicennæ, Cæf.

III. Digitalis minor luteo parvo flore: in Prodromo descripta.

IV. Digitalis angustifolia lutea.

Digitalis lutea parva, Lob. ico.

V. Digitalis angustifolia flore ferrugineo.

Digitalis gilvo flore, alias ferrugineo, Lob.

## E P H E M E R O N.

Cum doctissimus Fabius Columna, Digitalē censet esse Ephemerum Dioscoridū, pauca aspergamus. E' d' u' m siue l' eis a' z' e' i' a caulem & folia liliū habet sed hac tenuiora: flores candidos, amaros, semen molle, radicem unam digitali crassitudine, longam astringentem, odoratam, &c. Dioscoridi lib. 4. cap. 85. Ephemerum folia habet liliū, sed minorā, caulem parem, florem caruleum, semen supervacuum, radicem unam digitali crassitudine, Plin. lib. 25. cap. 13. Subjiciamus & Matthioli & Lobelii Ephemerum utrumque nobis incognitum.

I. Ephemerum quod aliqui sylvestrem Irin appellant, Matth. Lacunæ, Cast. desc.

Ephemerum non lethale Matthioli, Lugd. Tab.

Ephemerum Matthioli, ex spuris appositis plantis esse videtur, Colum.

II. Ephemerum Matthioli, vel potius Ephe-

merum spurium, Lob. Dod.

Has duas eandem esse vix credimus: cum illi folia liliū & radix unica digitali crassitudine tribuatur: huic verò folia & radix Isatidis adscribuntur: imò figurarum nulla est similitudo: & Lobelii potius Lysimachiam aliquam referat.



# LIBER SEPTIMVS.

## SECTIO PRIMA.

LYSIMACHIA; VERONICA; TEUCRIUM; SCOR-

DIVUM; CHAMAEDRIS; CHAMAEPYTIS; ALSINE; SPERGULA;

Anagallis; Elatine.

## L Y S I M A C H I A.

ΛΥΣΙΜΑΧΙΟΝ & ΑΥΤΡΟΝ Dioscoridi l. 4. c. 3. caules emittit cubitales fruticosos, folia salignis similia, flos flavus aureusve, &c. Sic dicta à Rege Lysimacho Agathoclis filio, ejus inventore: folia habet Salicaria viridia, florem purpureum (aureum habet vetus) fruticosa, &c. Plinius l. 25. c. 7. addit tantam ei vim esse, ut jumentis discordantibus iugo imposita asperitatem cohibeat. Unde videtur innuere; Quod tō rās ad hoc dicitur dictam esse. Salicaria etiam, a foliorum cum salicis foliis similitudine vocatur. Hujus species est filiquosa, quæ a filiquale sætu præconi, qui aucta & incremento florum eruptioni antevertit; quasi proles parente prior, Filius ante partem vocatatur.

Lysim.

*Lysimachia lutea.*

I. *Lysimachia lutea* major: quæ Dioscoridis.  
*Lysimachia lutea*, Trag. Fuch. Tur. Ang. Ad. Lob.  
 Cæf. Tab. Cam. Ger. Eyst. lutea communis, Cluf.  
 hist.  
*Lysimachia*, Matth. Lac. Lugd. 1. Lon.  
*Lysimachia vera*, Cord. in Diosc. falsâ, Cast.  
*Lysimachium verum*, Dod. gal. legitimum, Eid.  
*Lysimachium luteum*, Gesl. hor. Thal.  
*Salicaria*, Gesl. hor.  
 Foliis nunc ternis, nunc quaternis, nunc binis  
 reperitur.

II. *Lysimachia lutea minor*, foliis nigris punctis notatis.  
*Lysimachia lutea* in alis foliorum florens, Cæf.  
*Lysimachia lutea altera*, Cluf. pan. & hist.  
*Lysimachia flore luteo* majore, Cam.  
*Lysimachia lutea Pannonica* major, Eyst.  
 Foliis est quaternis, etiam ternis.

III. *Lysimachia trifolia lutea* spicata.  
*Lysimachia lutea altera* E. & B., Col.

IV. *Lysimachia bifolia flore globoso luteo*.  
*Lysimachia lutea altera*, Lob. Cluf. hist.  
*Lysimachium aquatile*, Dod. belg.  
 Addit Clusius *Lysimachiam luteam* 3. sive minorem, quæ à priore solum radice & caule, quæ melius exprimuntur, differt.

V. *Lysimachia lutea corniculata*.  
*Lysimachia* Virgineæ nomine ipsum semen Patavio missum quod anno 1619. in horto eleganter crevit & ex semine deciduo se facillè hætenus propagavit.

*Lysimachia filiquosa.*

I. *Lysimachia filiquosa hirsuta* magno flore.  
*Lysimachia* seu *Salicaria altera*, Trag.  
*Lysimachia purpurea*, Fuch.  
*Lysimachia purpureæ* primū genus, Eid. ico. Tur.  
*Lysimachium purpureum* 1. Dod. gal. Lugd.  
*Antoniana* major hirsuta, Gesl. hor.  
*Epilobii* 4. species, Gesl. ad Cord.  
*Lysimachia filiquosa*, Ger. 1. Tab.  
*Lysimachia* 2. & 3. flore purpureo vel rubro, Lon.  
*Lysimachii majoris purpurei* 1. species, Thal.  
*Onagra campestris hirsuta*, Cæf.  
 Flore est majore violaceo, purpureo.

II. *Lysimachia filiquosa hirsuta parvo flore*.  
*Lysimachia filiquosa* 2. Tab.

Major est & minor, utraq; in Prodr. descripta.

III. *Lysimachia filiquosa glabra* major.

S. Antonii herba 3. Gesl. ad Cord. cui & filius ante patrem.

*Lysimachia filiquosa*, Ad. Lob. Cast. major, Cluf.  
*Pseudolysimachium purpureum* 1. Dod.

*Onagra* genus alterum, Cæf.

*Lysimachia filiquosa flore albo*, Tab.

*Lysimachia campestris*, Ger.

*Lysimachii majoris purpurei* 2. species, Thal.

Flore est parvo pallide rubente, rarius albo: quibusdam Delphinium Dioscoridis cœnetur.

IV. *Lysimachia filiquosa glabra minor*.

Filius ante patrem minor, Gesl. col.

*Lysimachia filiquosa* varietas, Ad.

*Lysimachia* medium genus, Thal.

*Lysimachia minor* & 3. Tab.

Flores rubicundiores: alii ex rubicundo pallidiores: alii prorsus candidi.

V. *Lysimachia filiquosa glabra angustifolia*.

*Lysimachia media* altera species, Thal.

*Lysimachia filiquosa minor* & 7. Tab.

*Chamænerion*, Ger. ico.

VI. *Lysimachia Chamænerion dicta latifolia*.

*Antoniana*, sive S. Antonii herba maxima, Gesl. hor. ap.

*Chamænerion* & *Epilobion*, Gesl. ad Cord. Eyst. Thal. cui &

*Lysimachia omnium maxima*.

Filius ante patrem maximus, Gesl. col.

*Onagra*, Lugd. Cæf.

*Lysimachia* vulgo altera, Cam.

Sub *Chamadaphne* male in Matth. meo Typographi errore posita, cū ad *Onagræ* caput pag. 816. reponi debuisset, ut ex synonymiis, quilibet tātulum in plantis versatus, colligere potest.

*Onagra Dioscoridis* l. 4. c. 118. & *Oenothera Plinii* l. 26. c. 11. & 14. censetur: flore est cæruleo, rarius albo, ut & sublequens. (folia.

VII. *Lysimachia Chamænerion dicta angustifolia*.  
*Epilobium* (id est *επιλόβιον* viola super filiquā) sextum, Gesl. ad Cord.

*Pseudolysimachium purpureum minus*, Dod.

*Lysimachia filiquosa* varietas altera, Ad.

*Chamænerion Gesneri*, seu *Delphinium buccinum*, Diosc. Lob.

*Lysimachia filiquosa alia*, Lugd. 3. Cluf. hist.

*Lysimachia* species in uliginosis, Thal.

*Linaria rubra*, Lugd.

IX. *Lysimachia Chamænerion dicta alpina*: quæ in Prodro. describitur.

*Lyfimachia spicata.*

I. *Lyfimachia spicata* purpurea, fortè Plinii.  
*Solidaginis Sarracenica* alia species, Trag.  
*Lyfimachia altera*, Matth. Lac. Lugd. Cast. Eyft.  
*Lyfimachium purpureum*, Gef. hor. Thal.  
*Lyfimachium purpureum alterum*, Dod. gal.  
*Lyfimachia* 3. Tur.  
*Lyfimachia* fortè Pliniana, Ad.  
*Lyfimachia purpurea*, Lob. Cæf. Cam. Tab.  
*Lyfimachia flore purpurascens*, Ang.  
*Pseudolyfimachium purpureum alterum*, Dod.  
*Lyfimachia purpurea communis major*, Cluf. hist.

*Lyfimachia purpurea spicata*, Ger.

Folia bina communiter, aliquando terna, rarius quaterna, simul caulem ambiunt.

II. *Lyfimachia spicata cærulea*.  
*Lyfimachium cæruleum*, Dod. gal.  
*Lyfimachii* 3. genus, Dod. Gef. hor.  
*Pseudolyfimachium cæruleum*, Dod.  
*Lyfimachia cærulea hortensis*, Ad. Lob. Lugd.  
*Lyfimachia cæruleo flore*, Cluf. hist.  
*Veronica recta cærulea*, Eyflett.

*Lyfimachia non spicata.*

I. *Lyfimachia rubra non siliquosa*.  
*Lyfimachia* 2. vel minor rubro flore, Cluf. pan.  
*Lyfimachia purpurea* 2. five minor, Eid. hist.  
 II. *Lyfimachia linifolia purpurocærulea*.  
*Lyfimachia rubra minima*, Cluf. hist.  
 III. *Lyfimachia cærulea galericulata*, vel *Gratiola cærulea*.  
*Lyfimachia galericulata*, Lob. Lugd. Cluf. hist.  
*Lyfimachia flore cæruleo galericulato*, Cam.  
*Sideritis cærulea*, Thal.  
*Gratia Dei*, Cæf.  
*Tertianaria*, Tab.

*Herba judaica altera*, Dod. belg.

Hæc in Anglia flore albo quoq; reperitur.

## EXOTICA.

I. Poutiou ex Malacca ad febres abigendas: par. 4. Ind. or. 8.

II. *Sary* feu pollen, quo corpus inungentes contra ventorum vim feturos afferunt, l.c.

III. *Sodouwaya* in Java oblinendo corpori idonea, l.c.

IV. *Surahan*, vili pretio venditur, l.c.

## VERONICA.

**V**ERONICA, apud recentiores herba est celebratissima, Græcis & Latinis scriptoribus fortè incognita, quàmvis Dodonæus velit esse *Betonica* Pauli l. 7. *Casalpinus* verò ad *Myosotidem* *Dioscoridi* l. 2. cap. 214 at *Columna* ad *Alysson* *Dioscoridi* l. 3. c. 105. referendam censet. Germani *Ehrenpreiſſ* & *Grundheil* ob manifestam facultatem ulcera ac vulnera sanandi.

I. *Veronica mas erecta*.  
*Veronica mas*, Matth. Ang. Lugd. Cast.  
*Veronica affurgens*, Dod.  
*Veronica recta mas*, Lob. vulgaris recta, Cluf. hist.

Duplex est: major & minor: illa latiore folio & longiore spica: hæc angustiore folio & brevior spica,

II. *Veronica mas supina & vulgarissima*.  
*Teucrium*, Trag.  
*Veronica mas*, Fuch. Lon. Lugd. Thal.  
*Veronica mas serpens*, Dod.  
*Betonica* Pauli, Dod. gal.  
*Veronica vulgo dicta*, Gef. hor.  
*Veronica vera & major*, Ad.  
*Veronica major septentrionalium*, Lob.  
*Veronica*, Tab. vera & major, Lob. ico. Cam. Ger.  
*Veronica vulgaris supina*, Cluf. hist.

*Veronica humicaulis & supina*, Col.

*Auricula muris* 3. Cæf.

Floribus est subcæruleis, rarius candidis, reperitur nonnunquam foliis vulgaræ forma quidem similibus, sed triplo minoribus.

III. *Veronica spicata latifolia*.  
*Veronica prima*, vel major latifolia, Cluf. pan.  
*Veronica erectior latifolia*, Eid. hist.  
 Alia est foliis atrovirentibus & splendentibus: in altera nec splendent, nec adeo atra sunt: spica etiam in alia oblongior.

IV. *Veronica spicata angustifolia*.  
*Veronica recta herbariorum*, Lob. Lugd.  
*Veronica recta vulgaris major*, Cluf. hist.  
*Auricula muris* 4. Cæf.  
*Veronica recta* 1. & 2. Tab. affurgens, Ger.

*Veronica spicata cærulea*, Cam.

Variat foliis latioribus & paulò angustioribus: spica florum cæruleorum, & spica dilucent.

Addit



Addit Clafius in hift. alterius figuram, quam à prioribus non diftinguo, nomina  
 Veronicæ fecunda: erectioris anguftifoliæ.  
 V. Veronica fpicata minor.  
 Veronica recta minima, Eob. Lugd. Ger. Claf. hift.  
 Veronica recta minor, Cluf. pan. Tab.  
 Flore eft cæruleo, rarius albo.  
 VI. Veronica pratensis ferpillifolia.  
 Eufragia, & Eufragia nobilis, Brunf.  
 Teucrium alterum, Trag.  
 Veronica femina, Dod. gal. Lugd. Thal.  
 Betonica Pauli, Turn. Gefn. hort. quorundam, Cam.  
 Veronica pratensis, Dod.

Veronica minor ferpillifolia, Ad. Lob.  
 Auricula muris i. in pratibus, Cæf.  
 Foliis eft communiter integris, rariffimè cre-  
 natis: floribus cæruleis, frequentius pallidis & di-  
 lutis: hinc  
 Veronica minor, Tab. Ger.  
 Veronica minor femina flore candido, Tab.  
 fub  
 Veronica recta mare, apud Ger.  
 VII. Veronica alpina frutefcens.  
 Veronica 3. fruticans, Cluf. pan. & hift.  
 Veronica alpina ferpillifolia, Ponæ.  
 IIX. Veronica alpina bellidis folio hirtuta  
 in Prod. defcripta: quæ duplex eft maior &  
 minor.

## T E U C R I U M.

**T**ΕΥΚΡΙΟΝ Diofcoridi l. 3. c. 111. (eò quod Teucri ejus inventor exiftimetur Plinio l. 25. c. 5. auctore) & χαμαίς ex aliorum fententia. Plinio l. 6. & l. 26. c. 8. Teucrium.

I. Teucrium.  
 Teucrium 2. Matth. Lugd. t. Tab.  
 Teucrium, Fuch. Ang. Dod. gal. Cord. in Diofcor.  
 Lac. Lon. Ad. Lob. Cæf. Caft. verum, Gef. hort.  
 Eyst.  
 Chamædrys altera feu affurgens, Dod.  
 Teucrium vulgare fruticans, five 1. Cluf. hift.  
 Teucrium latifolium, Ger.  
 II. Teucrium foliis Scorodoniz.  
 Teucrium verum, Cam.  
 III. Teucrium Creticum incanum.  
 Teucrium Creticum, Cluf. hift.  
 IV. Teucrium peregrinum folio fimiofo:  
 an Paderota, Paulaniæ?

Teucrium Boeticum, Cluf. hifp. Lugd. Tabern.  
 Ger.  
 Teucrium fruticans Boeticum, Cluf. hift.  
 Camerarius, Teucriti Boetici, quod à Clufii di-  
 verfum fit & Teucriti Belgici, folo nomine memi-  
 nit: fed quid utrumq;?  
 V. Teucrium alpinum inodorum magno flo-  
 re: in Prodromo defcriptum.  
 VI. Teucrium alpinum coma purpureo cæ-  
 rulea.  
 Clinopodium alpinum, Ponæ.  
 VII. Teucrio affinis, Chamærops.  
 Chamærops, Plinii l. 26. c. 7. Lugd.

## S C O R D I U M.

**Σ**ΚΟΡΔΑΙΟΝ Diofcoridi l. 3. c. 125. quod Allium aliquantum redoleat: at Galenus 8. fimpl. propter acri-  
 moniam Scorodo, id eft Allio ad fimilem, nomen fortitum putat: quibusdam, Cratæ auctore, μνδερβ-  
 ιος, ab inventore dicitur: Plinio l. 25. c. 6. Scorodotis five Scordion.

Genera: Græci unus meminere: at Plinius l. c. duplex habet: alterum foliis lanuginofis querna fimilitudine:  
 11. & alterius generis latioribus foliis mentaſtro fimilibus, &c.

I. Scordium.  
 Scordium, Trag. Matth. Dod. Lac. Tur. Lon. Ad.  
 Cæſ. & Trixago paluſtris) Lob. Caſt. Lugd. Cam.  
 Eyst.  
 Scordium verum, Gef. hor.  
 Scordium commune, Ang.  
 Scordium, Tab. minus, Ger.  
 Magnitudine variat: hinc figuræ tres apud Ta-  
 cæmonæum

Scordii majoris & medii nomine;  
 Scordium majus & minus, Ger.  
 II. Scordium lanuginofum.  
 Scordium Creticum lanuginofum, Cam.  
 III. Scordium alterum, five Salvia ſylve-  
 ſtris.  
 Salvia ſyl. Trag. (& Nepeta altera) Lon. Tab.  
 Sphacelus ſyl. Dod. gal.  
 Scorodonia, Cord. in hift. Thal. Ger.

Salvia

Salvia montana & Ambrosia quibusdam, Gef. hor.

Scordium majus Plinii, Eid.

Scordium alterum Plinii, Ad. Lob. Cam.

Salvia agrestis sive Sphacelus. Dod. Lugd.

Melinum alterum brevius. Cæf.

Scordium 2. foliis amplis instar Melissæ, vel Calaminthæ primæ, in Samnitibus ad ripas Phicaræ nasci, Anguillara scribit: idemque in Græcia re-

periri, quod odore & qualitate à primo dissimile non sit.

IV. Scordium alterum lanuginosius verticillatum.

Scordotis Plinii, Hon. Belli, ep. 5. ad Clus.

Scordotis legitimum Plinii, Ponæ.

V. Scordio affinis, Elephas ob florem. Elephas Campoclaresium, Col.

## CHAMÆDRYS.

**X**ΑΜΑΙΔΡΥΣ Dioscoridi l. 3. c. 112. quasi humilis quercus, quod folia Quercus habeat, & hujus resplenda quasi humi repat: cui & χαμαίδρως & quibusdam ἁλυνόριον, propter similitudinem cum Teucrio. Trifaginem Gazæ vertit apud Theoph. 9. hist. 10. Sic Plinio l. 24. cap. 15. Chamædrys quæ latine Trifago, quam aliqui Chamædropem alii Teucrium appellaverunt. Sic alii Serrata, à foliis serratis, à qua serram inventam dixere & Quercula minor.

\*Unius solum apud Dioscoridem & veteres mentio fit.

I. Chamædrys arborea Ægyptiaca.

Chamædrys arborea in Insula Cocyræ, Alp.

Ad cubitos duos exurgit, foliis duplo aut triplo, quàm in Italica majoribus.

II. Chamædrys major repens.

Trifago, seu Chamædrys, Matth. Lugd.

Trifago, Lac. Trixago, Cast.

Chamædrys, Ang. Ad. Lob. Cæf. major, 1. Clus. pan.

Chamædrys major repens, Dod.

Chamædrys mas, Cam.

Chamædrys major 1. & 2. Tab.

Chamædrys major, & Chamædrys latifolia, Ger.

Folio majore & minore variat: floribus item albis ac rubellis in eadem planta.

III. Chamædrys minor repens.

Chamæpitys, Brunf.

Chamædrys, Dod. gal. Cord. hist. Gef. hor. Tab. Eyf.

Chamædrys vera, Trag. Tur. Cord. in Diosc.

Chamædrys vera mas, Fuch.

Chamædrys vulgaris mas, Lon.

Chamædrys major, Lob. ico. Lugd. minor, Ger.

Chamædrys repens minor, Dod.

Chamædrys major, vel 2. Clus. pan.

Chamædrys vulgaris, vel 2. Eid. hist.

Flore est purpurea, rarius nivea.

IV. Chamædrys spinosa: in Phytop. Matthiolo & Prodromo descripta.

V. Chamædrys alpina Cisti flore.

Cervaria, Gef. hor.

Herba cervi quibusdam, Eid. fra. co.

Chamædrys montana frutescens durior, Ad. Lob.

Chamædrys 3. sive montana, Clus. pan. & hist.

Chamædrys montana, Lugd. Tab.

Chamædrys alpina Simleri, Cam.

Argentina Mompelliaca, Tab.

Teucrium alpinum Cisti flore, Ger.

VI. Chamædrys alpina saxatilis.

Teucrium 3. Clus. pan. 6. pumilum, Eid. hist.

Veronica petraea sempervirens, Ponæ.

VII. Chamædrys alpina minima hirsuta, quarto loco in Prodromo descripta.

an Teucrium minimum, Clus. hist.

VIII. Chamædrys unicaulis spicata.

Trixago Apula unicaulis, Col. cui forte Verberna recta Dioscoridis.

IX. Chamædrys Austriaca foliis tenuissimis laciniatis: quæ 2. in Prodromo.

X. Chamædrys Hispanica foliis tenuissimis divisis: 3. in Prodromo.

XI. Chamædrys spuria major latifolia.

Veronica maxima, Lugd.

an Chamædrys mas altera, Cam.

XII. Chamædrys spuria major altera, sive frutescens.

Teucrium 1. vel Teucrium majus pannonicum latifolium, Clus. pan. at in hist.

Teucrium quartum.

Hujus duæ species: altera virgis erectis caulibus quadrangulis, nonnunquam rotundis, magis minusq; hirsutis lignescentibus & ex una ala cōmuniter cauliculis quatuor prodeuntibus, foliis laevibus

ribus: altera virgis humi diffusis, frequentibus, ut interdum magnos cespites late tegant, foliis minoribus & flore dilutioribus: & hæc est Teucris quarti species secunda, Clus. hist.

XIII. Chamædrys spuria hederacea repens, sive Scutellata repens.

Chamædrys hederacea, in Cat. Altorff.

XIV. Chamædrys spuria major angustifolia. Chamædrys altera, Trag.

Teucris 1. Matth. Lug. 2. Tab.

Chamædrys vulgaris mas, Fuch. Tur. Lug.

Hierobotane femina, Dod. gal. Lugd.

Pseudochamædrys, Gef. hor.

Chamædrys syl. Dod.

Veronica supina facie Teucris pratensis, Lob. ico.

Auricula muris 5. Cæf.

Teucris quarti species tertia, Clus. hist.

XV. Chamædrys spuria minor rotundifolia.

Chamædrys, Brunf. falsa, aliquibus Teucris, Gef. hor.

Chamædrys vulgaris femina, Fuch. Tur. Lon. Lugd.

Hierobotane mas, vel Verbenaca supina mas, Dod. gal. Lugd.

Teucris species quam Chamædryn vocant, Cord. in Diosc.

Teucris pratense, Ad. Lob. & Teucris spuris Chamædryoides, Lob. ico.

Pseudochamædrys, Thal.

Auricula muris 6. Cæf.

Teucris 3 minus, Tab.

Chamædrys sylv. Ger. Clus. hist.

Alia caulibus altioribus, foliis rotundioribus, amplioribus, flore cæruleo; alia folio rotundiore, sed minore, hispidiore, denato.

XVI. Chamædrys spuria minor latifolia.

Teucris 2. vel Teucris pannonicum minus, Clus. pan. at 5. Eid. hist.

Teucris pannonicum, Tab. Ger.

Flos aut cærulei saturati coloris aut dilutioris & quasi cinerei: sic ex carneo candicans.

XVII. Chamædrys spuria latifolia minima.

Veronica tetragona montana recta minima, Col.

XVIII. Chamædrys spuria minor angustifolia: pro quinta in Prodrum. descripta: quam Teucris quarti speciem 3. Clus. hist. secundum descriptionem diceremus, nisi figura ejus aliam ostenderet.

XIX. Chamædry spurie affinis rotundifolia scutellata.

Alyssum Dioscoridis montanum, Col.

## CHAMÆPITYS.

**X**ΑΜΑΙΠΥΤΤΕ Dioscoridi l. 3. c. 175 & 176. quasi humilis picea, quod folia Piceam oleane. Plinio l. 2. c. 6. Chamæpitys, Latinis Ajuga appellatur, diciturque, propter abortum, ab aliis Thuis terra.

Genera tria Dioscoridi: 1. herba est quæ humi serpit incurva similis, foliis sempervivi minoribus: ac multo tenuioribus pinguioribusque, & hirsutis: floribus luteis, vel candidis: 2. cubitalibus ramis in anchora speciem incurvatis, flore candido: 3. mas est, herbula levis, foliolis tenuibus, albis, pilosis: caule scabro, candido: pusillis floribus luteis, &c. Plinio l. c. cubitalibus ramis, flore pinus & odore: altera brevior & incurva similis: tertia eodem odore, & ideo nomine quoque, parvulo cauliculo, crassitudine digitali, foliis scabris, exilibus, albis, in petris nascens.

I. Chamæpitys incana exiguo folio.

Chamæpitys 1. Fuch. Ang. Lon. (qui flores purpureos tribuit.)

Chamæpitys 3. Dod. Matth. ital. Lac.

Ajuga 1. Tur. sive Chamæpitys altera, Matth.

Chamæpitys 1. Dioscoridis odorator, Ad. Lob.

Chamæpitys 3. sive altera, Matth. Lugd.

Foliis est incanis, hirsutis, flosculis luteis, distincta ab Echio scorpoide, Chamæpityde vermiculata, & Anthylloide, Thalii.

II. Chamæpitys molchata, foliis serratis: an prima Dioscoridis?

Chamæpitys species Monspelii, Gef. hor.

Iva molchata Monspelientum, Ad. Tab. Ger.

Anthyllis altera, Clus. hisp. & hist. Cast. Lugd.

Anthyllis Chamæpitydes minor, Lob.

Chamæpitys spuria prior, sive Anthyllis altera, Dod.

Chamæpitys altera & major, Cæf.

III. Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido.

Chamæpitys 3. Trag. Fuch. Ang.

Chamæpitys 2. Tur. Lon.

Chamæpitys 1. Matth. Dod. Lac. Cord. hist. Lugd.

Chamæpitys, Gef. hor. Cæf. vera, Cor. in Diosc.

Chamæpitys major, Tab. mas, Ger. Eyst.

Ajuga sive Chamæpitys mas Dioscoridis, Ad. Lob.

Ajuga, Cast. tertia, Tur.  
Ajuga luteo flore, Clus. pan. & hist.  
Peristerona Cratevæ, Ang.

Flore est luteo: at Clusius in hist. nœminit Ajuga multifidis foliis flore rubescente, quod Fuchio & Dod. tertium sit.

I V. Chamæpitys cærulea Austriaca.  
Chamæpitys Austriaca, Clus. pan. & hist. Eyf.  
Chamæpitys cærulea, Cam.

Flore est cõmuniter cæruleo: rarius purpureo.  
V. Chamæpitys spuria multifido folio, Lamii flore.

Ajuga adalterina, Clus. hisp. Lugd.  
Chamæpitys spuria altera, Dod. qui duplicem figuram habet, quem Lugd. historia imitatur.  
Chamæpitys adalterina, Lob.  
Chamæpitys alia, Cam. ep.  
Pseudochamæpitys, Clus. hist.

## A L S I N E.

**A**ΛΣΙΝΗ Dioscoridi l. 4. c. 87. quod lucos, quos *ἀλσιν* nominant & umbrosa loca amet: & Mōs cōs, id est muris auricula, quod muscutorum muribus solia similia habeat. Sic Plinio l. 27. c. 4. Alsine quam quidam Myosoten appellant, nascitur in lucis, unde & Alsine dicta. Unus uterque meminit.

I. Alsine hederulæ folio.  
Alsine 4 genus, Fuch. ico.  
Elatine, Dod. gal. Lac. Thal. prior, Lugd.  
Lappago Plinii, Ang.  
Alsine mas, Gesl. hor. species in vinetis, Eid. col.  
Alsine spuria prior, Dod.  
Morfus gallinæ folio hederulæ, Ad. Lob.  
Centunculus hirsutior, Cæf.  
Alsine hirsuta, Cam.  
Alsine hederacea, Tab. Ger.

Variat foliorum magnitudine: flore purpureo, aut dilute purpurascens: rarius lacteo.

II. Alsine Veronicæ foliis flosculis cauliculis adhaerentibus.  
Elatine polyichides Lugd.  
Alsine folio Veronicæ, Tab. Ger.  
Alysson, Col. in phytobas.

III. Alsine Chamædrifolia flosculis pediculis oblongis insidentibus.  
Morfus gallinæ 3. Trag.  
Alsine media, Fuch. Lugd. Cam.  
Alsine, Tur. alterum genus, Fuch. ico.  
Elatine altera, Dod. gal. Lugd.  
Alsine altera foliis serratis, Gesl. col.  
Alsine foliis Triflaginis, Lob. ico. Tab. Ger.  
Alsine spuria altera, Lob.  
Antirrhinon Dioscoridis, Cæf.

IV. Alsine triphyllus cærulea.  
Sintelfraut cæruleis flosculis, Trag.  
Alsine parva recta, Lob. ico. Cam.  
Elatine triphyllus, Lugd.  
Dactylibotanon cæruleo flore, Thal.  
Alsine recta, Tab. Ger.

Altera majoribus & crassioribus foliis; altera minoribus.

V. Alsine Symphyti petraei capitulis.  
Alsine alia, Clus. hisp. Boetica, Eid. hist.

VI. Alsine scandens baccifera.  
Cyclaminus altera Dioscoridis, Ghini.  
Recentiorum planta, Alsines majoris facie baccis Solanigenæ Cucubulum Plinii, Ad.  
Alsine repens, Clus. hisp. & hist. ap. alt. Lob. Dod. Cast. Cam.

Alsine major, Clus. hist. maxima, Thal.  
Cucubalus Plinii, Lugd.

VII. Alsine baccifera similis suis acinis.  
Herba adversus hæmorrhoides admirabilis acinis, Clus. hist. app. alt. lib. 6.

VIII. Alsine altissima nemorum.  
Morfus gallinæ majus, Brunf.  
Morfus gallinæ 2 genus, Trag.  
Alsine major, Dod. Cam. Tab. Ger.  
Alsine major, & Alsine genuina Diosc. Lugd.  
Alsine maxima, Lob. ico. media, Thal.  
Centunculus viticulis cubitalibus, Cæf.

IX. Alsine angustifolia.  
Alsine maxima, Lugd.

X. Alsine major.  
Alsine marina, Dod. Tab. Ger.  
Alsine sive Hippia major, Lob. ico.  
Centunculus, Cæf.

XI. Alsine media.  
Morfus gallinæ primum genus, Trag.  
Alsine, Math. Ang. Lac. Lon. Lob. Lugd. Cast.  
Alsine major, Fuch. 1. genus, Eid. ico.  
Alsine media, Dod. gal. Tab. cui & Alsine, Ger.  
Hippia minor, Cord. hist.  
Alsine minor, Dod. Ad. Lob. ico. Thal.  
Alsine morfus gallinæ femina, Gesl. hor.

XII. Alsine minor multiculis.

Morfus

Morfus gallinæ minor, Brunf.  
Morfus gallinæ species 4. Trag.  
Alfine, Turm. minor, Fuch. Dod. gal. Lon. Thal.  
Lugd. Tab.

Alfines 3. genus, Fuch. ico.  
Alfine minima, Dod. Ad. Lob. Cam. Ger.  
Centunculus minutissimis cauliculis, Cæf.

XIII. Alfine minor lini capitulis.

Alfine minima suffruticis instar, Thal.

Alfine petraea minima, Tab. petraea, Ger.

Variat: alia suffrutici similis, rigidis cauliculis: alia cauliculis tenerioribus: tertia medio modo se habet cauliculis non adeo implexis: & hujus, ut & prioris, plures differentie notantur, foliorum longitudine, tenuitate, hirsutis differentes.

XIII. Alfine minor foliis rotundis.

Alfines minoris alia species, Thal.

Variat: alteri enim folia sunt latiora, rotundiora: alteri subrotundiufcula & mucronata: alterius, medio modo se habent.

XV. Alfine verna Androsaces capitulis: sub 6. in Prodomo descripta.

XVI. Alfine affinis Androsace dicta major. Androsace altera, Math. Lugd. Clus. pan. & hist. Cam. Tab.

Androsace annua spuria, Ger.

Morfus gallinæ, vel Alfines species non ex Syria, sed ex quadam antiqua macerie, Ad.

XVII. Alfine affinis Androsace dicta minor: sub 5 in Prodomo descripta.

XIX. Alfine nodosa gallica.

Alfine nodosa, Lugd.

*Alfine Spergula dicta.*

I. Alfine Spergula dicta major.

Spergula, Dod. Lugd.

Sagine Spergula, Ad. Lob.

Alfine tenuifolia altera, vel terrestris altera *veris* *et* *col.*, Col.

II. Alfine Spergulae facie media.

Spergula marina, Lugd.

Anthylloides, Thal.

III. Alfine Spergulae facie minor: sive Spergula minor flosculo subæruleo: quæ sub Alfine 9. in Prodomo describitur.

an Asterias sive Stellaria, Lugd.

*Alfine palustris.*

I. Alfine aquatica major.

Alfine palustris, Tab. Ger.

II. Alfine aquatica media.

Alfine fontana, Tab. Ger.

III. Alfine aquatica minor & fluitans.

Alfine fluviatilis, Tab. Ger.

IV. Alfine palustris minor, folio oblugo: quæ 2 in Prodomo, &

Portulacæ aquaticæ nomine missa.

V. Alfine palustris minor terpillifolia: quæ 1. in Prodomo.

VI. Alfine littoralis foliis Portulacæ.

Alfines genus pelagicum, Clus. hist.

VII. Alfine maritima flore rubente.

Alfine maritima Neapolitana, Col.

IX. Alfine minor Androsaces alterius Marchioli facie: quæ 5. in Prodomo.

IX. Alfine nodosa Germanica: quæ 8. in Prodomo.

X. Alfine tenuifolia muscosa.

Alfine muscosa, Lugd.

*Alfine alpina.*

I. Alfine alpina glabra: in Phytopinace sub 21. at in Prodomo sub 3. descripta.

II. Alfine alpina juncea folio: sub 22. in Phytop. at sub 4. in Prodomo proposita.

III. Alfine montana capillaceo folio.

Alfine saxifraga angustifol. minima montana, Col.

IV. Alfine alpina cauliculis nudis prolifera. an Saxifraga 3. Col.

V. Alfine alpina minima glabra: quæ 7. in Prodomo.

VI. Alfine montana latifolia flore laciniato.

Alfine montana hederacea maxima, Col.

*Alfine hirsuta arvensis.*

I. Alfine hirsuta magno flore.

Auricula muris quibusdam, Dod. gal.

Alfine spuria 3. Eid. lat.

Alfine myosotis, Ad.

Alfine hispida 1. Thal.

Hæc duplex est: alterius folia minora hirsutis donantur: alterius pilosiora sunt.

II. Alfine hirsuta altera viscosa.

Auricula muris 3. Dod. gal.

Alfine species glutinosa, Ges. col.

Alfine spuria 4. Dod.

Alfine viscaria, Cam.

III. Alfine hirsuta minor,

Alfine hispida minuta, Thal.

## ANAGALLIS.

**A**ΝΑΓΑΛΛΙΣ *Dioscoridi l. 2. c. 209. Anagallida, aliqui Corchorum vocant, Plinio l. 25. c. 13. Genera duo Dioscoridi & Plinio flore tantum distantia: quæ caruleo est flore, semina: quæ phanium mas isdem dicitur.*

*Anagallis terrestris.*I. *Anagallis phœniceo flore.*

Anagallis, Cord. in Diosc. Gef. hor. mas, Brunf. Trag. Matthiol. Fuch. Dod. Tur. Lac. Lon. Lugd. Cast. Ger.

Anagallis rubro flore vel purpureo, Gef. col.

Anagallis phœnicea mas, Ad. Lob.

Anagallis phœnicea, Tab. punicea, Cæf.

Anagallis phœniceo flore, Cam. mas, Cluf. hist.

Anagallis terrestris mas, Thal.

Corchorus Cratevæ, Theoph. & Nicandri, Ang.

Hæc Dioscoridis mas est: aliquibus Corallina Æginetæ: aliis Corchorus Plinii: aliis Molochia Serapionis. Variat floris colore: phœniceo est communiter: est & purpurascens sive obsoletè purpureo, cui phœnicum quidpiam permistum conspicitur, monente Cluf. hist. ap. alt.

II. *Anagallis caruleo flore.*

Anagallis fœmina, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. Tur. Lac. Lon. Cast. Lugd. Ger.

Anagallis carulea fœmina, Ad. Lob. Cluf. hist.

Anagallis carulea, Cæf. Tab. caruleo flore, Cam.

Anagallis terrestris fœmina, Thal.

Flore est caruleo, rarius albo.

III. *Anagallis carulea, foliis binis ternisve ex adverso nascentibus.*

Anagallis tenuifolia Monnelli, Cluf. hist. ap. alt.

IV. *Anagallis lutea nemorum.*

Numularia sylvatica vel mas, Gef. hor.

Anagallis lutea, Ad. Lob. Lugd. Thal. Tab. Ger.

Anagallis luteo flavo flore, Cam. Cluf. pan. & hist.

Alfina lutea, Lugd.

Folio aliquando ampliore reperiri, auctor est Cluf. hist. ap. alt.

*Anagallis aquatica.*I. *Anagallis aquatica major folio subrotundo.*

Anagallis aquatica, folio maximo, Thal.

Berula five Anagallis aquatica, Tab.

Anagallis five Beccabunga, Ger.

II. *Anagallis aquatica minor folio subrotundo.*

Sion, Brunf. non odoratum 1. Trag.

Sium, Ang. Eric. Cord. Fuch. Lon. non odoratum quibuidam, Gef. hor.

Sii alterum genus, Fuch. ico.

Cepæa, Tur. Dod. gal.

Anagallis aquatica, (five Becabunga Germanorum) Ad. Lob. Dod. Lugd. Thal. Cæf.

Anagallis aquatica minor 1. Tab.

Anagallis aquatica minor flore pallido, Ger.

Quibuidam Sium Dioscoridis l. 2. c. 154. sed folia olusatris desunt & inodora sunt: aliis Cepæa Dioscoridis l. 3. c. 168. sed folia Portulacæ hæc non habet.

III. *Anagallis aquatica major folio oblongo.*

Berula major, Tab.

Anagallis aquatica, Ger. major, Gef. col.

IV. *Anagallis aquatica minor folio oblongo.*

Anagallis aquatica minor 2. Tab.

Anagallis aquatica minor, Ger.

V. *Anagallis aquatica foliis pulegii serpillivæ.*

Sium alterum & Anagallis aquatica, Trag.

VI. *Anagallis aquatica folio rotundo non crenato.*

Anagallis aquatica altera, Lob. Lugd.

Anagallis aquatica 3. Lob. ico.

Guilandinum modò Alfisma, modò Cochleariam nobis nominavit: & alii Samolum Plinii l. 25. c. 11. faciunt.

VII. *Anagallis aquatica angustifolia.*

Anagallis aquatica 4. Lob. ico.

IX. *Anagallis aquatica angustifolia scutellata: hæc in Prodromo, & pro 9. in Phytopycnacti descripta.*

ELATINE.

**E**ΛΑΤΙΝΗ *folia habet Helxina, at minora & rotundiora pilosa &c. in segetibus, Dioscoridi l. 4. c. 40. Idem Plinius l. 27. c. 9. Elatine nomine.*

I. *Elatine folio subrotundo.*

Veronica fœmina, Matth. Fuch. Gef. hor. Tur.

Dod. Lon. Cæf. Cast. Lugd. (qui Matthioli & Fuchii figuram exhibet) Cam. Ger.

Elatine

Digitized by Google

Elatine Dioscoridis, Ad. Lob.  
 Verbasculum quorundam, Lugd.  
 Elatine i. Tab. altera folio rotundo, Thal.  
 Reperitur foliis latioribus oblongis: dein foliis  
 decuplo minoribus, rotundis Numulariæ forma,  
 quam  
 Elatines alteram speciem Thalius facit.  
 II. Elatine folio acuminato in basi auriculato,  
 flore luteo.  
 Elatine, Matth. Cast. Lugd. recta, Lob.

Elatine altera, Dod. Lob. ico. Tab. Ger.  
 Elatine folio acuminato, Thal.  
 Linaria hederulæ folio, Col.  
 In agris hirsutior & minor: in hortis glabrior &  
 lætius virens.  
 III. Elatine folio acuminato flore cæruleo.  
 Differt à priore foliis rotundioribus, ad basin  
 minus auriculatis: ac floribus, qui subcærulei, vel  
 cærulei sunt: & Monspensuli in loco Gramuntio  
 & hinc inde circa vias reperitur.

## SECTIO SECUNDA.

*HELIOTROPIMUM; AURICULA MURIS; ECHIUM;  
 ONOSMA; ANCHUSA; LYCOPSIS; BUGLOSSA & BORRA-  
 go; Cynoglossum; Cerinthe; Lithospermum; Symphytum; Pul-  
 monaria; Consolida media; Brunella; Bellis.*

## HELIOTROPIMUM.

**H**'ΑΙΟΤΡΟΨΙΟΝ Dioscoridi l. 4. c. 193. quod τὰ φύλλα τῆ τοῦ αἰὶν συστρίψιμῳ, quod folia cum Sole  
 circumagat: & σκορπίου, quod ramuli cum floribus, Scorpionum cauda modo inflectantur. Theophrasto  
 7. hist. 3. & 9. Solaris herba Gazæ vertente. Plinio l. 22. c. 21. Heliotropium quod cum Sole se circumagat, etiam nubi-  
 lo dicitur, tantus sideris amor est, noctu velut desiderio contrahitur cæruleus flos.

Genera duo Dioscoridi: majus flore candido, aut subfulvo: minus, semine verrucatum (hinc Verrucaria) pensili.  
 Plinio, tricoccum & Heliotropium: parvum & magnum intelligens.

I. Heliotropium majus Dioscoridi.  
 Heliotropium majus, Matthiol. Ang. Dod. Gef.  
 hort. (& Scorpioides album) Lac. Ad. Lob. Cæf.  
 Lugd. (& Verrucaria) Cast. Tab. Cam. Ger. Clus.  
 histor.

Herba cancri majus, Lon.

II. Heliotropium minus supinum.  
 Heliotropium supinum, Dod. Clus. hisp. & histor.  
 Ger. deiscr.

Heliotropium humi sparsum, Lugd.

Heliotropium minus i. Tab.

III. Heliotropium supinum alterum.

Heliotropium minus folio ocimi, Gef. col.

Heliotropium minus, Lob. ico. Ger. repens, Ad.

Heliotropium minus 2. Tab.

Verrucaria altera minor, Lugd.

Heliotropium tricoccum.

Heliotropium minus, Matth. Lac. Cast. Lug. Dod.

Cam. ep. & hor. cui & herba Clytiæ.

Heliotropium minus tricoccum, Gef. hor. Clus.  
 hisp. & hist.

Heliotropium vulgare Tornesol Gallorum, sive

Plinii tricoccon, Ad.

Heliotropium parvum Dioscoridi, Lob.

Heliotropium tricoccum, Cæf. Lugd. Tab. Ger.

V. Heliotropium alterum, Matth. Lugd. quid?

*AURICULA MURIS sive ECHIUM  
 SCORPIOIDES.*

**ΜΥΟΣ ΝΤΑ** sive **ΜΥΟΣ ΝΤΙΔΑ**, id est muris auricula, quam Myosaida vocant, Dioscoridi l. 2.  
 c. 214. Myosota sive Myosotis, Plinio l. 27. c. 12.

**ECHIUM SCORPIOIDES**: Echium, propter foliorum formam: Scorpioides, eo quod ramulos floribus  
 onustos candarum Scorpionum instar contorqueant, vocamus: & cum aliis Myosotida, aliis Heliotropium faciant,  
 Heliotropium sequi, & Echium precedere volumus.

I. Echium Scorpioides arvense.  
 Auricula muris minor 3. Trag.  
 Euphrasia 4. & Pilosella sylvestris, Eid.  
 Scorpioides mas. Dod. in ico.  
 Scorpioides aquaticum, Gef. hor.  
 Scorpioides 3. Dod.  
 Myolotis hirsuta reptans, Ad. Lob.  
 Alfine myosotis, sive Auricula muris, Lob. ico.  
 Heliotropium minus alterum, Cæs. tertium, Tab.  
 Echii palustris altera species, Thal.  
 Auricula muris cærulea, Tab.  
 Pilosella flore cæruleo, Ger.  
 Heliotropium erectum, Eid.  
 Echium minimum vel Buglossum, Col.  
 Scorpioides tertium minus Dodonæi, Eyst.  
 Variat magnitudine, aliquando vulgata quadruplo major est & hispidior.

II. Echium Scorpioides minus flosculis luteis:

in Prodromo descriptum.

III. Echium Scorpioides palustre.  
 Cynoglossa minor, Brunf.  
 Euphrasia cærulea, Trag. Tab. Ger.  
 Scorpioides femina, Dod. in ico.  
 Scorpioides aquaticum, vel palustre, vel cæruleum, Gef. hor.  
 Heliotropii species altera, Eid.  
 Leontopodium, Lon. Lugd.  
 Myosotis Scorpioides partim repens, partim erecta, Lob. ico.  
 Heliotropium minus in palustribus, Cæs.  
 Echium palustre, Cordo, Thal.  
 Scorpioides tertium majus Dodonæi, Eyst.  
 an Auricula muris, Matthiol. Dod. gal. Lac. Cast. Lugd.  
 Est glabrum, aliquando leviter hirsutum: flore est cæruleo, rarius niveo.

### ECHIU M.

**E**CHION, ἢ Α'ΑΚΙΒΙΑ' ΔΙΟΝ Dioscoridi l. 4. c. 27. Echium dictum volunt quod contra viperarum vim valeat: alii quod flore fiat capitulis viperæ similibus: sed Dioscoridi quod semina xεραῖν ἐχθρὸν θύσσει, capiti viperæ similia habeat.

Genera: Plinio l. 25. c. 9. Echios utriusq. generis, pulegio similis foliis coronata: item altera, quæ lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula viperæ similia sunt. Verum Dioscoridis Echium, à Plinio l. 22. c. 20. Pseudoanclusam dicitur, quam à quibusdam Enchusam, aut Dorion, & multis aliis nominibus appellatum scribit.

I. Echium majus & asperius flore albo.  
 Echium flore albo, Cam. ep. Matth. & hor.

II. Echium vulgare.  
 Echium, Matth. Ang. Lac. Gef. hor. Dod. Lob. ico.  
 Cast. Lugd. vulgare, Clus. pan. & hist.  
 Echium, sive Alcibiacum, Dod. gal.  
 Lycopsis, Cord. in Diosc.  
 Buglossum syl. Lon.  
 Echium, Buglossum agreste, Ad.  
 Echium floribus purpurantibus rubellis, Lob.  
 Anchusa major, Cæs.  
 Anchusa syl. Thal.

Flos communiter cæruleus est: aliquando ex purpura rubet, vel subcinereus est. Caulis aliquando duorum triumve digitorum latus, quemadmodum in Beta, Digitali purpurea, Cucurbita, Thymalo cyparissia & aliis observavimus.

III. Echium Creticum latifolium rubrum.

Echium 3. vel Echium Creticum 1. Clus. hist.

IV. Echium Creticum angustifolium rubrum

Echium 4. vel Echium Creticum 2. Clus. hist.

V. Echium syl. lanuginosum.

Echium 1. & Echium pullo flore, Clus. pan. & hist.

VI. Echium syl. hirsutum maculatum.

Echium 2. vel rubro flore, Clus. pan. & hist.

Flos nunc saturatè rubente, modo dilutiore colore præditus est.

VII. Echium alpinum luteum.

Echium montanum Dalechampi, Lugd.

Trachelium ~~supra dicitur~~, Clus. pan.

IX. Echium pumilum flore luteo.

Echium flavo flore, Clus. cur. post.

X. Echium luteum minimum.

Echioides lutea minima Apula campestris, Col. lum.

X. Echium pumilum album.

Echioides parva alba Amphibia, Col.

XI. Echium Hispanicum flore calcari donato: quod 1. est in Prodromo.

ON-



## ONOSMA.

**O** N O S M A Dioscoridi l. 3. c. 147. foliis Anchuse sine caule, semine & flore. & Plinio l. 27. c. 12. cui Onosma. Onosma. Matth. Lac. Lon. Cast. Lugd. Tab. Ger. Hællenus plant. cui non vidimus: esse autem Lycopodium cognatam & in Anchusis habendam figura ostendit: & Adversariorum auctores, id velle videntur.

## ANCHUSA.

**A** Γ Χ Ο Τ Ε Α Dioscoridi l. 4. c. 23. ἄνηθρον quod vim suffocatoriam habeat, dicta videtur: alii vero à florido radice colore, siquidem ἄνηθρον erat suco illinere: hinc Galeus in Oratione suas ad artes 6. Anchusa pictas dicit. Anchusa etenim ab Echio, Lycopsides & Buglossa, radice sanguineo succo, quo manus inficiuntur, Dioscoride monente, differt.

Generatitia Dioscoridi: 1. quæ ὀνείλια. foliis Laſſuca hirsutis: 2. quæ Ἀνθισιάδων ὀνείλια, quæ priore minor: 3. secunda non dissimilis, semine puniceo. Plinius l. 22. c. 20. primam Dioscoridia nomine Anchusa. & l. 27. c. 5. secundam sub Alcibi propofuit: & l. 22. c. 21. Onochiles habetur.

I. Anchusa Echii foliis & floribus.

Anchusa, Ad.

II. Anchusa lutea major.

Anchusa 3. Matth. Ang. Lac. Cam.

Anchusa 1. species fortè, Cord. in Diosc.

Buglossa rubra, vel Anchusa 3. Lon.

Anchusa lutea, Ad. Lob. ico.

Anchusa 4. seu Pseudoanchusa, Dod.

Anchusa flore exalbido, Clus. pan. & hist.

Flos luteus, rarius albus: aliquando ex albo pallescens.

III. Anchusa lutea minor.

Anchusa Echiioides lutea, Col.

IV. Anchusa puniceis floribus.

Anchusa, Gesl. hor. secunda, Matth. Ang. Lac. Lug.

Buglossa rubra, vel Anchusa 2. Lon.

Anchusa minor seu Alcibiadiadon, vel Onochiles, Ad.

Anchusa parva, Lob. ico.

Anchusæ alterum genus Onochiles dictam, Clus. hist.

V. Anchusa minor Patavina.

Anchusa 3. Cam. ep.

VI. Anchusa angustifolia.

Anchusa lignosior angustifolia, Ad. Lob. ico. Lugd. Clus. hist.

Tragoriganum nothum Dalechampii, Lugd.

Lithospermum minus repens in Phytopynace, at in Matthiolo

Lithospermum fruticosum angustifolium.

## LYCOPSIS.

**A** Τ Κ Ο Ψ Ι Σ. quibusdam Ἀγχοψον quia radice etiam rubra est Dioscoridi l. 4. c. 6. Lycopsis, Plinio l. 27. c. 11. Sic dicta fortè à caulis, foliorum & florum implexa hirsutis pedem lupinum imitante.

I. Lycopsis.

Cynoglossum, Matth. Lac. Lugd.

Cynoglossa vera, Cast.

Buglossum vulgare, Lon. ico.

Echii altera species, Dod.

Lycopsis, vel Lycopsis degener Anchusa, Ægine-tæ, Ad.

Lycopsis altera Anglica, Lob. Lugd.

Echion, Cæf.

Aliquando caule caret: Monspelica flore est dilute purpureo: Anglica saturatioris est purpureæ.

II. Lycopsis Ægyptiaca.

Lycopsis Dioscoridis, Cynoglossi genus, Raul-wolf, Lugd. ap.

## BUGLOSSA &amp; BORRAGO.

**B** Ο Τ Τ Α Ν Σ Ο Ν. Dioscoridi lib. 4. c. 128. quod linguas bubulas imitetur. Dicitur & Βύρρανον, quod in vinum coniecta animi voluptates augeat, Dioscoridi & Plinio lib. 25. c. 8. cui Buglosses, bonni lingua similis.

BORR.

*BORRAGO* verò officinis, ad imitationem Marcelli dicta, *Buglossa vera veterum* censetur, & ab officinarum *Buglossa* diversa est. quam aliqui *Buglossam veterum*, alii eorundem *Lycopsis*, alii *Cirsium*, nescio quàm rectè dicunt. *Utrumque pro Buglossa agnoscimus*, ipsam *Borraginem officinarum*, *Buglossam latifoliam*: & *Buglossam officinarum*, *Buglossam angustifoliam* nominantes. At *Guilandinum*, *Buglossum officinarum*, *Buglossum antiquorum* esse asserit: *Borraginem* verò a *Dioscoride* *Echion* vocari suspicatur.

*Buglossum sativum.*

I. *Buglossum latifolium*, *Borrage*.

*Borrage*, *Brunt*. *Trag.* *Fuch.* *ico.* *Ang.* *Ges.* *hor.*  
*Dod.* *Lon.* *Lugd.* *Cæs.* *Cam.*

*Buglossum*, *Matth.* *Fuch.* *Tur.* *Lac.* *Ad.* *Cast.*

*Buglossum* verum, *Dod.* *gal.* *Cord.* in *Dioic.*

*Borrage* fl. cæruleo: & albo, *Eyst.*

*Buglossum latifolium*, *Lob.* *vulgare*, *Clus.* *hisp.*

*Buglossa urbana*, *Clus.* *hist.*

*Borrage* floribus albis, *Tab.* *hortensis*, *Ger.*

Flore est communiter cæruleo: aliquando candido, vel ex pallescente roseo: interdum Autumno suaverubente. Et *Taber.* proponit

*Borraginem* syl. floribus albis, quæ

*Borrage* flore albo, *Ger.* &

*Borraginem* tenuifoliam, quæ

*Lycopsis* *Anglica*, *Ger.*

II. *Buglossum latifolium semper virens.*

*Buglossum semper virens*, *Ad.* *Lob.* *ico.* *Lugd.* *Cam.*

*Buglossum* *Hispanicum*, *Cæs.* *Tab.*

*Borrage semper virens*, *Ger.* *Hisp.* *latifolium*, *Eystett.*

III. *Buglossum angustifolium majus.*

*Buglossa*, *Brunt.* *Cæs.* *Italica*, *Trag.* *Lon.*

*Buglossa longifolia*, *Cord.* *hist.*

*Buglossum vulgare*, *Matth.* *Lac.* *Cast.* *Lugd.* *Tab.* *Ger.*

*Cirsium* *Italicum*, *Fuch.*

*Lycopsis*, *Ang.* *Lycopsis*, *Dod.* *gal.*

*Cirsium*, *Cord.* in *Dioic.*

*Echium* *Italicum* spinosum, *Fuch.* *ico.*

*Anchusa*, *Tur.* *Anchusa* *Alcibiadion*, *Dod.*

*Buglossus* *Italica*, vel *Gallica* major, vel vera, *Ges.* *hort.*

*Buglossum angustifolium*, *Ad.* *Lob.*

*Buglossum* *Italicum*, vel *Hispanicum* grande, *Cam.*

*Buglossum* *Italicum* flore cæruleo: flore albo, *Eystett.*

Floris color cæruleus, albus, rubeus, interdum variegatus: folia modo latiora modo angustiora sunt: hinc figuræ tres apud *Tab.* & *Ger.* apud illum

*Buglossa vulgaris* *Italica* mas, & *Italica* femina: apud hunc, *Buglossa vulgaris*, *Anchusa* *Alcibiadion* & *Anchusa* *lutea*, *ico.*

Aliquando foliis est latioribus, sinuosis, florealbo, qui cum ramo instar *Scorpioidis* incurvatur, eoque à priore differt. quod

*Buglossum* foliis sinuosis nominavimus.

IV. *Buglossum vulgare*, asperitate & proceritate discrepans.

*Buglossum* vulgare violaceo & albo colore, *Eyst.*

V. *Buglossum angustifolium minus.*

*Buglossa minor*, *Trag.*

*Cirsium* *Germanicum*, *Fuch.* *Loniceri*, *Lugd.*

*Echium* lanuginosum primum, *Fuch.* *ico.*

*Anchusa* genus, *Dod.* *gal.* 3. *Eid.* *lat.*

*Buglossus* minor, *Ges.* *hor.*

*Cirsium* minus, *Lon.*

*Echii* facie *Buglossum* minimum, *Lob.*

*Buglossum* minus sativum, *Lugd.*

*Buglossum sylvestre.*

I. *Buglossum* syl. majus nigrum.

*Buglossum* alterum flore nigro, *Matth.*

*Buglossum* syl. *Matthioli*, *Lugd.*

*Buglossum* syl. majus, *Cast.*

*Buglossa* syl. nigra, *Thal.*

Flore nigro, rarissime albo.

II. *Buglossum* syl. minus.

*Buglossum* syl. *Brunt.* *Dod.*

*Borrage* syl. *Trag.*

*Echium*, *Fuch.* *Germanicum* spinosum, *Eid.* *lon.*

*Echium* alterum, *Cord.* in *Dioic.*

*Lycopsis* syl. *Dod.* *gal.*

*Buglossa* syl. *Dod.* syl. altera, *Lon.*

*Buglossum* erraticum asperum echinoides, *Ad.*

*Echium* *Fuchii*, *Lugd.* *Cam.*

III. *Buglossum* sylv. minus alterum & asperius.

*Buglossa* syl. *Trag.*

*Anchusa* minor, *Cord.* *hist.*

*Lycopsis*, *Lon.* *Lugd.*

*Buglossum* syl. minus, *Cast.* *Lugd.*

Flos ex cæruleo purpurascit, rarius candidus est

IV. *Buglossum* syl. tertium.

Cynoglossum, Trag. Tur. officin. Fuch. salsum, Lon.  
 Lycopsis, Fuch. ico.  
 Cynoglossos altera Plinii, Dod. gal.  
 Anchuta aspera, Cord. in Dioic.  
 Hoc prædicto simile, sed non idem.  
 V. Buglossum syl. caulibus procumbentibus.

Alyssum Germanicum Echiioides, Lob. Lugd.  
 Buglossæ syl. species, Thal.  
 Aparine major Plinii, Tab. Ger.  
 Crucialis quædam, Cæf.  
 Asperugo spuria, Dod. belg.  
 Borrago minor syl. Col.

## CYN OGLOSSUM.

**K**TNO'ΓΑΝΣΣΟΝ Dioscoridi l. 4. c. 129. id est, *Lingua canina, à foliorum forma quæ Plantagini latifolia similia, at angustiora, minora & lanuginosa Dioscoridi. Plinio lib. 25 c. 8. Cynoglossos caninas imitans linguas, topiariis operibus gratissima: est & alia similis ei, & quæ ferat lappas minutas. Neutrū Dioscoridius esse censemus.*

I. Cynoglossum maximum Belgicum.  
 Cynoglossum maximum, Lob. obi.  
 Hoc foliis, floribus & seminibus vulgato duplo majus est.

II. Cynoglossum majus vulgare.  
 Cynoglossa major, Brunf.  
 Cynoglossum vulgare, Matth. Lob. Thal. Cast. Lugd. Clu. hist. Eyf.  
 Cynoglossum, Dod. Ad. Tab. Ger. officinarum, Lon.  
 Cynoglossus vulgaris, Gef. hor.  
 Cynoglossa, Cæf. major, Cord. in Dioic.  
 Cynoglossa vulgaris major, Col.  
 Lycopsis, Lac.

Hoc sæpe sine caule reperitur, quod tamen à caulifero diversum non est: hinc duæ figuræ apud Matthiolum, Lob. Dod. Rarius flore albo occurrat.

III. Cynoglossum sylvaticum rubente caule.  
 Cynoglossum sylvaticum Hareynicum, Thal.  
 an Cynoglossum montanum, Cæf.  
 Cynoglossa montana maxima frigidarum regionum, Col.

IV. Cynoglossum sempervirens: in Phytopy-nace & Prodromo descriptum.  
 an Cynoglossa media altera virente folio, Col.

V. Cynoglossum globoso flore.  
 Cynoglossa media montana incana angustifolia altera, Col.

VI. Cynoglossum fructu umbilicato.  
 Cynoglossa altera media fructu κατυλάδης sive λυγριόδης, Col.

VII. Cynoglossum medium.  
 Cynoglossum similis planta Plinii.  
 Cynoglossa minor, Cord. in Dioic.  
 Cynoglossum pusillum Narbonense, Ad. Lob. ico. Lugd.  
 Cynoglossum parvum, Cæf. Italicum, Cam.  
 Cynoglossum pumilum, Clu. pan. sive Austriacum alterum, Eid.  
 Cynogloss. Narbonense, Eyf.  
 Cynoglossa minor montana serotina altera Plinii, Col.

IX. Cynoglossum Creticum argenteo angustifolio.  
 Cynoglossum parvum cinereum Creticum, Cam.  
 Cynoglossum Creticum 1. Clu. hist.  
 an Cynoglossa media argentea Apula campestris, Col.

IX. Cynoglossum Creticū latifolium foetidū.  
 Cynoglossum Creticum 2. Clu. hist.

X. Cynoglossum minus.  
 Elatine, Trag. Lon.  
 Lappula rusticorum, Lugd.  
 Cynoglossa minor montana serotina altera Plinii, Col.

Hæc magnitudine variat, cum vix semipalmaris in Anglia reperiat.

## CERINTHE sive CYN OGLOSSUM MONTANUM.

**C**ERINTHE Plinio l. 21. c. 12. est folio candido incano, subitali, capite concavo, mellis succum habente: florū candidissima sunt apes.

I. *Cerinthe seu Cynoglossum montanum* majus.  
*Cerinthe*, Gef. hort. Cast. quorundam, Cluf. hisp.  
*Cynoglossa montana*, Gef. hor.  
*Cerinthe major*, Lob. Lugd. Cam. Cluf. hist. Tab. Ger.  
*Telephium Dioscoridis* quibusdam, Eid.  
*Telephium maculosum*, Cam.  
*Maru herba*, Dod.  
*Pulmonaria Romana*, Cæf.  
 Variat flore luteo, purpureo luteo, purpureo & versicolore.

II. *Cerinthe flore ex rubro purpurascens*.  
*Cerinthe tertia*, Cluf. hist.  
 III. *Cerinthe flore flavo asperior*.  
*Cerinthe quorundam major flavo flore*, Cluf. hist.  
 IV. *Cerinthe minor*.  
*Cerinthe Plinii*, Ad. Lob. ico. Lugd.  
*Cerinthe minor*, Lob. Cam. Tab. Ger.  
*Cerinthe secunda*, Cluf. hisp. minor seu quarta, Eid. hist.  
*Maru herba minor*, Dod.  
 VI. *Cerinthe folio non maculato viridi*.  
*Cerintes quintum genus*, Cluf. hist. ap. al.

## L I T H O S P E R M U M

**ΛΙΘΟΣΠΕΡΜΟΝ** recensuit *Dioscorides lib. 3. cap. 158. quod à seminis duritie nomen accepit: foliis olea longioribus, latioribus & mollioribus &c. Semen lapidea duritie, rotundum candicans, erri parvi magnitudine. Plinius lib. 27. cap. 11. Lithospermo inter omnes herbas nihil est mirabilius, &c. lapillos gerit candore & rotunditate margaritarum, magnitudine ciceris, duritia vero lapidea: & qua pediculis adherent cavernulas habent & intrus semen, &c.*

I. *Lithospermum arundinaceum*, fortè *Diosc.* & *Plinii*.

an *Coix Theophrasti*, 1. hist. 16.  
*Lachryma Christi*, Trag. Gef. hort. cui & *Jodoci*.  
*Lithospermum majus*, Trag. Gef. hor. cui & fruticosum.

*Arundo lithospermos*, Gef. hor.  
*Lithospermon primum*, Lacun. arundinaceum, Lugd.

*Lachryma Jobi*, Ad. Cluf. hisp. & hist. Dod. Lob. Cam. Cast. Eyst.

*Lachryma vulgo*, Cæf.

II. *Lithospermum majus*, Matth. Lac. Cast. Lugd. quid?

III. *Lithospermum majus erectum*.

*Saxifraga tertia*, Brunf.

*Lithospermum*, Brunf. Fuch. Cord. in *Dioscor.* & hist. Tur. Lon. Ad. primum, Ang. commune, Gef. hort.

*Milium Solis sativum*, Trag.

*Lithospermum minus*, Matthiol. Dod. Gef. hort. Lac. Lob. Cast. Lugd. Ger. vulgare minus, Cam.

*Lithospermum sativum*, Fuch. ico.

*Lithospermum legitimum*, Cluf. hist.

*Lithospermum alterum fruticosum*, Thal.

*Lithospermum arvense*, Tab.

*Anchusæ 3. similis altera*, Cæf.

*Milium Soler Mauritanis*, quod in montibus So-

ler frequenter nascatur: hinc vulgo *milium Solis* ineptè dicitur.

Hujus species minima *palmum alta*, Lini foliis angustis, granulis pusillis, rotundis, *Adversaria* meminere.

IV. *Lithospermum minus erectum*.

*Lithospermum Anchusæ facie*, Lob. Lugd.

V. *Lithospermum minus repens latifolium*.

*Lithospermum alterum*, Ang.

*Lithospermum majus*, Dod. Ad. Lob. Lugd.

*Lithospermum vulgare majus*, Cam.

*Lithospermum repens majus*, Cluf. pan. & hist.

*Lithospermum*, Cæf. virgatum, Thal.

*Pulmonaria minor Dalechampii*, Lugd.

Hoc ad *Echium*, vel *Anchusæ* referri potest, quod aliqui *Lithospermum Dioscor.* & *Plinii* censent.

VI. *Lithospermum angustifolium umbellatum*: in *Prodromo* descriptum.

VII. *Lithospermum arvense radice rubra*.

*Lithospermum syl.* Trag. Fuch. Dod. gal. Cam. ep.

*Echium minus herba Lithospermo congener*, Gef. ap.

*Anchusæ degener facie Milii Solis*, Lob. ico.

*Anchusæ 3. Lithospermo similis*, Cæf.

*Anchusæ arvensis alba*, Thal.

*Anchusæ arvensis minor facie Milii Solis*, Tab.

*Lithospermum tertium*, Dod. nigrum, Lugd.

Ad Anchusam, vel Echium, aliqui referunt.

IX. Lithospermum Linariæ folio Germanicum.

Passerina, Trag. Cam.

Lithospermum syl. minus, Dod. gal.

Lithospermum quartum exiguum, Dod. lat.

Lithospermum minus, Lon.

Passerina herbariorum unicaulis, Ad.

Lingua passerina, Tab.

Passerina linaria, Ger.

Linaria altera botryodes montana, Col.

IX. Lithospermum linariæ folio Monspeliacum.

Passerina linariæ folio, Lob. Lugd.

## SYMPHYTUM.

**ΣΥΜΦΥΤΟΝ** Dioscorides lib. 4. cap. 9. & 10. proposuit: sic dictum à facultate conglutinandi, quæ pollet: nam & carnes dum coquantur conglutinas additum, eodem auctore. Et Plinio lib. 27. cap. 6. unde & Græci (ait) nomen imposuere, hinc Latinis Consolida dicitur.

**Genera:** Dioscoridi duplex est, πετταλον petracum, quod in petri nascatur, ramulis origano similibus, foliis tenuibus, & capitulis thymi: Alterum, quod aliqui πεττον vocant: caule cubitali, foliis hirsutis ad Buglossi foliorum similitudinem: floribus luteis, &c. Plinius lib. 27. cap. 6. Alum nos vocamus, Græci Symphytum petracum, similis canila bubule, foliis parvis cacuminibus thymi, &c.

I. Symphytum Consolida major.

Symphytum quidam Inulam rusticam, quidam

Alum Gallicum vocant, Scribon. c. 21.

Consolida major, Brunf. Trag. Cam. Thal. Ger.

Symphytum, Tur. Lon. majus, Matth. Cord. hist.

Cam. Cast. Tab.

Symphytum magnum, Fuch. Dod. ut. Lugd.

Symphytum alterum, Ang. Cord. in Dioscor. Lac.

Symphytum Alum, seu Alus, Ad. Lob.

Consolida vulgo, Cæf.

Marem faciunt & fœminam, floris colore possimum differentes: mas, flore est purpureo,

vel purpureo-ceruleo: fœmina, flore albo, vel pallide luteo: rarius luteo: hinc duæ figuræ a-

ud Tabernæ montanum & Gerardum: tres Ey-

lett.

Symphytum majus flore albo, & flore purpureo,

Taber.

Consolida major flore albo & flore purpureo,

Ger.

Symphytum majus fl. purpureo: fl. rubro: fl. palli-

o, Eylett.

II. Symphytum majus tuberosa radice.

Symphytum tuberosum, Lob. Dod. Lugd.

Symphytum tuberosum majus, Clus. hist.

Symphytum majus flore subluteo, tuberosa radice, Cam.

Symphytum radice tuberosa, Cam. ep.

Symphytum alterum folio Borriginis, Ang.

Consolida altera minor, Cæf.

Consolida tuberosa vel nodosa, Cam.

III. Symphytum minus tuberosa radice.

Symphytum tuberosum, Clus. pan. tuberosum minus, Eid. hist.

Floribus est pallidis, vel subluteis.

IV. Consolida major amplexicaulis flore purpureo, Thal. quid?

V. Symphytum minus Borriginis facie.

Symphytum pumilum repens Borriginis facie, Lob.

Borrigo minima herbariorum, Lugd.

an Alarum muri, Eid.

VI. Symphyto viribus affinis.

Bisâ radix quæ ex Bengala & Patane montibus adfertur, Acoſta cap. de Datura: sed quid?

## SYMPHYTUM MACULOSUM, sive PULMONARIA.

**PULMONARIA** dicta, quod hujus foliis ut plurimum macule albæ latæ aspersæ sint, & quod Pulmonum affectibus medeatur: quibusdam Callæ alterum genus apud Plinium l. 27. c. 8. cui Calla duorum generum est: una similis Aro, &c. Alterum genus ejus, quidam Anchusam vocant. folia Lactuca longiora, plumboſa, radice rubra, &c. Illam Arisarum, hanc Pulmonariam volunt. At Fracasorius Pulmonariam ex genere Buglossæ esse cenſet.

I. Symphytum maculosum, sive Pulmonaria trifolia.

Pulmonaria altera, Matth. Cast.

Pulmonaria & Pulmonalis, Dod. gal.

Kk 2

Pulmo-

Pulmonaria Plinii, Gefhor.

Pulmonaria, Cæf. maculofa, Ad. Lob. Cluf. pan. Cam. Tab. Ger. Eyft.

Symphytum maculoſum, Dod.

Pulmonaria major, Lugd.

Pulmonaria vulgaris maculoſo folio, Cluf. hiſt.

Foliis variat, quæ aliquando albis punctis notantur, aliquando iis carent: hæc

Pulmonaria folio non maculoſo, ſive 2. Cluf. hiſtor.

Floribus eſt communiter cæruleo rubentibus: rarius albis. Marem & fœminam, nomine Pulmonaria Plinii Taber. exhibuit, quem Gerardus imitatur.

II. Pulmonaria anguſtiſolia rubente cæruleo flore.

Conſolida major ſyl. Trag.

Symphytum ſyl. Cord. hiſt. & Pulmonaria Plinii, Schol.

Pulmonaria foliis Echii, Lob. ico. Ger.

Pulmonaria tertiæ ſpecies altera, Cluf. pan. 5. Panonica, Eid. hiſt.

Pulmonaria quarta Plinii anguſtiſolia, Tab.

Variat floribus, alteri flores initio rubent, dein cæruleum colorem ſaturationem contrahunt: alteri flores pulcherrimè rubentes: illa

Pulmonaria 5. hæc verò 4. Cluf. in hiſt.

III. Symphytum maculoſum, ſive Pulmonaria anguſtiſolia cærulea.

Pulmonaria 2. vel anguſtiſolia cæruleo flore, Cluf. pan. tertiæ Auſtriaca, Eid. hiſt.

Pulmonaria prima anguſtiſolia, Tab. 2. anguſtiſolia, Ger.

Pulmonaria Auſtriaca ſecunda, Cam.

## CONSOLIDAMEDIA.

**C**ONSOLIDAMEDIA, quibuſdam Chamæciſſos ſpicata Plinii lib. 24. c. 15. Aliis Anonymos Plinii lib. 27. cap. 4. (Anonymos inquit, non inveniendò nomen invenit) fortè quia vulneribus ſanandiſſima ſit.

I. Conſolida media pratensis cærulea.

Conſolida media, Brunf. Matthiol. Fuch. Taber. Eyſtett.

Conſolida media, & Herba Laurentiana, Caſt.

Prunella cærulea, Trag.

Bugula, Dod. ut: Cluf. pan. & hiſt. Lugd. Ger.

Bugula, & Prunella quibuſdam, Ad. Lob.

Arctica Pandectarii, Ang.

Symphytum medium, Lon.

Conſolida media major, Thal.

Conſolida media prima, Tab.

Chamæciſſus quorundam, Lugd.

Chamæciſſi alterum genus, Cæf.

Flore eſt cæruleo: rarius cinereo vel albo: foliis latoribus & anguſtioribus, leviter incifis vel ſinuatis.

II. Conſolida media pratensis purpurea.

Prunella purpurea vel quarta, Trag.

Conſolida media purpurea, Fuch. ſecunda, Taber.

Conſolida media minor, Thal.

Bugula carnei coloris flore, Cluf. pan. & hiſt.

Bugula flore albo, Ger.

Hæc repit & foliis priore eſt rotundioribus, non laciniatis, aliquando etiam non crenatis: flores, multo crenatis diluti coloris ſunt.

III. Conſolida media flore luteo: hæc cæteris multo minor eſt, foliis rotundis, crenatis, flore luteo: quam ex Anglia habemus.

IV. Conſolida media cærulea alpina, in Prod. deſcripta.

## BRUNELLA.

**B**RUNELLA, quæ ex Conſolida ſpeciebus eſt, ab effectu nomen accepit, èd quod ſaucium & linguæ affectibus, ſeu potius malo Caſtrenſi, Germanis die Brunn dicto, medetur: quod malum ab Aegina lib. 3. Eryſipelas Cerebri dictum videtur. Quibuſdam Symphytum petraum: aliis Polycnemum Dioſcoridi lib. 3. cap. 108.

I. Brunella major folio non diſſecto.

Brunella, Brunf. Dod. ut: Lob.

Prunella vulgaris & 6. Trag.

Conſolida minor, Matth. minima, Cam.

Prunella, Fuch. Ang. Ad. Cæf. Lugd. Cam. Taber. Ger.

Symphytum petraum, Lob. ico. an & Cord. in Dioſc.

Prun-

Prunella, aut potius Brunella officinarum, Eyst.

Flore est purpureo, vel cæruleo punicante: aliquando ex diluto cæruleo albicante, rarius albo: foliis integris nonnunquam leviter crenatis.

II. Brunella folio laciniato.

Symphytum petrarum, Lob.

Brunella altera, Dod.

Prunella secunda, Clus. pan. & hist. tertia, Tab.

Prunella altera hirsutior, Cæf.

Prunella Lobelii, Ger.

Flore est purpurei vel carnei coloris, vel cinerei, vel nivei: foliis aliquando solum superioribus, aliquando simul etiam inferioribus laciniatis.

III. Brunella Hyslopifolia: in Phytop. sub 2. descripta.

an Prunella secunda, Tab.

an Prunella flore albo, Ger.

IV. Brunella cæruleo magno flore.

Prunella cærulea altera, vel 3. Trag.

Prunella prima & major, Clus. pan. & hist.

Prunella grandiflora, Cam.

Brunella cærulea magno flore, Eyst.

Foliis est integris: reperitur & laciniatis: flore saturatus purpurascens, nonnunquam & dilutioris & exalbidi, rarius albi coloris.

V. Brunella minor alba laciniata.

Prunella candida altera, vel septima, vel femina, Trag.

Hæc semipalmatis est, aliquando trium quatuorve unciarum.

## BELLIS.

**B**ELLIDEM etiam ad Consolidam mediam, vel minorem, referunt, quam licet aliqui apud Theophrastum 7. hist. 9. Anthemidis foliacei speciem (Nigellam foliosam Gaza vertit) velint, Græci tamen indicta videntur. Plinio 1. 26. c. 5. Bellis in pratis nascitur, flore albo aliquatenus rubente. Et 1. 21. c. 8. luteus & Bellio pastillicantibus quinquagenis quinis barbulis coronatur.

I. Bellis syl. caule foliis major

Oculus bovis, Brunf.

Buphthalmum, Eid. majus, Lon.

Bellis major, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Lac. Cæf.

Cast. Cam. Ger. Lugdun. (cum figura Matth. &

Fuchsi) Ad. Lob. (cui & Consolida media vulneratorum) Eyst.

Bellis syl. Tur. major syl. Fuch. ico. Gef. hor.

Bellum majus, Tab.

Folio acutiore est, vel rotundiore: caule & hirsuto & glabro: flore nonnunquam gemino, etiam pleno, sed rarissime reperitur.

II. Bellis alpina major rigido folio: quæ 1. in Prodomo.

an Bellis alpina, Cam.

III. Bellis alpina alba minor: quæ 2. in Prodomo.

IV. Bellis montana major folio acuto: quæ 3. in Prodomo.

V. Bellis montana folio obtuso crenato: quæ 4. in Prodomo.

VI. Bellis syl. media caule carens.

Bellis media, Matth. Ad. Lugd. Tab. Clus. hist.

Bellis minor, Cast.

Bellis syl. media, Gef. hor. Ger.

Bellis syl. Dod. major syl. Lob.

VII. Bellis syl. minor.

Solidago Consolida species, Brunf.

Primula veris, Eid. Cæf.

Bellis minor, Matth.

Bellis minor syl. Fuch. Dod. gal. Tur. Gef. hor.

Lugd. Tab. Ger.

Bellis pratensis minor, Ad.

Flos colore variat: discum enim luteum ambiunt foliola, vel alba, vel ex candido rubra: alia ex albo & rubro mixta: alia intus rubra, in ambitu alba: aliquando in viridem colorem degenerant: reperitur vix uncias duas alta.

Bellis syl. minor flore mixto, &

Bellis syl. minor flore pleno rubro, Eyst.

IX. Bellis maritima foliis Agerati: quæ 5. in Prodomo.

*Bellis hortensis.*

I. Bellis hortensis flore pleno, eoque magno, vel parvo.

Primula veris, Trag. Gef. hor.

Bellis, Lon. minor, Matth. Lug. minima, Cast.

Bellis minor hortensis, Fuch. Dod. gal. Gef. hort.

Lac. Tab.

Consolida minor officinarum, an Bellis Pliniana, Ad.

Bellis hortensis multiplici flore, Lob. Tab. Ger.

Bellis minor fl. multiplici albo & rubro, Eyst.

Primula veris multiplici foliorum ordine, Cæf.

Floris colore variat, albo, incarnato, rubro, vario, scilicet candido & rubro: est & rufco: hinc

Kk 3 duæ

duæ figuræ, apud Lob. & Ger. tres apud Tabernæ-  
montanum.

II. *Bellis hortensis* prolifera.

*Primula veris*, cujus flores si non citius carpantur,  
ex se alios generant, ac sæpe ex uno quatuor aut  
quinque erumpunt, Trag.

*Bellis hortensis* suaverubens, viridisque prolifera,  
Lob. ico.

*Bellis prolifera*, Cam. variegata, Eyft.

III. *Bellis hortensis* pediculo folioso: quæ 7.  
in Prodro. mo.

*Bellis cærulea.*

I. *Bellis cærulea* caule nudo,  
*Aphyllantes* 3. Lugd.

II. *Bellis cærulea* caule folioso.

*Aphyllantes*, id est frondiflora, Ang. Cam,

*Bellis cærulea*, *Globularia Monspeliensis*, Ad  
Lob. Tab. Ger.

*Bellis montana*, Cæf.

*Scabiosa pumilum* genus, Clus. hist.

*Bellis minor* flore cæruleo, Eyft.

*Globularia cærulea*, Col.

Varia magnitudine, foliorum latitudine, &  
caulium altitudine: hinc tres apud Tab. Ger. ico-  
nes: *Bellidis cæruleæ*, *Apulæ*, & *Monspeliacæ*  
nomine.

III. *Bellis cærulea* spinosa: quæ præ 6. in Pro-  
dro. mo. describitur.

IV. *Bellis cærulea montana* frutescens.

*Bellis montana* fruticosâ in Ilva, Cæf.

*Scabiosa quinta*, vel *Scabiosa montana* repens,

Clus. pan.

*Scabiosa repens montana*, Cam,

*Scabiosa odorata*, Tab.

*Scabiosa montana minor repens*, sive 10. Clus.  
hist.

*Bellis lutea,*

I. *Bellis lutea* foliis profundè incisis major.

*Bellis major lutea*, Trag.

*Chrysanthemum*, Dod. Cam. ep. Cast.

*Chrysanthemum* folio virentiore, Cam.

*Chrysanthemum segetum* folio multiscisso, Ad.

*Chrysanthemum segetum*, Lob.

*Chrysanthemum arvense*, Tab.

*Chrysanthemi* species 4. Cæf.

II. *Bellis lutea* foliis profundè incisis minor,

*Chrysanthemum minus*, Cam. ep.

III. *Bellis lutea* foliis subrotundis,

*Chrysanthemum* 3. Cæf.

*Chrysanthemum Myconi*, Lugd.

an *Chrysanthemum* folio minus dissecto, Ca-  
merar.

IV. *Bellis spinosa* foliis Agerati.

*Bellis spinosa* elatior, Lob. ad par. alr.

V. *Bellis montana* globoso luteo flore,

*Globularia lutea montana*, Col.

## SECTIO TERTIA.

*PILOSELLA; GNAPHALIUM; LEONTOPODIUM;*

*HELICHRYSUM; STOECHAS CITRINA; CONIZA;*

*Aster; Tripolum; Alisma; & Virga aurea.*

### PILOSELLA.

**P***LOSELLA* à copiosis pilis quibus vestitur, nomen sortita est, quam aliqui ad *Myosotidem*, alii ad *Holo-*  
*stium* referunt: sunt qui Intybi minimam speciem faciant.

I. *Pilosella* major repens hirsuta.

*Auricula muris*, Brunf. Ericio Cord. alia, Cord. in  
Dioscor.

*Auricula muris minor*, Trag. Lon.

*Pilosella*, Matth. Ang. Ad. Lob. Cast. Tab.

*Pilosella* major, Fuch. Dod. ut: Lug. media, Thal.

*Pilosella* quibuidam *Holostium*, Lac.

*Pilosella* repens, Ger.

II. *Pilosella* major repens minus hirsuta.

*Auricula muris minor* secunda, Trag.

*Pilosella* vulgo, Cæf.

*Pilosella* major, Cam. ep.

*Lactucella* syl. repens, Cam. hor.

III. *Pilosella* major erecta.

*Pilosella* major, Ger. altera, Tab.

IV. *Pilosella* major erecta altera,

*Pilosella* major prima, Tah.

*Pilosella* major latifolia, Ger. ico.

V. *Pilosella* montana hispida parvo flore.

*Pilosella* major umbellifera max. & mon-  
tana & pratensis, Col.

VI. *Pilosella* Syriaca.

*Pilo-*



Pilosella maxima Syriaca, Lob. Lug. Tab.

VII. Pilosella incana saxatilis lutea.

Auricula muris altera incana saxatilis frigidarum regionum, Col.

## G N A P H A L I U M.

**Γ**ΝΑΦΑΛΙΟΝ Dioscoridi l. 3. c. 132. quod foliis αἰνὶ γαφάλλου pro tomento, utantur : Et Plinio l. 27. c. 19. cui Gnaphalium, quod alii Chamæzelon vocant. Verum apud Plinium l. 24. c. 19. habetur herba, Impia, incana, vocata rosmarini aspectu, thyrsi modo vestita atque capitata, unde alii ramuli assurgunt sua capitella gerentes, ob id Impiam appellatam, quoniam liberi supra parentem excellant, alii potius ita appellatam, quod nullum animal eam attingat, existimavere : hac Plinius. Sunt qui Gnaphalium vulgare esse velint, & esse quoque Centunculum ejusdem : Sic autem Plinius l. 24. c. 15. Itali Centunculum vocant, rostratis foliis ad similitudinem capitis penulatum, jacentem in arvū, Græci autem Clematidem.

I. Gnaphalium maritimum.  
Gnaphalium, Matth. Lob. Lug. legitimū, Clus. hist.  
Gnaphalium marinum, Gesl. hor. Ad. Lob. ico.  
(Cottonaria vulgi sive Bōbax humilis) Tab. Ger.  
Gnaphalium marinum tomentosum, Lugd.

II. Gnaphalium latifolium Americahum.  
Gnaphalium Americanum ἀργυροῦρον, Clus. pan. & hist.  
Gnaphalium latifolium peregrinum, Eysf.  
Centunculi Americani nomine ex America accepimus, apud quos uti in Brasilia, apud Toupinambaulcios frequens est.

III. Gnaphalium vulgare majus.  
Heliochrysis syl. Trag.  
Gnaphalium, Fuch. Gesl. hor. Tur. Lac. Cast.  
Gnaphalium vulgare, Matth. Ad. Lob. Lugd. Tab.  
Filago, Dod. ut. Ger.  
Centunculus, Tur.

Tomentum, Cord. hist. Lon.  
Impia Plinii, Ang. (& Cartafilago) Gesl. hor.  
Herba Impia, Cæf.

Gnaphalium vulgare minus, Thal.  
IV. Gnaphalium medium.  
Filago 4. Dod. gal. minor, Dod. lat. Lob. ico.  
Gnaphalium medium, Tab. vulgare, Ger.

V. Gnaphalium minus latioribus foliis.  
Gnaphalium Plateau 3. Clus. hist.

VI. Gnaphalium minus repens.  
Gnaphalium minimum, Lob. ico. minus, Tab.  
Filago minor, Ger.

Hoc etiam duarum solū unciarum reperitur.

VII. Gnaphalium roseū sylvestre.

IX. Gnaphalium roseū hortense : utrumque in Prodromo descriptum.

X. Gnaphalium majus lato oblongo folio.  
Gnaphalium 2. Plateau, Clus. hist.

XI. Gnaphalium majus angusto oblongo folio.  
Heliochrysis sylvestris, Trag.

Filaginis altera species, Dod. ut:

Filago Germanica alia secundum folia florida, Ad. Lob. ico.

Gnaphalium vulgare majus, Thal.

XI. Gnaphalium majus angusto oblongo folio alterum.

Pseudoleontopodium Matthioli, Lugd.

Gnaphalium Anglicum, vel Belgicum folio longiore, Ad. Lob. ico.

Chrysocome Germanica, Lob. obs.

Chrysocome lanuginosa, an Impia species, Lugd.

Gnaphalium majus, Tab. Anglicum, Ger.

Gnaphalii genus, Clus. hist.

Leontopodium alterum vulgare, Matth. Camera.

an Herba Impia in montibus, Cæf.

an Chrysocome & Chrysitis, Cæf.

Hoc cum à priori parum differat, qui voluerit, idem dicat.

### Gnaphalium montanum.

I. Gnaphalium montanum flore rotundiore.

Lagopus secundus, Trag.

Auricula muris, Lon. quarta, Trag.

Pilosella minor, Fuch. Dod. gall. Lugd. Thal.

Lagopiron Hippocratis, Gesl. animal.

Gnaphalii genus, Gesl. col.

Gnaphalium montanum purpureum & album, Ad. Lob. Tab. Ger.

Gnaphalium montanum suaverubens, &

Gnaphalium montanum variegatum, Eysf.

Variat floribus candidis, subpurpureis, roseis, ex candido & rubro mixtis. (flore.)

II. Gnaphalium montanum longiore & folio &

Gnaphalium montanum purpureum, & suaverubens, Lob. ico. Tab. Ger.

Gnaphalium montanum Dalechampii, Lugd.

Pilosella minor, Dod. Clus. hist.

Variat ut prior floris colore; hinc dux icones apud Lob. Tab. Gerard.

III. Gna-

III. Gnaphalio montano affinis Ægyptiaca.  
Baccharis Rauwolfii, Lug. ap. Clus. hist.

IV. Gnaphalium alpinum magno flore, folio oblongo.

an Leontopodium Dioscoridis?

Leontopodium verum, Matth.

Leontopodium Matthioli, Lugd. Tab.

Leontopodium, Dod. Cast.

Leontopodium sive pes leoninus, Ad.

Gnaphalium alpinum, Ger. def. Clus. pan. & hist.

V. Gnaphaliū alpinū magno flore folio brevi.

Leontopodium sive pes leoninus, Lob. Tab. Ger.

Idem cū priore censet Lugd. at cū illud radicē habeat magnam, quā si quā molīam, folia oblonga

hoc verō radicē tenuē, tolliq; brevia, differre ita-

VI. Gnaphalium alpinum minus. (tenuis)

Leontopodium parvum, Lob. Lug. Tab. Ger. def.

Pilosella minor altera, Dod.

## LEONTOPodium.

**Λ**ΕΟΝΤΟΠΟΔΙΟΝ *Dioscorides* l. 4. c. 131. duorum dicit generum & ad amatoria valere, &c. *Plinius* l. 26. c. 8. *Leontopodii* quidem meminit, sed à *Dioscoridis* diversum censens: *Dioscorides* fortē de *Gnaphalio alpino* intelligendus: quod *Gnaphalium* à *Plinio* l. 27. c. 8. *Cemos* appellari nonnulli existimant.

## HELICHRYSUM.

**Ε**ΛΙΧΡΥΣΟΝ aut χρυσάνθεμον & Ἀλκυρόν *Dioscoridis* l. 4. c. 57. ubi folia Abrotano similia & umbellam auream tribuit. At *Theophrastus* l. 9. c. 21. Ἑλκχρυσός, id est, aureum colorem habens, (Aureliū Galenū vertit) aliis *Coma aurea*. *Plinio* l. 21. c. 25. *Heliochrysum*, quod aliis *Chrysanthemum*, & qua *Dioscorides* habet.

I. Elichryson foliis Abrotani.

Helichrysum, Matth. def. Cast.

Helichrysum Creticum, Matth. ep. ico.

an Helichryson quod vulgo in Creta, Lagochimithia, quod leporibus cubilia grata præbeat, appellare solent. Bellon.

Elichryson, Ang. Lac. Dod. Lob. Clus. hiip. & hist. Lugd. Cam.

Heliochryson, Ad.

Helichrysum i. & Helich. i. altera icon, Tab.

Coma aurea & Helichryson, Ger.

Varietas in foliis advertitur: hinc duæ figuræ apud Taber. & Gerardum.

II. Elichrysum foliis oblongis Stæchadi citrinæ similis, Dod.

Helichrysum, Cam. ep. ico.

Chryfocome peregrina, Eysf.

III. Elichrysum foliis oblongis paucis Stæchadi citrinæ angustioribus.

Helichrysum Creticū, Matth. def. Lug. Cam. ep.

IV. Elichrysum seu Stæchas citrina angustifol.

Amaranthus luteus, Fuch. Lac. Lon. citrinus, Tur.

Stæchas citrina, Matth. Lac. Ges. hor. Dod. Cast.

Lugd. officinarum, Tab. desc.

Ageratum Aurelia, Dod. gal.

Helichrysum, & Amaranthus Galeni, Cæf.

Chryfocome aureæ coma, Ad. Lob.

Chryfocome prima vulgaris, Clus. hist.

Coma aurea, Lob. ico.

\* V. Elichrysum Orientale.

an Chryfocome Dioscoridis l. 4. c. 55. & Plinii, cui & Chrystitis l. 21. c. 5. in Phytopinace, Matthiolo & Prodromo descriptum.

Stæchas citrina comis grandioribus, Cam. ep.

Eliochrysum, Belli ep. i. ad Clusium.

Helichrysum Creticum, Eysf.

VI. Elichrysum Creticum.

Chryfocome 5, vel Cretica, Clus. hist.

VII. Elichryson sive Stæchas citrina latifolia.

Amaranthus & Heliochrysos primus, Trag.

Amaranthus luteus primus, Tab.

Chryfocome sive Amaranthus luteus, Ger.

Variat latioribus & oblongioribus foliis: hinc tres icones,

Amaranthi lutei i. 2. & 3. apud Tab. Et apud Ger. lob.

Chryfocome, Amarantho Galeni & Heliochryso sylvestri.

IX. Elichrysum syl. latifoliū capitulis cōglob.

Chryfocome & Helichrysos syl. Lob. ico.

Chryfocome montana, Cæf.

Chryfocome altera, Clus. hiip. tertia, peregrina tertia, Eid. hist.

Chryfocome, Tabern. Ger.

IX. Elichryson syl. angustifolium capitulis cōglobatis.

Stæchas citrina altera, Ad. Lob. ico. Lugd.

Ageratum aliud quorundam, Lugd.

Chryfocome, Cæf. altera, peregrina i. Clus. hist.

Elichry

*Elichrysium Creticum*, Cam.

*Stæchas citrina*, sive *Chrysocome Monspeliaca*, Tab.

X. *Elichrysium* syl. flore oblongo.

*Stæchas citrina altera inodora*, Ad. Lob. ico. Lug.

*Gnaphalium marinum Dalechampii*, Lugd.

*Chrysocome latioribus foliis*, Cæf.

*Chrysocome quarta, peregrina* 3. Clus. hist.

XI. *Elichrysium* syl. flore oblongo similis: in *Phytopynace* & *Prodromo* describitur.

XII. *Stæchas viridis capitulo oblongo*.

*Stæchas viridis Dalechampii*, Lugd.

## C O N Y Z A.

K O'NTZA *Dioscoridis* l. 3. c. 136. sic forte dicta, quod *κόνιζας*, seu *cutices*, suo lentore capiat: apud *Theophrastum* 6. hist. l. 1. c. 2. *Pulicariam Gaza* vertit. *Plinio* l. 21. c. 10. *Conyza*.

*Generatitia Dioscoridi*: parva, qua odore præstantior: major, gravi odore: tertium genus medium inter illas, in jucundioris odori, &c.: *Theophrasto* plura genera, mas & femina: hac minor, illa major. *Plinio* genera duas & femina, in folio differentia, &c.

I. *Conyza mas Theoph.* major *Dioscoridis*.

*Conisa magna*, Tur.

*Conyza major*, Clus. hist. Dod. Cæf. Cast. Cam.

*Conyza magna*, Lugd.

*Conyza major vera*, Ad. Lob. ico.

II. *Conyza major altera*.

*Conyza major Dioscoridis Raurwolfii*, Clus. hist.

*Conyza Syriæ*, Lugd. append.

III. *Conyza femina Theoph.* minor *Dioscoridis*.

*Conyza minor vera*, Ges. ap. Ad. Lob. ico. Lug.

*Conyza minor*, Clus. hist. & hist. Cæf. Cast.

*Conyza minor*, & *Eupatorium Mesues*, Col.

*Conyza minor altera*, Dod.

IV. *Conyza minor exotica*.

*Conyza minor Boëtica*, Clus. cur. post.

V. *Conyza Salviæ odorem spirans*.

*Planta Bantania*, Clus. exot. l. 4. c. 23.

VI. *Conyza major vulgaris*.

*Conyza major*, Trag. Matth. Dod. gal. Ges. hort.

*Lac. Lon. Cast. Lugd.*

*Conyza major altera*, Dod.

*Conyza Helenitis*, Cord. hist. Thal.

*Baccharis*, Matth. Lac. Lon. Tab.

*Baccharis Monspeliensium*, Ges. hort. Ad. Lob.

*Lug. Cam. Ger.*

VII. *Conyza pannonica lanuginosa*.

*Conyza tertia Pannonica*, Clus. pan.

*Conyza* 3. *Austriaca*, legitima fortè *Diosc.* Eid.

hist.

IX. *Conyza cærulea acris*.

*Anteriorius flos alter*, Trag.

*Rigeron tertium*, Dod. gal. quantum, Eid. lat.

*Dentelaria*, Ges. hort.

*Conyza muralis*, Eid. col.

*Conyzoides cærulea*, Ges. col. Cord.

*Conyza odorata*, Lugd.

*Conyza* genus tenuifolium, Thal.

*Conyza cærulea*, Tab.

*Amellus montanus*, Col.

Variat foliis, in altera brevioribus & latioribus: in altera longioribus & angustioribus: est & altera erecta, altera repens: flore cæruleo, qui in pappum vel album, vel rufescentem abit.

*Conyza montana.*

I. *Conyza cærulea alpina major*: quæ 1. in *Prodromo*.

II. *Conyza cærulea alpina minor*: quæ 2. in *Prodromo*.

III. *Conyza alpina pilosissima*.

*Conyza Helenitis pilosa*, Lob. ico.

IV. *Conyza incana*.

*Conyza Helenitis mellita incana*, Lob. ico.

V. *Conyza montana foliis glutinosis pilosis*.

*Conyza montana Myconi*, Lugd.

VI. *Conyza montana lutea*, foliis oblongis.

Hæc duplex à *Thalyo* proponitur, nomine

*Conyza majoris montanae*, &

*Conyza majoris alterius*: hujus posterioris figura à *Camerario* in suo horto exhibetur.

VII. *Conyzis affinis*.

*Britannica Gesneri* & *Lugd.* Ad. Lob. ico.

*Britannica vera Dalechampii*, Lugd.

*Bellis lutea Dalech.* Lugd.

*Conyza palustris.*

I. *Conyza media Asteris flore luteo*, vel *tertia Dioscoridis*.

L I

Calamin-

Calamintha tertium genus, Fuch.

Conyza, Cord.in Dioſc. Tab.altera, Tur.

Conyza media, Matt.Dod.ut: Lac.Ad.Lon.Lob.

Lugd.Eyſt.

Conyza 3. Matth.ep. Ang.Caſt. 3.aquatica, Gef.h.

Conyza 3. vulgaris, Cluſ. pan. media vulgaris, Eid.hiſt.

Conyza aquatica, Thal.

Conyza major, Ger.

Mentha lutea, Lon.

Aſter, Aſtico ſimilis altera quæ Cunilago, Cæſ.

Cunilæ tertium genus, quæ Cunilago Plin.l.20.c.16.

II. Conyza major flore globoſo.

Conyza minor, Trag.Matth. Dod.gal. Lac. Caſt.

Lugd.Tab.Ger.

Conyza prima, Ang.minor ſeu femina, Lon.

Conyza minima, Ad. (ſive Pulicaria) Lob.Dod.

Lugd.Thal.

Pyllium, Cord.hiſt.ico. Conyza, Eid.

Major eſt & minor.

III. Conyza aquatica laciniata.

Conyza Helenitis foliis laciniatis, Lobico.

Conyza Helenitis, Dod.belg.

IV. Conyza paluſtris ſerratifolia.

Conyza aquatica, & aquatica foliis ſerratis, Gef.hor.& col.

Conyza maxima ſerratifolia, Thal.

Lingua major Dalechampi, Lugd.

Conyza quarta, Cam.ep.

Conſolida paluſtris, Tab.

Solidago Sarracenica, Ger.

V. Conyza aquatica, Aſteris flore aureo: quæ 3. in Prodromo.

VI. Conyza affinis Germanica.

Solidago Sarracenica tertia, Trag.Lon.

Herba vulneraria ad fluvium Ptrim, Trag.

Conſolida Sarracenica tertia, Tragi.Lugd.

Conyza nomine poſita in Cordi hiſtoria.

## ASTER ATTICUS.

**A**'ΣΤΗ'Ρ ΑΤΤΙΚΟ'Σ Dioſcoridi l.4.c.120. ſtorem habet in cacumine purpureum, aut luteum, per ambitum anthemidis capituli modo diſiſum, ſolioli ſtella modo radiati. Plinio l.27.c.5. Aſter, ab aliquibus Bubonium appellatur, quoniam Inguinum (ſc. inflammationi) præſentaneum remedium eſt: in cacumine capituli ſtella modo (hinc Aſteris nomen) radiata, &c.

Aſter Atticus luteus.

I. Aſter luteus foliis ad ſtorem rigidis.

Aſter Atticus alter, Matth.Lugd.

Aſter Atticus verus, Ang.Gel.hor.

Aſter, ſive Stella Atica Monſpelienſium aureo flore, Ad.

Aſter Atticus, Lob. (cui & Inguinaria) Ger.luteus, Cam.

Aſter Atticus primus flore luteo, Cluſ. hiſp. vel

Aſter atticus legimus, Cluſ.hiſt.

Aſter atticus, Cæſ.

Aſter luteus alter, oculus Chriſti minor, Lugd.

Oculus Chriſti, Eid.

Aſter atticus Maſſilioticus, Tab.

Eſt latifolius: eſt & anguſtifolius.

II. Aſter atticus foliis circa ſtorem mollioribus.

Aſter cernuus, Col.

Baccharis vel Carpeſſum Alpini, quo nomine accepimus.

III. Aſter luteus radice odora.

Incentaria, Cæſ.

Aſteris altera ſpecies Apula, an Baccharis, Col.

Baccharis vera Dioſcoridis, Malocho, hoc nomine accepimus.

an Aſter luteo flore, Cam.ep.

IV. Aſter luteus major foliis ſuccisæ.

Aſter primus, vel pannonicus major, Cluſius pan.

Aſter tertius ſive Auſtriciatus: Eid.hiſt.

V. Aſter luteus hiſtuto Salicis folio.

Aſter pannonicus tertius, Cluſ. pan. at quintus, in hiſt.

Aſter flore luteo, Tab.

Aſter hiſtutus, Ger. ico.

VI. Aſter montanus luteus Salicis glabro folio.

Aſter atticus ſecundus, Cluſ. pan. at quartus ſive

Auſtricius ſecundus, Eid.hiſt.

Bellis lutea, Lugd.

Bubonium luteum, Tab.

Aſter Italorum, Ger.

VII. Aſter luteus folio glabro & crenato.

Aſter Italorum, Ad. Lob.

Aſter atticus, Dod.atticus Italorum, Cluſ. pan.

Aſter octavus Italorum, Eid.hiſt.ico.

IX. Aſter luteus anguſtiſolius.

Aſter conyzoides Geſneri, Lob.Lugd.

Aſter atticus tertius, Cæſ.

IX. Aſter

IX. After luteus linariæ rigidò glabro folio.

After atticus quartus, Clus.pan.def.

After sextus, Austriacus 4. Eid.defc.

X. After montanus luteo magno flore.

After montanus, Ad.Lob.ico.Ger.

After montanus luteus mas, Tab.

After æticus alpinus foliolis luteis, Cæf.

XI. After atticus luteus montanus villosus magno flore.

After montanus hirsutus, Ad.Lob.ico.Lugd.

After luteus sive oculus Christi minor, Eid.

After montanus luteus femina, Tab.

XII. After luteus supinus.

After atticus supinus, Clus.hisp. (at in hist. secundus) Dod.Lob.Lugd.

After atticus repens, Cam.

After Atticus cæruleus.

I. After atticus cæruleus vulgaris.

Tinctorius flos primus, Trag.

After atticus, Math. (cui & Amellus) Fuch.Dod. gal.Cord.in Diosc. & hist.dei.Gef.hor. Lac.Lon.

Clus.pan.Cast.Lugd.

After Atticus, Amellus non est, Guil.

After atticus purpureus, Fuch.ico.

After atticus 1. Dod. cæruleus, Thal.Cam.

After Italorum purpurascens, Lob.

After cæruleus Italicus, sive 8. Clus.hist.

After atticus minor flore cæruleo, Eyst.

Hujus differentiæ duæ: est latifolius & angustifolius & hujus pumilum genus: Sic qui maturius

floret, minus altè affurgit, quàm qui seriùs: communiter cæruleis, aliquando purpureis foliolis orbis luteus cingitur: rarissimè totus albus reperitur. Aliquando caulibus est altioribus & foliis latoribus, qui dicitur

After atticus major flore cæruleo, Eyst.

II. After hirsutus Austriacus cæruleus magno flore, foliis subrotundis: in Prodomo descriptus.

III. After montanus cæruleus magno flore, foliis oblongis.

After atticus quintus, sive Amellus alpinus, qui Virgiliano respondere videtur, Clus.pan.

After septimus sive Austriacus 5. vel After alpinus cæruleo flore, vel 7. Eid.hist.

After purpureus montanus, Lugd.

an Anthyllidi secundæ similis, Cæf.

Magnitudine variat: nam in monte Jura, duarum triumvé unciarum reperitur, cum alias palmam superet.

IV. After atticus alpinus alter.

After atticus cæruleus alpinus, Cam.ep.

Est omnino minor vulgari, & interdum globulitumens villosi foliolis ad radicem adnascuntur.

V. After Tripolii flore.

After minor Narbonensium Tripolii flore, Linariæ folio medio purpureus, Ad.Lob.ico.

After Linariæ foliis Narbonensis, Lob.

an Anthyllis altera, Cæf.

## TRIPOLIUM.

**T**ΡΙΠΟΛΙΟΝ (quasi dicas ter canum seu canescens) Dioscoridi l.4. c.135. cujus flores (ut tradunt, inquit) colorem ter die mutent, manè candidi, meridie purpurei, serò puniceo conspiciuntur.

I. Tripolium majus cæruleum.

Tripolium, Dod. ut: Lugd. Cam.

Tripolium littorum, Ad.

Tripolium vulgare, Lob.Lugd. Eyst.

Amelli species palustris, Col.

Flos purpureus, medio luteus aut croceus: aliquando in eodem medio & luteus & puniceus, ambitu purpureo, qui colores in omni flore

nescente conspiciuntur. Luteis etiam floribus Lobelius observavit: Folius quoque in summitate profundè in aliquot feras divisus notavimus.

II. Tripolium minus: & Lob. & Lugd.

Magnitudine solum à priore differre videtur.

III. Tripolium minus alterum.

Anthyllis minor, Cord.obf.

Tripolium minus, Cam.

## ALISMA sive DAMASSONIUM.

**A**ΛΙΣΜΑ sive ΔΑΜΑΣΣΟΝΙΟΝ Dioscorides l.3. c.169. foliis dicit plantaginibus sed angustioribus. &c. quem Plinius imitatus l.25. cap.10. cui duplex, alterum laciniosis angustis, alterum majoribus foliis in sylvis, &c. Quid verò sit, magna inter auctores controversia, alius Plantaginem, alius Calcicolum Mariae, alius

Ll 2

Digitalem,

*Digitalem, alius Idantham graciam, alius aliam statuentibus. Verum cogitandum, an non Dioscoridis & Plinii primum Alisma, sit Sarricula alpina, quæ Auricula Ursi dicitur: quemadmodum Plinii secundum, ipsum Verba-sculum. In Phytopynace duplex Alisma proposuimus: primum sub Alismate folio glabro, quod nunc ad Gentianas retulimus: alterum folio hirsuto, de quo inter Doronici species egimus.*

## VIRGA AUREA.

**VIRGA AUREA**, quæ a forma & floris colore luteo nomen habet, ab aliis propter vires & Solidago & Consolida vocatur. Quibusdam Panax Chironium Theophrasti 9. hist. 10. & Plinii l. 25. c. 4. Panax Pharnacium & Phanax Chironium folio Lapatii, censetur: aliis Cunilago Plinii, Panaces dictum: & quia folia aliquando maculata observantur, sunt qui Leucographin Plinii, l. 27. c. 11. autument.

### I. Virga aurea major, vel Doria.

Doria, fortè Panaces Chironium, Gesl. hor.

Dorea Narbonensis, quasi Aurea, Ad. Eyst.

Herba Doria, Lob. Cæs.

Dorea sive herba aurea, Lugd.

Limonii: aliud, Lugd.

Panax Chironium Theophrasti, Tab.

Herba aurea Ponæ & Lobelii, Lugd.

Variat foliis, iisque integris non serratis, qualia sunt cum primum erumpunt, & cum in hortis colitur: vel serratis, aculeo folii summitati insidente, quemadmodum Monipessuli observavimus: hinc duæ figuræ in Lobelii iconibus & in Lugdunensi historia.

### II. Virga aurea latifolia serrata.

Virga aurea, Cam. ep. Thal. Villanovani, Ger.

Virga aurea vulgo dicta, Cæs. serratis foliis, Tab.

Virga aurea altera serrato folio, Lob.

Virga aurea margine crenato, Dod.

Virga aurea altera, Lugd.

Virga aurea minor laciniatis foliis, Cam.

an Consolida Sarracenica major, Lugd.

Variat foliis longioribus, latioribus, brevioribus, serratis tamen: & quandoque folia lineis albis notantur.

### III. Virga aurea angustifolia serrata.

Solidago, Ang.

Solidago Sarracenica, Trag. Fuch. Dod. ut: Lon.

Ad. Lob. Lug.

Virga aurea, Gesl. hor.

Consolida Sarracenica, Thal. Eyst.

Consolida aurea, Tab.

Herba Doria, Ger.ico.

Est latioribus & angustioribus foliis: ex Anglia habemus folio niveo & bicolor.

IV. Virga aurea angustifolia minus serrata.

Virga aurea, Matth. Dod. ut: Lon. Lugd. (qui & Matth. & Dodonæi figuram exhibet) Cæs. Ger.

Eyst.

Virga aurea Villanovani, Ad. Lob.

Virga aurea foliis non serratis, Cam. ep.

Virga aurea Broccenbergensis, Thal.

Virga aurea major angustifolia, Cam.

Virga aurea alterum genus, Cæs.

Leucographis Plinii, Ang.

Symphytum petraeum 3. Tab.

Variat foliis, quæ sæpe sine crenis, aliquando saltem minus conspicuis serrata sunt: sic foliis oblongis, aliquando subrotundis & flore luteo, rarius albo: hinc tres figuræ apud Tabernam. Symphyti petraei 1. 2. & 3. nomine.

V. Virga aurea magno flore.

Consolida aurea nemorum, Limonii folio, Ad. Lob. ico.

VI. Virga aurea montana serrata magno flore, quam Plantaginis alpinæ nomine in summitate montis Calcaris circa tuguriola collectam, habemus.

## SECTIO QUARTIA.

**VERBENA ; SUCCISA ; SCABIOSA ; JACEA ;**

**STOEBE ; CTANUS ; TRAGOPOGON ; SCORZONERA ;**

*Caltha ; Helenium ; Flos Solis.*

### V E R B E N A.

**ἸΕΡΑ' ΒΟΤΑ'ΝΗ** sive ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΝΑ (apud Pausaniam ἀΐσπερσων) folia habet quernis similia, sed angustiora minoraque, colore aliquatenus glauco &c. Sacra herba dicta, quod in expiationibus ad amica sit perui-

fit peruvilis Dioſcorid. l. 4. c. 61. Sic verò Plinius l. 25. c. 9. Nulla Romana nobilitatis plus habet, quàm Hierobotane: aliqui perſtereon, noſtri Verbenacam vocant: hæc eſt, quam legatos ferre ad hoſtes indicavimus: hæc Jovis menſa vertitur, domus purgantur luſtranturq;.

Genera ejus duo ſunt Plinio l. c. folioſa, quam ſæminã putant: mas rarioribus foliis, &c. folia minorâ quàm quercus colos glaucus, &c. quidam unum omnino genus faciunt, quoniam utraq; eſſem effectus habeat, &c.

I. Verbenâ communis cæruleo flore.

Verbenâ maſcula, Brunf.

Hierobotane mas, Eid.

Columbaris, Herm. Barbaro.

Verbenâ, Geſ. hor. Lon. rectâ, Trag.

Verbenacâ, Matth. Lac. Caſt. vulgaris, Lugd.

Verbenacâ ſupina (& fœmina) Fuch. Cord. in

Verbenâ ſive Verbenacâ, Guil. pap. (Dioſc.

Verbenacâ rectâ, Dod. ut. Lugd. Tab.

Verbenâ communis & ſacra rectâ, Ad. Lob.

Verbenacâ fœminâ, Cæſ. Cam. vulgaris, Cluſ. hiſt.

Herbâ ſacra, Ang. Tur.

Floribus eſt cæruleis, quandoque albidis.

II. Verbenâ tenuifolia.

Verbenacâ ſupina, Cluſ. hiſt. Dod. Lugd. Tab.

Sacra Verbenâ Hiſpanicâ minor, Lob.

Verbenâ ſupina, Cluſ. hiſt.

III. Verbenâ Peruana, quæ Hiſpanicæ ſimilis, ex Monardi, Lugdunenſis refert.

IV. Verbenâ nodiflora, in Phytopinace, Matthiolo & Prodromo deſcripta.

Verbenacâ nodiflora, Imperato.

## SUCCISA ſeu MORSUS DIABOLI.

SUCCISA dicitur, quod ejus radices circumroſe ſint: vulgus enim credit, Dæmonem cum tantâ efficiatâ adicem hominibus invidet: eam ſtatim ubi ſuccreverit, undique circumrodere: quare Morſus diaboli dicitur. Sunt qui Geum veterũ ſenſent: at Columna videtur Pycnocomon Dioſcoridi l. 4. c. 176. aliis Nigina Plinio l. 27. c. 12. Herba, inquit, quæ vocatur nigina, tribus eſt foliis longiſſimis intubaceis: Alii ad Scabioſas: alii ad Jaceas referunt.

I. Succia glabra.

Jacea nigra, Brunf.

Morſus diaboli, Eid. Trag. Dod. gal. Geſ. hor. Lac.

Ad. Lob. Lon. Lugd. Cam. Tab. Ger.

Succia, Matth. Fuch. Dod. Caſt.

Scabioſâ folio integro, Cæſ.

Pycnocomon, Col.

Foliis eſt glabris & integris, rarius laciniatis: floribus cæruleis, rarius purpureis, vel incarnatis, rariſſimè albis: eſt etiam major & minor.

II. Succia hiriuta, quæ à priorè ſola hiriutæ differt.

Morſus diaboli hiriuta rarior, Geſ. hor.

## SCABIOSA.

SCABIOSA, aliis à ſcabro herbæ habitu (quod vulgata convenit) aliis quod ſcabiei medeatur, quod vox Pſora ſpræſendere videtur: quare & ſcæa Aëni aliqui ſenſent: Sunt qui ad Staben Dioſcoridi l. 4. c. 12. referant.

Scabioſâ pratenſis & arvenſis.

I. Scabioſâ pratenſis hiriuta, quæ officinarum.

Scabioſâ primum genus, Trag.

Scabioſâ, Lac. deſ. Lon. vulgaris, Fuch. cõmunis,

Dod. gal.

Scabioſâ altera cæpeſtris ſeu ſegetũ, Lob. ico. Ger.

Scabioſâ major, Caſt. arvenſis, Tab. vulgaris, Eyſt.

Scabioſâ folio liſſo, Cæſ.

Scabioſâ major flore ex cæruleo purpureo, Tab.

Huc referenda eſt

Scabioſâ major ſatorum vulgatio, Ad. Lob.

Scabioſâ vulgaris major, Dod. Lugd.

Scabioſâ diſſectifolia major, Thal.

Variat foliis modo craſſius, modo tenuius utrinque diviſis: flore ex cæruleo, purpureo, vel breſilico colore tincto: hinc duæ apud Taber. & Gerardum figuræ.

Scabioſâ major, flore ex cæruleo purpureo, Tab.

II. Scabioſâ major ſquammatæ capitulis.

Scabioſâ, Brunf. quinta, Trag.

Scabioſâ major, Matth. Lugd. Cam. Cluſ. hiſt.

Jacea nigra major laciniola, Ad.

Scabioſâ major flore purpureo, Tab. Ger.

Cyanus ſyl. major arvenſis, Thal.

Floribus eſt ex purpura ſubrubentibus: reperitur floribus paucioribus, minoribus, flore candido: foliis altera latioribus, altera anguſtioribus.

III. Scabioſâ major altera, ſquammatæ capitulis, ſive Jacea rubra latifolia laciniata.

Jacea tertia, Tab.

Jacea major, Ger.

IV. Scabioſâ fruticans latifolia alba.

Scabioſâ nona ſive æſtivalis, Cluſ. hiſt.

Hos vel candidus, vel cæruleis ſtaminibus ornatur,

natur, vel livet, vel ad cæruleum inclinat.

V. Scabiosa fruticans angustifolia alba.

Scabiosa montana calidarum regionum, Ad. Lob. Lugd.

Scabiosa quarta & major Pannonica, Clus. pan.

Scabiosa major Pannonica albo flore, vel. 8. Eid. hist.

Scabiosa maxima leucanthemos, Cam.

Scabiosa montana, Tab.

VI. Scabiosa angustifolia alba altera.

Scabiosa major alba, Tab.

Scabiosa montana, Ger. ico.

VII. Scabiosa multitudo folio flore flavescente.

Scabiosa tertia, Clus. pan.

Scabiosa septima vel *εχρησμένη* flore, Eid. hist.

Scabiosa tenuifolia, sive major, sive 7. Thal.

Scabiosa lutea è Thuringia, Cam.

Scabiosa Pannonica fl. albo, Eyft.

IX. Scabiosa flore globoso niveo.

Scabiosa alba in hortis Belgii, Clus. hist.

Scabiosa Belgica fl. albo, Eyft.

IX. Scabiosa alba gemino capite.

Scabiosa alba gemino tergeminoque capite, Clus. hist.

Flore purpurascente, vel incarnato, huic non absimilem, in Bavaria Camerarius obiervavit.

X. Scabiosa prolifera folio latiore.

Scabiosa prolifera, Lob. ico. Tab. prolifero flore, Clus. hist.

XI. Scabiosa prolifera foliis Gingidii: quæ 3. in Prodomo.

XII. Scabiosa tenuifolia prolifera minor.

Scabiosa tenuifolia minima prior, Eyft.

XIII. Scabiosa folio Sinapi syl. quæ 2. in Prodomo.

#### *Scabiosa montana.*

I. Scabiosa alpina foliis Centaurii majoris.

Scabiosa alpina maxima, Ad. Lob. ico. Tab.

Centaurium nothum Dalechampii, Lugd.

Scabiosa alpina Centauroides, Cam. Eyft.

II. Scabiosa montana glabra, foliis Scabiosæ vulgaris.

Scabiosa secunda vel alpina, Clus. pan.

Scabiosa quinta sive montana, Eid. hist. desc.

III. Scabiosa montana Dentis leonis folio: quæ 4. in Prodomo.

IV. Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra & prima.

Scabiosa latifolia purpurascente flore, Clus. pan. sive 4. Eid. hist.

V. Scabiosa latifolia rubra non laciniata secunda.

Scabiosa prima, vel latifolia rubro flore, Clus. pan.

Scabiosa rubra Austriaca, Lob. ico.

Scabiosa integrifolia prima, Thal.

Scabiosa tertia vel latifolia Pannonica rubro flore, Clus. hist.

Scabiosa Succisæ similis, Cæf.

Scabiosa latifolia septima, Tab.

VI. Scabiosa Virgæ pastoris folio.

Scabiosa latifolia peregrina, Tab.

VII. Scabiosa argentea angustifolia: quæ 6. in Prodomo.

an Scabiosa graminea folio argenteo flore purpureo, Cam.

IX. Scabiosa montana minor capitulo squamoso.

Scabiosa montana omnium minima, Adv. Lob. ico. Lugd.

Scabiosa æstiva minor, Lob.

Scabiosa montana minor septima, Tab.

#### *Scabiosa capitulo globoso.*

I. Scabiosa peregrina rubra capitulo oblongo: quæ 1. in Prodomo.

Scabiosa Indica sive sexta, Clus. hist.

Scabiosa Indica flore saturatè rubro, &

Scabiosa Indica flore dilutè rubro, Eyft.

Hanc foliis in tenuiores lacinias divisiss, floreque minore & rubro, nomine Scabiosæ nigrae odore Zibethi, ex horto Patavino habemus.

II. Scabiosa capitulo globoso major.

Scabiosa quinta & sexta, Trag.

Scabiosa minor, Math. Lob. (cui & Columbaria) Lugd. Cast.

Scabiosa minor lævis, Ges. hor.

Scabiosa media, Dod.

Scabiosa media serrato angustifolia, flore globularia: Ad.

Scabiosa 2. femina herbariorum, Tab.

Scabiosa foliis bellidis sylvestris majoris, major Thal.

Scabiosa quinta sive montana, Clus. hist. ico.

Phyteuma Dioscoridis, Col.

III. Scabiosa capitulo globoso minor.

Scabiosæ foliis bellidis species minor, Thal.

Scabiosa minor 1. 2. 3. 5. Tab.

Scabiosa media, minima, minor & major, Ger.

Scabiosa angustifolia flore subcæruleo, Eyft.

Folio



Foliorum diffinitionibus variant, cum alteri ad medium nervum tenuissimè dissecta sint, alteri non item: tertia folia inferiora penitus dissecta non habet.

I V. Scabiosa capitulo globofo foliis in tenuissimas lacinias divisis

Scabiosa tenuifolia species altera, Thal.

Scabiosa tenuifolia flore cæruleo, Eyst.

V. Scabiosa minor capitulo globofo odoro.

Phyteuma minus, Col.

*Scabiosa stellata.*

I. Scabiosa stellata folio laciniato major.

Scabiosa Hispanica major, Clus. hisp. & hist. Lob.

Lugd. Tab. Ger.

Scabiosa peregrina, Dod. Cæf.

Scabiosa Hispanica, Cam. Eyst.

II. Scabiosa stellata folio laciniato minor, sive maritima.

Scabiosa Hispanica minor, Clus. hisp. & hist.

Scabiosa Hispanica minor, vel altera, Lugd.

Scabiosa peregrina altera species, Dod.

Hæc si in hortis colatur pedalem altitudinem excedit.

III. Scabiosa stellata minima: quæ in Prodr.

I V. Scabiosa stellata folio non dissecto.

Scabiosa peregrina, Lob. Lugd. Ger.

Scabiosa arborescens, Cæf.

Scabiosa peregrina foliis non dissectis, Tab.

Scabiosa arborea Cretica, Pona.

Habet Camerarius Scabiosam Gallicam folio oblongo, tenui, nigricante, nitido: sed nostræ folia incana sunt.

# J A C E A.

JACEA adeo Scabiosa similis est, ut eam Scabiosam nominare soleant: sunt tamen qui velint Hyosiridem esse Plinii L. 27. c. 11. quam Intrubo similem sed minorem, & tactu asperiores, scribit.

*Jacea non laciniata.*

I. Jacea nigra pratensis latifolia.

Scabiosa vulgaris pratensis, vel 4. Trag.

Centaurei pratensis species, Gesf. hor.

Gethia nigra Scaligeri, Eid.

Jacea nigra, Eid. Tab. Ger. fl. purpureo, Eyst.

Cyanus ty. angustifolius, Thal.

Jacea alia nigra, Lugd.

Solidago Sarracenicæ altera, Lon.

Hujus folia inferiora quandoq; laciniata sunt:

quæ & floribus albis pingitur in hort. Eyst.

II. Jacea nigra angustifolia, vel Lichospermi

rensis foliis: quæ in Prodro.

Variat: alia caule & vi eoq; cum foliis virente:

alia caule aspero rufescente, vel molli tomento ve-

luto, foliisque incanis.

III. Jacea fruticans pini folio.

Tebe capitata rosmarini folio, Pona.

Chamaepitys fruticosa Cretica Belli, Eid.

Chamaepitys. Bertholo.

I V. Jacea integrifolia humilis: quæ 2. in Pro-

dro.

V. Jacea nigra squammoso capite major.

Jacea Austriaca prima, Clus. pan.

Jacea squammosa capite montana, Eid. hist.

VI. Jacea nigra squammoso capite minor.

Jacea Austriacæ primæ aliud genus, vel Jacea

montana squammoso capite minor, Clus. pan.

Jacea squammato capite montana 2. Eid. hist.

VII. Jacea latifolia capite hirsuto.

Jacea Austriaca secunda, vel Jacea montana villo-

so capite elatior, Clus. pan.

Jacea Austriaca villosa capite, sive 4. elatior, Eid.

hist.

Jacea panonica capitulo crispo, Cant. in Thal.

Cyanus syl. montanus integrifolius, &

Cyanus syl. *αυτοανανωστος*, Thal.

IX. Jacea angustifolia capite hirsuto.

Jacea montana villosa capite humilior, Clus. pan.

vel quinta, Eid. hist.

IX. Jacea alba hirsuto capite.

Jacea Austriacæ majoris villosa capite flore al-

bo, nomine, D. Fürerus Northusâ misit.

*Jacea laciniata.*

I. Jacea nigra laciniata.

Jacea nigra, Dod. ut: Lugdunens. vulgaris, Ad.

Lob.

Hyosiris Plinii, Ang.

Jacea Austriaca tertia, Clus. pan. at sexta in hist.

Jacea panonica Clusii hirsuto capite, Cam.

II. Jacea humilis alba Hieracii folio.

Jacea pumila, Ad. Lob. ico.

Jacea humilis Hieracii folio, Lugd.

Flore est albo: aliquando ex cæruleo obsoleto

purpureasce: Est major & minor.

III. Jacea laciniata squammata.

Jacea

Jacea squammato capite tertia Cretica, Clus. hist.

I V. Jacea laciniata lutea.

Jacea montana minima tenuifolia, Col.

V. Jacea latissimo laciniato folio: sub Jacea Babylonica in Prodromo descripta.

*Jacea laciniata capite spinoso.*

I. Jacea capite longis aculeis spinoso: quæ 3. in Prodromo.

II. Jacea lutea spinosa Centaurioides.

Jacea lævis maxima centaurioides Apula, Col.

III. Jacea lutea capite spinoso.

Jacea major lutea, Ad. Lob. ico. Lugd. Tab. Ger. Eyst.

Jacea lutea, Clus. hisp. & hist. Lugd. desc.

Spina folstitialis altera, Dod.

Carduus stellatus capitulis spinosis, Lob.

Carduus eriocephalus Dodonæi, Lugd. ico.

IV. Jacea Cyanoides echinato capite.

Jacea major folio multum laciniato, Ad.

Jacea major, Lob. Lugd.

Cyanoides flos, Dod.

Cyanoides major, Tab.

Jacea montana echinato capite, Clus. pan. & hist. five 7.

Stæbe Salmantica 2. Clus. hist. ico.

Flos purpurascens, rarius albus: rarissimè luteus.

V. Jacea foliis Seridis candicantibus, purpurea.

Jacea altera, Clus. hisp.

Jacea purpurea Valentina muricato capite, Clus. hist.

VI. Jacea laciniato Sonchi folio, sive Jacea latifolia purpurea capitulo spinoso: quæ 4. in Prodromo.

VII. Jacea minor foliis aculeatis: Cyani majoris nomine missa.

*Jacea laciniata incana.*

I. Jacea tomentosa capitulo spinoso: quæ 8. in Prodromo.

II. Jacea montana incana mollis capitulis hispidis: quæ 6. in Prodromo.

III. Jacea montana incana aspera capitulis hispidis: quæ 5. in Prodromo, qui volet has duas conjungat.

IV. Jacea montana candidissima Stæbes foliis, quæ in Phytopinace & Matthiolo sub Jacea incana laciniata: at in Prodr. sub 7. describitur.

V. Jacea montana incana capite pini. Chamæleon non aculeatus, Ad. Lob. ico.

Jacea montana, sive acanophora, Lugd.

Jacea alia pumila sive varia, Cam.

VI. Jacea montana incana odora.

Jacea montana Narbonensis, Lob.

Jacea muscata & quinta, Tab.

Jacea montana, Ger.

*Jacea olea folio.*

I. Jacea incana cyani capitulis.

Jacea incana altera Cyani aut Jaceæ capitulis, Ad.

Stæbe incana altera, Lob. ico.

Jacea incana, Lugd.

Cyano similis quædam, Cæf.

II. Jacea oleæ folio capitulis simplicibus. Parmica altera, Matth. Lugd.

Parmica, Lac. Cyano similis, Cæf.

Parmica Austriaca, Lob. Clus. pan. & hist. Dod. Cam. Ger.

III. Jacea oleæ folio minore flore.

Parmicæ Austriacæ species, Clus. eur. post.

IV. Jacea oleæ folio capitulis compactis.

Jacea pusilla incana altera folio oleæ, Lob.

Jacea incana folio oleæ, Lugd.

V. Jaceæ oleæ folio affinis.

Doricnyum Dioscoridis fortè, Ponnæ Ital.

Lagochimicæ nomine, semine ab Honorio Belli ex Creta missa, in horto anno 1600. crevit.

## STOEBE.

ΣΤΟΙΒΗ vulgaris est notitia, Dioscoridi lib. 4. cap. 12. Plinio lib. 22. cap. 11. Stæbe quam aliqui Phleom at lib. 21. cap. 15. quædam spinam in folio habet & in caule, ut Phleom quod aliqui Stæben appellant: ob quam utriusque brevitatē quid statuendum sit, dubium sanè: nihilominus tamen recentiorum aliqui, subsequentibus plantis id nominis tribuunt, quod extrema folia utcumque aculeata sint, quas tamen alii ad Cyanos, alii ad Centauria propter amorem referunt, ad confusionem vitandam, Stæbes nomen servabimus.

Stæbe

*Stœbefolia laciniata.*

I. Stœbe major foliis Cichoraceis, mollibus, lanuginosis.

Stœbe Salmantica prima, Cluf. hisp. & hist.

Stœbe Salmantica major, Lob.

Aphyllanthes prima, Dod.

Scabiosa, seu Stœbe Salmantica prior, Lugd.

Stœbe major, Tab.

Stœbe argentea minor, Ger.

Stœbe Hispanica, Cam.

II. Stœbe major foliis Erucæ mollibus lanuginosis.

Stœbe Salmanticæ primæ altera species, Cluf. hisp. Lugd.

Stœbe Salmantica secunda, Cluf. hist.

an Stœbe argentea incana Aldroandi, Lob.

Aphyllanthes tertia, Dod.

III. Stœbe major calyculis non splendens.

Centaurium majus in muris, Gef. hor.

Stœbe Salmanticæ alterius altera species, Cluf. hisp. Lugd.

Jacea, five Stœbe gallica, Cluf. pan.

Stœbe Gallica & Austriaca elatior, Eid. hist.

Cyanus syl. tenuifolius, Thal.

Jacea alba, Lugd.

IV. Stœbe viridis calyculis argenteis: in Pro-tromo.

V. Stœbe calyculis argenteis.

Stœbe Salmantica altera, Cluf. hisp. Lugd.

Stœbe Salmantica tertia, Cluf. hist.

Stœbe argentea Salmantica minor, Lob.

Aphyllanthes quarta, Dod.

Stœbe minor, Tab.

Stœbe argentea major, Tab.

an Stœbe, Ang.

an Papaver spumeum, Cæf.

VI. Stœbe calyculis argenteis minor.

Jacea alba, Tab.

Jacea flore albo, Ger.

VII. Stœbe incana Cyano similis tenuifolia.

Centaurii majoris species minor, Gef. col.

Cyano minori similis, Cluf. pan.

Stœbe Austriaca humilis, Eid. hist.

an Papaver spumeum aliud in faxosis, Cæf.

IX. Stœbe rubra Monspeliaca parvis Cyani capitulis: vel Jacea rubra angustifolia laciniata.

Jacea rubra major laciniola, Lugd.

X. Stœbe squammis asperis.

Aphyllanthes secunda, Dod.

*Stœbe non laciniata.*

I. Stœbe spinosa maritima.

Stœbe ex Cod. Cæsareo, Dod.

Stœbe peregrina, Cluf. hisp. ap. alt. aud.

Cyanus spinosus Creticus, Ponz Ital.

II. Sphæritis ex Cod. Cæsareo, Dod. quid?



## CYANUS.

CYANUS, à floribus cyaneo seu cæruleo colore, nomen accepit. Plinius lib. 21. cap. 8. de vestium emulatione cum floribus agens, ait, in nomine est & Cyani color: & cap. 11. Rosam, Cyanus excipit, Cyanum Amaranthum. At Hermolaus, Leucoium Dioscoridius censuit: & Cæspino, Struthium apud Theophrastum ex hoc genere videtur: verum Columna, Papaver Heracleum Theophrasti & Dioscoridi statuit: Lobelius num Chondrilla species à dubitat.

I. Cyanus montanus latifolius: vel Verbascum Cyanoides.

Verbasculum, Trag.

Cyanus major, Matth. Dod. ut: Lob. Lugd. Cast.

Cam. Ger. Eyf.

Cyanus major hortensis, Ad.

Cyanus montanus, Gef. hor. Tab.

Cyanus syl. Lon. flore grandi, Cæf.

Flore est magno cæruleo, aliquando umbilico purpureo: rarius flore albo est.

II. Cyanus segetum.

Ychnis agria, & Flos frumenti, Brunf.

ptilœcula, Trag.

Cyanus, Dod. gal. Turn. Gef. hort. Lon. Cæf. flos Dod.

Cyanus major, Matth. Lugd. Cast. Cam.

Cyanus syl. Fuch.

Cyanus vulgaris, Ad. Lob. Ger.

Cyanus cæruleus, Tab. arvensis cæruleus, Thal. Eyf.

Papaver Heracleum, Col.

Flos communiter cæruleus, rarius albus.

III. Cyanus hortensis flore simplici.

Floris colore variat, cæruleo, purpureo, hicque aliàs dilutè rubro & incarnato, aliàs ad puniceum inclinante, aliàs vario, violaceo, albo, & ex his co-

M m lori.

loribus mixto: hinc figuræ quatuor apud Tabernamontanum & Gerardum.

1. Cyanus cæruleus lativus, Tab. sub Cyano variegato apud Ger.

2. Cyanus purpureus, Tab. Ger.

3. Cyanus albus, Tab. Ger.

4. Cyanus ex albo violaceus, Taber. Cyanus violaceus, Ger.

Sic apud Eyst. fl. purpureo, incarnato, rubro, albo, albo fundo purpureo, variegato.

IV. Cyanus hortensis flore pleno.

Cyanus flore multiplici, Lob. ico.

Cyanus multiflorus, Tab. Ger.

Variae floris colore purpureo, albo, medio purpureo: hinc duæ figuræ apud Lob. & Ger. tres apud Taber.

1. Cyanus fl. purpureo multiplici, Lob. ico.

Cyanus purpureus multiflorus, Tab. Ger.

2. Cyanus fl. albo multiplici medio purpureus, Lob. ico.

Cyanus albus multiflorus medio purpureus, Tab.

3. Cyanus cæruleus multiflorus, Tab.

V. Cyanus repens latifolius.

Cyanus peramarus supinus capitalis squarosis siliamoidis parvi, Ad. Lob.

Cyanus repens, Lob. ico. supinus, Lugd.

Cyanoides minor altera, Tab.

VI. Cyanus repens angustifolius.

Cyanus repens alter, Lob. repens, Lugd.

Cyanus minimus, Ad. repens, Lob. ico.

Cyanoides minor, Tab.

## TRAGOPOGON.

**T**ΡΑΓΟΠΩΓΩΝ ἢ πλεγκώων, ἡδὲ κόμω, à proluxa lanugine, quæ à summo erumpit sibi nomen ascrivit, Dioscorides lib. 2. cap. 173. Tragopogon Theophrasto 7. hist. 7. At Plinio lib. 21. cap. 15. Come, ab alio Tragopogon, foliis Croci similibus. Et lib. 28. cap. 13. Est & Tragopogon quem alii Comen vocant, &c. Latinus Barbula hirci.

*Tragopogon luteo flore.*

I. Tragopogon pratensis luteum majus. Barbula hirci, Trag. Matth. Lac. Cast.

Tragopogon, Matth. Fuch. Ang. Gesn. hor. Turn.

Dod. Lon. Cæf. fl. luteo, Eyst.

Tragopogon luteum, Lob. Tab. Ger.

Tragopogon luteus communis, Thal.

Barba hirci, Cord. in Diosc. & hist. Dod. gal. Gesn.

hor. Lugd. flore luteo, Cam.

Gerontopogon flore luteo, Gesn. col. & Barba senilis.

II. Tragopogon folio oblongo sinuato: primo loco in Prodomo descriptum.

III. Tragopogon spicatum luteum.

Tragopogon spicatus, Lugd.

IV. Tragopogon laciniatum luteum.

Acorus Theophrasti, Ang.

Tragopogon laciniatis foliis, Col.

Folia prima graminea sunt, integra nec laciniata.

V. Tragopogon tenuissimè laciniatum: quod 1. in Prodomo.

an Chondrilla *παραπρωγωνίδειον* alia species, Thal.

VI. Tragopogon Coronopi folio.

Chondrilla *παραπρωγωνίδειον* major, Thal.

Duplex est: major: minor quæ sola magnitudi-

dine à priori differt.

VII. Tragopogon hirsutum.

Tragopogon Apulum hirsutum humile, Col.

IX. Tragopogon hirsutum venenatum.

Tragopogon ex Sicilia venenatum, Cæf. quid?

IX. Tragopogon gramineo folio radice villosa.

Barbula hirci minor, Tab.

Tragopogon minus, Ger.

X. Tragopogon parvum ex luteo purpurascens.

Tragopogon parvum flore Chondrillæ purpureo:

ruleæ, Lob. ob.

an Barbula hirci minor ex Ilva, Cam.

*Tragopogon purpureo flore.*

I. Tragopogon purpureo cæruleum porri folio, quod Aræbi vulgo.

Tragopogon alterum, Matth. Lugd.

Tragopogon. Dod. Lob. puniceum, Gesn. hor. purpureum, Ger. Eyst.

Tragopogon syl. flore purpureo, Cæf.

Barbula hirci altera, Matth. Cast. purpureo cærulea, Tab.

Barba hirci flore purpureo, Cam.

Gerontopogon flore puniceo, Gesn. col.

Gerontopogon five Salsifica Italorum, Lugd.

Flore est purpureo cæruleo, nigro purpureo, cæruleo:

rulcoalbo in Apennino Camerarius notavit.

II. *Tragopogon purpureo* & *creruleum* crocifoliū.

*Tragopogon crocifolium montanum*, flore nigro purpureo, Col.

III. *Tragopogon gramineis* foliis hirsutis.

*Tragopogon alter* gramineo folio suaverubente flore, Col.

## SCORZONERA.

**SCORZONERA** nomen est Hispanicum, à *scorzo vipera*, vel à *serpente scorzone*: quare idem est ac *Viperina* aut *Serpentaria*, quod contra viperarum & serpentum venena efficax sit. Sunt qui ad *Chondrillam* Dioscoridi referant, sed magis ad *Tragopogonis* genus reducenda.

### *Scorzonera latifolia.*

*Scorzonera latifolia* sinuata.

*Scorzonera Hispanica*, Matth. Lugd. Cast. Tab.

*Scorzonera*, Dod. Lob. Lon. Cæf. Cam. latifolia, Thal.

*Scorzonera major* Hispanica prima, Clus. hist.

*Scorzonera Germanica*, Tab.

*Tragopogon peregrinus* vel Hispanicus, Gesn. hor.

*Viperaria Hispanica humilis*, Ger. ico.

Ratione saporis radices duplex: communiter est subdulcis, ita ut à *Tragopogone* nihil ferè distet: altera radice est amara *Gentianæ* instar, & hoc *Tragopogon* veterum, Thalius censet. Floribus simplicibus & plenis Camerarius notavit.

### II. *Scorzonera latifolia altera.*

*Scorzonera Boëmica*, Matth. Lob. Lugd.

*Scorzonera major*, vel *pannonica* prima, Clus. pan. & hist.

*Scorzonera Germanica*, Tab. latifolia German. Eyf.

### III. *Scorzonera foliis nervosis.*

*Scorzonera altera*, Lob. ico.

*Scorzonera Germanica angustifolia*, Tab.

*Viperaria humilis*, Ger. ico.

IV. *Scorzonera latifolia humilis nervosa.*

*Scorzonera humilis latifolia* sive secunda, Clus. pan. Pannonica 1. Eid. hist.

*Scorzonera Pannonica*, Tab.

*Viperaria Hispanica*, Ger. ico.

### *Scorzonera angustifolia.*

I. *Scorzonera angustifolia* prima.

*Scorzonera humilis angustifolia* & *Pannonica* tertia, Clus. pan. & hist.

*Scorzonera Pannonica angustifolia*, Tab.

*Viperaria Pannonica angustifolia*, Ger.

II. *Scorzonera angustifolia altera.*

*Scorzonera Pannonica* 4. vel *Scorzonera humilis* fibrosa radice, Clus. pan.

*Scorzonera tenuifolia* prima, Thal.

*Hieracium septimum* Clus. hist.

Hæc radice est dulciscula, aut amara.

III. *Scorzonera angustifolia subærulea.*

*Scorzonera Pannonica* 5. vel major angustifolia, Clus. pan.

*Scorzonera tenuifolia altera*, Thal.

*Scorzonera angustifolia elatior* Pannonica 4. Clus. hist.

Variat foliis angustioribus, calyculis brevioribus, semine crassiore & brevior.

## CALTHA.

**CALTHA** Poëtarum hanc esse volunt, quam aliqui ab aureo colore floris, *Chrysanthemum* nominant, & quidem Dioscoridi lib. 4. cap. 58. At Columna in Phytobas. Clymenum Dioscoridi lib. 4. cap. 13. censet. Alii ad *Caltham* Plinii lib. 21. cap. 6. alii ad *Gromphanam* ejusdem, lib. 26. cap. 7. referunt. Dalechampi a cereo ipsius flore Cerinthem putat.

### I. *Caltha vulgaris.*

*Calendula*, Brunf. Trag. Dod. ut: Ang. Gesn. hor. Cæf. Cam. fativa, Tab.

*Caltha*, Matth. Fuch. Tur. Lon. Lugd. Cast.

*Caltha Poëtarum* & *Chrysanthemon oculatum* verius Dioscoridis, Ad.

*Chrysanthemum*, Lob.

*Calendula simplici* flore, Ger. Eyf.

*Clymenon* Dioscoridis, Col.

Flore est pallido, citrino, ruffo: quæ *Calendula* lutea mediocris, Eyf. aliquando reflorere & fruticosa evadit.

II. *Caltha polyanthos maxima.*

*Calendula multiflora* maxima, Tab. Ger.

III. *Caltha polyanthos major.*

*Calendula lutea*, fl. pleno, Eyf.

Mm 2

Variæ

Variat flore majore, minore, ejusque colore aureo, vel melino: hinc tres figurae apud Tabern. & Ger.

Calendula major polyanthos flore aureo.

Calendula polyanthos flore aureo.

Calendula lativa polyanthos melina.

IV. Caltha floribus reflexis.

Chrysanthemum sive Caltha reflexis floribus, Lob. ico.

Calendula multiflora orbiculata, Tab. Ger.

V. Caltha prolifera majoribus floribus.

Chrysanthemum proliferum, Lob. ico.

Calendula prolifera, Cam. Tab. Ger. Eyf.

VI. Caltha prolifera minoribus floribus.

Chrysanthemum proliferum alterum, Lob. ico.

Calendula prolifera 2. Tabern. major prolifera, Ger.

VII. Caltha arvensis.

Calendula circa Monspelium sponte, Gef. hor.

Calendula syl. minor, Cæf.

Calendula arvensis, Tab. Ger.

Folliis crenatis circa Monspelium reperimus.

IX. Caltha humilis & minima: in Phytopinace descripta.

IX. Caltha palustris flore simplici.

Caltha Virgilii, Trag.

Tusilago altera, Matth.

Dosterb. umeu/ Dodgal.

Chama leuce, Ang. Tur.

Chelidonia palustris, Cord. hist.

Caltha palustris, Gef. hor. (Ferraria quibusdam, forte à forma folii ferream soleam referentis)

Dod. Adv. Lob. Lugd. (& Malacocissus major) Cam. Ger.

Caltha palustris vulgaris, Clus. hist.

Chrysanthemum, Lon.

Epimedium Dodonzi, Thal.

Amellus Virgilii putatus, Eid.

Farfugium, Cast.

Populago, Tab.

Est flore majore & minore: hinc apud Tab. & Ger. nomine

Populaginis majoris & minoris, Tab.

Caltha palustris majoris & minoris, Ger.

Marem & faeminam facit Gef. l. de col. Stirp. illam ramulis rubentioribus, flore magis tincto: hanc minorem, albioribus ramulis, & flore minus tincto scribit.

X. Caltha palustris flore pleno: & Cam. & Clus. hist.

Caltha palustris floribus densis, Gef. hor.

Populago multiflora, Tab.

Caltha palust. multiplex, Ger. fl. multip. Eyf.

In Anglia sponte & plenis & odoratis floribus reperitur, Camerario autore: nobis hortensis est.

## HELENIUM ET FLOS SOLIS.

**E**'AE'NION Dioscoridi lib. 1. cap. 27. Helenium Plinio lib. 21. cap. 10. quod è lacrymis Helena natum dicatur, & ideo in Insula Helena laudatissimum esse: quo loci Plinius Aegyptiacum Dioscoridi proponit. Panax Chironium Theophrasti 9. hist. 10. quibusdam censetur.

Genera duo Dioscoridi: alterum foliis Verbasci, quod nostrum vulgatum est, ac à Plinio l. 19. c. 5. & l. 20. c. 5. Inula dicitur: Alterum Aegyptiacum, quod Helianthe est flore albo, de quo inter Cisti genera.

I. Helenium vulgare.

Enula campana, Brunf. Cam.

Elen'on, Trag.

Enula, Tur. Lon. Cæf.

Helenium, Brunf. Matth. Dod. ut: Cord. in Diosc.

Lac. Gef. hor. Ad. Lob. Cast. Cam. Tabern. Ger.

Eyf.

Helenium 1. Dioscoridis, Ang.

Inula, vulgo Enula campana, quod quæ in campis provenit hortenfi præferatur, Gef. hor.

Panax Chironium Theophrasti, Ang. Cord.

II. Helenio similis peregrina.

Faalim, Theveti: hujus iconem ex Theveti Cos-

mag. Lugd. habet: quid est?

III. Helenium Indicum maximum.

Planta maxima, Cortuso in epist. ad Matth. edit.

Ital. præfixa, Cast. cui & Bellis Pliniana.

Solis flos Peruvianus, Lob.

Chrysanthemum Peruvianum, Dod. Lugd.

Helianthemum Peruvianum, Cam. ep.

Herba Solis, Monardi.

Sol Indianus, Lon.

Helenium Indicum, Cæf.

Corona Solis, Tab.

Flos Solis gigantea, corona regia, crater Jovis, amoris tuba, rosa Hiericantis, Frag.

Flos

Flos Solis major, Ger. Eyft.

Flos à Sole dictus: Joieph. Acoftæ l. 4. c. 27.

an Planta prægrandis flore Calendulæ forma, ex  
cujus femine panem & pulvis in Virginia conti-  
nuit: in det. Virginæ.

Variat magnitudine foliorum & florum, caulis  
altitudine: adolescit enim in Hispania ad 24. pe-  
des. Flos (cujus folia in aliquibus longiora) ali-  
quando tantæ magnitudinis, ut 2362. semina in-  
venta fuerint: quem aliqui album viderunt.

IV. Helenium Indicum ramosum.

Chrysanthemum Peruvianum alterum, Dod.

Helianthemum Peruvianum proliferum, Cam. ep.

Flos Solis ramosus, Cam.

Corona Solis 2. Tab.

Flos Solis minor, Ger.

Flos Solis prolifer, Eyft.

In Italia viginti quatuor flores in una planta,  
plures in Hispania, sæpius contipiuntur: in Ger-  
mania etiam decem & plures observavimus.

V. Helenium Indicum mediū laciniato folio.  
Solis flos minor, Lob. Lugd. Cam.

VI. Helenium Indicum minus.

Corona Solis minor femina, Tab.

Flos Solis minor femina, Ger.

Ambo enim marem & feminam exhibent.

VII. Helenium Indicum tuberosum.

Flos Solis Farnesianus, sive Alter Peruvianus tu-  
berosus, Col.

Chrysanthemum latifolium Brasilianum, in Pro-  
dromo.

Chrysanthemum à Canada quibusdam.

Canada & Artichoki sub terra, aliis:

Gigantea, Burgundis.

## SECTIO QUINTA.

*PERFOLIATA; BUPLEURUM; CENTAURIUM MI-  
NUS; GRATIOLA; HYPERICUM; CORIS; SYMPHYTUM PE-  
træum; Polygonum; Anthyllus; Sedum; Coryledon; Aloë.*

### PERFOLIATA.

**P**ERFOLIATA dicta, quod singula folia caulis penetret: quam alii *Cacaliæ* Dioscoridis l. 4. cap. 123. su-  
spiciantur: alii *Coryledonem* ejusdem l. 4. c. 92. pronunciantem, ni radix obstat. Alii *Seseli Aethiopicum* e-  
jusdem l. 4. c. 61. censent.

I. Perfoliata vulgarissima, sive arvensis.

Perfoliata, Brunf. Matth. Fuch. Eric. Cord. Dod.  
ut: Ang. Gein. hor. Lon. Cord. hist. Lugd. Tabern.  
Eyft.

Perfoliata vera, Thal. vulgaris, Ger.

Perfoliata major, Trag.

Cacalia, Lac.

Perfoliatum vulgatius flore luteo folio umbili-  
cato, Ad. Lob.

Seseli Aethiopicum Dioscoridis, Cæf.

II. Perfoliata flore multiplici.

Perfoliata crispa ceu muscosa, Cam.

III. Perfoliata montana latifolia.

Perfoliata montana, Ger. Lugd. Cam.

IV. Perfoliata montana floiculis parvis.

V. Perfoliata alpina latifolia minor: hæc t. in  
Prodromo.

VI. Perfoliata alpina angustifolia major, sive  
folio anguloso: hæc 2. in Prodromo.

VII. Perfoliata alpina angustifolia media:  
quæ 3. in Prodromo.

an Perfoliata largifolia Dalechampii, Lugd.

IX. Perfoliata alpina angustifolia minor:  
quæ 4. in Prodromo.

IX. Perfoliata alpina gramineo folio, sive  
Bupleuron angustifolium alpinum.

Sedum petræum Bupleuri folio, vel Bupleuron  
petræum gramineo folio, Ponæ.

X. Perfoliata minor angustifol. bupleuri folio.  
Odontitis lutea, Lugd.

Perfoliatum angustifolium montanum, Col.

XI. Perfoliata alpina angustifolia minima:  
vel Bupleuron angustifolium Pyrenaicum: s. lo-  
co in Prod. describitur.

an Seseli Aethiopicum parvum foliis gramineis,  
Cæf.

XII. Perfoliata minor ramis inflexis: quæ 6.  
in Prodromo.

Mm 3 BUPLEU.

**B**OΥΠΑΕΥΡΟΝ Hippocrati & Nicandro in Tberiaco. Plinius l. & c. 22. Bupleuri meninit, ubi aliqui Animi vulgatus intelligendum censent: licet Bupleuron Plinius, rectius Valeriana campestris, quae etiam Lactuca agnina dicitur tribui videatur. Quare aliū hoc nostrum Bupleuron, βούπλεον dicitur, cuius Theophrastus 7. hist. 8. inter olera mentionem facit: Et Buprestū Plinio l. & c. 22. Sunt qui ad Panaces Chironium Dioscoridi, alii ad Elaphoboscum referunt.

## I. Bupleuron folio rigido.

Beupleurum, Ang. majus, Gef. hor.

Elaphoboscum &amp; Gratia Dei Gallis, Eid.

Bupleurum alterum latifolium, Ad. Lob. Dod. Lugd.

Bupleurum latifolium, Tab. Monspeliensium, Ger.

Panaces Chironium quorundam, Lugd.

## II. Bupleuron folio subrotundo, sive vulgatissimum.

Herba vulneraria, Trag.

Isophyllon, Cord. hist.

Beupleurum, Dod. gal. Gef. hor. Ad. Lugd.

Auricula leporis Monspeliensium, Gef. hist. anm.

Panax Chironium Dioscoridis, Lon.

Bupleurum angustifolium, Dod. Tab.

Bupleurum angustifolium Monspeliensium, Ger.

Bupleurum angustifolium herbariorum, Lob.

Sanamunda quibusdam.

Folia inferiora subrotunda, quae in caule longa &amp; angusta sunt.

## III. Bupleuron angustissimo folio.

Bupleuron minimum, Col.

## CENTAURIUM MINUS.

**C**ENTAURIUM duplex est: majus de quo supra capite de Lapsibo: minus aliud, quod κενταύριον ἡ μικρόν ἔστι, quoniam loca rigua amat Dioscoridi l. 3. c. 9. At Theophrasto 9. hist. 4. Πέντατον Panax tenuifolium dicitur. Plinio l. 25. c. 6. Centaurium alterum cognimine lepton, quod aliqui Libadion vocant, quoniam secundum fontes nascitur: Fel terre propter amaritudinem summam dictum. Gallis Exacon (κενταύριον ἀπὸ τοῦ ἀμαίνοντος) quoniam omnia mala medicamenta potum è corpore exigit per alvum: Tertia est Centaurium cognimine triorchus, &c. hac Plinius.

## I. Centaurium minus.

Centaurea, Brunf. Cæf. minor, Brunf.

Centaurium minus, Trag. Mat. Fuch. Ang. Dod.

ut: Tur. Cord. in Diosc. Gef. Lac. Lon. Cam. Thal.

Lugd. Cast. Tab.

Centaur. minus flore rubro, Eystett. quod &amp; fl. albo pingit.

Centaurium parvum, Ad. Lob. Ger.

Flos communiter è puniceo colore in purpura rubet: aliquando albus est: rari⁹ ferruginei coloris. Variat etiam ratione folii, Theophrasto 4. hist. 5. monente; in humidis enim, altius excrefcit: in aridibus, vix duas aut tres unicas aequat.

## II. Centaurium minus apicatum album: in Phytop. Matth. &amp; Prodromo descriptum.

## III. Centaurium luteum perfoliatum.

Perfoliata Achillæa, Gef. hor.

Centaurium luteum, Ad. Clus. hisp. prius, Lugd. Eystett.

Centaurium floribus luteis sive citreis pallidis Mesuæ, Lob.

Centaurium luteum perfoliatum, Cam. ep.

Achilleos, Cæf.

Centaurium parvum flavo flore, Clus. hist. luteum, Ger.

Centaurium minus luteo flore perfoliatum, Tab.

Hoc videtur Achilleon vera Plinii l. 25. cap. 5. quam scribit esse scapo cæruleo pedali, sine ramis, ex omni parte singulis foliis rotundis eleganter vestitam: vulneribusq; mederi. Et Mesuæ, l. 1. purg. 10. Centaurium floribus citreis pallidus.

Duplex est: alterum foliis angustioribus & non perfoliatis: alterum latioribus & caulem ambientibus: caule ramofo & non ramofo, & hoc est

Centaurium luteum alterum, Lugd.

## IV. Centaurium luteum pusillum,

Centaurium luteum novum, Col.

## GRATIOLA.

**G**RATIOLAE sive Gratia Dei nomen, recentior aetas tribuit, propter singulares vires, tam per superius quam per inferiora humores expurgandi, & recentia vulnera consolidandi: Hac veteribus indistincta videbatur.



quævis aliqui Papaver spumeum Dioscoridi l. 4. c. 67. alii Eupatorium Mesies esse velint. Centaurida alii faciunt, nec male cum Centaurii minoris species esse videatur: & inter spurias Centaurii minoris appellationes, Hellebri- nes & Multiradicis appellationes exstant, quæ Gratiola competere videntur, cum Hellebri modo purget, & radici- bus complurimis firmetur. Sunt qui Perficariam minorem apud Sylvaticum credant.

Gratiola centauroides.  
Gratiola, Matth. Dod. ut: Gef. hor. Ad. Lob. Lug.  
Cast. Cam. Tab. Ger.  
Gratia Dei, Lac. altera, Cæf.  
Gratia Dei, cujus semen Gelbenech, papaver spu-  
meum fortè, Ang.  
Limnesium sive Centauroides, Cord. hist.  
Eupatorium Mesie, Cord. schol.

Gratiola sive Centaurium aquaticum, fortè Po-  
lemonium palustre amarum Hippocrati veteri-  
nario, Gef. col.

Gratiola vulgo dicta, quæ quibusdam verius Hys-  
sopum vulgare censetur, Col.

Gratiola flore albo & Gratia Dei, Eysf.

Flos communiter purpuratens, aliquando as-  
bus, rarius luteus: folia minus magisve crenata.

## HYPERICUM.

**Y**περιχον οἰ δὲ Ἀνδριανῶν, οἰ δὲ Ἑλλήνων, οἰ δὲ Ἀμαρύντιος. quoniam semen odore pineam resinam imite-  
tur, Dioscoridi l. 3. c. 171. Et Plinio l. 26. c. 8. Hypericon quod alii Chamapityn, alii Corion appellant. Perso-  
rata vulgo, quod folia Soli objecta innumeris foraminibus scateri videatur: hinc & porosa quibusdam.

Genera: Dioscorides, præter vulgatum Hypericum & alterum sequenti capite exhibet, quod Ἀνδρο-  
πέον, ἢ Ἀνδριανῶν dicatur, hypericigenus esse magnitudine distans, cum majus & fruticosius sit: & Androsæ-  
mon dici, quod fructus, qui resinosi odoris est, attritu digiti veluti cruententur. Et sequenti capite Ἀνδριανῶν, οἰ  
δὲ Ἀμαρύντιος. οἰ δὲ Ἀνδροπέον ab Hyperico & Ascyro differt, &c. Plinio l. c. & l. 26. cap. 15. duplex est Hypericum:  
aliud oleaceo frutice tenui, cubitali, rubente &c. Aliud quod Corion appellant folio Tamaricis &c. Eid. l. 27. c. 5.  
Ascyrum sive Ascyroides Hyperici genus est, cujus coma trita velut cruentant: qua de causa quidam hanc Androsæ-  
mon vocaverunt. Idem. c. 4.

I. Hypericum vulgare.  
Hypericum, Brunf. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac.  
Lon. Dod. Ad. Lob. Cæf. Lugd. Cast. Cam. Tab.  
Ger. Eysf.

Herba perforata, & Hypericum vulgare, Trag.  
Ascyron, Dod. gal. Cord. in Diosc.  
Androsæmon minus, Gef. col.

Apud Dioscoridem inter Rutas sylvestres (cum  
pluribus species credatur) hujus descriptio etiam le-  
gitur.

Folius modo latioribus, modo angustis variat,  
quod Tragus duabus figuris expreissit: caules  
quoque ejus, quod in humentibus provenit, quadra-  
lunt, alibi verò rotundi. Hujus etiam mi-  
nor species caule quadrangulo, foliis non per-  
foratis.

II. Hypericum numulariæ folio: quod in  
Prodromo describitur.

III. Hypericum folio brevior.  
Hypericum Syriacum & Alexandrinum, Lob.  
Hypericum Syriacum, Lugd. Ger.  
Hypericum Alexandrinum, Tab.

IV. Hypericum minus cretum.  
Hypericum pulchrum vel quartum, Trag.  
Androsæmon, Lon.

an Hyperici minor species, Thal.

Hoc cum utriculis circa caulem reperitur.

V. Hypericum minus supinum, vel supinum  
glabrum.

Hypericum exiguum & primum, Trag.

Hypericum minus, Gef. col. Dod.

Hypericum minimum supinum Septentrionale,  
Lob.

Hypericum supinum tertium minigū, Clus. hist.  
Ascyro adpinxit, Cam. ep.

Hoc interdum exiguum est, aliquando magno  
celsipite serpit: hoc, Lobelius in obier, illud, in ico-  
nibus expreissit.

VI. Hypericum supinum tomentosum ma-  
jus, vel Hispanicum.

Hypericum supinum, Clus. hisp. tomentosum  
Hispanicum, Eid. hist.

Hypericum minimum supinum Septentrionalis,  
Lob. oblico.

Hypericum humi stratum, Lugd.

Ruta sylvestris Dioscoridis, Johanni Placæ, quæ  
à Ruellio inter notha rejecta.

VII. Hypericum supinum tomentosum mi-  
nus, vel Montpelliericum.

Hypericum supinum, Dod.

Hyperic-

Hypericum alterum tomentosum, Ad.

Hypericum tomentosum, Lob. Lugd. Tab. Ger.

Hypericum tomentosum secundum, Clus. hist.

Androsæmum album Dalechampii, Lugd.

Lobelius cum priore idem dicit: at Clusius negat idem esse.

*Hypericum Ascyron dictum.*

I. Ascyrum supinum villosum palustre.

Ascyrum supinum *εραδον*, Clus. hist. ap. alt. auctario.

II. Ascyrum, sive Hypericum bifolium glabrum non perforatum.

Hypericum in dumetis nascens primum, Trag.

Ascyrum, Matth. ep.

Androsæmon, Matth. fol. Fuch. Tur. Lac. Cord.

in Diosc. Cast. Gesf. col. (& Ascyroides) Cast.

Hypericum aliud, Dod. gal.

Androsæmon Campoclarense, Col.

III. Ascyrum magno flore: in Prod. describitur.

IV. Androsæmon hirsutum.

Hypericum in dumetis nascens 2. Trag.

Androsæmon, Matth. ep.

Ascyrum, Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac. Gesf. col.

Dod. Ad. Lob. Lugd. Cast. Thal. Cam. Czf.

Hypericum, Dod. gal.

Androsæmon alterum hirsutum, Col.

V. Androsæmon alterum foliis Hyperici, quod aliquibus Hypericoides.

Androsæmum magnum, Ad.

Androsæmon, Lob.

Ruta syl. Hypericoides, Dod.

VI. Androsæmon perfoliatum & perforatum.

Androsæmon alterum Apulum, Col.

VII. Androsæmon maximum frutescens.

Androsæmum, Dod. ut: Gesf. hor. Lugd. Czf. Majus, Cam.

Androsæmum aliud, Lugd.

Clymenum, Ang. Gesf. hor. Cast. ico.

Clymenum Italicum, Ad. Lob. Ger.

Siciliana, Gesf. hor. Col. Eyst.

Herba Siciliana, Tab.

Androsæmon Diosc. Galeni & Plin. & Ceteri.

Theophrasti, Czf. alpino.

Clymenon Plinii l. 25. c. 7. Anguillaræ, quod potius Periclymenum Dioscoridis est.

IX. Androsæmum foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis.

Tragium Creticum, Bellon.

Tragium, Belli ep. 3. ad Clus. legitimum, Ponz.

Androsæmum minus, Cam.

Ascyrum legitimum, vulgo *εραδον*, Belli ep. ad Clusium.

Androsæmum foetidum seu tragodes, Eyst.

## C O R I S.

**K**O'PIΣ quod aliqui Hypericum vocant, Dioscoridi l. 3. c. 174. frutex est folio Erica: Et Plinio l. 26. c. 14. aliud Hypericum quod alii Corin appellant folio tamaricis.

I. Coris lutea.

Coris, Matth. Gesf. hor. Lac. Lob. Lon. Czf. Lugd.

Cast. Cam. Tab.

Coris Matthioli, Ad.

Coris legitima Erica similis, Belli ep. 1. ad Clus.

Coris legitima Dioscoridis, Ponz.

II. Coris cærulea maritima.

Coris Monspelica, Ad. Lob. Cam. Tab.

Coris quorundam, Clus. hisp. & hist.

Flore est cæruleo, rarissime rubro.

## SYMPHYTUM PETRÆUM.

**Σ**ΥΜΠΤΟΝ ΠΕΤΡΑΓΟΝ in petra nascitur, ramulis Origano similibus, foliis Thymi, &c. Dioscoridi l. 4. c. 9. Alum nos vocamus, Græci Symphytum petræum: nascitur in petra, ideo petræum cognominatum, &c. Plinio l. 27. c. 6.

Symphytum petræum foliis Thymi.

Symphytum petræum, Matt. Lac. Lon. Lug. Tab.

Symphytum petræum Matthiolo creditur, Ad.

Symphytum petræum Matthioli, ad Coridem

Gallicam plurimum accedere videtur, Clus. hist.

Hoc ex agro Goriteni, ubi & Matthiolus novit, à Doct. Agerio accepimus: quod à Coride Monspelica diversum est.

## P O L Y G O N U M.

**Π**ΟΛΥΓΟΝΟΝ Dioscoridi l. 4. c. 4. à copiosis geniculis quibus caules cinguntur, dictum. Plinio l. 27. c. 14. Polygonon Græci vocant, quam nos Sanguinariam.

Genera duo Dioscoridis, mas & femina, de qua inter Equiseti species: mas, à seminibus sub singulis foliis turgescentibus, flos ei candidus, aut puniceus. Plinius Lc. qui plura genera Polygoni faciunt, hanc rem intelligi volunt, appellariq; à multitudine feminis, aut densitate fruticis Calligonon. Alii Polygonaton à frequentia geniculorum, &c. ubi quatuor genera recensentur: primum est Polygonum vulgare: alterum Herniaria: tertium Polygonum semina Dioscoridis: quartum quibusdam Casta lignea Monspelienfium videtur: sed rectius tribuitur ei planta, quam Polygoni nomine Clusius proposuit.

*Polygonum majus.*

I. Polygonum latifolium.

Herba proserpinaca (à serpendo) Apulejo.

Centumnodia, Brunf.

Polygonon, sive Polygonaton & Corrigiola, Eric. Cord.

Polygonum masculum, Trag. Lac.

Polygonum mas, Matth. Fuch. Dod. ut: Ang. Cord. in Dioic. (& Sanguinalis mascula à cohibedo sanguine) Gef. hor. Cæf. Thal. Lug. Cast.

Polygonum primum, Tur. vulgare, Cam.

Polygonum mas vulgare (Sanguinaria, Centumnodia) Ad. Lob. Ger.

Polygonum majus, Lon. Tab.

Aliud flore est candido, aliud ex purpura candicante, vel rubente.

II. Polygonum oblongo angusto folio.

Polygonum tertium, Tab.

III. Polygonum brevi angustoque folio.

Polygonum secundum, Tab.

Polygonum mas minus, Ger.

an Polygonum masculum fruticosum, Thal.

IV. Polygonum saxatile: quod 1. in Prodom.

V. Polygonum maritimum latifolium.

Polygonum marinum maximum, Ad. Lob. ico.

Polygonum marinum, Lob. ob. Cam. ep. & hor.

Polygonum marinum prius Dalechampii, Lugd.

Polygonum tertium in maritimis, Cæf.

Floiculis est purpurascens, est & albis.

VI. Polygonum maritimum angustifolium.

Polygonum marinum alterum Dalechampii, Lugd.

*Polygonum minus.*

I. Polygonum cocciferum: & Cam. ep.

Radicibus coccum adnascitur elegantissimo colore commendatum.

II. Polygonum angustissimo & acuto vel gramineo folio minus repens.

Polygonum, Germanis *Knarwel*/ Trag.

Polygonon 3. Dod. gal. exiguum, Eid. fol.

Saxifraga Anglica, Ad. Lob. ico. Lugd.

Polygonum minus seu femina, Lon.

Polycarpon à feminis copia, Lugd.

Polygonum minus polycarpon, Tab.

Polygonum selinoides sive *Knarwel*, Ger.

Varietas magna in hac planta observatur.

III. Polygonum gramineo folio majus etiam.

Polygonum minus alterum, Tab.

Anthyllis Valentina Clusii, Ger. ico.

IV. Polygonum angustissimo folio affinis.

Hæmorrhoidalis, quæ ad Caryophylleorum syl. classem referri debet, Clus. hist. ap. alt. ad l. 6.

Hæmorrhoidalis Aldroandi nomine, quæ à sanguine sistendo nomen habeat, ex Italia, circa Ravennam natam (etiam ex Valesia) accepimus.

V. Polygonum minus candicans.

Polygonum montanum minimum niveum & sericeum, Ad. Lugd.

Polygonum montanum niveum minimum, Lob.

Poronichia Hispanica, Clus. hisp. & hist.

Polygoni Hispanici genus, Lugd.

Polygonum montanum, Tab. Ger.

an Herba Turca montana, Cæf.

Variat ratione ætatis, nam adulta paleaceas membranulas niveas habet, quemadmodum Adv. & Lugd. pingunt: planta novella non item, sicut Clus. & Lob. proposuere: Sic in Belgio nata multum de candore suo remittit.

VI. Polygonum montanum vermiculata foliis.

Vermiculata montana nova, Col.

VII. Polygonum Creticum Thymi folio: quod 2. in Prodomo.

IX. Polygonum littoreum minus flosculis spadiceo albicantibus: quod 3. in Prodomo.

IX. Polygonum minus tenuifolium: quod 4. in Prodomo.

X. Polygonum maritimum minus foliolis Serpilli.

Polygonum alterum pusillo vermiculato Serpilli folio, Ad. Lob. ico.

Polygonum alterum Serpilli folio, Lugd.

XI. Polygonum minus, seu Millegrana major. Empetrum, Trag. Lon.

Polygonum minus, Matth. Cast.

Na

Epipactis, Ang.

Millegrana, Cord. hist.

Herba cancri minor, Cord. sch.

Herniaria, Gesl. hor. col. Dod. Lug. (cui & Lithon-

tribon ab effectu) Thal. Cam. Tab. Ger.

Herniaria multigrana serpillifolia, Ad.

Herba Turca, Lob. Cæs.

Polygoni genus Herniaria appellata, Clus. hist.

Hoc duplex est: aliud glabrum, aliud hirsutum. Et etiam Herniaria fruticosa viticulis li-

gnosis, foliolis oblongiusculis, brevis, densissimus.

XII. Polygonum minus lentifolium: quod 4. in Prodromo.

XIII. Polygonum minimum, sive Millegrana minima.

Millegrana minima, Lob. ico.

Herniaria altera, Thal.

XIV. Herba ad rupturas utilis Monardis & ex eo Lugdunensis historiz, quid est?

## ANTHYLLIS

**A**ΝΘΥΛΛΙΣ Dioscoridi l. 3. c. 153. duplex est: altera foliis lenti similibus, mollibus: altera foliis Ajacis, qua inter Chamæpitydes actum. Plinius l. 26. c. 8. illam Anthyllon vocat.

I. Anthyllis maritima Chamæsyce similis.

Anthyllis marina Narbonensium altera, Chamæsyces facie, Ad. Lob. ico. Lugd.

Huic similis aut eadem est.

Anthyllis Valentina, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd.

Peplion sive Peplis, Dod.

Chamæsyce Dalechampii, Lugd.

II. Anthyllis maritima lentifolia.

Anthyllis prior lentifolia maritima Peplios effigie, Ad. Lob. ico.

Anthyllis prima, Cast.

Anthyllis Portlandæ lentifolia Penz. Lugd.

III. Anthyllis maritima Alfinefolia.

Paronychia altera, Matth. Lugd.

Paronychia, Ang. Tab.

Gramen secundum Plinii, Ang.

Anthyllis marina incana alfinefolia Narbonensium, Ad. Lob. ico. Lugd.

Centumgrana, Cæs.

Παραύλα Dioscoridi l. 4. c. 54. & Gramen secundum Plinii l. 24. c. 19. Anguillara credidit.

Variet foliis modo subrotundis, modo oblongis.

IV. Anthyllis Chamæpitydes frutescens.

Anthyllis altera Chamæpity similis, Cord. Diof.

an Chamæpitys vermiculata, Ad. Lob. ico.

an Chamæpitys Dioscoridis Penz. Lugd.

an Anthylloides minor, Thal.

## SEDUM

**A**ΙΣΩΝ Dioscoridi l. 4. c. 89. διὰ τὸ ἐνδολὲς ἔχει φύλλον, quia folia perpetuo vireant: quare Ἰσώνιον apud Theophrastum i. hist. 16. Sempervivum Gaza vertit: cui hoc & natura ut semper humidum, vireat, durare valeat, eadem Theophrasto 7. hist. 14.

Genera Dioscoridi tria sunt: magnum, parvum, & tertium, quod aliqui Ἰσώδην αἰσῶν, ἢ Ἰσώνιον, ἢ Ἰσώνιον vocant: Ἰλλεεβραν vocant: quorum priora duoresferant, tertio vix est excaesuloria. Plinio l. 23. c. 19. Sedum duo genera: majus, quod aliqui Buphthalmion vocant, alii Zoophthalmion, alii Stergethron, quod amatorum conueniat: alii Hypogefon, quoniam in subgrundiis serè nascitur. Italis Sedum magnum, aut oculus, aut digitellus. Aliorum minusculum, quod Eriothales vocant, alii Tritiales, quia ter floreat, alii Chrysiothales, alii Isoetes: Sed alii Ἰσώνιον agriam vocant: Itali Illecebram: hactenus Plinius secutus Dioscor. Sedum inquit Festus, alii Sedum appellant. herbam quam Opilius Aurelius Sefuvium vocari ait, eamq; in tegulis feri: hoc forte factum, quod nonnulli locis plebis animos invaserit opinio, non ferri fulmine domum, an cuius tegulis Sedum vireat.

Sedum majus.

I. Sedum majus arborecens flosculis candidis.

Aizoon magnū Dioscoridis, si caulis altitudo & foliorum longitudo spectetur.

Sempervivum arborecens, Matth. Cast.

Sedum majus verum, Gesl. hor.

Sempervivum majus, Ang.

Sempervivū sive Sedum arborecens majus Dod. Sedum arborecens Græcum, Illyricum & Anglicum, sive maritimum, Ad.

Sedum arborecens majus Græcū, Lob. ico. Eyll.

Sempervivi maioris alterum genus, Cæs.

Sedum majus, Clus. hisp. legitimū, Eid. hist.

Aizoon arborecens, Lugd. Cam.

II. Sem-

II. *Sempervivum arborescens alterum*, Matth.

Cast. Lugd. An diversum à priore?

III. *Sedum majus vulgare*.

*Aizoon magnum Dioscoridis*, quoad postrema Dioscoridis verba.

*Sempervivum majus*, Brunf. Matth. Ger.

*Umbilici Veneris species altera*, Ang.

*Sedum majus*, Fuch. Cord. in Dioscor. (& Vitalis major) Lac. Tab. magnum, Tur.

*Sedum seu Sempervivum vulgare majus*, Gef. hor.

*Sempervivum primum*, Lon. majus primum, Cæf.

*Sempervivum majus*, Dod. gal. Lob. Cast.

*Sempervivum majus alterum sive Jovis barba*, Dod.

*Sempervivum*, sive *Sedum majus crenatum Myrtilifolium*, Ad.

*Aizoon majus*, Lugd. Cam.

*Coryledon altera prima*, sive *Sedum majus vulgare*, Clus. hist.

*Sedum vulgare*, Eyf.

IV. *Sedum majus montanum dentatis foliis*.

*Coryledon altera montana*, Clus. pan.

*Coryledon altera secunda*, Eid. hist.

*Aizoon sive Sempervivum majus*, Thal.

V. *Sedum majus montanum dentatis foliis alterum*.

*Coryledon altera montana minor*, Clus. pan.

*Coryledonis alterius altera species*, Eid. hist.

VI. *Sedum majus montanum foliis non dentatis, fl. rubentibus*.

*Coryledon altera Taurica*, Clus. pan.

*Coryledon altera tertia*, Eid. hist.

*Sedum minus flore rubente*, Eyf.

VII. *Sedum Nicotiana flore*.

*Sedum Malagascarium*, Clus. exot. quid?

#### *Sedum minus.*

I. *Sedum minus teretifolium album*.

*Sempervivum minus album*, Brunf.

*Sempervivum foemina*, Eid.

*Sedum minus primum*, Trag. Clus. hist. alterum, Gef. hor.

*Sempervivum minus*, Matth. Ang. Cast. Cæf.

*Sedum minus*, Lac. offic. Ger. minus foemina, Fuch.

*Sedum foemina*, Tur.

*Crassula minor*, Dod. gal.

*Sempervivum quartum*, Lon.

*Tragus herba*, Cord. in Diosc.

*Vermicularis & Illecebra major*, Ad. Lob. Lugd.

*Vermicularis flore albo*, Cam.

*Aizoon minus foemina*, Lugd.

*Aizoi minoris species*, Thal.

*Sedum minus hæmatodes secundum*, Tab.

II. *Sedum minus teretifolium alterum*.

*Sempervivum tertium*, Lon.

*Aizoon minus Matthioli*, Lugd.

*Sedum medium teretifolium*, Ad. Lob. ico.

*Sempervivum parvum*, Lob.

*Sedum minus alterum*, Clus. hist.

III. *Sedum minus teretifolium luteum*,

*Sedi minoris 2. species*, Trag.

*Sempervivum minus æstivum*, Lob. Lugd.

*Aizoon medium*, Thal.

IV. *Sedum minus folio circinato*.

*Aizoon dasyphyllum*, id est densifolium, Lugd.

*Sedum minimum frigidum*, Clus. hist.

*Sedum minus septimum*, Clus. hist.

V. *Sedum minus luteum folio acuto*.

*Sedum minus*, Tur. mas, Fuch. hæmatodes, Tab. Gerar.

*Sempervivum minus*, Dod. gal. primum, Eid. fol.

*Aizoon hæmatodes*, Lob. ico.

*Aizoon minus*, Lugd.

*Sedum minus quintum*, Clus. hist.

VI. *Sedum minus luteum ramulis reflexis*,

*Aizoon Scorpioides*, Lob. ico.

*Aizoon minus flore luteo inflexo*, Cam.

*Sedum minus quartum*, vel *Sedum minus Dioscoridis primum*, Clus. hist.

VII. *Sedum arvense flore rubente*: quod 9. in Prodomo.

IX. *Sempervivum minus vermiculatum acre*,

*Aizoon tertium*, Dioscoridis.

*Portulaca tertia*, Brunf.

*Sedum minus tertium & Vermicularis*, Trag.

*Sempervivum minimum sive 3. Matth. Cast.*

*Gramen 3. Plinii & Sempervivum 3. Ang.*

*Illecebra sive Sempervivum 3. Dod. ut:*

*Sedi tertium genus*, Fuch. Lac. Tur.

*Aizoon minus*, quod male pro *Vermiculari* accipitur, Cord. in Diosc.

*Aizoon acre*, Cord. hist.

*Sedum tertium Dioscoridis*, Gef. hor.

*Sempervivum tertium*, deisc. at 2. icon. Lon.

*Sedum minimum*, *Illecebra*, *Sedi tertium genus non sempervirens*, Ad.

*Sempervivum minimum sive Illecebra*, Lob.

*Sempervivum tertium minimum alterum*, Cæf.

Aizoon minus fervidi gustus, Thal.

Aizoon minimum repens, tertium Diosc. Lugd.

Sedum minimum, Tab.

Vermicularis sive Illecebra, Ger.

Sedum minus octavum causticum, Clus. hist.

Sedum minus seu minimum causticum, Eyst.

Aizoi facie planta quæ Daſtylon 2. vel 3. Colum.

I X. Sempervivum minus vermiculatum insipidum.

Aizoon minimum, Cord. hist.

Sempervivum tertium minimum, Cæf.

Aizoon minus & Vermicularis insipida, Thal.

Sedum minus, seu Vermicularis insipida, Eyst.

A' priore non solum gustu differt, sed etiam foliis magis teretibus & tenuibus: floribus est utraque luteis, rarius albis.

X. Sedum minus fruticosum.

Sedum minimum arborescens vermiculatum, Lob. Lugd.

an Polygonum masculum fruticosum, Thal.

XI. Sedum minus fruticosum alterum.

Vermiculatum fruticis varietas major, Lob.

Vermiculatum frutex major, Lugd.

Cassia lignea similis frutex tertius, Cæf.

An sit Chamæpitys altera Dioscoridis dubitant, Lobelius & Lugdun. hist. Selaginem Plinii Cætalpinus suspicatur, & quibusdam Sempervivum maritimum, aut Vermiculariam arborecentem dici.

XII. Sedum Portlandicum, Ad. Lob. ico. quid?

*Sedum saxatile & alpinum.*

I. Sedum alpinum Saxifragæ albæ flore, vel grandiflorum.

Sedum minimum tertium, Lob. Lugd.

Sedum ferratum, Dod. quoad ico.

an Sedum alpinum quartum, Col. part. 2.

II. Sedum alpinum album foliolis compactis.

Sedi aut Phylli genus flosculis albis, Gef. fra.

Sedum alpinum tertium, Clus. pan.

Sedum minus nonum, sive alpinum tertium, Eid. hist.

III. Sedum alpinum hirsutum lacteo flore, hist.

Sedum alpinum quartum, Clus. pan.

Sedum minus decimum, sive alpinum quartum, Eid. hist.

Jasme montana, Lugd.

IV. Sedum alpinum gramineo folio lacteo flore.

Sedum alpinum quintum, Clus. pan.

Sedum minus undecimum, alpinum 5, Eid. hist.

V. Sedum alpinum flore pallido.

Sedum alpinum primum, Clus. pan.

Sedum minus sextum, sive alpinum primum, Eid. hist.

VI. Sedum alpinum angustissimum folio, flore carneo.

Sedum alpinum secundum, Colum. par. 2.

VII. Sedum alpinum exiguis foliis.

Sedum alpinum primum, Colum. par. 2.

IX. Sedum saxatile hirsutum purpureum: quod 5. in Prodomo.

IX. Sedum saxatile atrorubentibus floribus: quod 6. in Prodomo.

X. Sedum saxatile variegato flore: quod 7. in Prodomo.

XI. Sedum alpinum hirsutum luteum.

Sedum saxatile foliis margine piloso, Gef. hor.

Phyllon thelygonon, Dalech. in Dioscor.

Phyllon arthenogonon Dalechampii, Lugd.

Sedum petracum montanum, Ad. Lob. ico.

Sedum alpinum sextum, Clus. pan.

Sedum minus duodecimum, alpinum 6. Clus. hist.

Leucoion luteum aizoides montanum, Colum. par. 2.

XII. Sedum alpinum foliis crenatis asperis: quod 8. in Prodomo.

an Sedum cujus folia marginibus asperis brachiis plicium referunt, Gef. hor.

XIII. Sedum alpinum floribus luteis maculosis.

Sedi minoris genus flosculis luteis vel croceis maculosis, Gef. fra.

XIV. Sedum alpinum rubro magno flore.

Aizoon montanum, Lugd.

XV. Sedum montanum tomentosum.

Sempervivum rubrum montanum, *αφαιδης* Col.

XVI. Sedum alpinum ericoides purpurascens: quod 3. in Prodomo.

XVII. Sedum alpinum ericoides caruleum: quod 4. in Prodomo.

*Sedum foliis laciniatis.*

I. Sedum alpinum trifido folio.

Sedum septimum, vel alpinum Ajugæ folio, Clus. pan.

Sedum minus decimum tertium, Eid. hist.

II. Sedum tridactylites alpinum majus album.

Alpine tridactylites alpina, in Phytop.

Saxifraga alba petraea, Ponz.

III. Sedum tridactylites alpinum pallide luteum.

IV. Sedum tridactylites alpinum caule folioso: hæc tria in Prodomo sub Sedo 1. describuntur.

V. Sedum tridactylites alpinum minus: quod 2. in Prodomo.

Sede

Sedo alpino tertio similis altera, Colum. par. 2.

V I. Sedum tridactylites testorum.

Hendelstraut / Trag.

Paronychia altera, Dodon. rutaceo folio, Ad.

Lob. Lugd. Ger.

Umbilici species quibusdam, Cæf.

Dactyliobotanon alterum, Thal.

Alfine petra rubra, & Paronychia tertia, Tabern.

Paronychia laciniata, Ger.

*Sedum palustre.*

I. Sedum palustre subhirsutum purpureum.

Sedi minoris quarta species, Trag.

Sedum palustre secundum, Clus. pan.

Sedum minus tertium, sive palustre, Eid. hist.

Aizoon palustre, Cam.

Sedum palustre fl. incarnato, Eysf.

Hujus species est altera major & candidior: altera minor & rubicundior, seu mas & femina: flos purpureascens aut carni coloris.

## COTYLEDON seu UMBILICUS VENERIS.

**K**ΟΤΥΛΑΝΘ'Ν Dioscorides lib. 4. cap. 92. Sedo subjungit, quod ipsi & πυράλιον & κομμάλιον dicitur: quod à figura folii Acetabulo simili nomen accepit: hinc Latinis, Acetabulum & Umbilicus Veneris. Plinio lib. 25. cap. 13. Cotyledon.

Genera duo sunt Dioscoridi: alterum folio acetabuli instar orbiculato & concavo, ita tamen ut cavum id aciem prope fugiat: alterum latioribus foliis, usq. pinguibus, ac cœu lingulas referentibus, densis & confertis circa radicem, & velut oculum in medio constituentibus, &c. Et Plinio, alterum folio est pingui & concavo ut coxendices: aliud fordidus foliis, latioribus, densioribusq. circa radicem velut oculum cingentibus, &c.

I. Cotyledon major.

Umbilicus Veneris, Matth. sol. Lac. Tur. Lob. ico.

Cæf. Cast. Lugd. Tab. Ger. major, Lon.

Umbilici Veneris species prima, Ang.

Cotyledon, Dod. ut: Ad. Lob.

Cotyledon sive Umbilicus Veneris, Clus. hisp. & hist.

II. Cotyledon media foliis subrotundis.

Umbilicus Veneris alter, Matth. Lac.

Cotyledon altera, Dod. ut: Clus. pan. Lugd.

Cotyledon altera quarta, Clus. hist.

Phyllum thelegonum Dalechampii, Lugd. sive

Lichen primum Plinii & sempervivum montanum.

III. Cotyledon media foliis oblongis serratis.

Onobletum Hippocratis, Ang.

Aizoon serratum, Cord. hist. Thal. cui & Crassula serrata.

Cotyledon minus sedi folio, Ad. Lob.

Umbilicus Veneris, Lob. ico. minor, Lon. Tabern. Ger.

Phyllon primum, Cæf.

Palmaria, Tabern. talis antequam caulem producat.

Cotyledon minus, Eysf.

IV. Cotyledon media subhirsuta floribus punctatis.

Sedum foliis minoribus albicantibus serratis, Gef. hort.

Cotyledon minus montanum alterum, Lob. ico.

Cotyledon altera Etlicheriana, Clus. pan.

Cotyledon altera quinta, Clus. hist.

V. Cotyledon minor foliis subrotundis serratis in Proдроmo describitur.

VI. Cotyledon stellata.

Aizoon peregrinum, Cam.

Sempervivum tertium, Colum.

## A L O E.

**A**ΛΟΗΝ Græci, Latini & officinae pariter, Aloë tum herbam ipsam, tum & ejus succum densatum appellant, dicitur & stirps Α'λεβιν' quod nō modo in terra, sed & extra eam vivat. Aloë autem diſſa videtur, quia maritimis gaudet. A recentioribus Sempervivum & Sempervivum marinum, quod Sempervivi modo diu duret, appellatur: Sedum amarum Columella: & quia ejus succus amarus est, idcirco & Gentianam, quæ amarissima est, Aloë Gallicam Apulejus nominavit. De Aloë Dioscorides l. 3. c. 25. quod folium habeat Scillæ similitudine, crassum, pingue, in rotunditate modicè latum, retro sursum pan. tum: utrinque spinulis raris & brevibus, &c. & Plinius lib. 27. cap. 4.

Nn 3

L. Aloë

## I. Aloë vulgaris.

Aloë, Trag. Matthiol. Fuch. Ang. Dod. ut: Cord.  
Lac. Tur. Gef. hor. Lon. Rauwolf. (quæ in Rama  
Judeæ copiosa) Ad. Lob. Cæf. Cast. Garz. Cluf. hist.  
Eystett.

Aloë communis, Cam.

Aloë Dioscoridis, Col.

Aloë in insula Socotra, par. 2. Ind. or. c. 6.

Aloë five Sempervivum, Arab. Sebar, Area, Cate-

comor, Linc. par. 4. Ind. or. c. 38. & fig. 19.

Azuar five Sempervivum, quo campi pleni, par.  
4. Ind. or.

II. Aloë folio in oblongum aculeum abeunte.

Aloë Americana, Dodon. Cluf. hisp. & hist. Cast.

Cam. Lugd. Tab. Eyst.

Aloë in Pisano vireto, Ad.

Aloë folio mucronato, Lob. Ger.

Aloë, Acoftæ.

Aloë alterum genus, Cæf.

Allagucy Indis, Fil y agulla, id est filum & acus  
Hispanis, cujus spinæ venenatæ, Frag.

Aloë spinosa five Americana, Cam.

America planta Aloës facie, Colum.

Manguey Mexiocanum, alio nomine Med. Linc.  
par. 4. Ind. or. fig. 19.

Manguey arbor, ex qua parantur aquæ, vinæ, oleum, acetum, mel, syrapi, fila, acus, & res aliæ infinitæ in nova Hispania, quarum plerumque unam domibus suis, ad vitæ sustentationem conficiunt, & c. par. 9. Ind. occid. L. 4. c. 23.

Ex foliis succus dulcis elicetur: & eisdem coctus & maceratis linum extrahitur, ex quo Indi lineæ candidissima texunt.

III. Aloë monstrosa Avinioni nata: de qua in Prodomo, & ad Cluf. cur. post.

IV. Aloë palustris.

Stratiotes potamios, Dod. gal.

Planta foliis Aloës, quæ Stratiotes non est, Auguil.

Sedum aquaticum, Dod. fol.

Stratiotes five Militaris aizoides, Ad. Lob.

Stratiotes aquatica, Lugd.

## SECTIO SEXTA.

**RADIX RHODIA; TELEPHIUM; SCORPIOL**  
**DES; PORTULACA; CEPÆA; CRITHMUM; KALI; TRA-**  
**gum; Tithymalus; Pityusa five Esula; Apios five Tithyna-**  
**lus tuberosus; Peplus five Esula rotunda; Pe-**  
**plis; Chamæsyce; Lathyrus;**  
**Hippohaes.**

## RADIX RHODIA.

**P**Ο'ΔΙ'Α Ρ'Ι'ΖΑ Dioscoridis lib. 4. cap. 45. sic dicta, quod contrita rosas redoleat: hinc quidam  
Rosea radix.

Rhodia radix, Trag. Matth. Ang. Dod. ut: Cord.  
histor. Gef. hor. Lac. Cluf. pan. & hist. Lugd. Cast.  
Cam. Ger.

Rhodia five rosea radix, Fuch. Ad. Lob.

Rosea radix, Lon. Tab.

Flos nunc pallefcit, nunc rubescens coloris est.

## TELEPHIUM.

**T**ΕΑΕ'ΙΟΝ Dioscoridis lib. 2. cap. 217. Portulacæ simile, alas binas in singulis foliorum geniculis habens.  
foliis caruleis crassis, lentis atque carnosiss refertum, flore luteo aut candido, &c. Et Plinio lib. 27. cap. 13.  
Telephion & caule & foliis Portulacæ simile. Sic dictum volunt, quod ulceribus malignis ac deploratis, quibus  
Telephus Mysia rex ab Achille vulneratus consenuit, ( quæ eam ob rem etiam Telephia vocantur ) auxiliatur. Vulgo  
Fabaria, à foliorum cum faba similitudine: officinis Crassula major. Verum Coryledoni alterius descriptio Fabariae,  
potius quam Telephio, convenire Cespino videtur: & sanè Telephium Dioscoridis non esse, cum ad solia alas non  
sint, censuimus.

I. Tele-



I. *Telephium vulgare.*

Scrophularia media, vel tertia, Brunf.

Fabaria, Matth. Guil. Lugd.

*Telephium*, Matth. Ges. hort. Lob. Taber. Cast. Cam.*Telephium album*, Fuch.*Acetabulum alterum*, Cord. in Dioscor. album, Fuch. ico.*Crassula major*, Dod. gal. Cæf. Thal.*Anacampteros*, Ges. hor.*Faba inversa*, Eid. Ad Lob. ico.*Telephium alterum*, sive *Crassula*, Dod.*Telephium vulgare*, sive secundum, Clus. hist.*Crassula* sive *Faba inversa*, Ger.*Cotyledon alterum* *Dioicoridis*, Col.

Alii foliis crenatis & subrotundis, ut apud nos provenit, pingunt: alii oblongis & integris, ut Lob. Dod. & Clusius. Flore est communiter albo, est & luteo: reperitur etiam flore purpurascens & foliis rarioribus, & est *Telephium tertium* purpurascens flore, Clus. histor.

Huc referendum id quod solo folio glauco cæruleo ve à vulgato differt, quod

*Telephium glaucum* verius, Lob. ob.II. *Telephium purpureum majus.**Scrophularia* seu *Portulaca major*, Trag.*Telephium purpurascens*, Fuch. Lugd.*Acetabulum purpureum alterum*, Eid. ico.*Telephium floribus purpureis*, Lob. ico. Lugd.

Cam. ep. Tab. Ger.

*Telephium quintum* purpureo flore, Clus. hist.*Fabaria*, Lon.*Crassula montana*, Cæf.*Rapuntium umbellatum*, Colum. part. 2.

Hoc foliis est longioribus & profundius crenatis: napsi aliquando paucioribus, aliquando pluribus, quod posterius

*Telephium quartum* est, Clus. hist.III. *Telephium purpureum minus*: in Prodromo descriptum.IV. *Telephium latifolium peregrinum.**Telephium Hispanicum*, Clus. hisp. Lugd. Tab.*Telephium primum*, Dodon. i. sive *Hispanicum*, Clus. hist.*Telephium* seu *Crassula major Hispanica*, Lob.*Crassula major Hispanica*, Ger.

Floribus est albis, etiam rubris.

Huic simile, modo idem non sit,

*Telephium Austriacum*, Clus. hisp. & hist.V. *Telephium repens folio deciduo.**Telephium minus repens sempervirens*, Lob. Lugd. Cam.*Cepæa Pancii*, Clus. hisp. & hist. Cam.*Telephium tertium*, Dod. sextum, Clus. hist. forte *Dioicoridis*.*Telephium minus*, Tab.*Telephium sempervirens*, Ger.VI. *Telephium repens folio non deciduo.**Telephium Imperati* in sua hist. Cam.*Telephium 7.* sive legitimum *Imperati*, Clus. hist.VII. *Telephium Dioicoridis*, seu *Scorpioides* ob filiquatum similitudinem.*Scorpioides*, Matth. Ang. Lac. Cast. Ad. Lob. Lon.*Scorpioides Matthioli*, Dod. ut: Ges. hort. Lugd. Cam.*Lunaria burissa* aliquibus, Ang. Ges. hor.*Telephyllon Cratææ*, Ang.*Telephium veterum verum*, Guil.*Telephium*, herba amoris, Cæf.

## SCORPIOIDES.

ΣΚΟΡΠΙΟΙΔΕΣ *Dioicoridis* l. 4. c. 195. quod semen habeat ad similitudinem caudæ *Scorpionis*, & quod *Scorpionum* ictibus presentaneo sit auxilio: & *Plinio* l. 22. c. 15. cui *Scorpius* dicitur: quod *Clymenum* *Dioicoridis* esse, *Casalpini* & *Columna* volunt.

I. *Scorpioides Bupleuri folio.**Scorpioides*, Dodon. gal. Ges. hort. Lugd. prior, Dod. fol.*Scorpioides repens bupleuri folio*, Ad. Lob.*Scorpioides bupleuri folio*, Cam. Tab. Ger.*Leporis auricula* vulgo, Cæf.*Catananx* quorundam, Cam.*Clymenos Dioicoridis*, Colum.II. *Scorpioides Portulacæ folio.*III. *Scorpioides montanum*, Lugd. quid?

## PORTULACA.

ΑΝΔΡΑΧΝΗ dicitur ipsa *Portulaca Dioicoridis* lib. 2. cap. 150. cui genera duo, *Andrachne* & *Andrachne sive strus*, qua solus est prior crassioribus atque densis, in petrosis nascitur: aliquando in hortu salsu elea, sed minoribus multo, verum pluribus & rariis: cauliculis rubicundis, frequentibus, in terram incli-

inclinati, &c. At Theophrastus *Ἀπὸ τῆς ἑρβῆς* herbam i. caus. plant. 10. & ejusdem 3. exhibet: dein *Ἀπὸ τῆς ἑρβῆς* e. borem i. hist. 8. & 15. 4. hist. 4. Portulacam Gaza reddit. Verum Plinius l. 8. c. 20. scribit, Portulacam quam Peplion vocant, non multum sativa efficacior esse: ubi Portulacam cum Peplio herba diversissima confundit: causi erroris quod aliqui Peplion, portulacam agrestem vocarint: confundit quin etiam vires sylvestris cum sativa Portulacae viribus.

### I. Portulaca latifolia, seu sativa.

Portulaca hortenſis, Brunf. del. Trag. Fuch. Dodon. gal.

Portulaca domestica, Matth. Ad. Lob. Cast. Tab. Ger.

Portulaca, Tur. Cord. in Diosc. Lon. sativa, Ang. (*γλισεῖδα* in Græcia) Cord. hist. Dod. gal. Lugd. Eystett.

Portulaca major, Cam. hortenſis, Gef. hor.

Portulaca latioribus foliis, Cæf.

II. Portulaca angustifolia sive sylvestris.

Portulaca sylvestris, Trag. Matthiol. Ang. Fuch.

Dodon. ur. Ad. Lob. Lugd. Cast. Ger.

Portulaca, Lac. arvensis, Tab.

Portulaca sponte nascens, Cord. hist.

Portulaca minor, Gef. hor. Cam.

Portulaca angustioribus foliis, Cæf.

Cepæa, Cord. in Diosc. Lon. def.

III. Portulaca arvensis.

Portulaca exigua, Cam.

IV. Portulaca aquatica, Thalii, quid?

V. Portulaca marina, Tab. Ger. quid?

## C E P Æ A.

ΚΗΠΑΙΑ Dioscoridi l. 3. c. 168. Portulaca similis est.

Cepæa, Matth. Ang. Lac. Lon. ico. Ad. Lob. Matth. Cast. Cæf. Tab. Cluf. hist.

Flosculis est albis, ex purpureo candicantibus vel luteis.

## C R I T H M U M.

ΚΡΙΘΜΟΝ sive *κρίταρον* Dioscoridi lib. 2. c. 157. foliis pinguibus, albicantibus, portulacam referentibus, sed crassioribus, longioribus, salsoꝝ gustu, floribus candidis, &c. in muria servatur, cruda & cocta edunt. Plinius lib. 21. cap. 15. *Batin* appellasse videtur, *Batin marinam*, & *Batin hortensianam*, quam aliqui *Aphragum Gallicum* vocant, sine ullis notis proponens: Batis etiam lib. 21. cap. 27. meminit, quæ alvum molliat, non plura habet.

I. Crithmum, sive Fœniculum maritimum majus, odore Apii.

Baticula alterum genus ex Sicilia, Cæf.

II. Crithmum sive Fœniculum maritimum minus.

Crithmum 1. Matth.

Crithmum, Ang. (& herba S. Petri) Dodon. gal.

Cord. in Diosc. Lac. Tur. Lugd. Cast. Tab.

Crithmus, vulgo Creta seu Salsa marina, Gef. ap.

Crethamum marinum, Cord. hist.

Crithmum marinum, Gef. hor. Dod. Ger.

Fœniculum marinum, videtur verum Empetron,

Rond. cap. de mem. læia.

Fœniculum marinum, sive Empetrum, Ad. aut

Calcifraga, Lob.

Batis, Gef. hor.

Baticula quasi parva Batis, Cæf.

Creta marina, Lon.

III. Crithmum maritimum flore Asteris Antici.

Crithmum tertium, Matth. Lugd. Cam.

an Anthillis major, Cord. ob. syl.

Anthillis prima, Dioscoridis, Cæf.

Crithmum Chrysanthemum, Dod. (Aster Antici

chrysinus quibusdam) Lugd. Tab. Ger.

Crithmum littoreum, Ad. Lob.

IV. Crithmum maritimum spinosum.

Crithmum secundum, Matth. Cast.

Secacul, Ang.

Crithmum spinosum, Dod. Tab. Ger.

Crithmum syl. Eryngium foliis Apii Plinii, Cæf.

Pastinaca marina, Ad. Lob. Lugd.

Tribulus marinus quorundam, Lugd.

Cachry marinum, Cam.

Corymbi alii colore candido, alii subrubentes

aut violaceo: in hortis cultum, lætius ac minus

spinosum redditur.

KALL

## K A L I.

**K**ALI Mauritanorum, aliqui ad Anthillidem alterum Dioscoridis: alii ad ejusdem Tragon (cum tamen sapore non sit acerbo, nec acinus constet) referunt. Plinius lib. 8. cap. 22. ad Halymum retulisse videtur, dum inquit, alii dum maritimum falsum, & inde nomen, &c.

I. Kali majus cochleato semine.  
Kali, Matth. (qui & hoc & Salicorniam unâ figurâ expressit) Dod. Cast.

Kali magnum, Sedi medii foliis semine cochleato, Ad.

Kali magnum, Lob. Lugd. & Kali Dalechampii.  
Soda, Lob. ico.

Kali cochleatum majus, Cam.

Anthillis altera falsa, Cam.

Salisola genus in hortis, Isgarum vulgo, Cæf.

II. Kali minus album semine splendente.

Anthillis altera, Borda quibusdam, Dod. gal. Lug.

Alcali minus, Gef. hor.

Kali album, Dod.

Kali minus, Ad. Lob. ico. Lugd. Eyst.

Kali alterum seu minus, Cam.

Salisola quædam in maritimis, Cæf.

III. Kali minus alterum.

Kali parvum foliis oblongis, Cam.

Anthilloides, Thal.

Est majus & minus.

Huc referri debent,

Anthillis minor tertia, quinta & sexta, apud Cord. in obs. sylv.

IV. Kali minus villosum: quod 1. in Prodr.

V. Kali gramineo folio: quod 2. in Prodr.

Salisola congener semine Polygoni, Cæf.

VI. Kali Arabum primum genus, Rauwolf. Lugd. ap.

VII. Kali Crassulæ minoris foliis.

Kalli 2. species, Anthillis quibusdam, Alp.

Kali floridum repens, Aizoides Neapolitarum, Col. par. 2.

IX. Kali Ægyptiacum foliis valde longis hirsutis.

Kalli tertia species, Alp.

IX. Kali geniculatum majus.

Kali, Matthiol. Ang. geniculatum, Lugd. Cam. Taber.

Salicornia, Dod. ut: Lugd.

Anthillis constans veluti tritici granis, Cord. ob. syl.

Alcali, Gef. hor. Lon.

Kali geniculatum vermiculatum, Ad.

Kali sive Sedum marinum, Lemnio.

Kaligertium, Cam. ep.

Kalli primum, Kellu Ægyptiis, Alp.

Salisola genus aliud, Cæf.

Differentiæ duæ, unum simplicius & brevius, dodrantali altitudine, rectum & annuum: alterum multis ramulis fruticans, tignosum & grandius, perpetuum. Habetur & rubrum & viride.

X. Kali geniculatum alterum, vel minus.

Kali Arabum 2. genus, Rauwolf. Lugd. ap.

## T R A G U M.

**T**PATOΣ, sive Ξυπρίον, aut Τετραγ. à Dioscoride l. 4. c. 51. & à Plinio l. 28. c. 13. Tragi & Scorpii nomine proponitur: foliis careere scribunt: & l. 22. c. 15. Scorpium alter.

I. Kali spinosum cochleatum.

Drypis Theoph. Tab.

Kali sive Alkali, Dod. belg.

an Hipophæston Dalechampii, Lugd.

Sunt qui Tragos esse velint.

II. Kali spinoso affinis.

Tragum, Matth. Lac. Cast. def. Lon. Tab.

Tragus & Kali 2. genus, Dod. gal.

Tragon non est sed Drypis, Guil.

Tragon improbus, Math. Ad.

Tragon Matthioli, Lob. Lugd. Ger.

an Tragos, Cæf.

Cum Dioscorides Trago folia non tribuat, idcirco videntur Matthiolus & Tabernæmontanus sine foliis pinxisse: at Lobelius & ex eo Lugdunensis historia, folia adpinxere, & quidem rectè, ut in Lio Venetorum observavimus. Non desunt qui utramque hic propositam plantam eandem faciant, & forsitan non ita malè: quàmvis posterior longioribus & latioribus sit foliis.

Oo

TITHI-

## TITHYMALUS.

**T**ΙΘΥΜΑΛΟΣ Dioscoridi l. 4. c. 165. ἡδύμαλλον, Theophrasto 9. hist. 12. Lactariam GAZA vertit. Plin. lib. 26. cap. 8. Tithymalus, quem nostri herbam lactariam vocant, alii Lactucam caprinam. Sic etiam Columella: et Celsus, marinam vocavit: officina Efulam dicunt. Lactaria nominata, ob lac omnibus commune, cum hac leviter secta, vel folio abrupto, lac effluat.

Genera Dioscorides septem recenset: 1. mas χαρνιας, quibusdam ἀμυγδαλονδης dictus: alterum femina μυρσινες, quem χαρνιτὶον ἢ μυρσινιτὶον cognominat: 3. ἡδύμαλλον, quem ἡδύμαλλον appellaverunt: 4. ἰνδονδης: 5. καρνεονδης: 6. δασυδονδης: 7. πατίφυλλον. Theophrasto 9. hist. 1. Tithymallorum plura sunt genera, maritimus: masculus olea folio: myrtarius candidus, Myrti folio. Plinio l. c. genera ejus multa: 1. Characias, qui & masculus existimatur: 2. Myrsinitem vocant, alii Caryiten folium myrti: 3. Paralius vocatur, sive Tithymalus folio rotundo: 4. Heliotropium appellant, folium Portulacae, sic dictum, quoniam caput cum Sole circumagat: 5. Caryissium vocant, propter foliorum similitudinem: 6. platyphyllon, alii corymbiten, alii amygdaliten à similitudine: 7. dendroides, alii cobion, alii leptophyllon.

*Tithymalus Characias, id est, vallaris, sive amygdaloides, à foliorum aliqua forma.*

## I. Tithymalus Characias amygdaloides.

Tithymallus masculus, Theoph.

Afcebra magnum, Mesuæo.

Tithymalus characias, Ang. 1. sive mas, Dod. ut: Lugd. Cæf.

Tithymalus characias 2. Clus. hisp. Cam.

Tithymalus characias amygdaloides, Lob.

Tithymali characiæ species, Thal.

Tithymalus amygdaloides, & amygdaloides latifolius, Tab.

## II. Tithymalus characias rubens peregrinus.

Tithymalus characias, Matthioli. Lac. Lon. Lugd. Cast. Tab.

Tithymalus characias legitimus 1. Clus. hisp. & histor.

Tithymalus characias alter, Dod. Cæf.

Tithymalus platyphyllon, Ad.

Tithymalus characias Monspelienfium, Lob.

## III. Tithymalus characias folio lanuginoso.

Tithymalo characiæ primo similis, Clus. hisp.

Tithymalus characias alter, Eid. hist.

## IV. Tithymalus characias rubens Germanicus.

Tithymalus pentactonios, Cord. hist.

Tithymalus characias quartus, Dod.

Tithymalus characias Parmonicus, Clus. pan.

Tithymalus characias tertius Austriacus, Eid. histor.

Tithymalus fruticosus albus stipitibus rubris, Camer.

an Tithymalus latifolius alter, Cæf.

## V. Tithymalus characias angustifolius,

Tithymalus myrsinites altera, Lob. Lugd.

Tithymalus myrsinites angustioribus foliis, Cæf.

Tithymalus myrsinites 3. angustifolius, Tab.

## VI. Tithymalus characias folio serrato.

Tithymalus characias quintus, Dod.

Tithymalus serratus Monspelienfium, Ad. Lob.

ico. Dalech. Lugd. cui & myrsinites serratus.

Tithymalus myrtites Valentinus, Clus. hist.

## VII. Tithymalus sylvaticus lunato flore.

Tithymalus platyphyllus, Ang.

an Tithymalus dendroides, Cord. in Diosc.

Tithymalus in montibus, Cæf.

Tithymalus lunato flore, Colum.

*Tithymalus myrsinites, sive myrtifolius.*

## I. Tithymalus myrtifolius arboreus.

Tithymalus dendroides, Matth. Gef. hor. Lac. Ad. Lob. Lugd. Cast.

Tithymalus characias tertius, Dod.

Tithymalus arboreus myrtifolius, Lob. ico.

Tithymalus arboreifolius, Cæf.

an Tithymalus petrus, Ang. Cam.

## II. Tithymalus dendroides ex Cod. Cæf. ico.

Dod. Lugd.

## III. Tithymalus myrsinites latifolius.

Tithymalus myrsinites, Matth. Ang. Dod. ut: Gef. ap. Lac. Lon. Lob. Cæf. Lugd. Cast. Cam.

Tithymalus myrsinites, myrtifolius, femina repens Diosc. Ad.

Tithymalus myrsinites legitimus, Clus. hist.

Tithymalus myrsinites 1. Tab.

## IV. Tithymalus myrsinites angustifolius.

Tithymalus myrsinites Dioscoridis, Ad. Lob. ico.

Tithymalus myrsinites alter, Tab.

Tithymalus myrsinites in montibus, Cæf.

V. Tithy-

V. *Tithymalus myrsinites* fructu verrucæ simili.

*Esula* multicaulis & quarta, Trag.

*Tithymalus helioscopius*, Dodonæi in ico. & Lugd.

*Tithymalus verrucosus* Dalechampi, Lugd.

*Alypum* Guilandinus vocare solebat.

*Tithymalus maritimus*.

I. *Tithymalus maritimus*.

*Tithymalus paralius*, Matth. Ang. Dod. ut: Lac. Gef. hor. Ad. Clus. hisp. Lob. Lon. Cast. Lugd. qui tres figuras habet, Cam. Tab.

*Tithymalus maritimus*, Cæf.

Variat, is qui in maritimis natus, ab hortensu, hinc duæ figuræ apud Dodonæum, ejus qui in maritimis & ejus qui in hortis crescit.

II. *Tithymalo* maritimo affinis linariæ folio.

*Esula* altera in humidis, Cæf.

*Tithymalus* linifolius, Cam.

*Tithymalus amygdaloides* angustifolius, Tab.

Hic antequam floreat, à *Linaria* solo lacteo succo distinguitur.

III. *Tithymalus maritimus* spinosus.

*Glastivida* altera, Belli ep. 4. ad Clus.

*Glastivida* 2. Cretica, Ponæ Bald. Ital.

IV. *Tithymalus maritimus* purpurascens floribus.

*Esula* rara è Lio Venetorum insula, Ad. Lob. Lugd.

an *Alypum*, Anguil.

Cum *Esulis* nihil præter lac commune habet, *Pityusæ* species Venetis, aliis *Turbith* nigrum.

*Tithymalus latifolius*.

I. *Tithymalus latifolius* Hispanicus.

*Tithymalus platyphyllos*, Clus. hisp. & hist. Dod. Lugd.

*Platyphyllum* Hispanicum, Lob.

*Tithymalus latifolius*, Cæf. hisp. Hispanicus, Tabern.

II. *Tithymalus arvensis latifolius* Germanicus.

*Tithymalus platyphyllos*, Fuch. Tur. Lon.

*Pityusæ* major, Dod. Gal. ico. Thal.

*Pityusæ* sive *Esula* minor, Dodonæi, Lugd.

Major est, & minor, & hæc foliis leviter hirsutis.

*Tithymalus belioscopius*.

*Tithymalus helioscopius*.

*Esula*, Brunf. vulgaris & tertia, Trag.

*Tithymalus helioscopius*, Matthiol. Ang. Fuch.

Dod. ut: Cord. in Dioic. Tur. Gef. hort. Lac. Lon.

Ad. Lob. Cæf. Lugd. cum icon. Matth. & Dod.

Thal. Cam. Tab.

*Tithymalus dendroides*, Dod. in ico. Thal.

Alia est foliis crenatis, sed non usque ad caulem: alia non crenatis & rotundioribus: caule leviter hirsuto.

*Tithymalus cyparissias*.

I. *Tithymalus cyparissias* foliis punctis croceis notatis.

*Esula* scabiosa, Gef. col.

*Tithymalus* *κατ' ουσίαν*, Thal.

*Tithymalus arvensis*, Cam.

Duplex est, major & minor.

II. *Tithymalus cyparissias*.

*Tithymalus cyparissias*, Matthiol. Fuch. Anguil.

Dodon. ut: (& *Pityusæ* minor) Tur. Lac. Gef.

hort. Lon. Ad. Lob. ob. Cast. Thal. Lugd. (qui

Matthioli & Dodonæi figuram habet) Tabern. Cam.

*Tithymalus cupressinus*, sive humi pinus, Lob. icon.

*Esula officinarum*, Cæf. hisp.

Variat: 1. foliis lini virentibus, comâ flavâ, aliquando subrubente: 2. in montibus candidior, foliolis angustis, *Esula* candidior, Cæf. alpino: 3. vix palmam altus, capitulo rubente.

III. *Tithymalus* sive *Esula* exigua.

*Esula* exigua, Trag. Lob. minima, Lugd.

*Tithymalus leptophyllos*, Matthiol. Lugd. Cam. Thal.

*Tithymalus minimus*, Tabern.

*Papaver spumeum*, Gef. hor.

*Peplis* minor Dalechampi, Lugd.

IV. *Tithymalus* sive *Esula* exigua foliis obtusis: 2. loco in Prodromo describitur.

V. *Tithymalus* exiguus saxatilis: 3. in Prodr.

## PITYUSÆ sive ESULÆ.

**P**ITTOΣÆΑ, à *Cyparissia* *Tithymalo* specie differre existimatur, idcirco etiam in *Tithymali* genere connumeratur: caule est cubito altiore, geniculato, foliis acutis & tenuibus, pini folia imitantibus: floribus

*exiguus pene purpureis : semine inflat lenticula lato : radice candida, crassa, lacteo succo referta : quibusdam in locu frutex hic praeaudis inventur, &c.* Dioscorides l. 4. c. 166. At Plinius l. 2. c. 6. cum honore & Pityusa simili de causa dicitur, quum quidam in Tithymali genera numerant: frutex similis est piceae flore parvo purpureo. At Pityusa videtur esse Esula sive Ezula, Arabum Alsicbra aut Alsobra & Scebra. Ezula etiam nomen à πύσος luxuriam esse potest: duabus enim prioribus syllabis sublatis, remanet εσ, cuius diminutivum usula, & vocali prima mutata, Esula.

I. Tithymalus foliis pini, fortè Dioscoridis Pityusa.

Esula vulgaris major & quinta, Trag.

Pityusa Esiula vulgo dicta, Gef. hor.

Pityusa sive pinea, Esula minus offic. Ad. Lob. ob.

Tithymalus pinea, Eid. ico.

Esula minor, Dod. Lugd.

Esula major, Cæsalp.

Tithymalus cupressinus 2. Tab.

II. Tithymalus palustris fruticosus.

Esula major & secunda, Trag.

Pityusa major, Dod. gal. def. Cord. in Diosc.

Pityusa grandis, Thal.

Esula major, Dod. Lugd.

Esula major Germanica, Ad. Lob. Lugd.

Tithymalus palustris, Cæsalp.

Tithymal. fruticosus Germanicus palustris, Cam.

an Tithymalus maximus, Taber.

III. Tithymalus montanus non acris.

Esula dulcis (vel 7.) Trag. Gef. hor. Lon. Lob. ob. Lugd.

Erino cognata herba, Gef. hor. Ad.

Pityusa sive Esula minor altera floribus rubris, Lob. Lugd.

Flos colore variat, est viridis, est rubri.

IV. Tithymalus incanus hirsutus: qui in Prodomo.

an Pityusa Anglicana, Cam.

V. Tithymalus foliis brevibus aculeatis.

Pityusa, Matthiol. Ang. Lac. Lon. Cast. Lugd.

## APIOS sive TITHYMALUS TUBEROSUS.

ΑΠΙΟΣ οἱ ὅτι ἰσχυρὰ. radice est ad pyri formam accedente, rotundiore tamen, lactei succi plena. &c. Dioscoridi lib. 4. c. 177. At Theophrasto 9. hist. 10. 12a. ἢ 2m (Gaza reddit carica seu pyrus) folio est runcati, brevi, caulibus ternis aut quaternis humi stratis: radice qua albucum, verum spumosa: 12as dicitur, quod 12ada, id est, caricam seu ficum aridam radix refert, Dodonæo monente.

I. Tithymalus tuberosa pyriformi radice.

Apios, Matth. Ang. Dod. gal. Lac. Lugd. Cast. Tab.

Apios vera, Ad. Lob.

Tithymalus tuberosus Diosc. Lug. tuberosa radi-

ce, Clus. hist.

Duplex est: 1. est radice crassiore & majore, fo-

liis & ramulis minoribus: 2. radice minore, ramulis longioribus & foliis maioribus.

II. Tithymalus tuberosa oblonga radice.

Ilichas alter, Clus. hist.

III. Tithymalus tuberosus Germanicus.

Tithymalus tuberosus alter, Camer.

## PEPLUS, sive ESULA ROTUNDA.

ΠΕΠΛΟΣ οἱ ὅτι σπυρδ, οἱ ὅτι μύκων ἀρραβόν, exiguus frutex lactei succi plenus folio parvo cernua, altiore: universa coma fortè dodrantali, rotunda, humi sparsa: semine sub foliis parvo, rotundo, minore quam candidi papaveris, radice habet unicam &c. Dioscorides lib. 4. cap. 168. Peplos, quem aliqui Syceen, alii maceon aphrodes vocant, Plinio l. 27. c. 12.

I. Peplus sive Esula rotunda.

Peplus, Matth. Fuch. Ang. Dod. ut: Cord. in Diosc.

& hist. Turn. Lac. Lon. Ad. Lob. Lugd. Cast. def.

Thal. Tab. Ger.

Peplis, Cast. ico.

Esula rotunda, Gef. collect.

II. Peplis altera species.

Tithymalus Epithymi fructu, Colum.

## PEPLIS.

ΠΕΠΛΙΣ οἱ ὅτι Ἀντιόχου ἀγρία. Hippocrati minor, frutex est ramulos quoquo versum expandens & candidi succi plenus, foliis bortenſis portulacae rotundis, inferne rubentibus: semine sub foliis rotundo, ceo pepli, servente gustu: radice tenui, singulari ac supervacua: in maritimis maxime nascitur, &c. Dioscoridi lib. 4. cap. 169. At Plinius lib. 5. cap. 22. Peplii meminit, ubi Portulacam sive stem ejusdem generis a natura

cum *Portulaca sativa*, cum *Peplio* herba diversissima confundit, ideo quod nonnulli *Peplion*, *agrestem Portulacam* vocant.

I. *Peplis maritima* folio obtuso.

*Peplis*, Matth. Tur. Ad. Clus. hiisp. & hist. Lobel.

Lugd. Cast. dei. Cam. Tab. ico. Ger.

*Peplus*, Cast. ico. minor, Tab.

*Peplium*, Cæsalpin.

*Peplion Dalechampii*, Lugd.

Variat caule rubro, albo.

II. *Peplis montana* folio Numulariæ.

*Peplis altera*, Ang.

## CHAMÆSYCE.

*Χαμαίσυκη* ἢ *συκὴ* ramos emittit quaternum digitorum, per terram stratos, teretes, lactei succi plenos: folia lentis figura *peplo* similia, parva, tenuia ac terræ inhaerentia, semen sub foliis rotundum ceu *pepli*, radicem tenuem ac supervacuum: sed neque florem neque caulem promit, *Dioscoridi* l. 4. c. 170. *Chamaesyce* lentis folia habet, in aridis petrosissq; nascens, *Plinio* l. 24. c. 15.

*Chamaÿce*, Matth. Ang. Gef. hor. Dod. Ad. cem figuram habet) *Camerar. Tabernæmont.*  
Lob. Clus. hiisp. & hist. Cæsalp. Lugdun. (qui dupli- Gerar.

## LATHYRIS.

*Λαθὺρις* quam aliqui *Τεθύμαλον* vocant, & *Tithymalorum* numero ascribunt, caule est cubitali digiti crassitudine, inani: in cacumine sunt ala & folia, in caule oblonga amygdalinis proxima, &c. fructum geris triplici loculamento distinctum, rotundum ceu *capparium*, in quo tria sunt minuta semina, incurvantibus tuniculis inter se discretis, ervis majora, que decorticata candida sunt, &c. totus frutex lacteo succo turget, *Dioscorides* l. 4. c. 167. *Lathyris* folia habet multa, lactuca similia, tenuiora. germina multa in quibus semen tuniculis continetur ut *capparis*: quæ cum inaruerit, eximuntur grana *piperis* magnitudine, candida, dulcia, facilia purgatu, *Plinius* l. 27. c. 11. *Granum regum minus*, *Mesua*.

I. *Lathyris major*.

*Catapauca*, Brunf. Cæsalp. minor, Lob. Tab.

*Lathyris*, Brunf. Matth. Fuch. Dod. ut: Cord. in

*Diosc.* Gef. hor. Tur. Lac. Ad. Lon. Lugd. Cam.

*Lathyris* sive *Cataputia minor* 2. Trag. (Cast.

*Cataputia vulgaris*, *Tartago Hispanorum*, Eyf.

Ratione ætatis, latiora vel angustiora folia habet: hinc apud *Tabern.*

*Lathyridis* latifol. & angustifoli; apud *Gerardus*,

*Lathyridis* sive *Cataputia majoris* & minoris nomine, figuræ exhibentur.

II. *Lathyris minor* conglomerato flore.

*Lathyris minor Dalechampii*, Lugd.

III. *Lathyris minima*.

*Cataputia pusilla*, Cæsalp.

IV. *Lathyridis* affinis

Semen Visâ dicta ex Bengala, *Lathyridis* grano simile, *Acoftæ* Clusii cap. de Manna, quidâ

## HIPPOPHÆS.

*Ἰπποφάης* cum sit ex iis, quæ lacteum succum fundunt, de eo, licet nobis incognitum in præsens. *Ἰπποφάης* frutex est densus, siccus, foliis longis oleagineis proximis, angustioribus, mollioribus, inter quæ spina canalicantes, sicca angulosa, floribus bedera corymbos referentibus, racematim coherentibus, sed minoribus mollibusq; & ex albedo partim rubentibus: radice crassa, molli, lactei succi plena, amara, ex qua velut è *Thapsia* liquor excipitur, ad biliosa, aquosa & pituitosa detrahenda &c. *Dioscorides* l. 4. c. 162. *Hippophyes* in sabulosis maritimisq; nascitur, spinis albis, bedera modo racemosa est, candidis & ex parte rubentibus acinis, radix succo madet, qui aut per se conditur aut pistillus farina, *Plinius* l. 22. c. 12.

I. *Hippophæis* quibusdam *ἄγρια* varia dæcion, est, Spina purgatrix, Angliæ.

*Hippophæis* ex Codice Cæsareo, Dod. Lugd.

II. Planta lactaria, Xabra & Camarronû Rhæsis, Rauwol. & Lugd. quid?

III. Dante radix quædam candida lacticina, *Acoftæ* Clusii cap. de Manna. quid?

# LIBER OCTAVVS.

## SECTIO PRIMA. DE CONVULVULIS.

**SCAMMONEA; CONVULVULUS seu SMILAX LÆVIS;**  
SOLDANELLA; SMILAX ASPERA ET SALSAPARILLA; CHINA;  
Bryonia; Mecoacha; Lupulus; Vitis vinifera.

### SCAMMONEA.

**Σ**KAMMONI'A Dioscoridi l. 4. c. 171. & Theophrasto 4. hist. 6. & 9. hist. 1. & 10. Latinis Scammonia. ex cuius radice succus elicisur, ut lib. 12. sect. 6. ostendimus. Dioscoridi descriptio nostra plantæ convenit, nisi sua ramos quadantenus hirsutos, folia item hirsuta tribueret: quam hirsutem (nescio an loci ratione) hactenus nos observavimus: & Matthiolus in Dioscorideâ descriptione omisit.

#### I. Scammonia Syriaca.

Scammonia, Matth. Gef. hor. Lon. Lug. Cast. Cæf.  
Scammonia, Dod. gal. Cord. in Diosc. Antioche-  
na, Cam.  
Scammonium, Cord. hist. Dod. Syriacum, Ad. Lob.

#### II. Scammonia Monspeliaca foliis rotundioribus.

Scammonia Monspel. Gef. hor. Eyf.  
Scammonium Monspeliense, Ad Lob. ico.

Scammonia Valentina, Cluf. hisp. Tab. Ger.

Scammonia maritima Monspeliaca, Lugd. Cam.  
Apocynum 4. latifolium, Cluf. hist.

III. Scamoniæ Mōspelaffinis, foliis acutioribus.  
Periploca prior, Dod.

Scammonii Monspeliaci varietas, Lob.

Apocynum 3. Cluf. hisp. 3. latifolium, Eid. hist.

Scammonii quoddam genus, Cæfalp.

Volubilis marina, Taber.

### CONVOLVULUS seu SMILAX.

**S**MILACEM duplicem Dioscorides habet: alteram l. 2. c. 176. ubi Phascolium intelligere oportet. Alteram l. c. 144. & 145. quam in asperam & levem distinguit: illa, quia ἐπὶ τῇ ἀσπερῇ, hæc quia ἐπὶ τῇ λεύῃ dicitur: utraq. que & Plinius l. 24. c. 10. meminit. At Theophrastus 3. hist. 16. Smilacem arborem, quæ ilici sit similis describit, quem Plinius l. 16. c. 6. Ilicii genus facit: qui l. 16. c. 10. & Taxum à quibusdam Smilacem vocari scribit. Smilax lævis, Convulvulus à Plinio l. 21. c. 5. dictus videtur: quod arbores scandat & eis se convolvat: quibusdam Jafione ejusdem l. c. 22. censetur.

#### Smilax lævis.

#### I. Convolvulus major albus.

Volubilis, Brunf. latifolia, Fallop. de decór.  
Volubilis major, Trag. Lon. Thal. Tab.  
Smilax lævis, Matt. Fuch. Gef. hor. Lac. Cast. Lug.  
Smilax lævis major, Dod. ut vel lenis major, Lob.  
Helxine cissampelos, Cord. in Diosc. (Ger.  
Malacocissus Damocratis, Ang.  
Convolvulus major, Gef. hor. Ad. Cæfalp.  
Campanula alba syl. Swer.  
Convolvulus major flore albo, Eyf.

Semen nigrum est, aliquando rufescens.

#### II. Cōvolvulus ramosus incan<sup>9</sup> foliis pilosell.

Helxine cissampelos ramosa Cretica, Ponæ Ital.

#### III. Convolvulus minor arvensis.

Volubilis minor, Trag. Lon. Thal.

Helxine cissampelos, Matth. Fuch. Ang. Gef. hor.  
Lugd. Cast.

Helxine hederacea, Lacun.

Helxine in segetibus nascens, Cord. in Diosc.

Smilax lævis minor, Dod. ut: Ger

Scammonia parva, Ang. Camer.

Orobanche Theophrasti, Anguil.

Cōvolvulus, Tur. minor, Gef. hor. Cæf. Cluf. hist.

Convolvulus minor purpureus, Ad. Lob.

Volubilis arvensis, Tab.

Dioscoridi l. 4. c. 39. ἐλξιν dicitur, quod folia est hederæ, sed minoribus, &c. interpretes Helxinen cissampelon reddidit: quibusdam Orobanchæ Theophrasti (Ervagiam Gaza) 8. hist. 8. alii Scammonia tenuis Plinii l. 24. c. 15.

Varia flos colore, qui vel candidus, vel rosæ



vel albus cum purpureo umbilico, vel puniceo  
lineis aspersis, vel purpureo radiis albis pict<sup>9</sup>.

IV. Convolvulus minor semine triangulo.  
Orobanchæ seu Cuscutæ altera Serapionis, Trag.  
Orobanchæ Ruellii, Gef. hor.

Helxine cissampelos, Dod. gal. Lugd.

Helxine cissampelos altera auriplicis effigie, Ad.  
Lobel.

Centunculus Plinii, Anguil.

Elatine, Cord. in Dioic.

Convolvulo similis herba, Gef. hor.

Convolvulus niger, Dod.

Volubilis media sive nigra, Thal.

Volubilis nigra, Tab. Ger.

Fromentone alterum genus, Cæsalp.

Polygonum hederaceum, Colum.

Aliis Malacocissos Constantini Imperatoris: a-  
liis Orobanchæ: aliis Helxine cissampelos: aliis E-  
latine: aliis Centunculus Plinii l. 24. c. 15. qui Græ-  
cis Clematis dicatur.

V. Convolvulus cæruleus hederaceo angu-  
lo folio.

Campanula cærulea, Dod. gal.

Scammonia similis flore cæruleo, Anguil.

Convolvulus peregrinus vel flos noctis, Gef. hor.

Nil Arabum, Gef. hor. Eyst.

Convolvulus asureus sive cæruleus hederaceus,  
Ad. Lob.

Campanula cærulea, Dod. Bry.

Convolvulus cæruleus, sive campana azurea, Lugd.

Convolvulus cæruleus, Cam. Cast. Tab. Ger.

Convolvuli alterum genus, quod pro Scammonio  
stenditur, Cæsalp.

Campanula cærulea hederaceo folio, Swert.

Quibusdam Granum nil Serapionis & Arabū:  
ignotum nigrum Columellæ aliis: aliis Pothos

cæruleus Theophrasti: quibusdam Volubilis la-  
ruginosæ, Meliszi.

VI. Convolvulus purpureus folio subrotun-  
do: qui 1. in Prod.

Convolvuli species altera, quæ ad Nil Avicennæ  
referri potest, Dod.

Campanula azurea, Swert.

Campanula Indica purpureo violacea, Bry.

Convolvulus Indicus flore violaceo, Eyst.

VII. Convolvulus peregrinus cæruleus, fo-  
lio oblongo: qui 2. in Prod.

Convolvulus cæruleus minor Bauhini, Bry.

Campanula incognita cæruleo alba, Eid.

IX. Convolvulus foliis laciniatis, vel quin-  
quefoliis: qui 3. in Prodr.

Convolvulus Ægyptiacus Bauhini, Bry.

IX. Convolvulus argenteus Altheæ folio.

Convolvulus folio Altheæ, Clus. hisp. & hist. Lugd.

Convolvulus peregrinus, Lob. Cast.

Scammonium minus Plinii a. Tab.

sub Papavere cornuto luteo minore, apud Ger.

Aliis Helxine cissampelos Dioscoridis: quibus-  
dam Scammonium minus Plinii. Flos ex purpura  
candicat: interdum omnino purpurascit.

X. Convolvulus Linariæ folio.

Cantabrica quorundam, Clus. hisp. & hist.

Cantabrica Plinii, Cast.

Convolvulus minimus spicæ folius, Ad. Lob. Lug-  
Ger.

Volubilis terrestris Dalechampii, Lugd.

Scammonium minus Plinii, Taber.

Helxine stans Guilandino, Scammonia Patavina  
Cortuso dicebatur.

Variat magnitudine, reperitur enim vix duas  
trésve uncias altus: flore est communiter purpu-  
reo, rarius albo.

## SOLDANELLA.

MILACIS levis generibus Soldanella ascribenda venit, quare & Belgis Convolvulus marinus dicitur: qua  
duplex est, maritima & alpina: alpinam, huic ob foliorum similitudinem iunximus. Soldanella maritima, qua  
officinis habetur, Dioscoridis l. 2. c. 148. est ἡ ἐν ἕρβῃ θαλάσσιᾳ, Brasica marina: si textus corrigatur.

I. Soldanella vel Brasica maritima major.

Raisicæ marinæ genus, Rauwolf. Lugd. ap.

Convolvulus marinus nofter, Imperato.

Hujus folia quædam sunt laciniata, quæ dā non-  
nulla tamen parte superiore sinuata.

II. Soldanella maritima minor.

Brasica marina, Matth. Dod. gal. Ang. Cord. in

Diosc. & hist. Gef. hor. Lac. Tur. Lon. Lug. Cast. Cā.

Soldanella, Gef. hor. Dod. Lon. Ad. Lob. Cef. Tab.

Soldanella marina, Ger. Eyst.

III. Soldanella alpina rotundifolia.

Soldanella montana, Ad. Lob. ico.

Soldanella alpina, Cam. ep. Clus. pan.

Soldanella alpina minor, Eid. hist.

Variat

Variat foliis & floribus: foliis, aliis superne viridibus, inferne dilutiore virore splendentibus: aliis foliis inferne ut Cyclamini rubentibus, quæ tertia species est Clusio. Flore est purpureo, nunc

lucratiore, nunc dilutiore: reperitur & niveo.

IV. Soldanella alpina folio minus rotundo. Soldanella alpina aliud genus, Cluspan. Soldanella alpina major, Eid.hift.

## SMILAX ASPERA.

**Σ**ΜΙΛΑΞ ΤΕΡΧΙΑ, *Smilax aspera* Dioscoridi l.4. c.144. propter sarmenta rubi modo aculeata: quidam? simpliciter Theophrasto 3. hist.18. ubi Garza Hederam Ciliciam interpretatur, quia Plinius l.16. c.35. scribit *Smilacem hederæ similem*. primum è Cilicia profecta, sed in Græcia frequentior, &c. Et l.24. c.10. *Smilax* qui *nicophoros* cognominatur. similitudinem *hederæ* habet.

I. *Smilax aspera* fructu rubente.

*Smilax aspera* vera, Trag.

*Smilax aspera*, Matth. Fuch. Dod.ut: Tur. Lac.

Cord.in Diosc. Gef.hor. Ad.Lob. Lugd. Cast. Cæsalp. Cam.

*Smilax aspera* fructu rutilo, Clus.hisp. & hist.

*Smilax aspera* 1. & 3. Tab.Ger.

*Volubilis aspera*, Lonic.

Folia maculis candidis quandoque notantur.

II. *Smilax aspera* minus spinosa, fructu nigro.

*Smilax aspera* fructu nigro, Clus.hisp. & hist.

*Smilax aspera* altera facie *Salsaparilla*, aut congener, Lob.ico.

*Smilax aspera* Lusitanica, Tab.Ger.

A' priore differt & fructus colore, & foliis, in hac mollioribus minusque spinosis, quandoque etiam spinis carentibus: foliis quoque angustissimis in Galloprovincia observatur.

III. *Smilax aspera* Indiarum Occidentalis.

Buenas noches, fructus exotici 3. Clus.exot. l.2. c.18. *Salsaparilla*.

IV. *Smilax aspera* Peruviana, sive *Salsaparilla*.

*Zarzaparilla*, Matth. Lac. Monar. Garz. Lugd.

*Zarzaparilla* Peruviana, Dodon.

*Zarza* seu *Salsaparilla*, Castor.

*Sarsaparilla*, Lon. Frag. Cæsalp.

*Salsaparilla*, Ad. Lobel. & par. 6. Ind. or. cap. 41.

*Smilax aspera* in Zazyntho, Alpino.

*Smilax* Peruviana, Tab. Gerar.

*Zarzaparilla* in Puna & ejus usus: Benzon. par. 6. Amer. l.3. c.119.

*Zarzaparilla* à similitudine, quam cum *Smilace* aspera habet, nomen accepit, quæ Hispanis *Zarzaparilla*, qui *Rubus viticula* dicitur: *Zarza* siquidem Hispanis, Lacunà teste, rubum: parra autem, Matthiolo interprete, vitem, & *parilla* parvam vitem five viticulam significant: hinc aliqui *Salsaparillam*, *Smilacis asperæ* Hispanicæ radicem consueverunt: cum tamè Peruviana, cœli temperati occasione & ipsius soli ingenio, longè efficacior sit quæ vel in Hispaniis, aut etià Africa nata. Cujus usum primi Hispani ex Peru & novi orbis sive Americæ provinciis ante 50. annos in Europâ invexerunt.

Triplex est, Nicolao Monardo monente, 1. et Hispania nova, quæ candidior, ad pallore tendens, & gracilior: 2. quæ multò melior, ex provincia Honduras, cinerea, nigrior & crassior: 3. ex provincia Quitto, locis urbi Guayaquil vicinis (unde *Zarzaparilla* Guayaquillana dicitur) adfertur, quæ colore est ex cinereo nigricante, majoribus crassioribus radicibus constans, quàm quæ ex Honduras adfertur, iisque interdum tam longis, ut altitudine humana fodiendum sit, antequàm erui possit. Hujus tertiam ad fluvium Guayaquil & in Puna Insula nascētis, Petrus Cieca parte prima Chronici Peruviani c.54. meminit, alteriq; in plerisque Indiæ regionibus nascenti præfert. At Cæsalpinus duas primas differentias agnoscit.

## CHINA.

**C**UM CHINA suis sarmentis *Smilaci asperæ* absimilis non sit, Acoſta monente, & suis cauliculis tenuibus, non *hederæ* modo arbores scandere, in historia Lugdunensi referatur, idcirco in hanc classẽ retulimus. Dicitur China & *Chinee* radix, à China Indiæ regione, in qua copiosè nascitur. Est autem duplex: alba enim ex India occidentali, Hispania nimirum nova & Peru, quæ colore magis rufus est: alia ex India orientali ex regione Sinarum (unde indigeni *Lampatam* vocatur) adfertur. Verùm Garzias & Acoſta (qui integram plantam depingit, & ex eo Lugd. hist.) Chinam orientalem aliter describunt, quàm Monardes suam occidentalem. At radix hæc Indiæ primum à Christi 1535. innotuit.

I. China radix: & Lugd. Fragoſo. Cina, alias China, Matthioli.

China, Lac. Lob. ico. Cast. Taber. Chinna five Cinna, Cæsalp.

Radix China, Garz. Acoft. Lug. in Floridæ: par. 2. Amer.

Chinz radix fruticis more excrefcit, foliis paucis Aurantiorum forma: in China arbor Lampaton dicitur: & radix quo nigrior eo melior: Lincot. par. 4. Ind. or. c. 33.

Orientalis exterius eft colore rubente aut subnigro, interius candicante aut subrubente: Occiden-

talis colore eft interius magis ruffo.

Amatus inter Arundines recenfuit: at Cæfalpio, China orientalis potius ex genere Iridis, quam Calami videtur. De hujus ufu Vefalius librū ſcri-

II. China ſpuria pyriſiformis. (pſit.

China ſpuria pyriſiformis, ſeu turbinata, Lob. ico.

III. China ſpuria nodofa.

Pſeudochina radix ex Virginea, Cluſ. exot.

## B R Y O N I A.

**B**ryonia, Dioſcoridi l. 4. c. 184. *ἔμπλατον*, Vitis alba, & *βρυονία* & *ἰριδοφυλόν* & *μήλωρ* & *ῥίζα* & c. dicitur. Theophrasto 6. hiſt. 1. *μήλωρ* & c. Plinio l. 22. c. 1. Vitis alba, quæ Græci *Ampeloleuce*, aliis *Ophioſtaphylon*, aliis *Melothron*, aliis *Pſiloſtrum*, & c.

Genera duo Dioſcoridi l. 4. c. 184. & 185. Vitis alba quæ aliquibus *Bryonia*, & Vitis nigra, aliis *Bryonia nigra*, aliis *Chironia* vitis. Sic & Plinio, qui *nigram* propriè *Bryoniam* vocari ſcribit.

I. *Bryonia aſpera* ſive alba baccis rubris.

*Bryonia*, Trag. Geſ. hor. Lon. Tab.

*Bryonia alba*, Dod. ut: Lugd. Thal. Cæſ. Gerar.

Vitis alba, Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac. Cord. in Dioſc. Ad. Lob. Caſt.

Vitis alba ſylveſtris, Geſ. hor.

*Bryonia* baccis rubris, Camer.

II. *Bryonia alba* baccis nigris.

*Bryonia nigra*, Dod. ut: Cord. hiſt.

Vitis nigra, Cord. in Dioſc.

Vitis alba baccis nigris, Caſtor.

*Bryonia* baccis nigris, Camer.

Differt à priore radicibus & baccarum colore; hujus radix interius buxo colore pallet: illius, ex albedo ſublutei coloris eſt: hujus baccæ maturæ nigricant, illius rubent.

III. *Bryonia Cretica* maculata: in *Phytopnace* & *Prodromo* pro 1. deſcripta.

*Bryonia dicoccos*, Hon. Belli, ep. 1. ad Cluſ.

*Bryonia Cretica*, Pon. Italico.

IV. *Bryonia lævis*, ſive nigra racemofa.

Vitis nigra, Matth. Ang. Lac. Caſt. Lugd. prima, Tabern.

Vitis ſyl. ſive *Sigillum Maris*, Dod. utroq;.

Vitis nigra ſyl. Geſ. hor.

Malacociffum *Damocrati*, & *Tamus*, Eidem.

Vitis vel *Bryonia nigra*, Ad. ſyl. Lob.

*Tamarum* vulgo, Cæſalp.

*Bryonia nigra*, Gerar.

Quibuſdam Vitis ſyl. Dioſcoridi l. 4. c. 183. (ſed florem capillaceum, muſcoſum ei tribuit, qui in noſtra non obſervatur) & Theophrasti 9. hiſt. 14. & 22. Aliis *Cyclaminus* ciſſanthemos Dioſcoridi l. 2. c. 195. de quo vide in *Periclymeno*. Aliis *Uva*

taminia Plinii l. 23. c. 1. aliis ejuſdem *Salicaſtrum*, quod potius *Amarædulci* convenit.

Baccæ maturæ aliquando ruſeſcunt, aliquando nigreſcunt.

V. *Bryonia lævis*, ſive nigra baccifera: quæ, ſub *Bryonia ſyl.* baccifera in Prod. deſcribitur.

VI. *Bryonia Mechoacana* alba.

*Mechoacan*, Monardi, Dod. Lon. Frag. 1. & 2. Tab. Ger.

*Bryonia* ſimilis planta *Peruviana Mechoacæ* provinciz, Lob. ob.

*Mechoaca Peruviana*, Lob. ico. Ger.

*Mechoacan*, Lugd. hiſt.

*Rhabarbarum Indicum*, Caſtor.

Radix *Mechoacan*: par. 9. Ind. occid.

*Mechoacan*, à provincia novæ Hiſpaniæ in qua reperitur, nomen obtinuit. Alii Rheo aſſimilant, unde *Rhabarbarum Indicum*, & *Rhabarbarum Mechoacanum*, Monardi: Germanis *Rhabarbarum album*. Dodonæus Rheo ſimile non eſſe, & cum *Bryonia* parum convenire, ſed *Scammonii* quoddam *Americanum* ſcribit. Sanè cum *Bryonia ſyl.* magnam affinitatem habet.

Duplex habetur ratio loci: prima annis ſupra ſeptuaginta ex *Mechoaca* novæ Hiſpaniæ *Intula* allata: altera verò ex Continente circa *Nicaragua* nata, quæ priore longè præſtantior eſt. Reſert *Fragoſus* etiam in *Aquacathan* novæ Galitiæ naſci. Et Cluſius in notis in Monardem, *Mechoacan* duo ſeminiſ genera ex Hiſpanica accepit: unum lævi cauliculo ſine ſiliqua, ſemine nigro, quale eſt *Scammonii* aut *Conv. olvuli* majoris: alterum oblongiore aliquantulum m cauliculo & ſemine ruſo, ſuperiore longiore & tenuiore,

Pp

utriuſq;

utriusq; filiqua parte interiore lanuginosa: ex utriusq; semine plantula Scammonii aut Convolvuli modo prodire, &c. De hac quemadmodum & de Nicotiana, Jacobus Gorraus Luterianus, & Ægidius Everhardus Belga, libellum, ille Gallicè, hic Latine, scripsit.

VII. Bryonia Mechiocana nigricans, quæ ex India Chelapæ sive Celapæ nomine ante annos duodecim allata: & à Matsiliensibus Jalapium,

vel Gelapo vocitatur: quæ sub Bryonia 3. in Prodro-mo exhibetur.

IX. Bryonia Mechiocana sylvestris. Mechoaca ex promontorio D. Heienæ, Monardi. Mechoacæ syl. genus, Lugd. hist.

Hæc priore minor est per omnia, cujus radix gravia symptomata excitat, quare Scammonia, Monarde auctore, nuncupatur.

## RADIX QUIMBAYA.

**R**adix QUIMBAYA: in provincia Quimbaya, cujus metropolis Carthago, radices tenues, digiti crassitudine, inter arbores nascuntur, quarum fragmentum per noctem in aqua maceratum, aqua partem majorem absorbit, ex residua uncia tres sumpta, benè igne instar Rhabarbari purgant. Monardes ex Petri Cieca Peruviana historia refert, & ex eo Lugdunensis historia: meminit etiam Fragoſus, sed succinctius.

## LUPULUS.

**L**upulum à Plinio L. 21. c. 15. Lupum salicarium nominatum voluit: qui Mesuæ 2. purg. 24. Volubilis sicut asperis dicitur: hodie in Græcia Epæ-vla nominatur.

Sati us est & sylvestris, magnitudine differentes: sic syl. florum conos minores, rariore, pauciores habet: alio Lupulus florens, fructu caret: & contrâ, fructum ferens, non floret.

I. Lupulus mas.

Lupulus, Brunf. Matth. Tur. Dodon. Clus. hist. Tabern.

Lupulus sativus, & syl. Trag. Lon. Cast. Lugd.

Lupus salicarius, Fuch. Dodon. gal. Gein. hort.

Lac. Lcb. (cui & Vitis septentrionalium) Cæsalp.

Lupulus salicarius sponanea, Ad.

II. Lupulus femina: & Cam. ep. & hor.

Foliis est rotundioribus, circa radicem sine incisuris tantum serratis: flosculis subpallidis, qui sine fructu pereuntes, in pollinem luteum abeunt.

III. Lupulus Mechiocannus.

Radix Carlo sancto, Monard. Lugd. Fragoſo.

Indica radix, Monardi, part. alt.

Carolus Sanctus, Caſtori.

Radix hujus plantæ, quæ Lupulo similis est, et provincia Mechiocan adfertur, cujus decoctum & pulvis in Catarrho, Epilepsia & lue Venereæ commendatur.

IV. Sippo, sarmenta longa, Lupuli sarmenta non abſimilia, quibus ad religandum Brasiliens utuntur: par. 3. Americ.

## VITIS VINIFERA.

**D**E 'ΜΠΕ'ΛΟΥ Ο'ΙΝΟΦ'ΟΡΟΥ Dioſcorides 15 sedecim capitulis egit, Vitem, Labruscam, Vitis Oenanthem, Onphaciam, Vini naturam, differentias & facultates, ex sapore, mixtione, loco natalis sumptas, exponens: quemadmodum de Lora, Mulſo & similibus. Et Theophrastus sparsim in suis libri de Vitis pioſe egit: ut de Vino q. hist. 20. & 6. caus. pluribus capitulis. Et Plinius l. 14. capitulis novemdecim.

Vitem dividimus in sativam & sylvestrem: sativa major est, cujus plurimæ species, alia minor. Major ut & colore & magnitudine differunt: alterius namque acris, aut virides albicantesve, aut sulvi, aut saturatiore bore nigricant, aut carulei, aut subrubentis coloris: alia acris oblongæ magnitudine & forma prunorum, quæ regulana dici potest: alia rotunda, iug, vel magnis vel parvis: alia acris sunt frequentioribus, alia rarioribus. Sunt quæ granis aut vinaceis carent, interdum unicum vel alterum granum habent: Rarius uva barbata reperitur. Minor vero est acris nigra, rarissime albidis, aut sulvis, nucleo minimo ac molli. Sapore etiam differunt, ut dulci acerbo, muscato, quæ Vitis Apiana Plinio.

In solis quoq; differentia, alia majora profundius incisa, ut Italica sicut ad pediculum usq; in laciniis acutis divisis: alia minora sunt: Sic alia tenuiora, alia crassiora: alia viridia, alia rubentia, alia maculata: alia ad tactum duriora, molliora, alia levia, alia deniq; subſtuta.

Ratione l. i. Vitis plurimum variant: apud nos commendantur, ex Germanicis quidam Briscica, A. sativa Ripensia, quæ ex ditione Bernatum habemus, Rhenana, & Nescatina, quæ duo postiora rarius habemus ex Gallia.

ex Gallicis, Burgundiaca & inter ea potissimum Arbustica, Muscatellina, Frontiniaca, quæ Lugduno advehuntur: ex Italicis, Rhetica, quæ ex Vallerelina asportantur: ex Hispaniis, Cimenis: ex Grecis, Malvaricum.

Sic in Aegypto, vinum tenue atq. aquosum existit, licet calidissima regio sit: cuius rei causam Aphrodisæus l. 2. prob. inquit. Et hoc vinum videtur Hesiodus si v. c. 1. vinum Biblinum vocasse: forte quia in eadem cum biblo. id est papyro regione proveniat: licet ipsius interpretæ Tzetius velit à Biblo civitate Libano monti proxima, nomen accepisse, siquidem constat ejus loci incolæ ferè hydropotes esse. Suidas verò tum à Byblos civitate, tum à Biblia vitis genere, dictum putat. Monet Guiland. Hippiani Rheginum vitem quæ Ileus vocatur Bibliam vocare. Sed hæc alterius sunt loci.

In India insula Baly, Vites bis in anno uvas promunt: Linsc. par. 3. Ind. or. cap. 40. & in insulis Azores, super metas rupes crescunt, quæ radices in medios hiatus seu saxorum rimas immittunt, quibus succum sibi necessarium proliciunt: & in istis petrae recessibus, Vites multo latius se proferunt, quam quæ in plantis sunt. quæ ad frugem pervenire nequeunt: Idem cap. 6. Sed in Hispaniola plantata exiguae uvas fundunt, nec admodum jucundi saporis & ferè Februario & Martio vindemiari solent, authore Benzone sive America lib. 4. c. ult. & ut Josephus Acol. l. 3. c. 22. & l. 4. c. 32. nec in insulis, nec in firma terra Uva aut vinum nascitur: in nova Hispania, vineæ uvas proferunt, sed nunquam probe maturescunt, ut vinum confici possit: nisi in Peru & Chile approbium vinum nascitur: nam jam vites colere didicere: & vinea plerumq. in convallibus Peruanis nascuntur, juxta quas fossas ad aquam colligendam excavant, quæ vites subinde irrigant.

I. Vitis vinifera, ex cujus Uvis acerbis immaturis succus exprimitur, quem *Uva* & *Omphacium* Dioicorides l. 5. c. 6. vocat: ex quo Syrupus de Agresta in officinis paratur.

II. Uva passa major, *Bosquæ* Græcis.

Uvæ passæ majores, Trag. Ges. hor. Castor.

Uva passa, Tur. Lon.

Zibebas ferens, Camer.

Uvæ Zibebæ, Tab. Gerar.

Non solum Uvæ, sed etiam acini præter modum amplii, crassii & oblongi sunt, ut non nisi passæ ad nos deferantur: Arabibus, uva Zibibi, Latinis passa, Germanis, Zibeben/ Meercruebel/ id est, uva marina.

III. Uvæ passæ Indicæ gigantis carentes.

Uvæ sine vinaceis seu apyrenis, ad Clus. cur. post.

IV. Uvæ passæ minores, vel Passulæ Corinthiæ.

Passulæ, Trag.

Uvæ passæ minores, Ges. hor. vel Corinthiæ, Cast.

Folii est rotundis, crassis, subtus incanis, in pauciores lacinias obtusas divisus: Uvis partim fulvis, partim subnigris, dulcibus & vinosis.

V. Vitis sylvestris, Labrusca.

Labrusca, Trag. Lugd. & aliis.

Labrusca dicta, quod in marginibus terræ, seu labris quibusdam oriatur. Dioicoridi l. 5. cap. 2.

*Uva* & *Uva*, qui genera duo fecit: alterius enim Uva non maturefcit, sed florem tantum profert: *Uva* nominatum: altera fructum perficit, ex parvis acinis nigris subastrigentibus. Plinius Labruscam vocat & Oenanthen, ex alba Labrusca præstantiorem, quam & nigra scribit. Et Generus lib. de hor. racemiferam tum albis, tum nigris acinis refert. Vocatur autem propriè Oenanthe, fructus Vitis sylvestris cum floret, Dioscoridi l. & c. 5. seu ut Plinius loquitur, Vitis labrusca uva, quæ cum floret colligitur, quando optimè olet.

Apud Floridentis Labrusca in magna copia crescit, author par. 6. Ind. occid. scribit.

VI. Vitis sylvestris Americana.

Vites sylvestres vicinas arbores scandentes & uvas edules præferentes in nova Francia habentur: par. 2. Amer.

VII. Vitis sylvestris Virginea.

Vitis duum generum spontè nascuntur: alterum uvistenuibus acerbis: alterum majoribus & dulcibus: Hariot. descr. Virgin.

IX. Vitis sylvest. Indica acinis pruni sylvestris.

Arbores multæ in India, quæ uvas quasdam agrestes ferunt, quarum Acini prunorum syl. speciem referunt, & nigro folliculo vestiuntur, sed quia illis multum ligni, parum pulpæ, ex iis vinum non faciunt: Benzo l. 1. c. 28.

## SECTIO SECUNDA.

## CLEMATITIS; LIGNUM COLUBRINUM; CLEMATIS;

PERICLYMENUM; APOCYNUM; ASCLEPIAS; POLYGONATUM;

*Lilium Convallium; Monophyllum; Laurus Alexandri-*  
*na, quibusdam Hippoglossum.*

## CLEMATITIS.

**K** *Asmatitis* Dioscoridi l. 4. c. 182. idem est ac *Sarmentaria*: sic dicta, quoniam κλέματα flagella, virgines flagellis similia emittat, ac ut illa arborescunt. Plinio l. 24. c. 10. *Clematida* Smilaci similem, per arbores repentem geniculatam & ipsam appellaverunt. A Theophrasto 5. hist. 10. ἡ τέγγιν dicitur, & esse arbores quæ *Vitis* & *Labruscæ* modo surgat.

I. *Clematidis* syl. latifolia.*Vitis sylvestris*, Trag. Lugd.*Vitis nigra*, Fuch. Tur. Lon. 2. Tab.*Vitalba*, Dod. ut: Guiland. the. (& *Vitis* syl. Dioscoridis) Cæsalp.*Viburnum Gallicum*, Bellon.*Atragene Theophrasti*, Ang. Clus. hist.*Vitis* syl. caustica, Gef. hor.*Clematis* 3. Matth. Cast. Thal. 2. Lacun.*Clematis altera prima*, Cord. in Dioscor.*Viorna vulgi*, Ad. Lob. Gerar.*Clematis* five *Viorna vulgi*, Lobelii, Eyst.*Clematidis* est Dioscoridis, *Atragene Theophrasti*: quibusdam *Vitis* syl. Plinii.

In foliorum divisuris mirè ludit &amp; sarmenta aliquando brachiorum crassitudinis sunt.

II. *Clematidis* Peruviana.*Bexugo del Peru*, ad *Atragene* sarmenta proximè accedentia, cortice cinereo obducta, gustus lenti, dein acris, deniq; fauces urentis: drachma purgat & *Mechoaca* præfertur, Clusius in notis ad *Monardem*.III. *Clematidis* peregrina foliis pyri ineis.*Clematis altera* Bœtica, Clus. hisp. & hist.*Clematis* Bœtica, Clusii, Lob. Lugd. Tab. Ger.IV. *Clematis* five *Flammula repens*.*Clematis altera*, Dod. gal. flore albo, Cast. Cam.*Clematis flammula* quibusdam, Gef. hor.*Clematis altera urens*, Ad. Lobel.*Flammula*, Dod. Lugd. hist.*Viticella*, Cæsalp.*Clematis urens*, Tab. Gerar.

Flammula dicitur, quod contusa applicata, vesicæ flammæ instar excitet, cujus folia aliquando Apii modo dividuntur: est etiam simplex vulgaris, alia multiflora, quæ

*Clematis urens* 2. Taber.*Clematis urens* multiflora, Gerar.V. *Clematidis* maritima repens: quæ 1. in Prod. *Clematites*, Anguil.VI. *Flammula recta*.*Flammula*, Matth. Lugd. Clus. pan. & hist. Tab.*Flammula frutex*, Cord. in Dioscor.*Clematis altera*, Turner.*Flammula altera*, Dod. altera surrecta, Lob.*Flammula recta*, Cam. Eyst.*Flammula jovis* surrecta, Gerar.

Duplex est: alterius sarmenta &amp; foliorum pediculi virescunt &amp; serius floret: alterius rubent &amp; maturius floret.

*Centella* herba quæ trita tumoribus impostis pustulas excitat, in epist. ad *Monardem* huc referri potest.VII. *Clematidis* alpina *Geranifolia*: quæ 2. in *Prodomo*.*Clematis cruciata alpina*, Ponz.IIX. *Clematidis* cærulea erecta.*Clematis altera* minor longifolia, *Clymenum* quorundam, Lob. Lug.*Clematis cærulea* Pannonica 2. Clus. pan.*Clematis cærulea* 2. Tab.*Clematis* major Pannonica, Gerar.

Magnitudine variat: hinc duæ figuræ apud Clusium hist. pan. &amp; Tab. sub

*Clematide cærulea* pan. 1. (quæ *Clematis cærulea* Pannonica, Eyst.) & 2. Et Ger. sub*Clemat. pan.* & *Clemat. majore* Pannonica.

Flore est cæruleo, rarius albo.

IX. *Clematidis* cærulea vel purpurea repens.*Clematis altera*, Matth. Dod. Cast. ap. Clus. hist. flore purpureo, Camer.*Clematidis* alterius altera species, Dod. gal.*Clematis*

Clematis peregrina cærulea & purpurea, Lob.  
Tab. qui duas figuras habet, & Ger. sub cærulea &  
rubra.

Clematis 3. quæ Flammula, Cæsalp.

Pothos cæruleus, Lugd.

Clematis peregr. incarnato simpl. flore, &

Clematis peregr. purpurea simpl. flore, Eyst.

Aliis Clematis Dioscoridis: quidam  $\pi\delta\theta$   
(Desideriū Gaza vertit) Theophrasti  $\sigma$ . hist. ult.  
faciunt.

X. Clematis cærulea flore pleno.

Clematis altera flore pleno, Cam. ep. Clus. cur.  
post.

Clematis peregr. purpur. flore pleno, &

Clematis peregr. incarnata plena, Eyst.

Flore est cæruleo, purpureo cæruleo, incarnato,  
ad purpureum colorem sed admodum dilutum  
accedente.

XI. Clematis trifolia flore roseo clavato.

Granadilla, Monardi, Petro de Cieca in hist.

Peruana, Lug. Vide in Americæ par. 9. l. 4. c. 27. at

c. 30. Granadilla inter ligna recensetur.

Flos passionis sive Granadille ex India, du Bry.

Granadilla dicitur propter semē, quod ut in ma-  
lis granatis inclusum continetur: Flos passionis  
lis, quod in flore aliquæ veluti passionis Christi  
figuræ delineatæ conspiciantur, Monardes.

Hujus folia & flores à Doctis. Simplicista Joh.  
Pona Veropā anno 1621. accepi.

## CLEMATIS INDICA, QUÆ LIGNUM

Colubrinum.

**C**lematidem vocamus, quia pleraque sarmentitia sunt & per arbores repunt: Pao da Cobra, id est Lignum  
Colubrinum, Lusitani nominant, quia adversus animalium virus ejaculantium morsus & ictus efficax sit.

I. Clematis Indica foliis Lentiscinis candi-  
lis maculis aspersis.

Ligni colubriini tertium genus, Garz. Frag.

II. Clematis Indica spinosa foliis luteis.

Ligni colubriini alterum genus, Garzia, Frag.  
& Clusio, qui ligni frustum pingit, & Lugd.  
hui malè titulus Ligni colubriini Acostræ inscri-  
ptus est.

Lignum colubrinum, Tab.

III. Clematis Indica foliis persicæ, fructu  
Periclymeni.

Ligni Colubriini primum genus, Garzia, Frag.

Palo del Cebra, id est, Lignum serpentinum seu  
Colubrinum, Linscot. 4. par. Ind. or. c. 31.

Pao de Cebra lignum seu radix Lusitanis dicta, o-  
mnium venenorum antidotus, in Insula S. Lau-  
rentii Ind. orient. par. 4. c. 7.

Et hæc tria ligni genera in insula Zeilan repe-  
riuntur.

IV. Clematis Malabarensis foliis Vitis, co-  
lore dracunculi.

Lignum colubrinum primum, Acostræ, Cast.  
Lugd.

V. Clematis Malabarensis altera radice ser-  
pente.

Lignum colubrinum alterum, Acostræ, Lugd.

Palo della Culebra, Cast. ap.

VI. Colubriini ligni tertium genus in eadem  
provincia, vastæ arboris magnitudine, Acostræ.

an Lignum colubrinum quod pingitur à Clusio  
notis ad Acostram.

VII. Radix quædam in Malaca, quæ adver-  
sus vulnera sagittis toxicis illitis facta, præsentia-  
neum remedium est, Garzias.

## CLEMATIS DAPHNOIDES.

**Q**uæ Dioscoridi lib. 4. cap. 7.  $\kappa\alpha\mu\alpha\tau\iota\varsigma$ , aut  $\delta\alpha\phi\nu\omega\iota\delta\iota\varsigma$ , aut  $\mu\alpha\lambda\upsilon\gamma\omega\iota\delta\iota\varsigma$  dicitur, ipsi  
Plinio lib. 24. cap. 15. Clematis Aegyptia, quæ ab aliis Daphnoides, ab aliis Polygonoides vocatur. Aliis tamen  
eiusdem lib. 21. cap. 11. Vinca pervinca censetur: alii, an ejusdem lib. 24. cap. 15. Centunculus sit, dubitantibus.

I. Clematis daphnoides minor.

Vinca pervinca, Brunf. Gesl. hor. Lon. Ad. Lugd.

Thamæ daphne altera Dioscoridis, Brunf. 4.

Pervinca (quod semper vireat) Trag.

Clematis, Matth. Lac. Cord. in Diosc. Turn.

Clematis prima Dioscoridis, Anguil.

Clematis daphnoides, Dod. ut: Fuch. Lob. Thal.

Cam. Tab. Clus. hist.

Clematis Aegyptia syl. Gesl. hort.

Provincia vulgo, Cæsalp.

Clematis daphnoides minor fl. cæruleo: fl. albo:

fl. purpureo: tres fig. Eyst.

Flores cærulei sunt: quandoque candidi: ra-  
rius rubentes, vel subpurpureascentes: interdum

Pp 3 flos

Ros alium florem medium continet.

### II. Clematis daphnoides major.

Clematis Ægyptia hortensis flore purpureo, Gef.  
hor.

Pervinca major, Ad. Eyft.

Clematis five Pervinca major, Lob.

Clematis daphnoides major, Dod. Cam.

Provinca altera major, Cæfalp.

Clematis major, Lugd. prima major, Cast.

Clematis daphnoides latifolia, Cluf. hift.

Hanc Clematidem Ægyptiâ Plinii: illam ejusdem Vincam pervincam, Cæfalpinus statuit.

### III. Clematis flore pleno.

Daphnoides polyflora, Lob.

Clematis flore multiplici, Cam. epit.

Clematis purpurea Austriaca, flore pleno, Camer.  
hor.

Clematis major flore duplicato, Lugd.

Clematis altera flore pleno, Cluf. hift. ap. alt.

Clematis daphnoides flore purpureo pleno, Eyft.

## PERICLYMENUM.

**P**ερικλῆμενος à Dioscoride lib. 4. cap. 14. describitur. quod sit frutex simplex, habens ex intervallis solida caulem amplectentia, subcandida, hederacea, & inter folia germina nascentia, super qua fructus hederæ similes: florem candidum saba similem subrotundum & quasi in folium procumbentem: semen durum & avulsibile: radicem crassam ac rotundam: Nisi Dioscor. radicem rotundam diceret, cum nostra conveniret: ut Plinius lib. 27. cap. 12. radicem præterit. Quare an nostrum Periclymenum, potius sit *κυκλάμιον* & *κύκλος* quam *περικλῆμενος* aut *περιφύλλων* vocitent, Dioscoridis lib. 2. cap. 195. & Cyclamenos Plinii lib. 25. cap. 7. ambigunt. quod Dioscor. scribente, folia fert hederæ, sed minora: caules crassos geniculatos, quibus circa vicinas arbores capiteo modo se volvunt: flores candidi, odorati: fructus verò instar acinorum nri: similes hederæ, molles, aliquantulum amari saporis & lentus: radix inutilis. Et si sint qui velint, Cyclaminum alteram Vitem sylvestrem & Periclymenum tribus distinctis locis à Dioscoride descriptum, unius plantæ nomina esse. Periclymenum dictum volunt, quod si ab inimiculis convolvatur.

### I. Periclymenum non perfoliatum Germanicum.

Caprifolium, Brunf. Gef. hor. Lon. Germanicum, Dod.

Periclymenum, Trag. Fuch. Dod. gal. Tur. Cord. in Diof. Gein. hor. Cam. Thal. Tab. Ger. Germanicum, Eyft.

Periclymenum non perfoliatum Septentrionalium, Ad. Lob.

Periclymenum vulgare Septentrionalium, Cluf. hift.

Flos candidus, subluteus.

### II. Periclymenum perfoliatum.

Periclymenum, Matth. Ang. Lac. Ad. Cast.

Periclymenum alterum, Dod. gal.

Periclymeni species cujus folia unita, Gef. hor.

Periclymenum perfoliatum, Lob. Lugd. (& grandius) Tab. Ger. Eyft.

Periclymenum vulgare alterum, Cluf. hift.

Vincibosum vulgo, Cæfalp.

Flores ex purpura niveo candore nitent, alio modo luteo aspersi: aut albi, aut inbruffi.

### III. Periclymenum humile.

Periclymenum 2. & Chamæpericlymenum Peritenicum, Cluf. pan.

Periclymenum minus, Taber.

Chamæpericlymenum, Ger. Cluf. hift.

### IV. Periclymenum humile Norvegicum.

Chamæpericlymenum tenerius aliud, Cluf. hift.

## APOCYNUM.

**A**ποκύνον ή κυπάριλλον, περιφύλλων, κυκλάμιον Dioscoridi lib. 4. cap. 81. Apocynum, Plinio lib. 25. cap. 1. quod canes, lupos, vulpes & pantheras, Dioscoride auctore, vel ut Plinius, canes & omnes quadrupedes. dicitur alias περιφύλλων quasi circumplectens, eo quod proxima amplexetur.

### I. Apocynum folio subrotundo.

Apocynum, Matth. Ang. Gein. hor. Lac. Ad. Lob.

(cui & Periploca Græca foliis latioribus hederaceis) Lugd. Cast.

Apocynum primum latifolium, Cluf. hift.

Cynocrambe, Lonic.

Apocyni alterum genus, Camer.

Periploca repens, Cæfalp.



II. Apocynum folio oblongo.  
Apocynum repens, Matth. Lugd. Camer.  
Apocynum foliis Oleandri. Anguil.  
Apocynum 2. angustifolium, Clus. hisp. & hist.  
Periploca, Cæf. altera, Dod.

Periploca serpens angustiore folio, Ad. Lob.

III. Apocynum angusto folio.  
Secamone, Scammonii species Ægyptiis, Alpin.  
Apocini secundi species altera, Clus. hisp. & hist.

## ASCLEPIAS.

**E**τσί Ἀσκληπιάς Dioscoridis lib. 3. cap. 106. & Plinii lib. 27. cap. 6. Asclepias, à quibusdam nostrum censetur (dubitat Anguillara, negat Matthiolus) at Apocyno cognata herba videtur.

I. Asclepias albo flore: & Gerar.  
Hirundinaria, Brunf. Trag. Gef. hor. Lonic.  
Hederalis, Ruellio.  
Vincetoxicum, Matth. Dodon. Thal. Cast. Lugd.  
qui Fuchii & Matthioli figuram exhibet.  
Asclepias, Fuch. Dod. gal. Cord. hist. Turn. Lac.  
Gef. hor. Ad. Lob. Cæf. Tab. duplici figura, Cam.  
Asclepias vulgi, Apocynum Dioscoridis, Col.

II. Asclepias nigro flore.  
Vincetoxici altera species, Dod.  
Asclepias altera flore nigro, Lob. sive Periploca minor.

Asclepias nigra, Lugd. flore nigro, Cam. Tabern.  
Clus. hist.

Vincetoxicum flore nigro, Cam. epit.

Apocynum, Colum.

III. Asclepias filiqua bifido mucrone.  
Asclepias Cretica, Clus. hist. append. 1.

IV. Asclepias ex Virginea.

Wisauck sive Vincetoxicum Indicum, Gerar.

V. Fructus Asclepiadis filiquæ similis, semini-  
bus planis nigris.

Fructus tertius è navigation. Batau. Clus. ex lib. 2.  
cap. 15.

## POLYGONATUM.

**Π**ολυγόνατον Dioscoridis lib. 4. cap. 6. quod radix crebro geniculata sit: vulgo Sigillum Salomonis, haud dubiè à vestigiis pluribus, radici sigilli instar impressi.

I. Polygonatum latifolium vulgare.  
Sigillum Salomonis, Brunf. Gef. hor. latifolium,  
Trag.  
Polygonatum, Matth. Lac. Cast. vulgare, Camer.  
vulgatius, Eyf.  
Polygonatum latifolium, Fuch. Dod. ut: Cord.  
in Dioscor. & hist. Gef. hor. Lob. Tab. primum,  
Gerar.

Polygonatum majus, Lon. Ad. Thal.  
Polygonatum latifolium vulgare, Clus. hist.  
Fraisinella, Ang. Cæf.

Vulgares herbarii Germanici, cum Diſtamno  
albo & Elleboro albo confundunt: alii malè Seca-  
cul Arabi faciunt. Variat bacis rubentibus, pur-  
pureis, quandoque nigris, ut Cam. in epit. monet.

II. Polygonatum latifolium maximum.

Polygonatum majus, Clus. pan. Eyf.

Polygonatum latifolium primum, Eid. hist.

Polygonatum Pannonicum, Cam.

III. Polygonatum latifolium Ellebori albi  
foliis.

Polygonatum 2. latius folio, vel 2. Clus. pan.

Polygonatum 3. latius folio, Eid. hist.

Polygonatum latifolium, Dod. post.

IV. Polygonatum latifolium flore majore odore.

Polygonatum flore odore, vel 1. Clus. pan.

Polygonatum secundum lasiore folio, Eid. hist.

Polygonatum, Ger. latifolium minus, Tab.

an Polygonatum angulosum, Cord. hist.

V. Polygonatum latifolium minus flore ma-  
jore: 1. in Prodr. 10.

VI. Polygonatum latifolium perfoliatum Brasili-  
anum: 2. in Prodr. 10.

VII. Polygonatum latifolium ramosum.

Laurus Alexandrina, Matth. Dod. gal. Cam.

Hippoglossum, Lugd.

Rulco alfinis tertia, Cæf. alp.

Polygonatum 3. Clus. pan. latif. 4. ramosum, Eid.  
hist.

Polygonato affinis planta, Lob. ob.

Polygonatum latifolium 3. & 4. Tab.

Polygonatum ramosum & acutum, Ger.

IX. Polygonatum angustifolium non ramosum.

Sigillum Salomonis angustifolium, Trag.

Polygonatum angustifol. Fuch. Dod. gal. Tur. Eyf.

Lugd. Clus. pan. vel 5. hist. primum, Tabern.

Poly-

Polygonatum tenuifolium, Cord. in hist. Camer.  
 Polygonatum tenuifolium majus, Thal.  
 Polygonatum erectum, Gef. hort.  
 Polygonatum minus, Lon. Ger. foliis rubis, Ad.  
 Lob.  
 Polygonatum alterum, Dodon.  
 Polygonato similis in albis, Cæsalp.  
 Quibusdam Chamædaphne Dioscoridis lib. 4.

cap. 149. aliis Ephemerum ejusdem lib. 4. c. 85. &  
 Plinii lib. 25. cap. 13. qui florem caruleum tribuit.  
 IX. Polygonatum angustifolium ramulosum.  
 Polygonatum angustifolium ramulosum, Clus. pan.  
 Polygonatum angustifolium 2. Tab. angustifolium, Ger.  
 Polygonatum 6. five angustifolium 2. Clus. hist.  
 Polygonatum tenuifolium minus, Thal.

## LILIUM CONVALLIUM.

**L**ilium, quod à loco natali convallium appellatur, à quibusdam Lilium vernum Theophrasti 6. hist. 7. censetur: alii Oenanthem ejusdem lib. 5. c. 7. & Oenanthem Athenai volunt.

I. Lilium convallium latifolium: in Prodro-mo describitur.

II. Lilium convallium album.  
 Lilium convallis, vel syl. Brunf.  
 Lilium convallium, Trag. Matth. Gesn. hor. Dod.  
 Cæsalp. Cast. Lugd. Cam. Tab. Ger. Clus. hist.  
 Lilium Theophrasti, Dod. gal.  
 Ephemerum non lethale, Fuch.  
 Callyonimus vel Chamæcitinus, Gef. hor.  
 Calacia, Lonic.  
 Liliū convalliū vel vernū Theophrasti, Ad. Lob.

III. Lilium convallium alpinum.  
 Lilium convallium alterum alpinum flore majore, & odoratiore, Camer.  
 Lilium convallium flore albo, Eyf.

IV. Lilium convallium flore rubente.  
 Lilium convallium floribus suaverdentibus, Lob. ico.  
 Liliū convalliū rubrū, Tab. flore subrubro, Cam.  
 Lilium convallium flore incarnato, Eyf.  
 Flore est minore, candore & rubore confusè mixto, & odore minus valet.

## MONOPHYLLUM.

**M**ονόφυλλον, unifolium dictum, quod cum prodit unico se folio, nam cum cauliculum acquirit, folia bene habet, rarius tria, & quidem in albis: propter similitudinem cum Lilio convallium, minus appellatur: sunt qui Cyclaminum tertium Plinii 1. 25. c. 4. velint.

Lilium convallium minus.  
 Unifolium, Brunf. Dod. ut: Lugd. Cam. Tab. Eyf.  
 Coryledon syl. & Unifolium, Trag.  
 Gramè Parnassij, Matt. Lug. Cast. Tab. majus, Ger.

Henophyllum vel Monophyllum, Gef. hor.  
 Cyclaminum unico folio, Dalech. in Diosc.  
 Monophyllum, Ad. Lob. Thal. Gerar.  
 Bifolium primum, Lonic.

## LAURUS ALEXANDRINA, quibusdam Hippoglossum.

**Λ**ύρα, Dioscoridis lib. 4. cap. 132. & Hippocrati Plinii 1. 15. c. 30. ubi Laurum Alexandrinum vocat. ab aliis Ideam dictam, sunt qui idem censent cum Lauro Alexandrina Theophrasti 3. hist. 17. Alii ἰδαία, Idearadix Dioscoridis lib. 4. cap. 44. Alii ἰδαία, aut ἰδαία, aut ἰδαία, Laurum Alexandrinum Dioscoridis lib. 4. cap. 147. Alii χαμαίδα, qua & ἰδαία Dioscoridis lib. 4. cap. 149. & Laurum Plinii lib. 15. cap. ult. & Chamædaphne ejusdem lib. 24. cap. 15. Denique sunt qui radicem Ideam, Hippoglossum Laurum Alexandrinum & Chamædaphnen apud Dioscoridem idem esse velint.

I. Laurus Alexandrina fructu pediculo infidente.  
 Uvularia, Brunf. (qui marem & foeminam pingit, sicut & Tabernæmontanus & Gerardus) Lonic.  
 Laurus Alexandrina, Brunf. Trag. Fuch. Ang. Gef. hort. Eyf.

Hippoglossum, Matth. Dod. ut: Turn. Lac. Ad. Lob. Cast. Gerar.  
 Hippoglossum quod à Lauro Alexandrina dicitur, fert, Guil.  
 Hippoglossus, Gesn. hort.  
 Daphne Alexandrina, Fuch.

Bonifacia & Bislingua, Anguil.

Laurus taxa Plinii, Lugd.

Rusco affinis prima, Cæfalp.

Bislingua, Cluf. panon.

Radix Idæa Dioscoridis, Colum.

Laurus Alexandrina Theophrasti, 2. Cluf. hist.

II. Laurus Alexandrina fructu folio infidente.

Laurus Alexandrina altera, Matth. Taber.

Laurus Alexandrina & Chamædaphne, Guil.

Laur<sup>o</sup> Alexandrina, Lac. Lob. ad. part. alt. Col. cui & Chamædaphne.

Laurus Alexandrina vera, Lugd. Cluf. hist.

Rusco affinis altera, Cæfalp.

Hippoglossum Matthioli, Ger.

Hæc folio est rotundiore, baccis in medio foliorum impressis, nec ulla epiglottide testis: illa folio est longiore, glossariis live ligulis donata, baccis ex oblongis petiolis dependentibus.

## SECTIO TERTIA.

*HEDERA; HEDERA TERRESTRIS; CYMBALARIA; NASTURTIUM INDICUM; BALSAMINA; NOLI ME TANGERE; ARISTOLochia; Cyclamen; Gramen Parnassii; Saxifraga; Chelidonia minor; Numularia.*

### HEDERA.

**H**EDERA ΚΙΣΣΟΣ Dioscoridi lib. 2. cap. 210. κισσός Theophrasto 3. hist. 18.

Differentias multas in specie sortitur, summas autem genere tres: nam quædam candida est, altera nigra, tertia helix: candida fructum fert candidum: nigra nigrum, aut croci emulum, quam vulgus Dionysiam vocat: Helix fructum non gignit. &c. Dioscorides. Sic Theophrasto l. c. multigena hedera est, quædam enim humi repens: quædam in excelsum se attollens: & excelсарum genera plura, sed tria summa patescunt, candida, nigra, tertiâq; clavicula, &c. Plinius l. 16. c. 34. Hedera duo prima genera fecit, marem & seminam (per marem Cissum intelligere oportet, confundit enim Cissum cum Cisso, id est Hedera) subjungit: species tres esse, candidam, nigram, helicem: quæ species in alias etiam dividuntur, &c. quæ ex Theophrasto sumpsit.

#### I. Hedera arborea.

Hedera, Brunf. Trag. Ang. Cord. in Dioscor. Dod. Cæfalp.

Hedera arborea, Matth. Ges. hor. Lugd.

Hedera nigra, Fuch. Dod. gal. Lac. Lonic.

Hedera corymbolâ communis, Ad. Lob. Tabern. Gerar.

Hedera major, Castor.

Variat: cultu enim arborefcit, & cum ad eam ætatem pervenit, in qua fructum ferre potest, totam faciem mutat, nam per se erigitur, nullum adminiculum quærens, & hanc Orthocissum antequam dicunt, quæ

Hedera arborea recta, Ad.

Folia mutat, ut quæ prius in plures angulos desinebât, angulis obliteratis, excepto eo qui in summo est, rotundantur, maculis albis, aliquando subrubentibus, inferne distinguuntur.

Baccæ maturitate nigra, rarò flavæ.

#### II. Hedera poetica

Hedera Dionysias, & Chryfocarpos, Dalech. Lug.

Dionysias aut Bacchica, quod ex ea poetarum coronæ confuerentur: Chryfocarpos, à fructus colore aureo: hinc folium minimè angulosum est.

#### III. Hedera major sterilis.

Hedera Helix, Brunf. Matth. (& minor) Fuch. Dod. ut Lac. Lon. Lugd. Cæf. Cam. Tab. Ger.

Hedera sterilis, Anguil.

Hedera arborea sylvestre genus, Ges. hort.

Helix sive provoluta sterilis hedera, Ad. Lob.

Hedera minor, quæ Helix, Castor.

Hedera species tertia helix vocata, Thal.

Hæc diversa ne sit ab arborea, Theophrastus ambigit: Plinius concedit: at recentiorum aliqui negant, fieri enim ut alicubi non arborefcant, ob imperfectionem quandam Individui non speciei.

#### IV. Hedera humi repens.

Hederula, Trag.

Hedera minor *κισσός* Dodon.

#### V. Hederaceis foliis planta.

Cyclaminos altera hederaceis foliis, Lob. Lugd.

## HEDERA TERRESTRIS.

**H**edera terrestris, χαμαινός & Dioscoridi lib. 4. cap. 126. si in descriptione pro μασπόμεν. μασπόμεν legitur: à Plinio videtur intelligi sub Hedera à terra se non attollente: quibusdam Malacocissos, quasi molis hedera, in Geoponicis: aliis Chamaeclema, quasi Clematis humilis repens.

I. Hedera terrestris vulgaris  
Hedera terrestris, Brunf. Matth. Dod. Lugd. Cæf.  
Thal. Tab. Gerar.  
Elatine, Brunf. 4.  
Chamaecissos, Trag. Fuch. Dod. gal. Lac. Cam.  
Chamaeclema, Cord. hist.  
Humilis hedera, Ad. corona terræ, Lob.  
Malacocissos, Lugd.  
Duplex est: major, quæ vulgata: minor elegantior, cauliculis erectioribus, brevioribus ut & fo-

liis: floribus magis cæruleis, quæ locis humidioribus circa arbores antiquas reperitur.  
II. Hedera terrestris montana.  
Hedera terrestris species montana, Cam. epit.  
Priore hirsutior est, foliis majoribus & floribus, qui purpurascunt.  
III. Hedera saxatilis magno flore.  
Asarina sterilis, Lob. ob.  
Asarina sive saxatilis hederula, Ad. Lob. icon.  
Asarina Lobelii, Lugd.

## CYMBALARIA.

**C**ymbalaria, à cymbalo nomen duxisse videtur: quibusdam Umbilicus Veneris alter censetur: at Hermolaus Barbarus, Capnon primam Plinii lib. 25. cap. 13. esse credidit.

Cymbalaria, Matth. Lugd. Cæf. Cast. vulgaris, Lac.  
Cymbalaria Italica hederaceo folio, Ad. Lob.

Umbilicus Veneris officinarum, Lonic.  
Linaria hederæ folio, Col.  
Cymbalaria foliis hederaceis flore cæruleo, Eyt.

## NASTURTIUM INDICUM.

Nasturtium dictum ob saporem, Indicum à loco natali.

I. Nasturtium Indicum majus.  
Nasturtium Indicū, Dod. Lob. Lugd. Cam. Cast. Eyt.  
Nasturtium peregrinum, quod Peruvianū, Lugd.

Flos sanguineus Monardi, Lugd.  
II. Nasturtium Indicum minus.  
Nasturtium Peruanum, Monardi.  
Folia habet rotunda, Lenticulæ paulo majora.

## BALSAMINA.

**B**alsamina dicitur, quod ex pomis ipsius maris immaturis oleo injectis, insolatione oleum seu Balsamum, ut Chirurgi vocant, ad vulnera consolidanda præstantissimum conficitur.

I. Balsamina rotundifolia repens, sive mas.  
Balsamina, sive pomum mirabile, Trag.  
Balsamina, Matth. Lac. Lugd. Cæf. alba, Gesf. hor.  
Balsamine 1. Fuch. Anguil.  
Balsamina pomifera, Gesf. collect.  
Charantia, Dod. ut: Lonic.  
Cucumis puniceus, Cord. hist.  
Balsamina cucumerina punicea, Ad. Lob. Tab.  
Balsamina mas, Cam. Gerar.  
Momordica, Castor.  
Quibusdam Plinii 120. c. 3. Cucurbita Somphos à Græcis appellata.

Fructus maturus colore variat, modò puniceo, modò luteo rubescens,

Balsamina mas fructu puniceo, & Momordica fructu luteo rubescens, Eyt.  
II. Balsamina femina.  
Balsamine altera, Trag. Matth. Fuch. Ang. Gesf. hor. Cast.  
Balsaminū, Dod. gal. Lon. & Charancia femina.  
Balsamina, Dod. Lugd. cū Matth. & Fuch. figura.  
Balsamella, Cord. hist.  
Balsamina amygdaloides, Gesf. ad Cordum.  
Balsamina femina, Cam. Tab. Ger. Eyt.  
Balsamina femina persicifolia, Ad. Lob.  
Catanance, Cæf. alp.  
III. Balsamina lutea, sive Noli me tangere.  
Mercurialis syl. altera, Trag.

Eſula, Eid. & Lugd.  
Tithymalus ſyl. Lonic.  
Noli me tangere, Gef. hor. & frac. (cui & Milium caprearum) Cam. Tab. Eyſt.  
Perficaria ſiliquoſa, Ad. Lob. Lugd. Cam. Thal.  
Impatiens herba, Dod.  
Catance altera, Cæſalp.

Chryſa, Lugd.  
Baliāmita altera, Col.

Noli me tangere & Impatiens herba dicta, propter ſiliquas, quæ ubi maturæ leviſſimo contactu diſſiliunt: aliqui Æſchinomene Plinii ſuſpiciantur: quibuſdam Piēdoapocynon. Flore eſt luteo, eſt & pallido.

## A R I S T O L O C H I A.

**A** *Πιστολχα* Dioſcoridi lib. 2. cap. 4. quod exiſtimetur optimè puerperis, ſeu partus doloribus opitulari: hinc ſortè Nicandri ſcholiaſtes reſert, Ariſtotelem herba huius inventionem mulieri tribuere. Et Plinio l. 25. c. 8. *Ariſtolochia* nomen grāvida dedit, videntur, quoniam eſſet *δεῖον λήξουσιν*: noſtri Malum terræ vocant.

Genera tria Dioſcorides agnovit, *σπογγώλου, ιακάρου, καὶ ματινίου*. Plinio genera quatuor: unum tuberibus radicū rotundis: alterum radicē longa: tertium longiſſima tenuitatis, quæ Clematis, ab alijs Cretica vocata: quarta quæ Piſtolochia, tēnuiori proxima, quam quidam Polyrhizon cognominant, &c.

I. Ariſtolochia rotunda, flore ex purpura nigro.  
Ariſtolochia rotunda vera, Trag. Lon. Cam.  
Ariſtolochia rotunda, Matth. Dod. ut: Ang. Cord.  
in Dioſ. Gef. h. Tur. Lac. Ad. Lob. Caſt. Lug. Eyſt.  
Ariſtolochia rotunda 1. Cluſ. hiſp. & hiſt.  
Ariſtolochia fœmina, Lugd.  
Ariſtolochia prima, Cæſalp.

II. Ariſtolochia rotunda flore ex albo purpurascēte.

Ariſtolochia rotunda altera, Cluſ. hiſp. & hiſt.  
Anguillara plures ſpecies inveniri ſcribit: verūm hæc non ſolum colore floris, ſed & foliis & fructu à priore differt.

III. Ariſtolochia longa vera: & Ang. Cam.  
Ariſtolochia longa, Dod. ut: Cord. in Dioſ. Gef. h.  
Ad. Lob. ieo. Cluſ. hiſp. & hiſt. Lugd. cum Cluſii & Fuchſij figura.  
Ariſtolochia altera radicē pollicis craſſitudine, Cæſalp.

IV. Ariſtolochia longa Hiſpanica.  
Ariſtolochia longa altera, Cluſ. hiſp. & hiſt.

V. Ariſtolochia Clematidis recta.  
Ariſtolochia, Brunſ. longa, Trag. Matth. Fuchſ.  
Tur. Lac. Lon. Caſt. Lugd.  
Ariſtolochia longa altera, quæ Clematidis veteribus, Cord. in Dioſ.  
Ariſtolochia longa vulgaris, Ang. Cam. ep. & hor.  
Eyſt.

Ariſtolochia Clematidis, Dod. gal. Ang. Gef. hor.  
Ad. Lob. Tab. Ger.

Ariſtolochia Sarracēnica, Dod. Lugd.  
Ariſtolochia Clematidis 1. Cluſ. hiſp. clematidis vulgatiore, Eid. hiſt.

Ariſtolochia altera radicē tenui, Cæſalp.

VI. Ariſtolochia Clematidis ſerpens.  
Ariſtolochia clematidis, Dod. Lugd. Caſt. deſcr.  
Belli epiſt. ad Cluſ. ſyl.

Ariſtolochia Cretica.  
Ariſtolochia clematidis altera, Cluſ. hiſp. vel Beotica, Eid. hiſt.  
Ariſtolochia Clematidis altera Hiſpanica, Lob.  
Flos luteus, aut ex purpura nigricans.

VII. Ariſtolochia Piſtolochia dicta.  
Piſtolochia, Dodon. ut: Gef. hor. Cluſ. hiſp. & hiſt.  
Camer. ep. Caſtor. Lugdun. cum Cluſ. & Dod. figura.

Ariſtolochia polyrhizon, ſive Piſtolochia Plinii, Ad. Lob.

Ariſtolochia altera plures radices ſpargens, Cæſ.  
Flos aliquādo niger, aliquādo ex herbido luteus.

IX. Piſtolochia Cretica.  
Piſtolochia altera ſempervirens, Cluſ. hiſt. ap. 1.

X. Ariſtolochia Maurorum.  
Rhaſut & Rumigi à Mauris nominata, Rauwolfſ.  
Lugd. append.  
Ariſtolochia peregrina Rauwolfſii, Cluſ. hiſt.

## C Y C L A M E N.

**K** *Τρυάμυθος* Dioſcoridi lib. 2. cap. 194. foliū eſt hederae purpureæ, variū, ſupra infraque, albicantibus maculis, &c. Theophraſto 9. hiſt. 10. Gaza tuber terræ reddidit, imitatus Plinium, cui l. 25. c. 9. Cyclaminus, noſtri Tuber terræ dicitur.

*Differentia: alius vere, alius autumnio flores: quibusdam flos odoratus, alius inodorus: & flore rubro, albo, lacteo, tum qui autumnio flores & odoratus est. Pettillium Plinii lib. 21. cap. 8. Anguillara censet: sic asylvum, Sphorin Aëtii Bononienses, Camerario notante, credunt.*

I. Cyclamen orbiculato folio infernè purpurascens.

Cyclaminus minor & Umbilicus terræ, Trag.  
Cyclaminus, Matth. Dod. gal. Cord. in Diosc. & hist. Gefhor. Lac. Tur. Lon. Taber.

Cyclaminus major, Cast.

Cyclaminus rotunda, Fuch.

Cyclaminus orbicularis rotundifolius, Dod.

Cyclamen vulgare, Eyst. officinarum orbiculato folio, Panis porcinus, & Arthanita, Lob. ico.

Cyclaminus flore odorato, Cluspan. & hist.

Cyclaminus vulgaris, & Cyclam. prior, cum iconè Matth. & Lobelii, Lugd.

Cyclaminus æstivus vulgaris, Camer.

Cyclamen orbiculato folio, Gerar.

Flos nunc dilutius, nunc saturatius purpurascit: albo flore rarius reperitur. Radice est aliquando maxima, & ejus species quædam, radice instar capitis arietis, Gefhor.

II. Cyclamen orbiculato folio infernè ex viridi pallente.

Cyclamini odorati altera species, Cluspan.

Cyclamen odorato flore 2. Eid. hist.

III. Cyclamen radice maxima foliis infernè rubentibus.

Cyclamen Romanum, Eyst.

an Cyclamen à Muroto, Clus. hist.

IV. Cyclamen folio anguloso.

Cyclamen foliis angulosis, Gefhor.

Cyclamen vernum, Lob. ico. Cam.

Cyclamini orbiculati tertia species, Dod.

Cyclaminus verno tempore florens, Cluspan. & hist.

Cyclamen vernum, Eyst.

Folio est rotundiore rarius oblongiore, floribus intensius quam in vulgari rubentibus, vel omnino albescentibus.

V. Cyclamen odoratum æstivo solstitio florens folio maculato.

Cyclamini odorati duplex varietas, Clus. hist.

Prima foliis aliquantulum angulosis, albis maculis obscurè averfà parte notatis: flos saturatè purpurascens. Alterius folia averfà parte viridia, ad-  
verfà maculis albis manifestis, flos dilutius purpurascit, vel omnino albescit.

VI. Cyclamen hederæ folio: & Adv. Lobel. Cluspan.

Cyclamini alia species, Dod. gal.

Cyclaminus orbicularis, Dod. alter orbicularis, Lugd.

Cyclaminus inodoro purpurascens flore, Clus. hist.

Cyclaminus æstivus folio hederaceo, Cam.

Cyclamen serotinum foliis hederaceis, Eyst.

VII. Cyclamen folio hederaceo polyanthes  
Cyclaminus Byzantinus alter, tubere palmæ latitudinis *μαυαδης*: tulit flores 20, 30, 100. Clus. hist.

IX. Cyclamen radice castaneæ magnitudinis  
Cyclaminum Constantinopolitanum, vel byzantinum, Cluspan. & hist.

Folia prona purpurascētibz supina candidatibz maculis notantur.

IX. Cyclamen radice exigua.

Hermodactylus quorundam, Trag.

Cyclaminus exigua, Eidem.

Cyclaminus montis Juliani cujus Mesues meminit, Ang.

Cyclamini exiguæ veræ species, Lugd.

Cyclaminus radice avellaneæ, Cluspan.

Cyclaminus æstivus, Eid. hist.

Cyclamini minor, Castor.

X. Cyclamen oblongo radice.

Cyclaminus radice oblonga malo in fine adnem, Gefhor.

Cyclaminus oblongum, Eid. append.

Cyclaminus *μακρὸς* & Cam. epit. longius radice, Eyst.

Cyclaminus cujus radix digitalem crassitiem superat, & cubitalis est longitudinis, Cluspan.

Cyclamen odoratum *μακρίππιζ* & Clus. hist.

XI. Cyclamen vernum luteum.

Cyclamen luteo flore, Ang. Ad. Lugd.

XII. Cyclamen vernum album.

Cyclamen vernū flore albo, Lob. ad. par. 2. Clus. hist. ap. alt. aud. quod foliis circinatæ rotunditate, Eid. eur. post.

XIII. Cyclamen foliis Violariæ radice co-  
dis effigie.

Cyclamen vernum spurium, Clus. hist. ap. alter.

**G**ramini quod in Parnasso monte provenit, folium hederaceum, florem candidum, &c. Dioscorides l. 4. c. 32. tribuit: ubi & alterius in Cilicia nati meminit, quod incolæ Kivaz appellant, cujus virantis esu boves inflammantur: quid velit non assequimur.

I. Gramen Parnassi albo simplici flore.  
Gramen Parnassi, Dod. ut: Gef. h. Lob. icon. Eyf.  
Hepatica alba, Cord. hist.  
Enneadynamis Polonorum, Gef. hort.  
Unifolium palustre, Gef. collect.

Gramen Parnassi hederaceum recentiorum, Ad. Lob.  
Gramen hederaceum, flos hepaticus, Tab. (obf.)  
Gramen Parnassi minus, Gerar.

II. Gramen Parnassi albo pleno flore.  
Gramen Parnassi duplicato flore, Lob. Lugd.

## SAXIFRAGA.

**S**axifraga ab effectu dicta, cum ejus stillatitia, ut & decoctum, lapides venales & frangere & pellerè dicatur, ut & farina granorum ad radicem, ex decocto sumpta.

I. Saxifraga rotundifolia alba.  
Saxifraga, Brunf. major, Eid. 4. Fuch. Lacun.  
Saxifraga alba, Trag. Dod. ut: Fuch. ico. Gef. hor.  
Lugd. Thal. Camer. Tab.  
Saxifraga quarta, Matth. Cast.  
Saxifraga, Lon. alba chelidonides, Ad. Lobel.  
Theligono affinis herba, Cæsalp.  
Saxifraga alba tuberosa radice, Clus. hist.  
Hæc nonnullis locis foliis est majoribus, altiusque exurgit: frequentius tamen minoribus est & humilior.

II. Saxifraga ad folia bulbos gerens.

Saxifraga bulbosa altera bulbifera montana, Colum.

III. Saxifraga rotundifolia aurea.  
Saxifraga aurea, Dod. ut: Gef. hort. Thal. Cam.  
Ger. Lugd. cum. Dod. & Lobelii figura.  
Saxifraga aurea lichenis facie, & natalitiis, Ad. Lobel.  
Chrysosplenium, Taber.  
Hepatica palustris, Eyflett.  
Erythimi species Aldroando dicebatur: In historia Lugd. Saxifragæ alpinæ figura jungitur, quam cum priore eandem suspicor.

## CHELIDONIA MINOR.

**C**helidonia duplex habetur, major de qua supra: minor, de qua nunc, quam Dioscorides l. 2. c. 212. χελιδόνιον ὀνίκερον, aut ὀνίκερον ἄνθος nominat, cujus descriptio, præter vires, nostræ convenit: an forsitan ratione soli diversitas obvenit? Plin. l. 25. c. 13. Strumea censetur, quo loci de Ranunculo agit.

I. Chelidonia rotundifolia major: in Prodromo descripta.

II. Chelidonia rotundifolia minor.  
Testiculus sacerdotis, Sylvatico.  
Ficaria & scrophularia minor, vel 2. Brunf.  
Hæmorrhoidum herba, Hier. Brunswic.  
Chelidonium minus, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Ang. Cord. in Diosc. & hist. Gef. h. Tur. Lac. Lon.

Guil. (an Amellus sit dubitat) Ad. Lobel. Lugd. Cast. Thal. Tab. Gerar. Eyf.  
Malacocissus minor, Fuch. icon.  
an Ranunculus latifolius, Lugd.  
Favagello, Cæsalp.  
Hujus folia aliquando macula purpurea notantur: flore est luteo simplici: rarius pleno, Camerario monente.

## NUMULARIA.

**N**umularia à foliis nummi speciem referentibus dicta: aliis Centummorbia, à mirifica in vulneribus medendi facultate: aliis Hirudinaria, quod hirudinis instar passim terræ affixa hæreat. Sunt qui Numulum Plin. l. 18. c. 28. censent, ubi falsò Mimmulus legatur: an fortè apud Theophrastum l. 9. c. 14. ἰπὸ δισδαρῶν, Rubiam Gazæ vertit.

I. Numularia major lutea.  
Serpentaria 3. & Centummorbiolum, Brunf.  
Numularia, Trag. Matth. (& Lunaria minor) Fuch. Dod. ut: Gef. hor. Lon. Ad. Lob. Lugd. Cast. Cæf. Cam. Tab. Gerar. Eyf.

Centummorbia, Gef. Turn.  
Hirudinaria minor, Taber.  
Ratione soli variat: hortensis per omnia major, sylvestris contrà: hinc duæ icones apud Tabern.  
Hirudinariæ majoris & minoris: & apud Ger.

Q 3 Numul-

Numulariæ, &amp; Numulariæ minoris, nomine.

quæ in Prodromo describitur.

II. Nummularia minor purpurascens flore:

## SECTIO QUARTA.

CUCUMIS, MELO, PEPO, MELOPEPO, ANGU-  
RIA; CUCURBITA; COLOCYNTHIS; CU-  
cumis Aspinus.

## CUCUMIS.

**E**tsi Σίκυς nomen apud Græcos, (quemadmodum Cucumeris apud Latinos) generale sit omnium botanorum fructuum, videlicet Peponum, Melonum, Cucumerum, Anguriarum & cæterorum ejusdem generis, ut Guilandinus quoque, notavit: attamen Σίκυς ἴμαρ Diofcoridis l. 2. c. 163. Theophrasti l. hist. 16. alii σίκυς, & καύων. Cucumer Plinio l. 19. c. 5. Cucumis Varroni à carvone, quasi Curvimer, dicitur.

Genera duo Diofcoridi & Theophrasto, sativa & sylvestris: sativa, inquit Theophrastus, partim genera effestimant, ut & Cucurbitæ, partim negant: sed in uno eodemque genere, alias meliores, alias deteriores affirmant. Cucumeris tria genera notant, Laconicum, Scytalium, Boeticum. Plinius l. c. de Cucumere agens, Melones, Cucumeres & Angurias complectitur: admonens, ea forma qua cogantur crescere, sic flore in fistulam demisso, mira longitudine nasci: subjungens, Græcos Cucumerum tria genera secisse Laconicum, Scytalicum & Baticum: sic ut sylvestri l. 20. c. 1. & de anguino sive erratico l. 20. c. 2. legitur.

## I. Cucumis sativus vulgaris.

Cucumis sativus, Brunf. Matth. Fuch. Dod. gal. Lon. Cast.

Cucumis, Trag. Ang. Tur. Lac. Fracast. Taber. Cucumis vulgaris, Dod. Gerar.

Cucumer sativum, Cord. in Diofco.

Cucumis sativus &amp; esculentus, Ad. Lob. Lugd.

Citreolus vulgo, Cæsalp.

Cucumeres virides, albi, longi, recurvi: læves, asperi; Aliis Sycios Galeni, aliis ejusdem Melo-pepon. Fructus maturus subluteus est: habetur &amp; totus albus.

## V. Cucumis sativus major.

Cucumis Turcicus, Fuch. Tab. Gerar.

Cucumis ex Hispanico semine natus, Tab. Ger.

## II. Cucumis flexuosus.

Cucumis longus, Matth. Lugd. oblongus, Dod.

Cucumis anguinus &amp; tortilis, Lacun.

Cucumis anguinus, Ang. Gef. col. Lugd. anguina, Tab. Gerar.

Cucumis flexuosus, sive anguinus, Ad. Lob.

Cucumis sativus 2. Cast.

Citreolus alter forma anguis, Cæsalp.

Hujus species habetur fructu cubitali.

Sic in regno Congiano insignis magnitudinis &amp; suavitatis habentur: par. 1. Ind. or. l. 2. c. 1.

## IV. Cucumis pyriformis.

Cucumer minor pyriformis, Tab. Ger.

V. Cucumis Ægyptius rotundifolius.

Chate Ægyptiis, cucumerum genus, Alpin.

## M E L O.

**C**ucumerum genera censentur Pepones & Melo-pepones, potissimum figura & quantitate differentes: majores enim & oblongi, Pepones: mali effigiem referentes, Melo-pepones, nomine ex Melone & Pepone composita dicuntur. Hoc genus Palladius Melones, quasi μήλωνες, id est pomicos, à malorum figura appellavit, quod nomen adhuc in usu est. Sicque tria Cucumeris genera statui possunt, Cucumer, Melo & Pepo. At Melon Theophrasto Sy-cion; Plinio, Cucumis mali cotonei effigie, Melo-pepo Galeni: forte Cucumis antiquorum.

## I. Melo vulgaris.

Melo, Brunf. Trag. (&amp; Melo-pepo) Lac. Tab. Ger.

Pepo, Matth. ico. Fuch. Lugd. Cast.

Pepo, grandis Melo, Cord. hist.

Cucumis Galeni &amp; antiquorum, Dod. gal.

Melo vulgaris, Melo-pepo in Græcia, Guil.

Melo sive Melo-pepo vulgi, Cucumis Galen. Dod.

Melo vulgi, sive Cucumis antiquorum, Melo-pepo Diofcoridis, Ad. Lob.

Melon vulgo &amp; Pepon, Sycion Theophrasti.

Melo-pepon Galeni, Cæsalp.

Melo-pepo, Gef. hor. Lon. Lugd.

Variat fructu, nunc oblongo, alias contra-tiore rotundioris figura, aliis modicè depresso &amp; levis: li: Sub-



li: Subinde majore, scilicet

Melo Hispanicus, Tab. & Ger. quandoq; minore. Cortex aliis asper, rugosus & tuberosus: & hic est Pepo strumosus, Ad.

aliis lavis: nunc viridis, nunc cinereus, nunc pallidus, nunc varius. Pulpa, aliis rufa, aliis candida & vitens: eaq; quibusdam suavior, quibusdam moschi odore, qualium Cordus & Dodonæus meminere. Aliqui æstivi, aliqui hyberni ad hyemē perdurantes. Habentur, Camerario monente, Americi & alii Italici, Patavini, item Zatti dicti: tum Neapolitani, quorum semina adeo tenui crustula teguntur, ut excorticata videantur, Gymnospermi appellati: deniq; pilosi.

II. Melo rotundus parvus.

Melo succaratus, Lob.ico. saccharinus, Tab. Ger.

Dantur aurei, parvi, in modum pomorū Arantiorum, Cam. vel ut Cæsalp. mali rosei magnitudine. Meminit & Garzias Melonis genus in Hispania, quod Budiecas vocent.

III. Melo pyriformis moschatus.

Melo Saccharinus variegatus, Eysf.

IV. Melo pyriformis.

Pyromelo, Tab. Gerar.

V. Melo Ægyptius.

Abdellavi Ægyptiorum, Melones à nostratibus diversi, Alpin.

VI. Melonis Ægyptii alterum genus.

Chajar, Melonum genus apud Ægyptios, Alpin.

VII. Melo Indicus fructu oblongo.

Batie Indi, sive Indicus Melo, Garziaz.

Patecas, Anguria, sive Melo Indicus, Linsc. par. 4. Ind. or. c. 10.

Melones aquatici in Java, Batie in universa India: par. 4. Ind. or. c. 6. & fig. 20.

an Comolanga, Lud. Romani, Clus. in Garz. Sca-

IX. Melones Peruani. (lig. Lugd.

Melones in valle Peruana tanta felicitate proveniunt, ut radix caudicis crassitudinem assequatur & viva aliquot añis in solo vigeat, quæ quotannis Melones profert, cujus luxuries non secus ac cæterarū arborū amputatur: Joseph. Acosta l. 4. c. 19.

IX. Fructus Melonum similis, cortice duro vestitus, in Java, Linscot. par. 3. Ind. or. c. 10.

# PEPO.

**P**επον Dioscoridi l. 2. c. 164. Theophrastus i. hist. 22. & Plinius l. 20. c. 2. de Peponibus, quæ Dioscorides refert: qui l. 19. c. 5. scribit, Cucumeres cum magnitudine excefferunt, Pepones vocari. Dicitum volunt sicut τὸ πᾶν μέλαινα maturefcere, eo quod maturitate flavescant.

I. Pepo oblongus.

Pepo, Brunf. Lon. Cast. Camer.

Pepo magnus, Dod. gal. Gesf. hort.

Pepo major oblongus, Dod. maximus oblongus, Tab. Ger.

Cucumis Pepove oblongus, sive ovalis vulgaris.

Pepo oblongus. Lob. (simus, Ad.

Melo seu Pepo oblongus, Cæsalp.

Variat magnitudine: hinc apud Tab. duæ figuræ, Peponis maximi oblongi, & Peponis Indici minoris oblongi: & apud Ger. qui posteriorem Peponem minorem syl. vocat.

II. Pepo compressus major.

Pepo maximus Indicus compressus, Lob.

Pepo rotundus major, Dodon.

Melon sive Pepo modicè depresso & scissilis, Cæf.

Corticis colore & substantia variat: qui enim albedo est colore, substantia est molliore: qui obscurè virente duriore.

III. Pepo compressus minor.

Cucumis seu Zucco marinus, Trag.

Cucumer marinus, Fuch. Tur. Lonic.

Pepo rotundus, Dod. gal. Gesf. hor. rotundus mi-

an Cucurbita rotunda Italica, Lugd. (nor, Dod. Corticis colore variat, qui est croceus, luteus, citrinus, niger.

IV. Pepo rotundus Melonis effigie.

Pepo oblongus, rotundus, luteus, viridis, Trag.

Pepo syl. Dodon.

Pepo rotundus compressus Melonis effigie, Ad. Lob. Lugd.

Pepo Indicus minor rotundus, Tab. Gerar.

V. Pepo rotundus Arantii forma.

Cucurbita Arantii forma, Eysf.

VI. Pepo minor clypeatus.

Pepo Indicus minor clypeatus, Taber.

Pepo Indicus fungiformis, Ger.

VII. Pepo minor angulosus.

Pepo Indicus minor angulosus, Tab. Gerar.

Huc & Pepo minor Indicus 4. Tab. referendus.

IX. Pepo Virginianus.

Macôcquer, peponibus, melonibus & cucurbitis valde similis: cujus unum genus menstrui: alterum bimestri spatio matureicit: deiser. Virgin.

MELOPE-

## M E L O P E P O .

## I. Melopepo clypeiformis.

Pepolatus, Dod.gal.latoris fructus, Eid. Gefn.h.  
 Cucumis Pepóve lator clypeiformis, Ad.  
 Melopepo lator clypeiformis, Lob.icon.  
 Cucurbita laciniata Dalech.Lugd.  
 Cucurbita fessilis, Gef.append.  
 Melopepo clypeatus, Taber.

Pepo maximus clypeatus, Gerar.

## II. Melopepo compressus.

Melopepo, Anguil.  
 Melopepo compressus alter, Lob.ica.compres-  
 sus, Taber.  
 Pepo maximus compressus, Gerar.  
 III. Melopepo teres: & Lob. & Taber.  
 Pepo maximus rotundus, Gerar.

## A N G U R I A .

**A**nguria voce, primum Actium usum esse volunt: alias Citrullus, à citreo colore dicitur. Peponem Dioscoridus, Galeni & Plinii, & Arabum Battecha esse volunt.

## I. Anguria Citrullus dicta.

Citrullus, Trag.Gef.hor. Lon.Tab.officinarum,  
 Ad.Lob.Ger.  
 Anguria, Matth. Ang.Lac.Gefn.col.Dod.Lugd.  
 Cast.Camer.  
 Cucumer vel Cucumis citrullus, Fuch. Dod. ut:  
 Gef.hor.Turn.  
 Cucumer vulgò, Cæsalp.

Corticis colore variat, qui aliis viret, aliis sub-  
 candidis maculis asperius: caro aliis, rubens &  
 dulcior, aliis candida. Semina colore nigro, ru-

bro, fulvo: rarius semine caret, ut Cæsalp. notavit.

## II. Anguria carne lignosa.

Cucumeris vulgò dicti genus quoddam sylvestre,  
 carne intus lignosa, atq; adeo dura, ut pilæ modo  
 resiliat, nec frangatur projectum, Cæsalp.

## III. Anguria Ægyptiaca.

Anguriæ nostratibus majores, cortice flaviore,  
 quæ intus semina tantum & aqua dulcissimâ conti-  
 an Dullaha Arabum, Cæsalp. (nont, Aljia)

## IV. Anguria Brasiliana.

Citrullæ rotundæ, Maurôgaus nomine: Lerio car.

## C U C U R B I T A .

**K**ONKURBITA id est duos Dioscoridi l.2. c.162. dicitur, ad differentiam CONKURBITA, de qua l.4. c.175. me-  
 minit & Theophrastus l.hist.18. Latinis, Cucurbita à concurratu, quod facile siquid olisterit, quo min-  
 extendatur, incurvescat.

Genera duo prima Cucurbita Plinio l.19.c.5. Camerarium & Plebeium quod humi recipit: crescit quæ cognita  
 forma, libertate vero pensili concessa, jam visa est novem pedum longitudinis. Semina quæ proxima collo fuerint,  
 proceras pariunt: quæ in medio, rotundas: quæ in lateribus, crassas brevioresq;.

Calabassi seu Cucurbita in India ad miraculum usq; auferunt, quæ in hac sola provincia Chile nascuntur &  
 Capallos nuncupantur: Cucurbitarum species propè infinita sunt, quadam immensa mole monstrosæ sunt, quæ dis-  
 secta & rescicata excavantur & ex iis varia vasa effinguntur: ex minoribus pocula, aut pateras ingeniose calices  
 concinnant: Joseph. Acosta l.4.c.9.

Sic Brasiliani ex Cucurbitis liquidam pulcem, Mingau vocatum, sorbent: Stad.def.Brasil. l.2.c.12.

## I. Cucurbita major fessilis, flore albo.

Cucurbita cujus fructus in orbem collectus intum-  
 mescit, Trag.  
 Cucurbita fessilis, Matth.epit.  
 Cucurbita major, Fuch.Tur.lator, Dodon.  
 Zuccha rotunda, Anguil.  
 Cucurbita Cameraria major, Dod.gal.Lugd.  
 Cucurbita fessili fructu, Cord.in Diosc.

Variat magnitudine, colore corticis, viridi, fla-  
 vo, candido, maculoso: aliquando sulcis distin-  
 guitur: quædam tuberosa est.

II. Cucurbita major rotunda fl.luteo folio a-  
 Cucurbita Indica, Matth.Cast.

Zuccha major rotunda, Cord.hist.

Cucurbita quæ Zuccà marinâ Itali vocant, Gefn.

Cucurbita rotunda, Cæsalp.

Cucurbita Indica rotunda, Lugd.

Cucurbita Indica major & minor, Taber.

Citrullus major & Pepo major syl. Ger.icon.

Varia hujus genera, magnitudine, facie, & co-  
 lore differentia: eorum namq; quoddam gen-  
 est, quod utriusque ulnis vix amplecti potest, &  
 insula S. Laurentii, ejusmodi colore rubro, flavo  
 albo & saporis longè gratioris atque nostratibus  
 bertim proveniunt. Palud. in notis ad Linfoc.  
 ve par.2. Ind.or.c.5.

## III. Cucur

III. Cucurbita lagenaria fl. albo, folio molli.  
Cucurbita, Brunf. prior, Dodon.  
Cucurbita minor, Fuch. Dod. gal. Turn.  
Cucurbita plebeia, Gef. hort.  
Cucurbita lagenaria, Lob. Cast. Gerar.  
Cucurbita lagenaria major & minor, Ad. Taber.  
Cucurbita Cameraria minor, Lugd.  
Variat fructus, quandoque lagenarum forma,  
aliquando ventricosa absque collo pyri turbinati  
figura.

IV. Cucurbita lagenaria Americana.  
Cucurbitularum ex quibus Americani lagenulas  
cōficiunt, Americus Vesputius navig. 2. memi-  
nit, quas viri de collo suspendūt, quarum una her-  
bā plena est quam mandunt: altera farinā, quam  
bacillo madefactō, herbæ aspergunt.  
an Lagenulæ Americanae ē fructu ē mari Australi,  
Clus. ex. l. 2. c. 8.

Sic in regno Congo, in Cucurbitis aquam adfe-  
runt: par. 1. Ind. or. l. 2. c. 1.

V. Cucurbita oblonga flore albo, folio molli.  
Cucurbita fructu oblongo, Trag. Cord. in Diosc.  
Cucurbita oblonga, Fuch. longa, Tur. Lonic. Cast.  
Tab. Cam. longior, Dodon.  
Cucurbita anguina, Dod. gal. Gerar.  
Zucchā longa, Anguil.

Cucurbita, Gef. hor. sativa longa, Cæsalp.  
Cucurbita live Zucchā, Ad. omnium maxima an-  
guina, Lob.  
Cucurbita Cameraria longa, Lugd.

Falcata figura sæpe crescit, quædam cervicem  
tantum recurvam habent: quædam rectitudine  
servata bicubitalem, etiam tricubitalem longitu-  
dinem acquirunt.

VI. Cucurbita capitata.  
Cucurbita quædam scissilis alba lata, ab altera par-  
te compressa, Gef. hort.

Cucurbita capitata, Taber.  
Cucurbita fungiformis, Gerar.  
Cucurbita stellata sive scissilis, Camer.

VII. Cucurbita verrucosa: & Lugd.  
IIX. Cucurbita parvum genus, fructu pugni  
magnitudine, cortice rubro, maculis aspersio, & te-  
mine rubro, Joh. Bauhino.

IX. Cucurbitacei generis semen spadiceum.  
Fructus alicujus semē 19. Gareti, Clus. ex. l. 2. c. 16.  
X. Cucurbitis non absimilis fructus Brasilianus.  
Fructus in sylvis cucurbitæ forma non absimilis,  
sed longè amplior, quos frustatim concidunt, in  
aquam conjiciunt, baculo spumam excitant, qua  
pro sapone utuntur, Lerio desc. Brasiliæ sive par.  
3. Ind. occid. c. 17.

## COLOCYNTHIS.

**K** Ολοκυνθις aut καλκωνδα αἰρεῖς, aut σικωά πικρά, aut καλκωνδα ἀλάττωσις, Dioscoridi l. 4. c. 178. Cu-  
cubita sylvestris, Colocynthis dicta, quæ minor sativa, Plinio l. 20. c. 3.

Genera varia habentur: alia minor fungosa & levis, quæ officinarum est: alia major, oblonga ac flavā, alia candi-  
da: alia rotunda varia: alia scissilis, nigra, maculata, magna instar Cucurbitæ: & alia ab hac differens etiam scissi-  
lis, sed minor, alia denique turbinata.

I. Colocynthis fructu rotundo major.  
Cucurbita agrestis, Brunf.  
Colocynthis vera, Trag.  
Colocynthis, Matth. Ang. Cord. in Diosc. (& Cu-  
cubita deserti) Gef. hort. (& Cucurbita sylv.)  
Lac. Lon. Ad. Lob. (& Cucurbitula amara) Lugd.  
Cast. Cam. Gerar.  
Colocynthis prima, Dod. gal. mas, Taber.  
Colore est viridi, magnitudine utramq; manum  
replente.

II. Colocynthis fructu rotundo minor.  
Colocynthis fungosa & levis, Cord. hist.  
Colocynthis minor, Gef. append.  
Cucurbita syl. fructu rotundo minor, Cæsalp.  
Colore est flavo, hujusque medullā aridā offi-  
cinæ utuntur.

III. Colocynthis oblonga.  
Colocynthis grandis oblonga, Cord. hist.  
Colocynthis grandis candida solo colore ab ob-  
longa differens, Eid.

Variat colore: alia enim primū viridem colo-  
rem in cortice ostendit, postea maculis candican-  
tibus conspergitur, postremo totus in luteo pal-  
let, fitque durus & lignosus: alia principio viret  
quidem, sed mox albicantibus maculis aspergi-  
tur, ac in maturitate totus albicat. Cordus in sua  
historia differentias sex proposuit, & ex eo Lugd.  
histor.

IV. Colocynthis pyriformis, seu Pepo amarus.  
Colocynthis Germanica, Trag.  
Colocynthis 2. Dod. gal. femina, Taber.  
Colocynthis turbinata, Cord. hist.

Rr

Co-

Colocynthis pyriformis, Ad. Lob. Lugd. Gerar.  
Colocynthis nigra pyriformis, Camer.  
Cucurbita syl. Dod. figura pyriformis, Cæsalp.  
Pseudocolocynthis pyriformis, Eyst.

Cucurbita syl. Somphos Plinii dicta, quibuldā.  
V. Colocynthis pomiformis cortice maculato.  
Colocynthis exacte sphaerica, Ad.  
Pseudocolocynthis pomiformis, Eyst.

## CUCUMIS ASININUS.

*Sinus 270. Diofcoridi l. 4. c. 154. Theophrasto 7. hist. 6. & 9. hist. 10. Cucumis sylvestris Plinio l. 20. c. 1.*

Cucumis sylvestris asininus dictus.  
Cucumis agrestis, Brunf. Cord. in Diof. Lugd.  
Cucumis sylv. Trag. Matth. Ang. Fuch. Dod. ut  
Lac. Lon. Cæf. Cast.  
Cucumis anguinus, Tur. Cord. hist.  
Cucumis erraticus vel asininus, Gel. hort.

Cucumer Elaterii syl. Ad. Lob.  
Cucumis asininus, Tab. Ger. Eyst.  
Ex hujus succo exiccato & in pastillos cōforma-  
to fit *ματθελον* dictum Diofcoridi l. 4. c. 155. &  
Theophrasto 9. hist. 10. Gaza agitatorium vertit,  
ut intra lib. 12. sect. 6. ostenditur.

## SECTIO QUINTA.

*MALVA; ALTHÆA; ALCEA; CORCHORUS; GERAN-  
NIUM; SANICULA; PES LEONIS; CANNABIS; EUPATORIUM;*

*Potentilla; Herba Molucana; Caryophyllata; Dentaria; Epime-  
dium; Pæonia; Leotopetalon; Chrysogonum;  
Staphis agria.*

### MALVA.

**M**ALVA *μαράχιν* Diofcoridi l. 2. c. 144. & Theophrasto 1. hist. 5. à *μαράχιν* ab emolliendo ventre, nomen habet, etiam Plinio l. 20. c. 21. monente: idq; propter naturalem lentorem suum, ut Paulus asserit: unde à Martiali l. 10. Mollis vocatur. Latinis Malva & Varoni quasi Molva, quod alvum molliat, quia antiqui in acetariis cum Lactuca ad alvum subducendam utebantur.

Duplex est Diofcoridi & Plinio. sativa & sylvestris: subjungit Plinius, duo esse genera, qua foliis amplitudine discernantur, majorem Græcos Malopen vocare in sativis: alteram Malachen: è sylvestribus cui grande folium & radices albae, Althæa vocatur, &c. Theophrastus duplicem exprimere videtur, dum 1. hist. 5. & 14. Malvam in arborem transire scribit, Malvam roseam intelligens: dum vero 7. hist. 7. ait, Malvam coqui & cibo idoneam esse, vulgarem Malvam innuit. Antiquitus in Malvarum foliis scripturatum, Cinna antiquus poeta indicat, cujus versus ab Isidoro referuntur: quare suspicari licet huc respexisse Pythagoram, qui ut Aelianus auctor est, *μαράχιν*, id est malve folium sanctissimum esse dicebat.

I. Malva syl. folio rotundo.  
Malva, Brunf. Matth. Lac. Cast.  
Malva vulgaris, Lugd. vulgarissima, Trag.  
Malva syl. pumila, Fuch. Dod. ut Tur. Thal.  
Malva syl. repens pumila, Lob. Lugd. Gerar.  
Malva syl. Ang. Ad. syl. lupina, Cord. hist.  
Malva agrestis minor, Gel. hort.  
Malva minor, Loh. syl. minor, Tab. vulgaris minor, Cam.  
Malva flore candido, Cæsalp.

Variat foliis rotundioribus & latioribus.

II. Malva sylvestris folio sinuato.

Malva erratica 2. vel Malva equina, Brunf.  
Malvæ vulgaris altera species, Trag.  
Malva syl. elatior, Fuch. Dod. gal.  
Malva syl. Tur. Ger. syl. recta, Cord. hist.  
Malva syl. vulgaris, Cord. in Diof. sylv. procerior, Dod. Ad.  
Malva syl. major, Gel. hort. Lugd. Tab. Thal.  
Malva vulgaris procerior, Lob. major, Lon.  
Malva vulgaris major, Cam.  
Malva flore subnubente, Cæsalp.

Apud veteres in genere domesticarum fuit.

III. Malva Americana: quæ 3. in Prodromos

IV. Malva

## IV. Malva hederaceo folio.

Malva quarta, Matth.

Malva hederacea five montana, Eid. ep. Cast.

Malva major tertia, Lugd.

## V. Malva foliis crispis.

Malva species sinuosa, Cord. in Diosc.

Malva sativa laciniosa, Eid. hist.

Althæa crispa &amp; major, Gef. hort.

Malva crispa, Gef. hor. Dodon. Cam. Taber. Ger. Eyflett.

Malva crispatis oris, Lob.

Flos est albicans, modò roseus.

## VI. Malva folio vario.

Malva trimestris vel pumila, Clus. hist.

## VII. Malva rosea folio subrotundo.

Malva sativa antiquorum: quæ cultu arborescit, Theoph. Malope, Plinii.

an Anadendromalache, Galeni.

Malva hortulana, Brunf.

Malva sativa major, Eid. 4.

Malva hortensis, Trag. Fuch. Tur. Dodon. Lon. Gerar.

Malva sativa, Dod. gal. Anguil.

Malva major Matth. arborea, Eid. 4. five hortensis, Taber.

Malva Romana, Gef. hort.

Hastula regia, Eid.

Malva major uncaulis, Matth. Cast.

Malva rosea fruticosa, Ad. Lob. rosea simplici flore, Lugd.

Malva alterum genus, Cæsalp.

Flores candidi, rubentes, modò saturatiùs, modò dilutiùs, aliàs purpuræ modo relucèntes: &amp; ex rubro nigricantes: quare

Malva hortensis fl. simplici albo: fl. simp. incarnato: fl. simp. rubro, pingitur ab Eyf.

II X. Malva rosea folio subrotundo, flore pleno.

Malva Romana multiplex, Trag. Gef. hort.

Malva rosea multiplex, Lob. Lugd. Taber.

Malva hortensis multiplici flore, Dodon.

Malva major uncaulis multiplex, Cast.

Flos colore variat, albo, incarnato, rubro, puniceo, nigricante; hinc tres figuræ apud Tabern. &amp; Gerardum, &amp; in horto Eyf. quatuor.

Malva arborea multiflora, Taber.

Malva hortensis multiplici flore, Gerar.

Malva arborea flore nigro multiplici, Tabern. &amp; Gerar.

Malva rosea multiplex, Taber.

Malva purpurea multiplex, Gerar.

Malva rosea multiplex fl. albo: fl. incarnato: fl. pleno atrorubente: fl. pleno rubro, Eyf.

## IX. Malva rosea folio ficus.

Malva rosea simplex peregrina, Tab. Gerar.

X. Malva folio ficus altera: quæ prima in Prodromo.

## XI. Malva arborea Veneta dicta parvo flore.

Malva major altera, Matth. Lugd.

Malva arborea, Matth. ep. ico. Cast. &amp; major uncaulis, Matth. ep. def.

Malva arboreicens, Gef. hort. Dod. Cam. Cæsalp. Eyf.

an Malva arborea syl. Ad.

Flos est cæruleus, nec multo major quàm Malva equina: flos sit: Malva arbor Plinio.

## XII. Malva Syriaca.

Cobes Malva species, Camer,

## A L T H Œ A.

**A**λθæα. alii ἰβλæα, quæ in sylvestrium malvarum genere est: Dioscoridi l. 3. c. 163. sic dicta ab αλθæα quod remedium, vel αλθαιον medendo, quod hujus multiplex usus sit: hinc Dioscoridi, quod inter primas utilis sit, & πολυχρονος, pluribus remediis polleat: & Plinio l. 20. c. 21. ab effectu excellentia nominata, quæ à quibusdam Aristalthea dicitur.

Genera: unius solum meminere, ut & Theophrastus 9. hist. 15. ubi Gaza Hibiscum reddidit: at 9. hist. 19. florem melinum tribuit.

## I. Althæa Dioscoridis &amp; Plinii.

Althæa, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Tur, Lac. Cord. in Diosc. &amp; hist. (&amp; Malva palustris)

Gef. hor. Lon. Ad. Lob. (&amp; Hibiscus) Lugd. Cast. Tab. (&amp; Bismalva) Gerar.

Althæa five Malvaviscus, Anguil.

Malva agrestis genus, Gef. hort.

Malva syl. prima, Cæsalp.

Althæa vulgaris, Camer. Thal. Clus. histor. Eyflett.

Flores candidi, aut ex albedo dilute purpurascentes.

II. *Althæa flore majore.*

*Althæa pannonica secunda, Clus. pan. & tertia, in histor.*

*Althæa Thuringiaca, Camer. Eyf.*

III. *Althæa laciniato folio.*

*Althæa tertia, Clus. pan. Pannonica quarta, Eid. histor.*

IV. *Althæa frutescens folio rotundiore incano.*

*Althæa frutex, Clus. hisp. Lob. Ger. prima, Clus. histor.*

*Althæa arborefcens Clusii, Taber.*

*Althæa lignosa Dalechampi, Lugd.*

*Malva altera ad Malopen accedens, Cæf. alp.*

*Althæa fruticans Hispanica, Eyf.*

*Gallica majore est quam Hispanica flore.*

V. *Althæa frutescens folio acuto, parvo flore. Althæa arborea Olbia in Galloprovincia, Ad. Lob. ico.*

*Althæa arborefcens, Cam. Tab. Gerar.*

*Hæc cum quarta eadem non est, licet Lobelius*

*velit, sed distinguenda, ut rectè Clusius fecit.*

VI. *Althæa frutescens Bryonia folio: in Prodromo describitur.*

VII. *Althæa palustris: & Lugd. Tab. Ger.*

*Althæa palustris cytini flore, Ad. Lob.*

*Althæa hortensis sive peregrina, Dod.*

*Sida vulgo, Cam. ico. Theophrasti 4. hist. ii. censetur.*

*Flore est albo & subrubeco.*

XII. *Althæa Theophrasti flore luteo.*

*Althæa altera, sive Abutilon Avicennæ, Math.*

*Ibiscus Theophrasti, Dod. gal.*

*Althæa Theophrasti, Ges. hort. Cæf. Lugd. &*

*Althæa altera, Eid.*

*Althæa peregrina, Ges. hort.*

*Althæa luteis floribus, Ad. Lob. Ger.*

*Abutilon, Anguil. Dodon. Cast. Cam. Avicennæ, Eyflett.*

*Malva Theophrasti, Tab.*

IX. *Althæa Theophrasti similis.*

*Abutilon Indicum, Cam.*

*Flos magnitudine rosæ syl. albicans, interius luteus.*

## A L C E A.

**A** *Alcea Diofcoridi l. 3. c. 164. fortè sic dicta ab ἀλκα. auxilio vel remedio, cum ejus radices Dysentericæ & ventris auxilio sint. Plinio l. 27. c. 4. Alcea. Generi sylvestrium Malvarum Diofcorides, qui unius meminit, adscripsit.*

I. *Alcea vulgaris major.*

*Alcea & herba Simeonis, Brunf.*

*Alcea, malva rosæ syl. genus, Trag.*

*Alcea, Math. Fuch. Dod. gal. Cord. in Diof. Ges. hort. Lac. Lon. Lugd. qui duas figuras habet, Cæf. Tabern.*

*Cannabis syl. & Herba Ungarica, Ang.*

*Alcea vulgaris, Dod. Ad. Lob. Lugd. Cam. Clus. hist. Eyf.*

*Malva agrestis genus, Ges. hor.*

*Malva verbenaca, Ger.*

*Alcea est Diofcoridis & Plinii: quibusdam Cannabis syl. Diofcoridis l. 3. c. 166. aliis Malva Theophrasti.*

*Foliis variat, acutioribus, rotundioribus, hirsutioribus, lavioribus: flore est ex rubro rosco, vel candidiore.*

II. *Alcea vulgaris minor.*

*Dens leonis & Malva querna, Lon.*

*Alcea minor Dalechampi.*

*Foliis est in longas lacinias divisis.*

III. *Alcea folio rotundo laciniato.*

*Alcea peregrina, Clus. hist.*

*Malva montana, sive Alcea rotundifolia laciniata, Colum.*

*an Alcea tenuifolia Cordi, Thal.*

IV. *Alcea Pannonica & Alcea tenuifolia, Cam. quid?*

V. *Alcea cannabina.*

*Alcea, Ang.*

*Alcea fruticosior, Ad. Lob. pentaphylla folio cannabis sylvestris, Diofcoridis, Eid. ico.*

*Alcea fruticosa cannabino folio, Clus. hist.*

*Alcea altera, Cæf.*

*Alcea cannabina, Cam.*

*Alcea fruticans, Eyf.*

*Hæc ~~cannabis~~ <sup>cannabis</sup> æque, Cannabis syl. Diofcoridis l. 3. c. 166. videtur.*

VI. *Alcea arborefcens Syriaca.*

*Alcea arborefcens, Rauw. Cam.*

*Althæa frutex 2. Clus. hist.*

*Kermia Syrorum quibusdam.*

A'ce

Alcea Syriaca, Eyst.

Hujus flores è rubro purpureascunt, at vetustate ad cæruleum coloré vergunt: habetur etiam flore candido, quæ

Alcea Syriaca fl. candido, Eyst.

Hujus & altera species minore flore, quæ

Althæa frutex tertia, Clus. hist.

#### VII. Alcea vesicaria.

Alcea Veneta, Trag. Dod. gal. Lugd. Eyst.

Alcea Bononiensis, Gesl. hort.

Hypocoum, Matth. (malè sic dicitur Guil. momente) Lac. Lugd. Cæf. Cast.

Hypocoum alterum spurium, Gesl. hort.

Alcea peregrina, Gesl. hor. Tab. Ger. folifequa, Ad. Lob.

Alcea vesicaria, Dod.

Malva Veneta, Gesl. hort. Lon.

Herba Ungarica, Lon.

#### IX. Alcea hirsuta.

Alcea villosa Dalechamp. Lugd.

an Alcea minor in sylvis foliis Geranii, Cæf.

#### IX. Alcea Indica magno flore.

Sabdariffa, Lob. Dod. Lugd. Cam. Tab. Ger. Eyst.

Alcea Americana, Clus. hist.

Foliis ludit, prima aliquando integra, communiter in tres lacinias divisa: aliquando instar foliorum Elleborastri in septenas profundas lacinias secta observavimus.

#### X. Alcea Indica parvo flore.

Exotica malvacea, Bamia Eben quibusdam, Ad.

Trionum Theophrasti, Rauw. Lugd. ap.

Sabdariffa alia, Lugd.

Bamia, Alp. Cam. Belli ep. s. ad Clus.

Bamia Alexandrina, Cæf. Cast. ap.

Alcea Ægyptia, Clus. hist.

#### XI. Alcea Ægyptiaca affinis.

Fructus 18. è navigat. Bataw. Clus. ex l. 2. c. 15.

#### XII. Alcea Indica parvo flore altera.

Bamia Ægyptiaca filiqua decagona, cum in alitis pentagona duntaxat, Clus. hist. ap. alt. ad lib. 4.

#### XIII. Alcea Ægyptiaca villosa.

Abelmosch Ægyptiorum, sive Abutilon Avicennæ, Pona ital.

Belmulcus Ægyptiorum nomine ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

## C O R C H O R U S.

**C**orchori duplicis Plinius meminit: alterius lib. 25. c. 13. Anagallidem intelligens: alterius lib. 21. c. 15. inter herb. s. sponte nascentes & in cibis usitatas: & lib. 21. c. 32. Alexandrinorum cibis, convolutis foliis ad similitudinem mori, &c. Et Alpino, facultate similis est Altheæ & Ægyptiæ in cibis familiaris, aut gratius. Et Judæi coctâ solâ cum carne edunt, quæ sapore acetose prædita sunt, annotante Rauwolfio in suo Hodeporico.

Corcoros Plinii, Lob. Lugd.

Olus Judaicum Avicennæ, quibusdam & Moluchi Arabum, Rauwol.

Corcorus sive Melochia, Cam.

Melochia, Alpini.

## G E R A N I U M.

**T**heophrastus Dioscoridi lib. 3. c. 131. à grævi capitis imagine, in summo ejus cacumine visenda, nomen habet: at recentiores, à ciconia rostri effigie, Rostrum ciconia nominant. Geranium, & aliquibus Myrrhæ, aliis Marthyrdæ (rectius Myrrhida) Plinio l. 26. c. 11.

Genera duo Dioscoridi: alterum foliis Anemones, alterum foliis Malvæ. Plinio tria sunt: primum similis cicutæ, foliis minoribus, saporis & odoris jucundi: subjungit ex Græcorum sententia, alterum foliis Malvæ, & tertium Anemones.

Geranium Anemones folio rotundo.

#### I. Geranium batrachiodes folio Aconiti.

Geranii species tertia, Gesl. hor.

Geranii majoris species prima, Eid. ap.

Geranium 2. vel batrachoides alterum, Clus. pan.

& hist.

Geranium sive batrachium cæruleum, Tab.

Geranium batrachiodes, Ger.

Variat flore cæruleo, albo, albo lineis cæruleis variegato: est & flore cæruleo duplici, sed duplo majore, & dicitur

Geranium batrachiodes cæruleum, &

Geranium batrachiodes flore albo, Eystlett.

II. *Geranium batrachiodes* hirsutum, flore atterubente.

an *Geranii majoris* species 2. Gef.ap.

*Geranium primum* pullo flore, Clus.pan. & hist.

III. *Geranium batrachiodes* odoratum.

*Geranium montanum*, Gef.col.

*Geranium batrachiodes* alterum, Dod.

*Geranium batrachiodes* longius radicatum, Lob. Lugd.

*Geranium macrorhizon*, Cam.Eyftett.

*Pes columbinus* in sylvis nascens alter, Cæf.

IV. *Geranium sanguineum* maximo flore.

*Sanguinaria radix*, & *Geranium* 3. Trag.

*Geranium* alterum majus, Gef.hor.

*Geranium hæmatodes*, Dod.gal.Lugd.Clus.pan. Thal.Cam.

*Geranium sextum*, Fuch.Tur.Lac.Lon.

*Geranium gruinum* sanguinale hæmatodes supernum radice reptice, Lob.ico.

*Geranium* 7. hæmatodes, Clus.hist.

*Geranium sanguinarium*, Eyftett.

V. *Geranium batrachiodes*, Gratia Dei Germanorum, Lob.

*Geranium quartum* (sanguinarie radice species) Matth.Lugd.Cast.

*Geranium* 5. Fuch.Lac.Lon.sextum, Tur.

*Geranium batrachiodes*, Dodon.Camer. Thal. Lugd.

*Geranium batrachiodes* five magnum cæruleum, Adver.

*Geranium batrachiodes* primum, Clus.pan.

*Geranium sanguinarium*, Tab.majus, Eyftett.

*Geranium tertium* batrachiodes majus, Clus.histor.

Duplex est: grandius floribus cæruleis aut albis, & quidem eodem loco: minus, rubris.

VI. *Geranium batrachiodes* flore variegato.

*Geranium Anglicum* variegatum, Eyftett.

VII. *Geranium batrachiodes*, Collum gruis Germanorum.

*Geranium quartum*, Fuch.

*Gruinale*, Dod.Lugd.

IX. *Geranium montanum* fuscum,

*Geranium montanum*, Dod.

*Geranium fuscum*, Lob.Lugd.Eyftett.

*Geranium maculatum*, Tab. five fuscum, Ger.

X. *Geranium tuberosum* majus.

*Geranium primum*, Matth.Ang.Lugd.Cast.

*Geranium bulbosum* Matthioli, Tab.

*Geranium subrotunda* radice, Dioscoridis, Gef.hort.

*Geranium tuberosum*, Dod.Lugd.vel 10. Tab.

*Geranium tuberosum* majus, Cam.

*Geranium bulbosum*, Dioscoridis primum, Ad. Lob.

X. *Geranium tuberosum* minus, Cam.

*Geranium tuberosum* minimum, Cam.

XI. *Geranium* radice grumosa.

*Geranium tertium*, vel bulbosum Pennæ, Clus.pan.

*Geranium* 4. vel bulbosum, Eid.hist.

XII. *Geranium* nodosum.

*Geranium* quintum nodosum Plateau, Clus.hist.

*Geranium sextum* tuberosum Plateau, Idem.

an *Geranium* five batrachium cæruleum, Tab.

an *Geranium batrachiodes*, Ger.

XIII. *Geranium* parvum foliis ranunculi.

*Geranium* 8. vel Salmaticense rostratum, Clus.histor.

XIV. *Geranium argenteum* alpinum.

*Geranium alpinum* longius radicatum, Ponz.

XV. *Geranium* lucidum saxatile.

*Geranium* saxatile *ὄρεα* v. Thal.

*Geranium* saxatile, Cam.Eyftett.

*Geranium* alterum montanum saxatile rotundifolium, Col.

#### *Geranium Malvæ folio.*

I. *Geranium* folio Malvæ: rotundo.

*Geranium* alterum, Hermolai, Brunf. Trag.Mat.

Fuch.Dod.gal.Tur.Lac.Lon.Cast. Thal.

*Geranii vulgaris* species, Gef.hor.

*Pes columbinus*, Dod. Ad. (seu *Geranium* alterum Dioscoridis) Lob.Cæf.

*Geranium* aliud, Lugd.

*Geranium columbinum*, Tab.Ger.

*Geranium malvaceum* five *Baliâminum*, Cam.

Duplex est majus & minus: majori caules majores & folia paulo molliora: minori omnia minora & folia asperiora. Sic folia modo in profundiores, modo breviores & latas laciniis divisa sunt: floris magnitudine etiam differunt: flore triplo majore & cærulej elegantioris coloris ex hort. Dei habemus.

II. *Geranium* columbinum tenuis laciniatum: quod 2. in Prodomo.

III. *Geranium* folio Althææ.

*Geranium sextum*, Matth.Lugd.Cast.

*Geranium* à calceolario missum, Dod.



Geranium malacoides, Ad. Lob. Ger.

Geranium alticoides, Cam.

Geranium Monspeliacum, Tab.

Pes columbinus tertius, Cæf.

Sub Geranio 2. etiam hoc intelligit Dioscorides, dum gruum rostra tribuit. Geranium foliis candidioribus malvæ, Plinio.

IV. Geranium malacoides minus: quod 1. in Prodomo.

*Geranium folio Cicutæ vel Myrrhidis.*

I. Geranium Cicutæ folio acu longissima: quod 3. in Prodomo.

II. Geranium Cicutæ folio moschatum: & inodorum.

Acus moschata, Eric. Cord. Cæf. Col.

Herba moschata, Ang.

Geranium, Trag.

Geranium 1. Matth. edit. 1. Fuch. Dodon. gal. Tur. Lac. Lon. Cast.

Geranium tertium, Matth. edit. post. Lugd.

Geranium supinum, Dod. majus, Cord. hist.

Geranium *maritimum*, Thal.

Myrrhida Plinii, rostrum Ciconiæ, Ad. Lob.

Geranium moschatum, Cam. Ger. Eyst.

Geranium myrrhinum, Tab.

Hoc vel odoratum moschum redolens, vel inodorum est.

III. Geranium Coriandri folio odorum.

Geranium Apulum Coriandri folio alterum odorum, Colum.

IV. Geranium cicutæ folio minus, & supinū.

Herba Roperti & Geranium quartum, Brunf.

Geranium minus & primum, Trag.

Myrrhida Plinii & Rostrum ciconiæ inodorum vulgatum, Lob. ico.

Geranium 7. live Geranium gruinum, Dod.

Geranium minus vel arvense, Tab.

Geranium moschatum inodorum, Ger. Eystett.

Flos communiter brevilicis coloris: aliquando albus est: hinc duæ figuræ

1. Geranium minus, Tab.

Geranium moschatum inodorum, Ger.

2. Geranium arvense album, Tab.

Geranium inodorum album, Ger.

V. Geranium Robertianum primum.

Geranium tertium, Brunf. Matth. Fuch. Tur. Lac. Lon. Thal.

Gratia Dei, vel Geranium quibusdam, Trag.

Sideritis tertia, Dod. gal. Ang. Gef. col. Lac. Lon.

Panax Herculeum, Ang.

Geranium Robertianum, Ad. (Sideritis Achilleædon, aut congener) Lob. Dod. Cam. Tab.

Rupertiana vulgo, Cæf.

Herba Ruperti & Geranium 2. Dioscoridis, Lug.

Duplex est: alia omnino viridis, quam feminam faciunt: alia rubens, quæ præfertur: triplex differentia in Adver.

VI. Geranium Robertianum alterum.

Geranium quartū, Fuch. Tur. Lac. Lon. quintum, Matth.

Geranium gruinale, Dod. gal. Lugd.

Geranei Robertiani altera species, Ad.

Geranium violaceum (vel 12.) Tab. Ger.

VII. Geranium latifolium longissima acu.

Geranium Creticum annuum hæmatodes, Lob.

Geranium Creticum, Cam. Tab. Ger. Clus. hist.

## SANICULA.

*Sanicula à sanandis vulneribus nomen traxisse videtur: Doctissimus Columna sub Sideritide tertia Dioscoridis pingit & describit.*

Sanicula officinarum.

Diapentia, Brunf. Matth. Cast. cui & Pentaphylli species.

Sanicula, Brunf. Trag. Dodon. ut: Anguil. Gef. hort. Lac. Lon. Cæf. Camer. Thal. Tabern. (cui

& Confolida quinquifolia) Eystett.

Sanicula mas, Fuch. Lugd.

Sanicula & Diapentia, Ad. Lob. Ger.

Sideritis tertia Dioscoridis, Col.

## PES LEONIS.

*PES LEONIS à forma foliorum: vulgo Alchimilla, quod Alchimistarum præconiū celebrata sit.*

I. Alchimilla vulgaris.

Pes leonis, Brunf. uic. Brunf. Fuch. Lon.

Leontopodium, Brunf.

Alchimilla, Trag. Dodon. ut: Lac. Anguil. Adv.

Lob. Cæf. Thal. Tabern. Gerar. Eystett. vulgaris,

Clus. hist. Crin.

Stella-

Stellaria, Matth. Cast. Lugd.

Drosera & Drosium, sive *Ψιδαν*, à rore foliis  
infidente, Cord. in hift.

Stella herba Italica, Gef. hor.

Flosculi communiter colore pallidi ac herbacei:  
rarius albi.

II. Alchimilla alpina quinquefolia, in Pro-  
dromo descripta.

## CANNA B I S.

**K** *A'ra, &c. Dioscoridi lib. 3. cap. 165. & Plinio lib. 20. cap. 23. Cannabis que in sylvis primum nata est. Est autem sativa & sylvestris: Sativa, mas & femina. Sic que floret fructum non fert, que fructum fert, non floret.*

### I. Cannabis sativa.

Cannabis, Brunf. Matth. Ang. Lac. Tur. Lon. Ad.  
Lob. Cast. Tab. Ger.

Cannabis major, Trag.

Cannabis sativa, Fuch. Cord. in Diosc. fecunda,  
Dodon.

Cannabis mas, Dod. gal.

### II. Cannabis Virginiana.

Cannabis in Virginea spontè prodit à nostra caule  
& foliis diversa, materia tamen perinde bona: in  
des. Virgin.

### III. Cannabis erratica.

Cannabis femina, Trag. Dod. gal. Lugd.

Cannabis erratica paludosa sylvestris, Ad. Lob.

Cannabis sterilis, Dod. Cam. syl. Cast.

### IV. Cannabi similis exotica.

Bangue, Garzia, Acofta, Monard. Frag. Cast.  
Lugd.

Bangue cum Maslac Turcorum affinitatem ha-  
bet, Cluf. in Acoft.

Bangue arbor canabi similis ad omnia ferè uti-  
lis ceu Amfion (sive Opium) Linscot. part. 4.  
Ind. or. c. 35.

Bangue crebri apud Ægyptios & Turcas usus,  
quod triplici modo parant, & primum Afsis: al-  
terum, Bosá: tertium, Bernaui, quod verum

& genuinum Bangue est, Palud. notis in Linscot.

Cum folia cum cannabi similitudinem habeant  
& cortex in fila diduci possit, huc retulimus.

*Herba exotica que in fila instar Cannabis  
diducitur.*

### I. Herba de Bengala.

In Bengala ex herba quam ad colum instar lini  
nent, telam texunt, quæ subtilitate sericum ante-  
cellit: ex foliis linteamina elaborant acu pingentes  
nunc flosculos, nunc historias vario colore,  
quæ lectulis insternuntur: Linsc. par. 2. Ind. orient.  
18. & in Madagascar & in Baya: part. 3. c. 11.

II. Tokaun folia oblonga & acuta ex quibus  
fila detrahunt, & reticula piscatoria inde conte-  
xunt: Stad. in Brasil. l. 2. c. 8.

III. Herba in cujus foliis sericum instar te-  
nuis pellicula nascitur, cujus folia duos pedes lon-  
ga, unum lata, & ad binos pedes cum semisse in  
Virginia & Persia adolefcit: des. Virgin.

### IV. Radix filamentosa sericea.

Tit planta in sylvis nascens sine fructu: radice  
geminorum compressorum pugnorum magni-  
tudine, coma flavescente molliissimum sericum  
referente, quo pro plumis utuntur ad lectisternia:  
Linscot. par. 3. Ind. or. 6.

## EUPATORIUM.

**E** *Ἐμπόριον Dioscoridi lib. 4. cap. 41. ἡ Ἐμπόριον Oribasio in collect. & ἡ Ἐμπόριον, id est, Hepatica, quod he-  
pati medetur. Plinio lib. 25. c. 6. Eupatoria regiam auctoritatem habet. Sunt qui velint nomen ab inventore  
Mithridate cognomento Eupatore habere.*

### I. Eupatorium cannabinum.

Salvia, Brunf. ico.

Herba S. Kunigundis, Trag. prima, Tab.

Eupatorium vulgare, Matth. Tur. Dodon. Lugd.  
Cast.

Eupatorium adulterinum, Fuch.

Pseudohepatorium mas, Dod. gal. Thal.

Eupatorium Avicennæ creditum, Ang. Gef. hor.  
Lac. Lon. Cam.

Eupatorium aquaticum, Gef. col.

Trifolium cervinum aquaticum, Gef. hor.

Cannabina aquatica mas, Ad. Lob. (sive Eupato-  
rium mas) Colum.

Eupatorium, Cæf.

II. Can-

II. Cannabina aquatica folio tripartito diviso.

Verbena supina vel tertia, Trag.  
Verbenaca recta, Cord. in Dioic.  
Verbefina, Gef. ap.

Forbefina Bononienfium, Gef. hor.  
Pseudohepatorium fœmina, Dod. gal. Thal.  
Hepatorium aquatile, Dod.

Hydropiper, Lugd.

Bidens folio tripartito diviso, Czf.

Folia communiter in tres partes, aliquando quinque & sex digitorum instar divisa sunt.

III. Cannabina aquatica folio non diviso.

Eupatorium cannabinum fœmina Septentrionalium, Ad. Lob. ico.

Hydropiper aliud Dalechampii, Lugd.

Bidens folio non dissecto, Czf.

Eupatorium cannabinum chrysanthemum, Tab. Ger.

Conyza palustris, Eyt.

Cannabina aquatica similis capitulis nutantibus: in Prodromo.

IV. Eupatorium veterum sive Agrimonia.

Agrimonia, Brunf. Dod. Lon. Czf.

Eupatorium vulgare, Trag.

Eupatorium, Matt. Fuch. Dod. gal. Cord. in Dioic. & hist. Lac. Tur. Cast. Tab. verum, Lugd.

Eupatorium Græcorum, Ad.

Eupatorium Dioscoridis & aliorum Græcorum, Gef. hor. Lob. Thal.

Eupatorium Dioscoridis & Avicennæ, Anguil. Colum.

Hoc Eupatorium est Græcorum & Avicennæ, & Eupatoria Plinii: quibusdam ejusdem Plinii Argemonia in arvis nascens.

V. Eupatorium odoratum.

Agrimonia odorata, Cam.

Eupatorium Dioscoridis odoratum, Cast.

Eupatorium alterum odoratum & aromaticum, Colum.

VI. Agrimonie similis.

Agrimonoides, Colum. à quo accepimus: & postmodum etiam ex Italia semen, nomine Pimpinellæ folio Agrimonie missum fuit.

## POTENTILLA.

Potentilla ab eximii viribus nomen obtinuit: alii Argentina, à foliorum argenteo splendore. Sunt qui Stephanomelidem Plinii l. 26. c. 13. censeant: alii ad Argemonem referunt.

Potentilla, Brunf. Matth. Fuch. Lon. Czf. Lugd.

(& Argentina sylvestris) Cast. Thal.

Tanacetum agreste, Brunf.

Anserina, Trag. Tab.

Argentina, Dod. ut: Ad. Lob. Ger.

Argemone altera, Fuch. ico. Gef. hor.

## HERBA MOLUCANA.

Herba Molucana, Acofta, & ex eo Lugd. vulgo remedium pauperum & destructio Chirurgorum, quia insignis vulneraria est: in Maluco abunde nascitur.

## CARYOPHYLLATA.

Caryophyllata, ab odore radicis sic dicta, quod vernali tempore eruta, Caryophyllum aromaticum odore refert: vulgus ab insigni ejus efficacia Herbam Benedicam & Sanamundam appellat. Sunt qui ad Lagopum Dioscoridis lib. 4. cap. 17. referant: alii rectius ad Geum Plinii lib. 26. cap. 7. alii ad ejusdem lib. 25. cap. 9. Argemoniam cujus radix thus redeat.

I. Caryophyllata vulgaris.

Garyophyllata, Brunf. Trag. Dod. gal. Gef. hort. Lon.

Garyophyllata altera, Ang.

Herba benedicta, Brunf. 4.

Benedicta, Gef. hor.

Caryophyllata, Matth. Lac. Lugd. Thal. Cast. Tab.

Ger. vulgaris, Ad. Lob. Cam. Cluf. hist.

Caryophyllata hortensis, Fuch.

Geum, Tur. urbanum, Gef. hor.

Gariofilata vulgo, Czf.

II. Caryophyllata vulgaris majore flore.

Caryophyllata sylvestris, Fuch.

Caryophyllata montana vulgari similis, Cam.

III. Caryophyllata foliis hederæ terrestris.

Caryophyllata syl. vel quarta, Tab.

IV. Caryophyllata aquatica nutante flore.

Benedicta syl. Trag.

Ss

Geum

Geum rivale, Gef. hor.

Caryophyllata Septentrionaliū rotundifolia pap-  
pulo flore, Ad. Lob.

Caryophyllata montana Dalechampii, Lugdun.  
Eystett.

Caryophyllata montana prima, Clus. pan. & hist.

Caryophyllata major seu purpurea, Thal.

Caryophyllata aquatica, Cam. ep. palustris, Cam.  
Tabern.

V. Caryophyllata aquatica altera.

Caryophyllata montana tertia, Clus. pan. & hist.

Variat flore simplici & multiplici.

VI. Caryophyllata alpina lutea.

Caryophyllata montana, Matth. Lugd. i. montana,  
Anguil.

Geum alpinum & quartum, Gef. hor.

Caryophyllata major rotundifolia, Lob.

Caryophyllata montana, Dod. Tab. Ger.

Caryophyllata montana secunda, Clus. pan. & hist.

Caryophyllata alpina, Cam.

Garioflata alterū genus montanum fl. luteo, Gef.  
Flore est luteo: rarius purpureo vel albo.

VII. Caryophyllata alpina minor: in Phyto-  
pinace & Prodromo descripta.

Caryophyllata alpina omnium minima, Ponz.

Caryophyllata alpina minima prima species,  
Eid. Ital.

IX. Caryophyllata alpina Apii folio.

Caryophyllata alpina minima altera, Ponz. Ital.

IX. Caryophyllata alpina quinquefolia.

Caryophyllata alpina pentaphyllata, Ad. Lob. ico.  
Gerar.

Caryophyllata montana, Cast.

Caryophyllata alpina quinquefolia, Tab.

an Polyrrhizos latifolia, Lugd.

Variat foliis latioribus, angustioribus.

## DENTARIA.

**D**entaria à radice forma & colore nominatur, quæ candidissima ex pluribus squamis, quasi dentibus, com-  
ponitur: quibusdam à colore Coralloides & Alabastrites. Sunt qui ad violas referant: alii inter Solidagines &  
Symphyta: alii inter Saxifragias: alii inter Saniculas recensent: an Ceratia Plinii l. 26. c. 8.

I. Dentaria heptaphyllos.

Saxifragæ montanæ alia species, Gef. hor.

Coralloides altera, Cord. hist.

Viola dentaria altera, Dod.

Alabastrites altera, Lob.

Dentellaria altera, Lugd.

Aconitilycostoni genus alterum Dalech. Lugd.

Dentaria major, Cæf. altera, Tab.

Dentaria *πεντάφυλλος* Clus. pan. & hist. Ger.

II. Dentaria pentaphyllos: & Cam. & Ger.

Dentaria minor, Matth. Lugd. altera, Cæf. Tab.

Coralloides, Cord. hist. ico.

Pulmonaria quibusdam, sive Sanicula alba, Gef.  
hor.

Saxifraga montana quinis foliis, Eid.

Viola dentaria prima, Dod.

Nentioralis alpina herbariorum alabastrites, Ad.  
Lob. ico.

Dentellaria rubra Dalech. Lugd.

Coralloides Cordi, Thal. cui & Rhizocorallium.

Dentaria sexta, pentaphyllos prima, Clus. hist.

Dentaria corallina altera, Tab.

Variat foliis, in altera scabris & tactu asperis: sa-  
turè virentibus: in altera mollioribus, neque adeo

saturatione præditis: radice item, hujus enim  
magis est dentata, sive inæqualis & plurimis cras-  
sis squamis exasperata illa

Dentaria 6. *πεντάφυλλος* 1: hæc

Dentaria 7. *πεντάφυλλος* 2. Clus. in histor. nomi-  
natur.

III. Dentaria heptaphyllos baccifera.

Coralloides, Cord. hist. detcr.

Coralloides alta species, Cord. histor. icone vitio-  
sissima.

Dentaria bulbifera, Lob. Cam. Ger.

Dentaria baccifera, Clus. pan. & hist.

Dentaria minor, Cæf.

Dentaria septifolia, Ger.

Hæc heptaphyllos, rarissimè pentaphyllos: flor.  
albus, aut ex candido leviter purpureus.

IV. Dentaria baccifera foliis palmatæ.

Dentaria angustifolia baccifera peculiaris, Eyst.

V. Dentaria triphylos.

Dentaria coralloide radice 2. Clus. pan. Ger.

Dentaria enneaphyllos, Lob.

Dentaria, Cast. trifolia, Tab.

Dentaria quinta *πεντάφυλλος* Clus. hist.

Ceratia Panii, Col.

## E P I M E D I U M.

**E**πιμεδον Dioscoridi lib. 4. cap. 19. caulis est non magnus, hederae foliis denis aut duodenis, neque semen, neque flores proferens: radicibus tenuibus, nigris gravis odoris gustu insipido. Idem habet Plinius lib. 27. c. 9. ubi aliqui Epimedium, alii Epimenidion legunt: Quibusdam Epipetron ejusdem lib. 21. c. 15. de qua nil nisi quod nunquam floreat immittat Theophr. hyst. 9. lib. 8. cui Epimetrium penitus flore caret.

Epimedium Anguil. (cui & Lunaria quorundam) | Planta altera in montibus Liguriæ, Cæfalp. dam) Ad. Dod. Lob. Lugd. Tab. Camm.

## P Æ O N I A.

**P**αῖνια ἢ γλυκύσιδον, quibusdam πιντόσιρον. cujus radicem aliqui ῥίζης δακτύλου vocant, Dioscoridi lib. 3. cap. 157. Παῖνια ἢ γλυκύσιδον (casta, aliis dulcisida Gaza reddente) Theophr. hyst. 9. lib. 9. Et Plinio lib. 27. c. 10. Glycyside, quam aliqui Pæoniam aut Pentorobon appellant. Eidem lib. 25. c. 4. Pæonia vetustissima inventu est, nomen; authoris retinet, quam quidam Pentorobon appellant, alii Glycysiden. Dicitur Pæonia, a Medico Pæone, qui ea Plutonem ab Hercule vulneratum, Homero Odys. 5. fugente, curasse perhibetur.

Genera duo Dioscoridi: mas, folia jaglandis habet, in scemina Smyrni modo dividuntur: mari radix digitali crassitudine, alba; scemina radicibus seu glandes circiter septem aut octo adherent, ut in Asphodelo. Plinio l. c. duo genera: scemina, cujus radicibus balani longiores circiter octo aut sex adherent: mas fluitus habet, quoniam non una radice mixtus est, palmi altitudine & candida; addit semen in siliquis, aliud grano rubente, aliud nigro.

I. Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas.

Pæonia nobilior, vel 2. Trag.

Pæonia mas, Matt. Ang. Cord. in Diof. Ad. Lob. Dod. Cæf. Lugd. cum duplici figura, Tabern. Ger. Eyflett.

Pæonia mas foliis nucis, Gef. hor.

Variat floribus colore purpureo, incarnato: & hujus herbarum folia latiora segmenta habet quæ subtus exalbida, hinc Eyflett.

Pæonia mas fl. purpureo.

Pæonia mas fl. incarnato.

Pæonia mas major.

Pæonia mas major fl. incarnato, Eyflett.

Floris amplitudine reliquas superat: & herbarum folia in latiores & pauciores virecentes particulas dividuntur.

II. Pæonia communis vel scemina.

Pæonia, Trag. Tur. Lon.

Pæonia scemina, Brunf. Fuch. Anguil. Dod. gal. Cord. in Diof. & hyst. Gef. hor. Ad. Lob. Cam.

Pæonia scemina altera, Dod. Lugd.

Pæonia vulgaris scemina, Clus. hyst.

Pæonia rubra flore simplici, Eyflett.

Aglaophotis Æliani censetur.

III. Pæonia scemina altera.

Pæonia scemina, Matth. Lac. Cast. Cam.

Pæonia scemina prior, Dod.

Pæonia promiscua seu neutra, Ad. Lob.

Pæonia altera vel scemina Dioscoridis, Cæf.

IV. Pæonia tenuis laciniata subtus pubescens flore purpureo.

Pæonia Hispanico semine nata, sive secunda, Clus. hystor.

Pæonia Hispanica sive pumila, Cam.

Pæonia pumila scemina, Lob. ico.

Pæonia pumilis, Eyflett.

an Pæonia minor, Gef. hor.

V. Pæonia folio subtus incano, flore albo vel pallido.

Pæonia albo flore, Lob.

Pæonia leucanthemos, Plisphetida Bellonii, Cam.

Pæonia Cretica, Clus. hyst.

Pæonia alba quæ promiscua est, & Ψιπάκια vocatur, Hon. Belli epist. 1.

Huc referri potest ea, quæ flore est pallescente.

Pæonia ochranthemus Camerarii: quamvis & illa, flore non solum sit albo, &

Pæonia simplex niveo flore, Clus. hyst. sed etiam flore candicante aliquid rubri dilutioris asperitum habente.

Pæonia mas flore albo, Eyflett.

VI. Pæonia aquilina foliis.

Pæonia quarta foliis supernè virentibus, infernè pubescentibus, Clus. hyst.

VII. Pæonia pomi arantii colore.

Pæonia tertia foliis per ora crispis, infernè cinericei coloris, flore carnei dilutioris, Clus. hyst.

*Pæonia peregrina* flore coccineo, Eyst.

II X. *Pæonia* flore variegato.

*Pæonia* quinta, Clus. hist.

Flos interdum carneus, aut ruber, aliquando media ex parte ruber, aliis carneus, vel utroque colore radiatim distinctus.

I X. *Pæonia peregrina* flore saturè rubente.

*Pæonia Byzantina* prior, Clus. hist.

*Pæonia Byzantina* major, Eyst.

X. *Pæonia peregrina* fl. dilutè rubente.

*Pæonia Byzantina* altera, Clus. hist.

an *Pæonia Byzantina* minor, Eyst.

Flos illo paulo major, dilutioris coloris, filiquæ breviores, semina rotundiora minusque nigra sunt.

*Pæonia* flore pleno.

I. *Pæonia* fœmina flore pleno rubro majore.

*Pæonia* fœmina multiplici flore, Gef. hor. Dod.

Tab. Ger.

*Pæonia* fœmina polyanthos, Lob. Lugd.

*Pæonia* πολυανθος, Clus. hist.

*Pæonia* polyanthos fl. rubro, Eyst.

Flos hujus aliquando foliis quingentis donatur: ex hujus femine tres differentie natæ. 1. flore simplici sex foliorum. 2. flore simplici octo foliorum serie, colore magis saturo rubro. 3. flore pleno matri concolor & etiam major.

II. *Pæonia* flore pleno rubro minore.

*Pæonia* pleno rubro flore minor, Clus. hist.

*Pæonia* altera flore pleno dilutior & minor, Cam.

III. *Pæonia* fœmina flore albo pleno.

*Pæonia* fœmina polianthos flore albo, Tabern. Gerar.

IV. *Pæonia* flore ex albido pleno major & minor.

*Pæonia* sexta, sive exalbida plena, Clus. hist.

*Pæonia* fl. pleno incarnato, Eyst.

## LEONTOPETALON.

**Λ** *Εοντοπῆταλον* Dioscoridi l. 3. c. 110. *Leontopetalon*, quod alii *Rhapeion*, Plinio l. 27. c. 11. *Dioscoridi* flos punice coloris *Anemone* similis: cujus Plinius non meminit: at luteum solum observavimus.

*Leontopetalon* (id est, leoninum folium) Ad-  
vers.

*Leontopetalum*, Matth. Ang. Gef. hor. Lac. Lob.  
Don. Lon. Lugd. Cæs. Cast. Eyst.

## CHRYSOGONUM.

**Χ** *Χρυσογόνον* Dioscorides l. 4. c. 56. meminit, quod aliqui *Jacobæam maritimam*, alii *Tormentillam* censens, cum tamen sui generis planta sit.

*Leontopetalum* affinis foliis quernis.

*Chrysogonum* Dioscoridis, Rauwof. & Lugd.

append. Cast. Ponz Ital.

## STAPHIS AGRIA.

**Σ** *Ταφὶς ἀγρία* Dioscoridi lib. 4. cap. 156. *Astaphis agria*, sive *Staphis*, Plinio lib. 23. cap. 1. Latine, herba pedicularis, ab effectu, unde & *Phitroctonon* dici potest, cum nunc in *Grecia* *φειροκτωνον*, *gramen pedicularium* nominetur.

*Staphis agria*, Trag. Matth. Fuch. Dod. ur. Gef.  
hort. Lac. Tur. Ad. Lob. (sive *Vitifolia*) Lugd.

Cæsalp. Cast. Cam.

*Pedicularis*, Cord. in Dioscor.

## SECTIO

## SECTIO SEXTA.

QUINQUEFOLIUM; HEPTAPHYLLON sive TOR-  
mentilla; Fragaria; Trifolium; Medica; Lotus; Melilotus.

## QUINQUEFOLIUM.

**Πενταφυλλον** (quod nomen à numero foliorum habet) Dioscorides l. 4. c. 42. proposuit, cui folia sint Mentha, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata, flores ex candido pallescentes, auri emulos: radice subrubra, oblonga, &c. Sic & Theophrasto 9. hist. 14. πενταφυλλον, ubi Gaza Quinquifolium & Quinquiperam vertit. Et Plinius l. 25. c. 9. Quinquifolium nulli ignotum est, Graeci vocant Pentapetes, sive Chamazelon, sive Pentaphyllon.

## Quinquifolium flore albo.

I. Quinquifolium album majus caulescens: quod 1. in Prodomo.

II. Quinquifolium album majus alterum. Pentaphyllum verum ac nobile, Trag. Quinquifolium majus candidum, Fuch. Pentaphyllū albū, Matth. Ad. majus fl. albo, Eyst. Quinquifoliū 1. Tur. albū, Dod. gal. Gefap. Lugd. Quinquifolium sive Pentaphyllum 1. Clus. pan. & hist.

Quinquifolium sylvaticum, Tab. Ger.

III. Quinquifolium album minus: quod 2. in Prodomo.

IV. Quinquifolium album minus alterum. Quinquifolii albi species quædam, Gefap. Quinquifolium 2. minus albo flore, Clus. pan. & hist.

## Quinquifolium flore luteo.

I. Quinquifolium majus repens. Pentaphyllum minus, Brunf. vulgare, Trag. Pentaphyllon, Gef. hor. Cast. Dioscoridis, Tab. Pentaphyllon majus, Thal. luteum majus, Dod. gal. Lugd. Pentaphyllon 1. & 2. Lon. repens, Cam. Quinquifolium, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Lac. Ad. Lob. (sive Pentaphyllum vulgare) Cæf. secundum, Tur.

Quinquifolium majus, Dod. Ger. luteum majus, Fuch.

II. Quinquifolium minus repens aureum. Quinquifolii quarti secunda species, Clus. pan. & hist.

III. Quinquifolium minus repens luteum. Quinquifolii minimum genus, vel 1. Trag. Pentaphyllum minus luteum, Ad.

IV. Quinquifolium minus repens lanuginosum luteum. (hist.

Quinquifolii quarti prima species, Clus. pan. &

Pentaphyllum sive Quinquifolium minus, Tab. Incana pentaphyllæ, Ger.

an Pentaphyllon Bavaricum, Cam.

V. Quinquifolium minus repens alpinum aureum.

Quinquifolium tertium, Clus. pan. & hist.

VI. Quinquifolio similis Enneaphyllos: 4. in Prodr.

## Quinquifolium erectum.

I. Quinquifolium folio argenteo.

Pentaphyllon exiguum alterum, Trag.

Pentaphyllon album, Matth. canum, Thal.

Pentaphyllon luteum minus, Dod. gal. rectum minus, Cam.

Pentaphyllon tertium, Lon.

Quinquifolium luteum minus, Fuch. Tur. Lugd.

Quinquifolium petrarum majus, Tab.

Quinquifolium Tomentillæ facie, Ger.

II. Quinquifolium rectum luteum.

Pentaphyllon majus, Brunf. Lob. ob. Eyst. rectum majus, Cam.

Pentaphyllum aliud album, Ad.

Quinquifolium luteum rectum, Gefap.

Quinquifolium vulgare, Lob. ico. Ger. alterum vulgare, Dod.

Quinquifolium Theophrasti majus, Tab.

Heptaphyllon Hermolai, Cæf.

Pentaphyllon flore albo, Lugd.

Folia terna, quina, sena, ut plurimum septena, in eadem planta observantur: flores sublutei, albi, rubri. Hinc figuræ duæ

Quinquifolii & Pentaphylli albi, & rubri, Lob.

Quinquifolii Theophrasti majoris & albi, vel majoris 1. & 2. Tab.

Quinquifolii vulgaris & Pentaphylli purpurei, Gerar.

III. Quinquifolium montanū erectum hirsutum, luteum: quod 3. in Prodr.

## IV. Quinquefolium fragiferum.

Fragaria quarta, Trag.

Quinquefolium ꝑ. Clus. pan. quintum fragiferū, Eid. hist.

Quinquefolium fragiferum sextum, Tab.

## V. Quinquefolio fragifero aënis.

Pentaphyllum supinum Tormentillæ facie, Lob. Lugd.

Pentaphyllum supinum Potentillæ facie, Clus. pan. &amp; hist.

Quinquefolium tertium serpens, Lob.

Quinquefolium fragiferum repens, Tab.

Fragaria vesca, Ger.

## VI. Quinquefolium palustre rubrum.

Pentaphyllum rubrum, Dod. gal. Ad. Lugd. palustre, Lob. ico. Thal. Ger.

Pentaphyllum palustre, Cord. hist. Cam.

Quinquefolium quartum, Dod.

Quinquefolium palustre, Ges. hor. Cam. ep. Tab.

Quinquefolium rubrum, Lugd. (Eyst.

Folii quinq; &amp; sex variat, unde quibusdam heptaphyllum dicitur.

## VII. Quinquefolium lupini folio.

Pentaphyllum *dequisomæ*, Thal.

## IIX. Quinquefolium tuberosum Indicum.

Pentaphyllum Indicum, Clus. exot. l. 4. c. 18.

## HEPTAPHYLLON sive TORMENTILLA.

**TORMENTILLA.** quod radice pulvis cum aluminis & pyrethri momento, cavis dentium inditus, dentium tormentum sive cruciatum sedet: quam alii Pentaphyllis: alii Bisfortis adnumerant: sunt qui Chrysogonum Dioscoridis suspiciantur: Heptaphyllum, id est, Septifolium a quibusdam, à foliorum numero, nominatur.

## I. Tormentilla sylvestris.

Tormentilla, Brunf. Trag. Matth. Dod. ut: Cord. in Diosc. &amp; hist. Ang. Lac. Lon. Ad. Lob. Cef. Lug.

Thal. Cast. Tab. (&amp; Consolida rubra) Ger. Eyst.

Heptaphyllum, Fuch. Tur. Ges. hort.

Huius folia aliquando averfa parte candida sunt: aliquando quina, sæpissimè septena.

## II. Tormentilla alpina vulgaris major.

Tormentilla alpina, Cam.

Radix odoratior, rubicundior ac major vulgari.

## III. Tormentilla alpina folio sericeo.

Argentaria petræa, Ges. hor. alpina, Eid. col.

Pentaphyllum argenteum, Ang.

Pentaphyllum alpinum petrosum &amp; minimum, Ad. Lob. ico. Ger.

Heptaphyllum, Clus. hisp. &amp; hist.

Stellaria argentea, Cam. ep.

Alchimilla alterum genus, Cæs.

Tormentilla candida Dalechampii, Lugd.

Argentea heptaphyllum montana, Cam.

Quinquefolium alpinum, Tab.

Pentaphyllum petræum minus, Eid. quod supinum, Ger.

IV. Herba Wiapassa in Guajava abundans radicè habet Gingiberi, quoad saporem, nõ dissimilè, &amp; ad diarrhœa sedandâ utilis: par. 8. Ind. occid.

## FRAGARIA.

**FRAGARIA** à fragro, id est odorem reddo, dicta videtur: *Κόμαρον* Apulei censetur: inter Pentaphylla flore albo. Dioscoridem intellexisse volum: & quia Mora terrestria Servio dicta fuisse, sunt qui ad Chamebatum referant. Plin. l. 25. c. 9. Fraga. Rubus Ideus non spinosus quibusdam.

Genera: alia montana & sylvestria, in montibus & sylvis nata: alia sativa, quæ in hortis. Fructus magnitudinis figura oblonga, rotunda, & colore variat.

## I. Fragaria vulgaris.

Fragaria, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Ges. hort. Lon. Ad. Lob. Lugd. Cast. Ger.

Trifolium aliis Fragaria, Brunf.

Fragula, Cord. hist.

Rubus idæa minor, Lac.

Fragum &amp; Trifolium fragiferum, Tab.

Fragaria major, Thal.

Fraga fructu rubro, Eyst.

Fructus magnitudine &amp; colore variat: quædam

rubra, quædam inter album &amp; rubrū mediū, quædam sanguinei coloris: habetur fructu duplo majore vulgari, herbaceo, luteo, pallore &amp; candore confusis: imò &amp; subalba, quæ

Fraga major subalba, Lob. fructu albo, Eyst.

Fraga alba, Dod.

Fraga æquè magna ac in Anglia in Virginea crescent.

## II. Fragaria fructu albo.

Fraga candida, Trag.



Fragaria minor seu nigra, Thal.

Fragum album, Tab.

Fragaria, Ger.

Fructus est aliquando toto candido, minus grumoso, dulciore: aliquando parte superiore rubicundiore, at inferiore candidiore.

III. Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine.

Fragum fructu magno, Eyst.

IV. Fragaria foliis hispidis.

Fragaria tertium genus, Trag.

Fragaria species minor, Haarbær/ Gef. hort.

Fragum tertium, Tab.

Partim rubra, partim eandem sunt, vel subpurpu-

V. Fragaria bis fructum ferens.

Fragaria genus in alpinis, Cæf.

Fructus forma compellita, striata, Rubidiori sapore: vere & autumno maturat.

VI. Fragaria flore luteo.

Fragaria parva luteo flore, Gef. hort.

VII. Fragaria sterilis.

Fragaria sterilis, Gef. hort. marem dixeris, Eid. col.

Fragaria syl. minimè veica five sterilis, Lob.ico.

IX. Fragaria affinis sericea incana, in Pro-dromo descripta.

Incana Pentaphylli effigie, an Leucas Diofcoridis, Ad.

## TRIFOLIUM.

**T**ριφύλλον Trifolium Diofcoridi l. 3. c. 123. sic dictum, quod singulis germinationibus, cerna exeant folia.

Genera: Diofcorides solum bituminosum proposuit, quod τριφύλλον, μυσκιδές & λευκόν: quod bitumen oleat, dicatur. At Plinius l. 21. c. 9. Trifolii tria genera enumerat: Mynanthos ait, vocant Græci, alii asphal-tion, majore folio: alterum acuto, oxytriphylon: tertium ex omnibus odoratissimum.

I. Trifolium bitumen redolens.

Trifolium asphaltæum, Matth. Gef. hort. Fracast.

Ad. Lob. Lugd.

Trifolium, Dod. gal. Cord. in Diof. Gef. hor. Lon.

Trifolium bituminosum, Ang. Dod. Cæf. Cast.

Cam. Tab. Ger.

Oxytriphylum, Gef. hor.

Folia inferiora, antequam caulem proferat, rotunda sunt, cum verò caulescit, acuta: hinc duæ figuræ in hist. Lugd: altera rotundis, altera longioribus foliis. Semen Italicum in Germania terræ mandatum, profert plantam odore bituminoso: at semen plantæ in Germania educatæ, rursus satum, plantam sapore & odore deficientem producit: hinc duæ figuræ in horto Eystett.

Trifolium bituminosum odoratum, &

Trifolium bituminosum inodorum, Eyst.

II. Trifolium palustre.

Limonium, Cord. in Diof. pratense, Trag.

toppyrum, Dod. gal. Gef. hor.

Trifolium palustre, Cord. hist. Dod. Thal. Eyst.

Lotus palustris, Gef. hort.

Trifolium paludosum, Ad. Lob. majus & minus, Gerar.

Menianthes palustre, Lugd. duplici figura.

Trifolium majus & fibrinum, Tab.

Variat ratione loci, majus datur & minus, rotundiore & acutiore folio: quare Taber. & Ger. figuræ duas exhibent.

III. Trifolium Americanum.

Trifolium Americū, Lob. Dod. Lugd. Tab. Cam.

Loti syl. genus latifolium ex Armenia, Cæf.

Trifolium pratense.

I. Trifolium pratense purpureum.

Trifolium majus, Brunf. def.

Trifolium pratense purpureum, Trag. Fuch. Ad.

Trifolium pratense rubrum, Cam. Thal.

Trifoliū pratense, Matth. Dod. ut Tur. Lac. Lob.

Lugd. Cæf. Tab. Ger. alterum, Cast.

Hujus differentiæ multæ sunt ratione magnitudinis, tam foliorum, quàm caulium & fructus: folia cōmuniſſimè rotunda, quibusdam oblōga, rarius in extremo sinuata: nonnunquam unum alterūve folium in binas, ternas, etiā quaternas lacinias dividitur: rarius cauliculo, foliorum minorum velut falciculus in umbellæ modum intidet: quibusdam in folio macula est, vel nigra, vel alba, lunæ falcata: figurâ: floris color aliis purpureus, & modò saturatio, modò pallidior.

II. Trifolium pratense album.

Trifolium pratense alterum, Trag. Matth. Lac.

Trifolium pratense primum, Cast.

Trifolium pratense albū, Fuch. Dod. gal. Tur. Ad.

Trifolium acutum, Lon. (Cam.

Trifolium majus primum, Clus. pan. & hist.

Trifolium pratense vulgare flore candido, Thal.

III. Quadrifolium horrentie album.

Quadrifolium phæum fuscum, Ad. Lob. Lugd.

Lotus quadrifolia, Tab.

Foliis quaternis, quibus aliquando septenis denatur.

IV. Tri-

IV. *Trifolium pratense luteum capitulo brevior.*

*Melilotum minus*, Brunf. 4.

*Meliloti exigua species* 1. vel 6. vel minor, Trag.

*Trifolium pratense luteum*, Fuch. Tur. Lug. Cam. *pratense tertium*, Cast.

*Lotus sylvestris*, Lon. syl. minor, Dod. gal. Lugd.

*Trifolii genus medicæ simile*, Gef. hor.

*Trifolium luteum* 1. capitulo brevior, Thal.

an *Trifolium luteum minimum*, Ad.

*Trifolium arvense*, Tab.

*Trifolium Burgundiacum*, Ger.

V. *Trifolium pratense luteum capitulo lupuli, vel agrarium.*

*Melilotus* 8. vel *Lotus campestris*, Trag.

*Trifolium agrarium*, Dod.

*Trifolium luteum minimum*, Lob. Lugd.

*Trifolium luteum alterum lupulinum*, vulgo *lupulus sylvaticus*, Thal.

Illud flore est minore, semen fert, & quibusdam mas: hoc verò flore est majore & speciosiore, sterile & fœmina dicitur.

VI. *Trifolium pratense minus flosculis purpureis.*

*Lotus pratensis purpurea*, Lugd.

Folia modò terna, modò quaterna habet.

*Trifolium montanum.*

I. *Trifolium montanum purpureum majus.*

*Trifolii altera species & major*, Gef. hort.

*Trifolium majus* 2. Clus. pan. & hist.

*Trifolium aliud montanum majus*, Thal.

II. *Trifolium montanum purpureum folio acuto crenato: quod* 1. in Prodomo.

III. *Trifolium montanum purpurascens folio obtuso crenato: quod* 2. in Prodr.

IV. *Trifolium montanum purpureum minus. Trifolium montanum aliud minus*, Thal.

Variat flore, qui purpureus, reperitur & albus.

V. *Trifolium montanum album.*

*Trifolium majus albo flore*, Clus. pan. majus, primum, Eid. hist.

VI. *Trifolium montanum lupulinum: quod* 3. in Prodomo.

*Trifolium alpinum.*

I. *Trifolium alpinum flore magno, radice dulci: quod* 4. in Phytopinace: 20. in Prodr.

*Trifolium angustifolium alpinum*, Ponz.

*Glyzyrrhiza astragaloides* quibusdam.

II. *Trifolium alpinum argenteum Persici flore.*

*Trifolium argenteum alpinum*, Ponz. ital.

III. *Trifolium saxatile hirsutissimum: quod* 4. in Phytopinace: 19. in Prodomo.

*Trifolium spicatum.*

I. *Trifolium spica subrotunda rubra.*

*Lagopus maximus folio & facie Trifolii pratensis*, Ad. Lob.

*Lagopus major folio trifolii*, Dod. major flore rubro, Cam.

*Lagopus maximus Lobelii*, Clus. pan. & hist. Lug.

*Lagopus peregrina*, Eyst.

II. *Trifolium spica oblonga rubra.*

*Trifolium majus tertium*, Clus. pan. & hist.

III. *Trifolium montanum spica longissima rubente.*

*Cytisus*, Trag. Lugd. (& *Pes milvi Pádeft*) Cam.

*Cytisus Columella*, Lon.

*Lagopus altera folio pinnato*, Lob. Lugd.

*Lagopus major*, Eyst. alter, Dod.

*Trifolii majoris tertii, altera species*, Clus. pan. & hist.

*Trifolium spicatum*, Thal.

Folia in calidioribus regionibus marcescunt, nitore, lævore ac striis elegantissimis avium pennas imitantur.

IV. *Trifolium montanum angustissimum spicata.*

*Lagopus altera angustifolia*, Ad. Lob. ico. Lugd. an *Lagopus minor*, Cæf.

Foliis latioribus in montibus Euganzis, & angustioribus circa Monspelium collegimus: aliquando etiam omnibus partibus minor & semipalmaris est, &

*Alopecurus graminea Dalech.* Lugd. dicitur.

V. *Trifolium Hispanicum angustifolium, spica dilute rubente.*

*Lagopus angustifolius Hispanicus*, Clus. hist.

VI. *Trifolium arvense humile spicatum, fere* *Lagopus.*

*Lagopus & Lotus campestris*, Trag.

*Lagopus sive pes leporinus*, Matth. Fuch. Dod. ut Lac. Lob.

*Lagopus & Lagopyron*, Ad.

*Leporinus pes*, Cord. in Diosc.

*Lagopus major*, Cæf. minor, Cam.

*Lagopus vulgaris*, Lugd. cū duplici figura, Thal.

*Lagopodium*, Tab. Ger.

*Λαγόπυρι* Dioscoridi 1. 4. c. 17. *λαγόπυρον*, Hippoc.

*Lagopus*, Plinio 1. 26. c. 8.

Spica colore variat, lutea, aliquando cineritia, albescēte, iisq; majorib; minoribus, rotundiorib; longiorib;

longioribus: foliis latioribus, angustioribus. Cretici Lagopi nomine habemus foliis latioribus & brevioribus, spicati; brevioris & flavescente.

Trifolium capitulo stellato, folliculato, globoso.

I. Trifolium stellatum: quod 16. in Prodomo.

II. Trifolium pratense folliculatum.

Trifolium pratense Salmanticum, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd.

Trifolium Hispanicum, Tab. Salmanticum, Ger.

III. Trifolium globosum, sive capitulo Lagopi rotundiore: quod 17. in Prodomo.

IV. Trifolium globosum repens: quod 18. in Prod.

V. Trifolium capitulo spumoso laevi: quod 4. in Prod.

VI. Trifolium capitulo spumoso aspero majus: quod 5. in Prodomo.

VII. Trifolium capitulo spumoso aspero minus: quod 6. in Prodomo.

IIIX. Trifolium fragiferum Friscum, Clus. cur. post. Aliud floribus dilute rubentibus in globulum, rubi idem fructum forma & colore emulantis, collectis: alia species capitulo saturati violacei coloris, ad Rubi vulgaris fructum accedente.

IX. Trifolium capitis Thymi: quod 7. in Prodomo.

X. Trifolium album angustifolium, floribus velut in capitulum congestis.

Dorycnium falsum dictum, Ges. hor.

Dorycnium Monspeliensium, Ad. Lugd. Cam.

Dorycnium, Lob. Hispanicum, Clus. hisp. & hist. Tab. Gerar.

Folia terna, quaterna, aliquando quina junguntur: quae modo latiora, modo angustiora.

XI. Trifolium capitulo oblongo aspero: quod 8. in Prodomo.

*Trifolium peltatum, scutellatum, cochleatum & turbinatum.*

L. Trifolium peltatum Creticum: quod 14. in Prodomo.

II. Trifolium cochleatum vel scutellatum fructu latiore, folio minuto obtuso: quod 9. in Prod.

III. Trifolium cochleatum fructu latiore.

Medica minor, Trifolium tortuosum, Ges. hor.

Trifolium cochleatum primum, Dod. Ger.

Medicae species 3. siliqua glomerata, Ad. species 3. Lobel.

Medica, Tur. Anglica, Tab.

Trifolium siliquam habens cochleae modo implexam, Czf.

Medica platycarpus, Cam.

Medica syl. prior, Lugd.

IV. Trifolium cochleatum fructu magis tortili: quod *uareia* Cydoniae, *uapinde* Retimi nomine, ex Creta Honor. Belli misit.

V. Trifolium cochleatum turbinatum, sive fructu compresso oblongo.

Medicae species secunda, Ad.

Medica syl. altera, Lugd.

Medica rotundo semine, Cam.

Hoc, sed fructu minore, Loti aut Trifolii nomine, ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

VI. Trifolium cochleatum polycarpon: quod 10. in Prodomo.

Duplex est: aliud folio obtuso non crenato: aliud folio acuto crenato: illud Italicum, hoc Gallicum est.

VII. Trifolium cochleatum maritimum tomentosum.

Trifolium maritimum, Ges. hor.

Medica marina, Ad. Lobelico. Clus. hisp. & hist. Tab. Cam.

Trifolii quoddam genus in maritimis, Czf.

Anthyllis altera, Lugd. ico.

Trifolium cochleatum marinum, Ger.

*Trifolium cochleatum hispidum, echinatum & spinosum.*

I. Trifolium cochleatum fructu nigro hispido.

Trifolium cochleatum alterum, Dod.

Medica folliculo spinoso, Lob. Lugd.

Medica semine minuto hirsuto, Cam.

Medica, Castico.

II. Trifolium cochleatum folio cordato maculato.

an Trifolii species nigris maculis, quod haemorrhoidum cognominant, Ges. hor.

Medica Arabica, Cam.

III. Trifolium folio obtuso folliculis cordatis: quod 13. in Prodomo.

IV. Trifolium fructu compresso spinis horrido.

Medica siliqua spinosa, Ad.

Medicae species, Lob. ico.

V. Trifolium cochleatum echinatum minus: quod 12. in Prodomo.

VI. Trifolium echinatum arvense.

Tribulus terrestris minor repens, Lugd.

Medica pusilla, Cam.

Pilulas habet quaternas, quinas simul junctas: sublequens vero binas, ad summum ternas.

Tt

VII. Tri-

VII. *Trifolium echinatum arvense fructu minore.*

*Tribulus minor rectus, Dalech. Lugd.*

II X. *Trifolium spinosum Creticum: in Phytop. Matthiolo, & Prodromo sub 15. descriptum.*

*Trifolium spinosum Creticum, ἰσχυρὸν Bel-li, Clus. hist.*

*Trifolium siliqua cornuta & falcata.*

*Dioscorides περὶ κλάδ. l. 2. cap. 177. foliis & caule Trifolii pratensis, siliquis corniculorum modo in-  
ortis descriptis: Mnd. x. Theophrasto 8. hist. 8. &  
2. caus. 20. Et Plinio l. 8. cap. 16. Medica à Medis  
advecta per bella Persarum, &c.*

I. *Trifolium siliqua cornuta, sive Medica.*

*Medica, Dod. ut: Cord. in Diosc. Lac. Cels. Cam.  
Cast. descr.*

*Medica vera, Gesl. hor. sativa, Lugd.*

*Medica flore purpureo, Ang. herba, Lon. def.*

*Medica legitima, Clus. hist.*

*Fenum Burgundicum, Ad. Lob.*

*Medicam veterum & Alfasat Avicennæ vo-  
lunt: quæ floris colore variat, communiter cæ-  
ruleo, violaceo, luteo: ex utriusq; mixto.*

II. *Trifolium siliqua cornuta, vel  
Medica frutescens.*

*Meliloti majoris species tertia, Trag.*

*Trifolii genus Medicæ similis, Gesl.*

*Medica flavo flore, Clus. pan. & hist.*

*Lens major repens, Tab.*

*Apud nos flore est luteo: at circa Nemanum in  
Gallia Narbonensi, in arvis reperitur flore luteo,  
albo, viridi, cæruleo, purpureo, nigro, vario, ex  
cæruleo viridi composito.*

III. *Trifolium siliqua falcata.*

*Lunaria radiata Italarum, Lob.*

*Medica syl. altera lunata, Lugd. cum duplici fi-  
gura.*

*Trifolii genus siliqua lata & falcata, Cels.*

*Medica lunata, Cast. ap.*

IV. *Trifolium siliqua falcata alterum.*

*Trifolium falcatum, Clus. hist. ap. alt. & cur. post.*

*Trifolium acetosum.*

*Οξυεισόμεν quibusdam, ab acido sapore, & for-  
mata trifolii: Oxy Plinio l. 2. cap. 12. folia terna  
habet.*

I. *Trifolium acetosum vulgare.*

*Trifolium acetosum, Brunf. Matth. Dod. Lugd.  
Thal. Cast. fl. albo, Eyst.*

*Panis cuculi, Brunf. 4.*

*Oxytriphylon, Trag. Lac.*

*Oxy, Fuch. Dod. gal. Tur. Cord. hist. Cam. alba,  
Ger. Tab.*

*Oxy quorundam, Ang. Pliniana, Gesl. hort. Ad.  
Lob.*

*Alleluja, Lac. Lon.*

*Lujula, Fracast.*

*Trifolium acetosum, Calabris Juliola, ridiculè  
barbari corrumpere in Alleluja, Scalig. in Theoph.  
de caus.*

*Floris colore variat: communiter lacteus est:  
rarius purpurascens, vel subcæruleus & luteus.*

II. *Trifolium acetosum corniculatum.*

*Oxy flore luteo vel flavo, Clus. hispan. & hist.  
Dod. Tab.*

*Oxy, Cels. Ger. lutea corniculata repēs, Lob. Lug.  
Lotus urbana, Tur. ico.*

*Trifolium acetosum flore luteo, Cast. Eyst.*

*Trifolium hepaticum.*

I. *Trifolium hepaticum flore simplici.*

*Hepatica, Brunf. Dodon. gal. aurea, Brunf. 4. Gesl.  
hor. Tab. Thal. quibusdam Anthera.*

*Trifolium magnum seu aureum, Trag.*

*Triada & Taura, Hermolao.*

*Trinitas, Matth. Ang. Cord. hist. (sive Epimediū)  
Gest. ap. Cels. Cast.*

*Herba Trinitatis, Gesl. hor. Lugd.*

*Trifolium aureum, Dod. Lon. aureum magnum,  
Cast.*

*Hepaticum trifolium, Ad. Lob. Cam. Ger.*

*Hepatica terrestris, Gesl. col. Hepatica trifolia,  
Clus. hist.*

*Foliis ludit, aliquando majoribus & maculis va-  
riegatis: floribus communiter cæruleis, vel vio-  
laceis, subpurpureis, rubris albis, etiam maculis  
purpureis aspersis: hinc figuræ duæ apud Lobel.  
& Gerar.*

*Hepatici trifolii & rubri:*

*Hepaticæ aureæ flore cæruleo & rubro, Tab.*

*Hepatici trifolii cærulei & rubri, apud Clus. &  
apud Eystett. fl. albo, rubro, & cæruleo.*

II. *Trifolium hepaticum flore pleno.*

*Hepatica trifolia polyanthos, Lob. Lugd.*

*Hepatica trifolia cæruleo pleno flore, Clus. hist.  
ap. alt.*

*Hepatica multiflora, Ger. aurea multiflora, Tab.*

*Hepatica aurea flore pleno & cæruleo, Eystett.*

LOTUS

## LOTUS &amp; MELILOTUS.

**A**notus Lotus herba (de arbore enim hic sermo non est) Dioscoridi l. 4. c. 111. triplex est: sativa, quam aliqui *τελευλλον* vocant, quæ in hortis nascitur: sylvestris, quam aliqui *Αλκυον* Libum à loco natali appellant, caule biembitali, aut etiam majore, alis multis, foliis Lori trifolia pratenfis, semine sænugreci ac multo minore, gustu medicato: tertia est Lotus Aegyptia, de qua supra. Theophrasto 7. hist. 9. Lotus herba in caule tantum foliata est: & c. 14. licet, inquit, nomen unum habeat, tamen plura ejus genera sunt, ut sermo æquivocus sit, folio, caule, flore, fructuq; discreta: Sic de Loto Aegyptia egit 4. hist. 10. Plinius l. 13. c. 17. de Loto arbore differeus, subjungit: est autem eodem nomine & herba (Lotum urbanam Dioscoridum intelligens) & in Aegypto caulis in palustrum genere: de hac posteriori egit l. 22. c. 21. Lotometram vocans. Idem l. 22. c. 21. ait, Homerum inter herbas subnascentes Deorum voluptati Loton primam nominasse: haud dubie Lotum sativam Dioscoridum intellexit.

De Meliloto autem Plinius l. 21. c. 9. inquit, in coronamentis folio venit Melilotum quod Sertulam Campanam vocamus: est enim in Campania Italia laudatissima: coronas ex hac antiquitus factitas, indicio est nomen Sertula, quod occupavit: odor ejus croco vicinus est, & flos, ipsa cana: placet maxime foliis brevissimis atq; pinguis-  
simis. Et cap. 11. Melilotos ubiq; nascitur, laudatissima tamen in Attica: ubi cumq; verò recens nec candicans & croco quam similima: quanquam in Italia odorator & candida.

I. Melilotus officinarum Germaniar.  
Melilotum majus, Brunf. Melilotus, Lac. Lon.  
Melilotus vera, Gei. hor.  
Melilotus major vulgaris, Trag.  
Melilotus vulgaris, Lugd.  
Lotus urbana, Matt. sativa, Cast. sativa altera, Lug.  
Saxifraga lutea, Fuch. Sax. altera, Lac.  
Lotus sylvestris, Fuch. ico. Cæf. Tab.  
Loti sive Trifolii species, Cord. in Diosc.  
Gerar. flore luteo, Dod. gal. Ad. Lob. Camer.  
Gerar. flore luteo, Eysf.  
Trifolium odoratum 1. & 2. Dod. Thal.

Flore est communiter luteo, aliquando albo, quæ  
Melilotus major candida, Trag. hinc duæ apud  
Taber. figuræ:

Loti sylvestris: & flore albo. Et apud Gerardū:  
Meliloti Germanice, & Meliloti crenatæ nomine.

Dodonæus hujus differētiās quinque recensuit: 1.  
flore luteo: 2. flore candido: 3. peregrina fl. pur-  
pureo cæruleo inodoro: 4. fl. luteo longiorib. fili-  
quis: 5. fl. luteo foliis per circūferentiā nō crenatis.

II. Melilotus corniculis reflexis major.  
Melilotus major, vel 3. species, Trag.  
Melilotus Italica, Fuch. Dod. gal. Gei. h. Ad. Lob.  
Meliloti quartum genus, Fuch. ico.  
Melilotus sive Sertula cāpana, Matt. Cord. in Diosc.  
Lotus sylvestris, Gei. hor.

Trifolium corniculatum 2. Dod. Thal.

Melilotus alia, Cæf.

Sertula campana, Cast.

Aliam figuram habet Lobelius, nomine  
Meliloti Syriacæ odoræ & Sertulæ campanæ.  
Melilotus Syriacæ, Ad.

Hæc Patavii facta, corniculis exit minus falcatis  
& ignaviore odore. Huc referatur

Melilotus altera pusilla Londinensis, Ad. (repēs.

III. Melilotus corniculis reflexis minor, vel  
Melilotus Aegyptia, Alchimelech, Alpino.

IV. Melilotus Italica folliculis rotundis.

Melilotus, Ang. Italica, Cam.

In quibudam folliculis duo, in reliquis unum  
granum continetur.

V. Melilotus angustifolia repens, folliculis ro-  
tundis quod sub Trifolio 23. in Prod. describitur.

VI. Lotus hortensis odora.

Trifolium Dioscoridis, Trag.

Lotus sylvestris, Matth. Ang. Cast. altera, Lugd.

Lotus sativa, Fuch. ico. Dod. gal. Cord. in Diosc.  
& hist. Gei. hor. Cām.

Lotus urbana, Lac. Tur. desc. Eysf.

Trifolium odoratum, Fuch. Tur. Lon.

Trifolium odoratum alterum, Dod. Lugd.

Trifolium caballinum, Gei. hor.

Lotus hortorum odora, Ad. Lob.

Melilotus vera, Tab. singularis Alpini, Ponæ.

Quibusdam *μύλι σίτον* Theophrasti 7. hist. 14.  
Mel frugum Gaza vertit: Lotus urbana sive sati-  
va Dioscoridis: Septies in die odorē mutare fer-  
tur, unde nomē Germanicum *Sibenzeit*: nostris  
*Schabzingertraut* / quia Helvetii suis peculiari-  
bus caseis, quos *Schabzinger* vocat miscere solēt.

VII. Lotus sativa Græca maculato folio.

Lotus sativa, & cum folium modo macula rufa  
modo nigra notatum sit, & caligini oculorum  
medeatur, à quibusdam *τελευλλονματῆς*, id est,  
Trifolium oculatum vocatur, Ang.

*Lotus pentaphyllos filiquis rectis.*

I. Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor glabra.

Lagopus primus, Trag.

Meliloti exigui species altera, vel 7. & nobilis, Eidem.

Melilotus Germanica, Fuch. Lon.

Meliloti tertium genus, Fuch. ico.

Lotus sylvestris, Dod. gal.

Trifolii species, Cord. in Diosc.

Lotus pentaphyllos, Gef. hor.

Trifolium corniculatum primum, Dod. Thal.

Melilotus coronata, Ad Lob.

Lotus sativa Matthioli edit. prima, Lugd.

Melilotum vulgo, Czf.

Pseudomelilotus, Cam.

Trifolium filiquosum minus, Tab. Ger.

Flos lutei coloris, aliquando ad aureum vergēs, non inquam subviridis.

II. Lotus pentaphyllos minor hirsutus, filiqua angustissima: sub Trifolio 21. sive corniculato minore piloso, in Prodromo descriptus.

III. Lotus pentaphyllos flore majore luteo splendente.

Meliloti majoris quarta species, Trag.

Trifolium corniculatum tertium, Dod.

IV. Lotus pentaphyllos major hirsutis candidans.

Melilotus vulgaris alter syl. Czf.

V. Lotus pentaphyllos major alter.

Lotus pentaphyllos major & erectus, Gef. hor.

VI. Lotus pentaphyllos frutescens tenuissimis glabris foliis: sub Trifolio 22. vel corniculato frutescente in Prodromo descriptus.

VII. Lotus Hispanica foliis maculatis: sub Trifolio 24. vel Meliloti Hispanico maculato describitur.

VIII. Lotus pentaphyllos incanus.

Glauz, Anguil. quo nomine & Alpinus donabat.

Cytisus Columellæ, Camer, Eyf.

Dorycnium 2. & non descriptum, aliis.

an Idem cum

Dorycnio congenere planta, Clus. hisp. & hist. & Lugd.

Dorycnii species, Tab.

Dorycnium Monspelienſe, Ger.

Clusius enim flores colore viridi: Anguil. & Cā. purpureos, vel ex albo purpurascētes adſcribit.

IX. Lotus pentaphyllos filiquosus villosus.

Oxytriphylllum alterum Scribonii, Ad. Lob. ico.

Oxytriphylleon Scribonii, Lotus syl. Clus. hist.

an Trifolium alterum folio acuto oxytriphyllo Plinii? an Lotus sylvestris ex Cod. Czf. areo, Dod. Lug.

Flore est albo, est & purpureo.

X. Lotus filiquosus glaber flore rotundo.

Lotus Lybica Dalechampi, Lugd.

an Oxytriphyllo genus, Clus. hisp.

Hoc duplex Clusio: unum candidioribus ramis & albo radice: alterum caule & ramis ex albo purpurascētibz, in quibusdam rubentibus.

XI. Lotus fruticosus incanus filiquosus.

Lotus asperior fruticosus, vel Narbonensis incana, Lob. Lugd.

XII. Lotus pratensis filiquosus luteus.

Lotus trifolia pratensis filiquosa Monspelienſis, Ad. Lob. ico.

Lotus filiquosus luteo flore, Clus. pan.

Lotus pratensis filiquosus, Eid. hist.

Lotus trifolia filiquosa, Tab.

Lotus trifolia corniculata, Ger.

Duplex est: major & durior: minor & mollior.

XIII. Lotus ruber filiqua angulosa.

Lotus filiquosus rubro flore, Clus. pan. & hist.

Lotus pulcherrima tetragonolobus, Cam. Eyf.

Scandalida Cretica Italorum.

*Lotus pentaphyllos filiqua convexa.*

I. Lotus pentaphyllos filiqua cornuta.

Lotopios sive Hieranzani Candia, Ponæ.

Lotus *hegy Zviri*, quo nomine Bellus ex Creta ad nos misit: & in epist. 5. ad Clus.

II. Lotus filiquis ornithopodii.

Lotus peculiaris filiquosa, Cam.

Lotus sylvestris Dioscoridis, Ponæ.

III. Lotus pentaphyllos filiquis recurvis pedes corvinos referentibus.

Coronopus ex Cod. Czf. areo, Dod. quid?

IV. Lotus pentaphyllos vesicaria.

Dorycnio similis, Ang.

Trifolium vesicarium, Clus. pan.

Trifolium Halicacabum sive vesicarium, Cam.

*Lotus affinis.*

I. Loto affinis Ægyptiaca.

Abſus, Alpini.

II. Loto affinis Vulneraria pratensis.

Anthyllis prior, Dod. gal. Lac. Lugd.

Anthyllis leguminosa, Lob. Clus. pan. & hist. Cā.

Anthyllis lenti similis, Dod.

Vulneraria rustica, Gef. hor.

Lagopodium, Tab.

Archetica Saxorum, Thal.

Flore communiter est luteo, rarius albo:  
hinc duæ figuræ apud Tab. & Ger.

1. Lagopodium flore albo, Tab.

Lagopum maximum, Ger.

2. Lagopodium flore luteo, Tab.

Anthyllis leguminosa, Ger.

III. Loto affinis hirsuta flore subrubente.

Anthyllis leguminosa purpurascens flore, Clus.  
pan. & hist.

Lotus latifolia Dalechampii, Lugd.

Aliquando tota incana est, qualem ex Hispania  
habemus.

IV. Loto affinis siliquis hirsutis circinatis.

Auricula muris, Cam.

# LIBER NONVS.

## SECTIO PRIMA.

RUBIA; APARINE; ASPERGULA; MOL-  
lugo; Gallion; Cruciatæ.

### RUBIA.

**E**ΡΥΘΡΟΨΑΝΟΝ (ab ἔρυθρον, id est ruber) ἢ ἔρδιδανον, aliquibus ῥόδανον, radix est rubra  
tingendo idonea, Dioscoridi l. 3. c. 160. ἔρδιδανον Theoph. 6. hist. 1. Rubia (a radicis colore) Plinio l. 19. c. 3. ac  
l. 24. c. 11. Erythrodanum, aliqui Ereuthodanum vocant, nos Rubiam, quæ lane tinguntur.

Genera duplex est, una sylvestris, sativa altera, cui caules quadranguli, longi, asperi, quales Aparinae, foliis in orbem  
per intervalla, circa singula genicula stellæ modo decussatim radiatis, &c. Dioscorides l. c. At Theophrasto l. c. plura  
sunt genera (Dodæo Rubia propriè species nulla sunt) & 7. hist. 9. radices rubicunda: verum 9. hist. 14. folia hederæ  
sed rotundiora tribuit. Plinio l. 19. c. 3. Rubia spinosus caulis geniculatus, quinis circa articulos in orbem foliis. Hic  
Plinius licenter asperum caulem spinosum vocat: cum Theoph. 6. hist. 1. spinis Erythrodanum carere aperte scribat.  
Laudatissimum, ait Plinius, Italica & maxime suburbana & omnes penè provincie sciant, &c.

I. Rubia tinctorum sativa.

Rubia sativa; Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. gal.

Gef. hor. Lac. Tur. Lon. Fracast. Lugd. Cast.

Rubia, Cord. in Diosc. Ang. Dod. Cæf. major, Ad.

Lob. Clus. hist.

Thapsia Asclepiadis, Ang.

Seritur non paucis Germaniæ, præsertim aptud  
Silesios, Belgii, Galliar, Italiæ & Hispaniæ locis, in  
usum enim tinctorum agri conferuntur: quemad-  
modum apud Dioscoridem, in Thebana Galliæ,  
& Ravenna Italiæ, nec non in Caria inter oleas fe-  
rebat.

II. Rubia syl. aspera, quæ sylvestris Dioscoridi.

Rubia erratica, Trag.

Rubia syl. vera, Cord. ob.

Rubia maxima, Lob. ob.

Rubia sylvestris, Cæf.

Quibuidam locis spontè in sepibus provenit, sativæ  
per omnia similis, radice tamen multo ma-  
jore, & foliis atrovirentibus.

III. Rubia sylvestris lævis.

Rubia sylvestris, Brunf. Matth. Fuch. Dod. gal.

Gein. hor. Lac. Tur. Lon. Lob. Lugd. Camer. Cast.

Thal. Tab. Ger.

Rubia syl. minor, Ad. Lob. obf.

Lappago Plinii, Cæf.

Alyllum Plinii l. 24. c. 11. (quod foliis tantum &  
ramis minoribus, ab Erythrodano distare scribit)  
quibuidam: aliis Lappago ejusdem l. 26. c. 10.

IV. Rubia pratensis lævis acuto folio: quæ  
Rubia 2. in Prodomo.

V. Rubia montana angustifolia: quæ 1. in  
Prodomo.

Rubia sylvatica longioribus & angustioribus fo-  
liis, Gef. hor.

VI. Rubia cynanchica.

Aspergula herba repens, Gef. col.

Synanchica, quod ad anginas sumpta & admota  
valeat, Lugd.

Saxifraga altera, Cæf.

Galium tetraphyllum montanum cruciatum, Col.

VII. Rubia cynanchica laxatilis: quæ 8. in  
Prodomo.

VIII. Rubia linifolia aspera.

Juncaria Salmaticēsis, Clus. hisp. & hist. Lob. Ger.

Juncaria, Tab.

Synanchica species, Lugd.

IX. Rubia maritima.

Rubia marina Norbonensium, Ad. Lob. Dod. Clus. hisp. & hist. Tab.

Erythrodanum marinum, Lugd.

Crucialis maritima, Cæf.

X. Rubia quadrifolia vel latifolia lævis.

Rubia lævis Taurinensium, Lob. Lugd.

XI. Rubia quadrifolia, vel rotundifolia lævis; sub Rubia 3. in Prodomo.

XII. Rubia latifolia spicata.

Rubia spicata, Imperato: Cretica, Clus. hist.

XIII. Rubia angustifolia spicata: quæ 4. in Prodomo.

XIV Rubia Virginea.

Chappawr, radices tenues quibus ad tinduras utuntur: in deser. Virgin.

Rubeola.

I. Rubeola arvensis repens cærulea: quæ 5. in Prodomo.

Rubeola arvensis, Cam.

II. Rubeola repens lutea foliis spinosis.

Rubia minima, Lob. Lugd.

III. Rubeola saxatilis: quæ 6. in Prodomo. an Rubia saxatilis, Cam.

IV. Rubeola echinata saxatilis.

Cruciata muralis, Colum.

an Crucialis minima in maritimis, Cæf. alp.

V. Rubeola maritima aspera: quæ 7. in Prodomo.

### APARINE sive ASPERUGO.

**A**πείνη, ἀμυγδαλέσπερον, ὀμφαλόκαρπον, φιλάνθρωπον ramis quadrangulis, asperis, folia, ceu & rubia. ramulos in orbem per intervalla cingunt, &c. Dioscoridi l. 3. c. 10. 4. Lappam Gaza apud Theophrastum 7. hist. 8. & 14. vertit: Aparinem (scribit Plinius l. 27. c. 5.) aliqui Omphalocarpum, alii Philanthropum vocant, ab asperitate vestium tenaci, &c. Eidem l. 26. c. 10. Asperugo inter Lappagines, dicitur ab asperioribus foliis, ad quod nomen vulgare alludit.

I. Aparine vulgaris.

Aparine, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Ang. Dod. ut: Cord. in Dioscor. Lac. Turn. Lon. Ad. Lob. Lugd.

Cæf. alpin. Castor.

Aparine aspera, Thal.

II. Aparine purpureis floribus,

### ASPERULA.

I. Asperula, sive Rubeola montana odora.

Caprifolium vel Stellaria, Brunf.

Hepatica tertia, Eid. 4.

Matriisylva, Trag. Cord. in Diosc. Lon. Thal.

Asperula, Dod. gal. Frac. Lob. Lugd. Ger.

Asperula odorata, Dod. Cast. Clus. hist.

Aspergula odora nostras, Ad.

Aparine sylvestris quædam, Cord. in Diosc.

Alyflos, Gef. hor. Lac.

Alyfium Plinii minus, Gef. collect.

Rubia syl. alia minor, Gef. append.

Hepatica stellata, Tab.

II. Asperula cærulea arvensis.

Alisson, Turner.

Asperula cærulea, Dod. Lob. Cam. Lugd.

Alyfium Galeni quibuidam, sed perperam.

III. Asperula hexaphyllos purpurea.

Myagræum alterum minus Dalechampii, Lugd.

IV. Asperula verticillata luteola.

Asperula verticillata muralis minima, Col.

### MOLLUGO.

**M**olluginis Plinius l. 26. c. 10. his verbis meminit: Et Lappago similis anagallidi (forte legendum Galio) non esset ramiflor, ac pluribus foliis aspera, rugosa, asperioris succi, gravis odoris: quæ talis (forte mollis legendum) est, Mollugo vocatur: similis sed asperioribus foliis, Asperugo.

I. Mollugo montana latifolia ramosa.

Matriisylva secunda, Trago.

Rubia sylvestica altera, Gef. hor. major, Eid. ap.

Alyfion Plinii majus, Gef. col.

Mollugo montana, Dod. Lugd. Thal. Tab.

Mollugo, Clus. pan. & hist. Belgarum, Lob.

Gallium sive Mollugo montana, Gerar.

II. Mollugo montana angustifolia, vel

Gallium album latifolium.

Gallion tertium, Trag. album, Ad. Cam. Thal.

Gallion candido flore, Cord. in Dioscorid. Cæf. alpin.

Mollugo prima, Dod. Lugd. Tab.

Mollugo vulgarior herbariorum, Lob.



## G A L L I U M.

**G**ALLIUM γαλλικόν, γαλλίων. nomen ex eo traxit, quod coaguli vice γάλα, lac cogat & coagulet: ramulum foliumq; habet Aparinae similitudinem, rectum: florem in cacumine luteum, &c. sic Dioscorides lib. 4. cap. 96.

- I. Gallium luteum.  
 Gallii primum genus, Trago.  
 Gallium, Matth. Lac. Cast. luteum, Cord. in Diosc.  
 Lob. Lugd. Cam. Ger.  
 Gallium. Fuch. Dod. aut: Ang. Lon.  
 Gallium luteum, Ad. Thal. primum, Tab.  
 II. Gallium rubrum.  
 Gallium rubro flore, Clus. hist.  
 III. Gallium nigropurpureum montanum

- tenuifolium, Col.  
 IV. Gallium palustre album.  
 Gallium palustre, Dodon.  
 Gallium flore candido in palustribus, Cæsalp. Cast.  
 Aparine lævis palustris, Thaliô.  
 Gallium album, Lon. Tab. Ger.  
 V. Gallium album minus.  
 Gallium album minus, Tab. rubrum, Ger. ico.  
 Folia bina plerumq; nonnunquam terna habet.

## C R U C I A T A.

**C**RUCIATA ac Crucialis, à foliorum in crucis formam suis nominatur, licet ad Rubia & Aparines similitudinem aliquomodo accedat.

- I. Cruciata hirsuta.  
 Gallii secundum genus, Trago.  
 Gallium, Turner.  
 Crucialis, Hermol. Cæsalp.  
 Cruciata, Dod. ut: Gek. hor. quæ Gallio cognata,  
 Cam. Cast. ico.  
 Cruciata minor, Ad. Lobel. (& Asperula aurea)  
 Lugd.  
 Cruciata herniaria, Thaliô.

- Alysson Plinii, Cæsalp. Inguinaria Plinii lib. 26.  
 cap. 9. quibusdam Inguinaria passim in vepribus nascens, ut prolixè inguinibus in manu tantum habenda est: plura non habet) fortè quia in herniosis, rupturis solidandis, admodum præstans habetur.  
 Eadem in montibus longè exiliôr.  
 II. Cruciata glabra: hæc sub Gallio latifolio glabro in Prodomo describitur.

## SECTIO SECUNDA.

## R U T A ; T H A L I C T R U M.

## R U T A.

**R**UTANON Dioscoridi lib. 3. cap. 52. Theophrasto 1. hist. 10. ita dicitur quod caliditate sua μυρρον τὸν πολὺν (semen coarguet) ut Nicandri schol. tradit. Ruta Plinio lib. 19. cap. 8. ubi ferendi modum refert. Ruta fortè dicta à Græco ῥῖον: Scribit enim Iohannes in rebus Peloponnesiacis ῥιγανόν in Peloponneso ποτὶ τὴν αἰτῆν.

Genera: Dioscoridi l. c. alia sativa & hortenſis: alia montana & sylvestris: & hac eidem duplex: sic ait, ita montana & sylvestris sativa & hortenſis acrior est, & in cibis damnata: est autem in hortenſi genere esui aptior, quæ juxta ficus provenit: sylvestris sativa quodammodo similis est: & cap. 33. Vocant etiamnum sylvestrem autem, quod in Cappadocia & Galatia Asiatica, Moly dicitur. Frutex foliis longioribus flore candido, &c. Sunt rutam hanc Harmala vocent, Syri Belsa, Cappadoces Moly, &c. Theophrasto, Ruta caudice uno constat & arboris quasi naturam adipiscitur: & 2. hist. 1. ex palmitibus exit & avulsione: & 7. hist. 4. plura sunt ejus genera: & 1. hist. 6. sylvestris aspectu vicina urbana est, præterquam foliis minoribus, &c. & 1. hist. 16. Rutula folia carnosa habet caro in latitudinem descenditur, non in rotunditatem: item crassatur. Plinio lib. 20. cap. 13. Sativa folia latiora, & fruticosiores: sylvestris horrida ad effectum est & ad omnia acrior, &c. addit Pythagoram, in hac marem, minus herbaceisq; coloris foliis, à fœmina discevisse: eam latioribus foliis & colore.

## I. Ruta

I. *Ruta hortensis latifolia.*

Ruta, Brunf. Matth. Ang. Frac. Tur. Lac. Cef. Cast.

Ruta domestica, Trag. hortensis, Fuch. Dod. gal.

Gef. hor. Lob. Cam. Gerar.

Ruta sativa, Cord. in Dioscor. Lugd. major, Gef. hor.

Ruta major &amp; hortensis, Ad.

Ruta graveolens hortensis, Dod.

Ruta latifolia, Tab.

Hæc in hortis ita colitur, ut sæpè tres, etiam quatuor cubitos superet: hanc arbusculæ similem cultura evasisse in horto Stutgardiano observavimus.

II. *Ruta hortensis altera.*

Ruta hortensis minor, Trago.

Ruta sativa tenuifolia, Cord. in hist.

Ruta hortensis nobilitate præstans, Gef. hor.

Ruta tenuifolia, Tab.

Ruta sylvestris graveolens, Ger. ico.

Illà vulgarior est & per omnia major & cæsi coloris: hæc verò minor, præstantior & nigricantior.

III. *Ruta sylvestris major.*

Ruta syl. Matth. Dod. gal. Ad. Lon. Lugd.

Ruta syl. prima, Lac. Cast. graveolens, Dod.

Ruta sylvestris majoribus foliis, Gef. hor.

Ruta montana, Tab. Ger. syl. montana, Lob.

IV. *Ruta sylvestris minor.*

Ruta sylvestris minoribus foliis, Gef. hor.

Peganion Narbonensium sive Rutula, Ad.

Ruta sylvestris, Dalechampsio in Diosc. Lob. Lugd.

Cam. epit. qui priori adjungit

Ruta sylvestris minima, Dod. Ger.

Ruta montana &amp; sylvestris, Clus. hisp. &amp; hist.

Ruta syl. tenuifolia, Cam. syl. minor, Tab.

Ruta montana legitima, Clus. ap. alt. lib. 2. figuram

exhibet, priorè minus elegantè &amp; spuriam dicens

Huc referenda

Ruta syl. Cretica, Clus. hist. quæ priorè vegetior & magis luxuriat, quia in culto loco nata, foliis valde leniter incisus, & gravis odoris.

V. *Ruta sylvestris flore magno albo.*

Ruta sylvestris, Ang. Cord. in Diosc. Gef. hor.

Ruta syl. Harmala, Matth. Clus. hist. Lugd.

Ruta sylvestris 2. Cast. Camer.

Harmel, Gef. hor. Constantinopolitanum, Czf.


Harmala, Dod. Clus. hisp. Tab. Czf.

Harmala Syriaca, Ad. Lobel.

Huc referri debet

Ruta triangulo pericarpio, Ad.

## THALICTRUM sive RUTA Pratensis.

 Ἀλκίτρον folia Coriandri habet at pinguiora: cauliculum rute crassitudine, in quo folia, Dioscoridi lib. 4. cap. 98. Sic dictum fortè à δάκνο vireo, eò quòd dum germina protrudis eleganter vireat. Pbellandrium Plinii aliqui suspicantur.

I. *Thalicttrum majus siliqua angulosa aut striata.*

Thalicttrum, Cord. in Dioscor. nigrum, Eid. hist.

Thal.

Piganum, Dod. gal. Lugd.

Ruta pratensis, Gef. hor. herbariorum, Ad. Lob.

Saxifraga lutea, Gef. hort.

Barba caprina minor, Gef. hort.

Thalicttrum quorundam, Gef. hort.

Thalicttrum secundum sive Germanicum latifolium, Cam.

Thalicttrum magnum, nonnullis Pseudorhabarbarum, ob radicis luteum colorem, Dod.

Thalicttrum pratense 1. vel 5. Clus. pan. &amp; hist.

Ruta sylvestris, Czf.

Florum muscosa stamina è pallido candicante rarius purpureascent: hinc

Thalicttrum fl. incarnato, &amp;

Thalicttrum fl. albo, Eyft.

II. *Thalicttrum majus non striatum.*

Thalicttrum magnum secundum, Dod.

Ruta pratensis major 2. Tab.

III. *Thalicttrum majus flavum staminibus luteis, vel glauco folio.*

an Pes Milvi, Anguil.

Thalicttrum majus tertium, Dod.

Thalicttrum 1. vel Hispanicum, Clus. pan. &amp; hist.

Thalicttrum 1. Italicum, Cam.

Thalicttrum in Hetruria vulgo Verdemarcum Czf. alp.

Ruta pratensis major quarta, Tab.

Thaliectrum sive Thaliectrum majus, Ger.

IV. Thaliectrum majus florum staminibus purpurascens.

Thaliectrum majus quartum, Dod.

Thaliectrum 4. vel montanum 3. Clus. pan. & hist.

Thaliectrum quintum flore purpureo, Cam.

Ruta pratensis major 3. Tab.

Florum stamina dilutam violæ nigræ purpuram referunt.

V. Thaliectrum montanum album.

Thaliectrum 2. & 3. vel montanum 1. & 2. Clus. pan. & hist.

Thaliectrum sextum flore albo, Camer.

Duplex est, unum altius excrefcit, flore candido admodum gravis odoris : alterum flore albo etiam, sed paulo humilior, minus ingrati odoris.

VI. Thaliectrum pratense angustifolium.

Thaliectrum pratense 2. vel 6. Clus. pan. & hist.

Thaliectrum 3. angustifolium, Cam.

Ruta pratensis major 5. Tab.

VII. Thaliectrum pratense angustissimo folio : quod 1. in Prodomo.

IX. Thaliectrum minus.

Hypecoum forte, Dod. gal. Lugd.

Ruta pratensis tenuifolia, Ad.

Thaliectrum tenuifolium, Cord. hist. Lob.

Thaliectrum minus, Dod. Ger. parvum, Cam.

Thaliectrum septimum, Clus. pan. & hist.

Ruta sylvestris altera, Cæalp.

Ruta pratensis minor, Tab.

Stamina florum quandoq; pallidi coloris sunt, quandoq; ex luteo languescunt, & è violaceo purpurascunt.

IX. Thaliectrum minimum foetidissimum & quod 2. in Prodomo.

Simile, sed caule ex puniceo colore purpurascens Thaliectri maritimi nomine, D. Gillenius misit.

## SECTIO TERTIA.

### DE LEGUMINIBUS CAPREOLIS Donatis,

**L**EGUMINA dicta putat Varro à legendo, quoniam ea non secantur, sed vellendo leguntur. Græci *ταρεα* vocant, at Theophrastus *κατάσπονδα*.

**FABA; SMILAX HORTENSIS, sive DOLICHOS, sive PHASEOLUS; PISUM; OCHRUS, sive ERVILIA; LATHYRUS, sive Cicercula; Vicia & Aphaca; Arachis sive Cracca; Arachidna, & Lentesc.**

#### FABA.

**A**cturi de Leguminibus, primo de FABA sermo erit, quia inter legumina maximus bonus faba: quippe ex qua tentatus etiam sit panis, cujus farina Lomentum appellatur, ut Plinius l. 8. c. 12. loquitur: ita hodie ejus farinam quidam Secale miscent, & panem faciunt solidum ac multi nutrimenti: Sic & Phrisi etiam hodie magna ex parte fabarum farinâ, bordei farinâ aut avenæ admixta, panes faciunt.

Græci *βίβη* à feracitate dicta: vel *κατάσπονδα* ut Eustachius vult: quemadmodum *κατάσπονδα* locus fabis constitus, seu fabetum apud Theophrastum 4. hist. 10. Fabulum Gellio & Festo.

Duplex Dioscoridi lib. 2. cap. 127. & 128. altera *κατάσπονδα* altera *αγρια*: illa Græca, quæ eadem cum vulgari videtur & ad differentiam Aegyptiacæ Græca dicta: hæc Aegyptia nominata. At Theophrastus 7. hist. 3. de communi faba egit, quemadmodum de Græca 4. hist. 2. & de Aegyptia, 4. ejusdem 10. Plinius Faba communis descripti nem sparsim lib. 18. cap. 7. exhibuit, eam feri, aut salia habere multiplicia rotunda, ut & magna leguminum pars solam ex leguminibus unicantem esse (inter legumina sola potissimum erecta caule constat Theophr. 8. hist. 3.) quadraginta diebus florere & alternis lateribus silvari: at lib. 18. cap. 12. nasci tamen & sua sponte plerumq; in locis sicut Septentrionali Oceani Insula, quas ob id Fabarias (idem Plinius 4. hist. 13.)

Vu appi-

appellari: item in Mauritania passim sylvestrem esse: meminit & Aegyptia spinosa caule folio amplo, capite papaveri simile, colore roseo, &c.

I. Faba, Brunf. Matth. Ang. Fuch. Tur. Cord. in Dioscor. Gein. hort. Lac. Lon. Cast. Cam. sativa, Lugd.

Faba vulgaris, Trag. Fuch. Cord. hist.

Phaselus sativus, Dod. gal. qui secutus Ericinum Cordum, Fabam esse negat.

Bcona sive Phaselus major, Dod.

Faba major vulgaris, Ad.

Faba major recentiorum, Lob. hortensis, Ger.

Variat flore & fructu: floribus colore, qui vel ex purpura nigrescit: vel candidus, situris nigris conspicuus, quas literas lugubres dicunt, ideo aliqui iis non vescuntur: & harum usus à Pythagora prohibitus, vel quia animæ mortuorum in ea sint: vel quia existimant sensus hebetare & incomnia facere. Fructus magnitudine, figura & colore differunt: sunt magnæ & inter legumina maximæ censentur, & quo majores eo magis in longitudinem depressæ: sunt minores quæ rotundiores: in qualibet siliqua ut plurimum ternæ, ad summum quinæ. Colore plurimum candidæ, vel in candido pallentes, ex rubicundo colore purpurascens, nigræ aut in nigro purpurascens: & has Fabas nigras vocat, majores & minores facit, Cord. hist.

Fabæ duorum aut trium generum in insula Madagascar reperiuntur: par. 4. Ind. or. cap. 1. Sic in Guinea varii generis, in primis aliqua delicatæ & molles: par. 6. Ind. or. cap. 12. varia quoque genera in Anabonæ: par. 8. Ind. or.

II. Faba minor sive equina.

Bcona sive Phaselus minor, Dod.

Faba minor, Ad. Lugd.

Fructus est teretis quodammodo figuræ, ac in rotunditate oblongus, colore subalbicans aut subflavus, alias nigro, umbilicum superne parvum ac nigrum habens: medium quoddam genus inter majorem ac sylvestrem fabam: majoribus enim, minor & rotundior, sylvestribus vero major ac longior. Ex hac apud zelandos & finitimos panes fabaceos veterinis dant, & hæc in eorum (hinc Bconam equinam vocant) jumentorumque pabulum fertur, Dodon. At Sebustiani rustici non alio pane vescuntur, quam confecto ex paululo tritici, secale & rotunda minutataque faba, Lugdun.

III. Faba sylvestris fructu rotundo atro.

Faba sylvestris, Matth. Ad. Castor. Lugd. Tabern. Cam.

Phaselus syl. & niger, Dod. gal. (quæ forte Faba est) Gesl. hor. (cui Phaselus forte veterum) Lugd.

Bcona sylvestris, Dod.

Faba Græcorum sylvestris, Lob.

Pisâ nigra, Camer.

Aracus, Fuch. sili vulgo Vitia Romana, Cam.

Cucophicos Cretentium nomine semen ex Creta, ab Honorio Belli accepimus, quod ex deciduo semine facile regerminat.

IV. Faba Indica purgatrix.

Faba purgatrix, Monard. Frag. Lugd. quoad descriptionem.

Phaselus Pernanus, Petri de Osma ad Monardem.

Fructus peregrinus undecimus, sive Phaselolus colore Macounæ similis, Clus. exot. l. 2. c. 30.

V. Faba purgatrix latissima ex insula D. Thomæ.

Phaselolus major, Clus. ad Monard.

Cor Divi Thomæ, à forma & quod in insula D. Thomæ nascatur, Eid.

Lobus crassus ex insula S. Thomæ, Clus. ex. l. 3. c. 4.

Phaselolus novi orbis, Lob.

Phaselolus Americanus purgans, Tab. Ger.

Faba purgatrix, Lugd. ico.

VI. Faba Indica prælonga.

Fructus it. peregrinus, vel Phaselolus ex spadicæo nigricans, Clus. exot. l. 2. c. 30.

Fructus peregrinus it. tab. 3. Lugd. Tab. Ger.

VII. Faba arborecens: hujus differentias in Prodromo proposuimus, quas Fabæ arborecens Anglicæ nomine Amstelrodamo à D. Jacobo Guilelmi Hooft accepimus.

1. Faba arborecens rusâ, sinu ad basin semicirculari uncias quatuor longa, tres lata.

2. Faba arborecens media, umbilico semicirculari, cortice nigro striato.

3. Faba arborecens minor umbilico oblongo, cortice nigro, an Faba arborecens Filemanni, Clus. exot. lib. 3. cap. 6.

4. Faba arborecens umbilico oblongo spadicæo cortice.

an Phaselolus peregrinus primus, Clus. exot. lib. 3. cap.

esp. 7. qui & secundum priore minorem exhibet.

5. Faba arborescens scapulæ os referens, spadiceo cortice.

6. Faba arborescens unguis magnitudine nigro cortice.

an Phaseolus peregrinus quintus, Clus.

II X. Fabæ Brasiliæ.

Fabæ genus pollicis crassitudine à Barbaris Com-manda-oualou appellata: Leriio descr. Brasil. c. 12.

Habent & alias fabas crassas & minutas: par. 3. Amer. ep. alt. de Brasil.

## SMILAX HORTENSIS sive DOLICHUS, sive Phaseolus.

**S**milax  $\epsilon\chi\pi\alpha\iota\alpha$  foliis est hedera sed mollioribus, canticulus claviculæ instar propinquè fruticibus sese im-plicans, ut operi topiario inserviat, cuius fructus  $\lambda\acute{o}\varsigma\iota\alpha$  (quasi siliquulas dicas) semina continet renibus si-milia, non aequali colore, sed ex parte rufescentia, &c. Dioscoridi lib. 2. cap. 176. Hec ab Hippocrate, Diole, Theophr. & plerique, aliis *Dolichus* vocatur: à nonnullis à siliquarum magnitudine  $\delta\epsilon\lambda\phi$  &  $\lambda\acute{o}\varsigma\iota\alpha$ : ab aliis  $\epsilon\alpha\pi\alpha\lambda\epsilon\tau\epsilon$  (à  $\phi\alpha\sigma\iota\alpha$  ut aliqui volunt differens) Galeno 1. aliment. scribente. Dolichus Theophr. 8. hist. 3. Et Aëtius Smilacem hortensem Dolichos esse & Phaseoli genus, & ab omnibus Lobos nominari, aperte docet.  $\phi\alpha\epsilon\iota$   $\lambda\phi$  apud Dioscoridem lib. 2. cap. 130. sed sine ullis notis habetur. Sunt tamen qui Smilacem hortensem à Phaseoli solum sili-quæ & semine differre censeant, quæ in Smilace majora sint, ut Matthioli voluit, qui pro Phaseolo & pro Smilace hortenfi eandem pingere videtur, nisi quod pictura una recta, altera inflexa est: At Anguillara, phaseolum & phase-lum non distinguit: auctor hist. Lugdun. asserit Galeno vocem Phaseolum quatuor syllabis prolata, à Phaseolo tribus syllabis pronunciato, diversam esse, & de hoc cum Erviliis simul tractasse. Plinius lib. 18. cap. 7. Phaseolus folia venosa trahit.

Duplicem facimus, vulgarem alium, alium peregrinum: vulgarem, alium majorem, fructu longiore & renis formam melius referente, qui communiter candidus: alium minorem siliqua angustiore: distant etiam crassitie & tenuitate. Hic variat floribus & seminis colore: flores plerumque candidi, pallidi, flavescentes, purpura-scentes sive amethystini, & ut Cordus in sua historia censuit, floribus colorem fructus sequuntur. Verum in semine fructuque major est coloris varietas, sunt nivei, flavi, ex flavo obsoleti, purpurei, rubri, latericei fere coloris, amethysti-ni, violaces, atrovioleti, nigri, initio purpurei deinde atrii: vel albi nigri venis & lituræ distincti: item carnei & cinerei similibus venis insignes: item albi purpurascens, orbibus albis variegati, vel spadicei nigri maculis asper-si: nonnulli incani, atro colore, vel ab una parte, vel utringue, notati.

*Smilax hortenensis sive Phaseolus  
vulgaris.*

I. *Smilax hortenensis sive Phaseolus major.*

Phaseolus, Brunfel.

Phaseolus, Dodon. gal. Camer. vulgaris (vel Faba Turcica multicolor) Adv. Lob. Clus. pan. & hist. albus, Ger.

Smilax hortenensis, Brunfel. quoad descript. Trag. (cui & Siliqua Theophr.) Matth. (& Phaseolus hortenensis) Fuch. Tur. Lac. Cord. in Diosc. Get. hor. Lugd. Taber. (qui, ut & Gerardus, fructus duode-cim generum pingit) Camer.

Smilax sativa sive lenis, vel Dolichus, Cord. hist.

Dolichos Theophrasti, Anguil.

Dolichus (sive Phaseolus) Dod. Lon.

Phaseoli genus peregrinum, quos Phaseolos Tur-cicos vocant, Cæf.

II. *Smilax hortenensis minor.*

Dolichus alter, an Phaseolus minor sive Alexan-drinus Tralliani, Dod.

an Phaseolus, Turn.

Sola magnitudine à priori differt.

III. *Smilax siliqua sursum rigente: vel*

Phaseolus parvus Italicus.

Phaseolus, Marth. albus, Lugd.

Phaseolus, Phaseolus, Ang. Cord. in Diosc. & hist.

Phaseolus, Cæfalp.

Flore est majore candido papilloni simili, foris in viridi colore pallefcens: foliis nullam asperitatem habentibus: sunt majores & minores: sunt albi, subnigri, illi macula nigra, hi alba notati: est & minor albidus, cum orbita rubente aut nigricante.

*Phaseolus peregrinus.*

Non minor sanè varietas est in Phaseolis ex America, Africa atque aliis regionibus, pro-

Vu 2 cul

cul ab orbe nostro remotis, quàm in his quæ in Europa nascuntur: Sunt enim majores, minores, mira colorum varietate inter se discreti. Illorum nonnulli, aut prorsus candidi, aut flavi, aut cinericei, aut fusci, aut atrii, aut rubri, aut amethystini, aut variis coloribus non uno modo distincti: interdum albo & nigro, rubro & nigro, flavo & nigro: sic alius ex flavo & spadiceo simul mixti coloris, at circa hilum candidus: alius roseus, in quo rubri nonnihil elucet, &c.

I. Phaseolus peregrinus hortenſi affinis, semine lato albo, multis nigris venis striato.

Phaseolus 1. sive Africanus, Clus. pan.

Phaseoli peregrini primi genus alterum, Clus. list.

Phaseoli magni lati albi, Lob. ico.

Phaseolus Africanus, Cam.

an Okindiger in Virginea, s. his Anglicanis similes, planiores tamen & diversorum colorum, nitida & maculosa: in desc. Virgin.

Okindiger in Virginea, par. 1. Ind. occid.

Ex Africa primum allatus.

Variat: ex nigro varius, prorsus niger, coloris regularum, striis per longitudinem nigris.

II. Phaseolus peregrinus primo similis, fructu lato, albo striato.

Phaseolus peregrinus 9. Clus. hist.

III. Phaseolus peregrinus hortenſi affinis, fructu tumidiore minore niveo.

Phaseolus peregrinus 2. sive Phaseolus de Guatimela, Clus. pan. (at icon habetur sub Phaseolo Purkircheriano 2.) & hist.

an Phaseoli parvi pallido albi ex America delati, Lob. ico.

IV. Phaseolus peregrinus Anagyridis fructui similis, ex nigro subvireicens.

Phaseolus Ægyptiacus 5. Clus. pan. descr. at figura habetur sub 3.

Phaseolus peregrinus 5. Clus. hist.

Phaseolus Ægyptiacus, Tab. Gerar. desc.

an Dolichus, Bellonio.

V. Phaseolus peregrinus Anagyridis fructui similis colore rubescente.

Phaseolus peregrinus 3. qui cum sequenti Lobi Indici nomine ex Hispania missus, Clus. pan. quoad descriptionem: & hist.

VI. Phaseolus peregrinus minore fructu, albo nigra macula insignito.

Phaseolus peregrinus 4. Alubias de Indias, Clus.

pan. quoad descriptionem: & hist.

Phaseolus albus, Lugd.

Phaseoli pumilioes, albi & nigri, Cam.

Variat colore: est alius niveus nigra macula notatus: alius in lateribus nigris maculis signatus.

VII. Phaseolus peregrinus angustifolius: an idem cum Smilace hortenſi minore.

Phaseolus peregrinus, Dod. sextus, Clus. hist.

Fructu est vulgari minore & planiore, coloris subrubri: ex Hispania Frizoles Guateli nomine missus.

IX. Phaseolus peregrinus angustifolius alter, fructu ex albo & nigro vario.

Phaseolus peregrinus septimus, Clus. hist.

Variat: nam in fructu striæ, nunc in longitudinem extenduntur: nunc maculæ nigræ majores vel minores, confuso ordine, asperæ: vel exiguæ albæ maculæ in lobo, vel solum in parte media conspiciuntur.

IX. Phaseolus peregrinus foliis minoribus, fructu exalbido, nonnunquam variegato.

Phaseolus peregrinus octavus, Clus. hist.

Fructus, colore est exalbido: aliquando nigricantibus virgulis secundum longitudinem, vel confusè notatur: interdum totus penè nigricat.

X. Phaseolus peregrinus lobo & fructu nigro.

Phaseolus peregrinus 10. Clus. hist.

XI. Phaseolus peregrinus fructu variegato.

Phaseolus peregrinus 11. Clus. hist.

Fructus planus dilutè rubens, nigris venis per longitudinem excurrentibus: aliquando maculæ magnæ vel exiguæ confusè asperguntur: interdum altera solum parte nigricat, parvis rubris maculis variegatus.

XII. Phaseolus peregrinus fructu subrubente nigris striis variegato alter.

Phaseolus peregrinus 12. Clus. hist.

Aliquando plurimæ striæ totum fere arum reddunt.

XIII. Phaseolus peregrinus exalbido cui columbini fere figura, fuliginosa macula insignitus.

Phaseolus tertius peregrinus, Clus. exot. 1. 3. c. 7.

XIV. Phaseolus peregrinus niger macula subalba notatus.

Phaseolus quartus peregrinus, Clus. exot. 1. c.

Phaseolus Æthiopicus vel niger.

L. Phaseolus Æthiopicus lobis nigris venis spersus, fructu atro splendente.

Phaseo-

*Phaeolus peregrinus* 13. vel *Æthiopicus*, Cl. hist.

I. *Phaeolus Æthiopicus* lobis flavescentibus fructu nigro.

*Phaeolus peregrinus* 14. Cl. hist.

III. *Phaeolus Æthiopicus* lobo saturo purpureo, fructu atro.

*Phaeolus peregrinus* 15. Cl. hist.

*Phaeolus Guinensis*.

I. *Phaeolus Guinensis* fructu fusco spadiceo.

*Phaeolus peregrinus* 16. Cl. hist.

Sunt majores, sunt & minores.

II. *Phaeolus Guinensis* lobo cortice nigro tecto & in cuspidem longam & acuminatam desinente.

*Phaeolus peregrinus* Nigritarum, Cl. exot. l. 2. c. 11.

III. *Phaeolus Guinensis* lobo ex fusco cinereo fructu nigro.

*Phaeolus Nigritarum* 2. Cl. hist. l. c.

IV. *Phaeolus Guinensis* lobo ex fusco cinereo, fructu spadiceo superiore majore.

*Phaeolus Nigritarum* 3. Cl. exot. l. c.

V. *Phaeolus Guinensis* filiqua ulnæ lōgitudine.

Fabæ magnæ in filiquis, quarum aliæ ex arboribus pendendæ ulnæ unius longitudinem & palmi latitudinem, partim verticillores ex rubro & nigro, quales Turcicæ vocatæ, sed majores: partim albæ & rotundæ, quarum singulæ suis filiquis insunt, veluti Ciceres: par. 2. Ind. or. c. 4.

*Phaeolus Aegyptiacus* sive *Lablab*.

I. *Phaeolus Aegyptiacus* nigro semine.

*Phaeoli* genus *Leplap* sive *Lablab*, Cl. pan.

*Phaeolus peregrinus* *Leplab*, Cl. hist.

*Phaeolus niger* *Lablab* vocatus, Alpin.

Est & niger & spadiceus. hilo albo.

II. *Phaeolus Aegyptiacus* semine rufo.

*Lablab* alterum rufum Alpin, Cl. hist.

*Phaeolus Indicus*.

I. *Phaeolus Indicus* major bicolor.

*Phaeolus peregrinus* *Indicus*, Cl. pan. & hist.

*Phaeolus* 5. sive *Aegyptiacus*, Cl. pan. icon.

*Phaeolus Aegyptiacus*, Tab. Ger. icon.

Fructus est nucæ ponticæ paulo minor, parte superiore niger, inferiore aureus.

II. *Phaeolus Indicus* minor: est rubens, variegatus, fuscus, macularus.

III. *Phaeolus Indicus* minor, alter.

Mates, Cl. in Garz. & pan.

*Phaeolus Indicus* alter, Mates, Cl. hist.

Fructus peregrinus 10. Cl. exot. l. 2. c. 30.

Fructus est purpureo, aut albis purpureisq; maculis distincto.

IV. *Phaeolus Indicus* ruber.

*Phaeoli* rubri *Indiani* durissimi, Lob. icon.

Est ruber, ex phæniceo croceus, ex rubro spadiceus splendens.

V. *Phaeolus Peruvianus* ruber subrotundus.

*Phaeoli* peregrini variorum generum, Cl. exot.

l. 2. cap. 3.

Hujus differentia aliquot: alius major, coloris ex atro rubentis, quæ parte lobo adhæretat longiore vestigio nigro præditus: alter minor, satis crassus, coloris rubri corallii æmuli: vel alter forma similis, coloris magis saturo & ad puniceum quodammodo vergente: tertius elegantissimus magis orbicularis, qui major & minor, color in utroque bifariam divisus, media ex parte corallii instar rubet, altera ater, lævis & splendens est: & hic *Anacok* dicitur.

VI. *Phaeolus peregr.* ex rubro & nigro distinctus *Anacok*, Cl. exot. l. 2. c. 11. & l. 3. c. 13. (Ætus.

VII. *Phaeolus peregrinus* bifidus duplex: alter orbicularis cineracei coloris, tenui atra membrana: alter durus nigricans, tenui membrana albatactus.

*Phaeoli* alii peregrini, Cl. exot. l. 3. c. 14. qui & tertium addit. lævem, spadiceum, durum & solidum, Capotillo del Aldana nomine missum.

IX. *Phaeolus Indicus* ovatus: hic varius est colore: est niger, spadiceus umbilico albo, eoque majore vel brevior: sanguineus, hilo nigro.

IX. *Phaeolus orbicularis* niger *Americanus*. *Parapar*, Cl. exot. l. 2. c. 21.

*Phaeolus Americanus*, vel *Brasilianus*.

I. *Phaeolus Brasilianus* foliis molli lanugine obfritis, fructu magno.

*Phaeolus Brasilianus* *Macouna* dictus, Cl. ad Monard.

*Phaeolus Brasilianus*, Lob. C. Ger. tertius, Tab.

*Phaeolo* *Nigritarum* similis ex *Pernambuco* *Americæ*, spadicei coloris *Macouna* appellatione insignitus, Cl. exot. l. 2. c. 6.

Et hic variat colore fructus: alius rufescit, alius dilutioris coloris, alius totus niger, alius punctat. Similes ex cinereo candidæ ex *Africæ* *Mauritania* adferunt, quo solo à *Brasiliano* differunt, Cl. Lug.

II. *Phaeolus Brasilianus* alter fructu nigro pisi magnitudine.

*Phaeol* Brasilian. alter, Cl. ad Monard. Lob. Tab.

Phaeolus alter Indicus, Lugd.

III. Phaeolus Brasiliensis vulgari similis, sed major & latior.

Phaeolus genus è Brasilia, novi orbis provincia, Clus. ad Monardem.

Hic modo flavus, modo omnino niveus, modo dilutior colore, modo ater, aut purpureus, aut albis purpureisq; maculis distinctus.

IV. Phaeolus Brasiliensis spadicci coloris & circa hilum fusci candicans.

Phaeolus Brasiliensis, Clus. exot. l. 3. c. 12.

V. Phaeolus Brasiliensis minor.

Phaeoli parvi ex America, Lob. Lugd.

Phaeolus Brasiliensis primus, Taber.

Hujus magna varietas, quare fructus duodecim genera, Tabern. & Gerardus pingunt.

VI. Siliquulam angustam, vix uncialem, cui grana aliquot exigua, subviridia, cum hillo albo in medio, ut in Phaeolis, ex India cum quibusdam aliis, Reverendus D. Terentius cum sequenti inscriptione misit: Siliquula, ut & semen huic chartula involuta, est herbæ Anil, nec est species Glasti, sed legumen.

## P I S U M.

**P**isum, Græci è πῖσος & πῖνον vocatur, quod à πῖσος derivatum videtur, quod decorticare significat: pleriq; etiam λανθον dici putant, sed improprie: nam ex farina leguminum pulmentariam, λανθον dicitur Græci, Galenus in lib. de cibis boni & mali succi testatur. Pisum verò, à Pīsa, loco in quo olim copiosissima nascebatur, nominatum dicunt. Hujus Dioscorides non meminit, nisi forte cum Phaeolis comprehenderit: at Hippocrates, Theophrastus, Galenus, Aeginetæ. Nam Theophr. 8. hist. 3. leguminum alia solum habent rotundum, ut Fabæ: alia oblongius ut Pisum, & hoc caulem humi procumbentem habet: & 8. hist. 5. femina siliquis inclusa, non intersepta, sed quasi invicem contingentia, consistunt: & 3. caus. 27. vermes in ipso generantur, ob alimentum calidius, temperiem, cum plus minusve alimenti præbetur, aut aer immodicè humidus siccus ve est, vel etiam cum non temperativè humefcit. Plinius l. 18. c. 7. & 12. Pisi obiter meminit.

Genera duo sunt: est majus & minus: majoris semina resiccata & angulosa sunt, inaequales angulos habentia, colore alias candido, alias sordido: Minus similiter duplex, aliud quod in hortu seritur, quod si pedamentis sustentetur, majus est, alias exiguum fructum cumq; serius reddit: & illud est quod in agris seritur: flores habet ut plurimum candidos, aliquando tamen ex purpurea obscuris, fructus colore ut plurimum luteo (unde αἰγός Græci, à λυτο οχρα colore, quem ipsius fructus medulla interior refert, dicitur) subinde virenti.

I. Pisum majus quadratum,

Phaeoli primum genus, Trago,

Pisum prima species, Dodon. gal.

Pisum majus, Dodon. Gerard.

Pisum angulosum hortorum quadratum Plinii, Ad.

Pisum quadratum Plinii, Lob. icon, Taber.

Pisa Italica grandia, Camer,

Pisum magnum peregrinum, Eysf.

Fructus dum virent, rotundi sunt: exsiccati angulosi & cinerei sunt: imò & candida & subflava, Lugd.

II. Pisum umbellatum: & Gerar.

Pisum primum genus, Trag.

Pisum prolesum, Taber.

III. Pisum hortense majus.

Cicer arictinum & Pisum alterum genus, Trag. Dod. gal.

Pisum majus, Matth. Fuch, Ang. Lon. Cast.

Pisum minus, Dodon.

Pisum vulgatius majus, Ad. Lob. icon.

Pisum ramulare, Lugdun.

Piseolus vulgo, q & Piseoli viridis meminit, Cels.

Flore est purpurea, aliquando albo & vario, partim albo & partim ex purpura obicuro, Fructu est rotundo albo: est & rufus, aliquando rubro variegato.

Pisa quoq; alba in Brasilia habentur, quæ Com-manda-miri nuncupant: Ler. descr. Bras. 12.

IV. Pisa Virginiana.

Wikonzów, nos Pisa appellamus, sapore & bonitate Anglicana superant: def. Virgin.

V. Pisa Virginiana sylvestria.

Pisa syl. Anglicanis minora, esui apta: descr. Virg.

VI. Pitum arvense.

Pisum, Brunf. Dod. gal. Turn.

Pisum agreste, seu 3. genus, Trag.

Pisum 3. species & minor quæ & Ervilia, Dod. (gal.)

Pisum minus, Matth. Lon. Dod. Cast.

Pisum minus ex luteo virefcens, Ad. Lob.

Pisum in arvis humi serpens, Lugd.

Ervilia sive Ochrus, Eid.

Pisa vulgaria, Camer.

Pisum minus 1. & 2. Tab,

Flore



Flore est candido, vel diluti rosei coloris: fructu rotundo, albo, viridi, ex luteo yirente, cinericeo, cæruleo: nigra habet Gesnerus, quæ sapore, odore à communibus nil differunt, quæ Pīsa nigra Tabern. nominat.

VII. Pīsa sine cortice durior.

Pīsa leptoloba, quæ simul cum folliculis comeduntur, Camer.

IX. Pīsum exoticum ochræ colore.

Pīsum ochræ colore, Clus. exot. l. 3. c. 15.

IX. Pīsum sylvestre perenne.

Pīsum sylvestre, Ad. Clus. pan. & hist. Thal. Tab. (qui majus & minus pingit) Ger.

Pīsum sylvestre Pannonicum, Cam.

Phaseolus sylvestris, Lugd.

X. Pīsum vesicarium fructu nigro, alba macula notato.

Vesicaria nigra sive peregrina, Trag. Dod. gal.

Vesicaria sive Halicacabum repens, Matth.

Halicacabum peregrinum, Fuch. Dod. Ges. hor.

Lugd. qui & Fuchii & Matthioli figuram exhibet. Tab. (& Cardispermum) Cam. Ger.

Dorycnium & granum cordis, Cord. in Diosc. & hist.

Solanum peregrinum, Lac.

Caput monachi, Ges. hor. & collect.

Pīsum cordatum, Ad. & cor Indum, Lob. Eyf.

Faba inversa recentiorum, Cæf.

Vesicaria altera, Cast.

*Pīsum Indicum.*

I. Pīsum Indicum majus.

Variat fructus colore nigro, subfusco, variegato, umbilico eminente.

II. Pīsum Indicum minus coccineum.

Pīsa rubra ex novo orbe, Ges. hor.

Pīsum coccineum Americum, Lob.

Pīsum Americum, Lugd.

Phaseolus ruber Abrus vocatus, Alpin.

Phaseolus ex leme, Hon. Belli epist. 5. ad Clus.

Phaseolus Indicus, vulgò falsò Pæonia Indica:

nomine Ginge & Abrus mittitur, Camer.

an Sandali rubri semina, Cæf.

Vicia Africana, Clus. exot. l. 4. c. 15.

Fabrum genus quod Ægyptiis Abrus, par. 2. Ind. or. cap. 4.

Et hic major coccineus compressus: & minor coccineus nigra macula notatus, reperitur.

III. Pīsum virulentum Chinesè.

Fabrum genus quod Abrus Latinis, Conduri Malays, Saga Javanis, quibus pro solis ponderibus utuntur, Linscot. par. 4. Ind. or. cap. 8. & par. 3.

cap. 29.

Sic Fabis rubris & nigris pro pōderibus in Guinea utuntur: par. 2. Ind. or. c. 18.

## OCHRUS sive ERVILIA.

**Q**ua Theophrasto 4. caus. plant. 2. §. 8. & à luteo Ochra colore quem medulla referat nominatur, & Gaza Cicera reddit, Plinio l. 18. c. 7. & alii Latinis Ervilia dicitur.

Duplex est, Sativa, qua Pīsum est minus, & Sylvestris, de qua nunc.

Ochrus folio integro capreolos emittente.

Aracus, Matth. (cui & Aracus niger) Cast. (ad-

data Aphace figura) Cam.

Ervilia, Ang. sylvestris, Dod. ut.

Ochrus syl. sive Ervilia, Ad. Lob.

Cicer ervinum quorundam, Lugd.

Isopyron, Cælalp.

Papulles Creticæ nomine, semen ab Honorio Belli missum: facile germinat. Semina colore

sunt subluteo, alii pullo, etiam atro observantur.

## LATHYRUS sive CICERCULA.

**L**egumen quod Græci Αδύρα appellanti à Columella & Palladio Cicercula dicitur, de quo Theophrast. 8. hist. plantar. has in probl. Rom. scribit Pythagoricos averfatos esse fabas & τὸν Αδύρον, & τὸν ἐπὶ Κυρῶν, u. ἡ ἀπο-  
δύρεται τὸ ἄπῳς & τὸ ἴδιον, ad etymon alludens. Verū Αδύρος herba ab hac diversa est, de qua inter Tithymalos.

Duplex est: nam vel seritur vel sponte provenit: Et in sylvestri differentia magna est, in foliorum latitudine & angustia: florum colore rubro, purpurascens, albo, flavescens: siliquarum longitudine, brevitate, hirsutie, & levitate.

I. Lathyrus sativus flore fructuq; albo.

Pīsum Græcorum sativum, Trago.

Ervium album Sativum, Fuch.

Lathyrus, Cicercula, Dod. gal.

Phaseolus minor, aliquibus Ervum angulosum,

Cord. in Diosc.

Ervum, Lacun.

Cicercula, Ang. Lon. Cæf. Castor.

Aracus

Aracus alter five Lathyrus minor, Dod.  
 Lathyrus angustiore gramineo folio, Ad.Lob.  
 Lathyrus leguminosa angustifolia, Tab.  
 Lathyrus sativus angustifolius, Lugd.  
 Lathyrus alter flore albo, Camer.

II. Lathyrus sativus flore purpureo.

Aracus five Cicera, Dodon.

Lathyrus flore purpureo, Cam.

Flores habet ex rubra purpura in puniceū incli-  
 nantes: grana angulosa, alia obsoleta, nigroq; pro-  
 xima.

III. Lathyrus sylvestris major.

Pisum Græcorum syl. Trag.

Ervum sylvestre, Fuchf.

Cicerula, Turner.

Lathyrus sylvestris, Dod. ut: Clus. hist. Lugd. ico.

Mochi in Heruria, Cæsalp.

Lathyrus sylvestris, Eyst.

Variat flore albo: nonnihil ex luteo pallescente:  
 est & rubente.

IV. Lathyrus major sylvestris alter.

V. Lathyrus sylvestris minor.

Catanance, Dod. gal. Gesl. hor. Lugd.

Ervum sylvestre, Dodon. herbariorum, Ad.Lob.

VI. Lathyrus latifolius.

Clymenum, Matth. Cast. descr. Clus. pan.

Ervum sativum, Cord.

Lathyrus sylvestris latifolius, Cam.

Lathyrus Narbonensis latiore folio, Ad.Lob. Eyst.

Lathyrus syl. major, five purpureus, Thal.

Ervilium, Cæsalp.

Cicerula sylvestris, Taber.

VII. Lathyrus angustifolius siliqua hirsuta.

Flore est cæruleo penè violaceo,

## VICIA & APHACA.

**G**alenus 2. aliment. scribit ab Asiaticis ΒΙΚΙ'ΟΝ dici legumen, eoq; solo nomine id vocari: Attici vero  
 Γοιερων aut κίον. Latine Vicia nominatur à vinciendo, ut Varroni placet, quod item capreolos habet  
 ut vitis, quibus sursum versus serpit ad scapum Lupini, aliumve calamum, ad quem ut adherere, eum vincere so-  
 let. Et hec duplex est, Sativa & sylvestris.

**APHACA** legumen Dioscorides l. 2. c. 178. ἁφάκη nominat, quæ in arvum nascatur, lente altior, siliquis len-  
 tium majoribus, in quibus semina terna, quaternave, nigra lente minora. Theophrasto Aphaca duplex, altera alba  
 est, de qua inter Insuacea: altera legumen, quod cum Lente & Piso in leguminum genere 8. hist. 5. posuit, & Plin-  
 ius l. 27. c. 5. Theophrastum secutus est: Galenus cum Vicia conjunct.

I. Vicia sativa vulgaris semine nigro.

Ervum. Brunfels.

Orobis sativus & Vicia major & i. Trag.

Vicia, Anguil. Lonic.

Vicia, Græcorum Aphace, Cord. in Diosc.

II. Lathyrus angustifolius semine maculoso.  
 Aracus Hispan. five Lathyrus Ægyptiacus, Cam.  
 Cicerula Ægyptiaca, Clus. hist.  
 an Aracus, Ad.Lob. & Cicera, Lugd.

IX. Lathyrus angustissimo folio America-  
 nus variegatus.

Orobi Americani nomine in horto meo crevit.

Lathyrus peregrinus è cæruleo purpurascens  
 flore: & suaviter rubescens, Eyst.

X. Lathyrus angustifolius humilior.

Ervum Montipeliensium.

XI. Lathyrus sylvestris major angustissimo  
 folio: in Prodomo descriptus.

XII. Lathyrus peregrinus foliis Vicie: flo-  
 re subcæruleo, pallidè purpurascens: in horto  
 meo crevit.

XIII. Lathyrus sylvest. luteus foliis Vicie:  
 an Aracus flore luteo, Adver.

Legumen terræ glandibus simile, Dod.

Glandibus terrestribus congener flore luteo,  
 Clus. pan.

Lathyrus sylvestris floribus luteis, Thal.

Vicia, Taber.

XIV. Lathyrus arvensis repens tuberosus.

Apios, Trag. Fuchf. Lugd.

Pseudoapios, Matthiol.

Chamæbalanus, Dod. gal. Taber.

Ornithogalum purpureum, Cord. in Diosc.

Astragalus, Tur. Penz. Lugd.

Panis porcinus, Lonic.

Astragalus arvensis, Thal.

Terræ glandes, Dod. Ad.Lob. Gerar.

Glandes terrestres, Clus. pan. & hist.

Arachidna, Theophrasti, Colum.

Semina alia nigricans, alia cinereum colorem  
 obtinent.

II. Vicia sativa alba.

Ervum candidum, vel Faba veterum, Trago.

Vicia alba, Anguil.

Vulg.

Vulgari pīso minus compressum & coloris pallidi.

### III. Vicia maxima dumetorum.

Vicia sylvestris altera, vel 5. Aphace Dioscoridis, Osmunda Latinorum, Trag.  
Cracca major, Taber.

### IV. Vicia sepium folio rotundiore acuto.

Orobis sylvestris, sive Vicia major syl. & 2. Trag.  
Aphaca, Matth. Ang. Gel. hort. Cast.

Aphace, Fuch.

Vicia, Dod. ut: Ad. Lob. Clus. hist. Cæs.

Vicia sylvestris, Lonice.

Semen nigrum aut maculatum, crassitie, rotunditate & amaritudine differt.

V. Vicia vulgaris acutiore folio, semine parvo nigro.

Vicia, Matthiol. Lac. Cast.

Aphaca vera, Lugd.

### VI. Vicia multiflora.

Galega altera, vel sylvestris, aut Germanica, Dod.  
Galega sylvestris Dodonæi, Thal.

Aracus, Taber.

VII. Vicia Onobrychidis flore in Prodromo descripta.

IX. Vicia sylvestris spicata.

Vicia sylvestris spicato flore, Clus. pan.

Vicia sylvestris secunda, Clus. hist.

IX. Vicia sylvestris hirsuta incana.

Vicia sylvestris flore albo, Clus. pan. & hist.

X. Vicia syl. lutea filiqua hirsuta nondum descripta, Möspelli collecta & Norimberga à Doct.  
Doldio Ciceris aut Pisi nomine missa.

XI. Vicia lutea foliis convolvuli minoris.

Aphace Dioscoridis, Gal. Plinii, non Theoph.

Picine Theophrasti, Ang. Cam. (Dod. ut:

Aphaca, Ad. Lob. Cæs. Camer.

Orobanchæ leguminum, Lugd.

Elatine 3. Taber.

## ARACHUS sive CRACCA.

**F**rumentorum vitium quoque est, quod Græci Ἀράχων Theoph. 3. hist. 10. (rem scabram & duram dicit, quæ in lente nascatur) nominant. Ruellius Craccam appellari refert. Differt ab Aphaca & Vicia potissimum semine: nam Cracca semina exquisitè rotunda, nigra: & ut Galenus inquit, Ervo minor. Aphaces verò & Vicia semina, nō rotunda, sed aliquando latiora, veluti Lentium, teste Galeno. Alimentum sacculi.

I. Vicia semine rotundo nigro.

Vicia minor vel 3. Trag.

Arachus, Dod. gal. Gel. hort.

Craccæ primum genus, Dodon.

Aracus, Araca & Cracca major, Ad. Lob.

Arachi primum genus Dodonæi, Thal.

Flores parvi & purpurei.

II. Vicia segetum cum filiquis plurimis hirsutis.

Vicia minima vel 4. Trago.

Arachus altera, Dod. gal. Thal.

Aracus sive Cracca minima, Ad. Lob.

Craccæ alterum genus, Arachis potius, quàm

Arachus, Dodon.

Arachus, Lugdun.

Cracca minor, Taber.

Flosculi in parvis spicis candiduli, semina incana ac subalbida.

III. Vicia segetum singularibus filiquis glabris.

Flosculi parvi candiduli, singuli singulis pediculis insidentes.

IV. Vicia flore luteo semine nigro.

Aracus, Cæsalp.

## ARACHIDNA.

**Q**uadam scribit Theophrastus 1. hist. 11. ex radicibus plures differentias præter prædictas sortiuntur (οἱ τῶν ἀραχιδνῶν οὗ τὸ οὐκ οὐδ' ἀραχῶν) h. e. seu Arachidna radix, ejusq, quod simile est Araco: amba namque fructum non minorem superno afferunt, &c. neutrum aut solum, aut folio simile quicquam gignit, utrumque potius velut ἀμφοτέρων est, h. e. infra supraq, terram fructum edit. Plinio 1. 21. c. 15. Aracidna & Arachos (potius Arachoides) &c. Vox hæc Ἀραχιδνᾶ composita videtur: ἀραχῶς enim Cicercula species est, quam hæc solus & fructu refert: ὕδρον verò tuber significat, cujusmodi similitudinem quandam radices habent.

I. Viciæ similis supra infraque terram fructum edens.

Arachidna Cretica, Belli: quo nomine totam

plantam transmisit.

Arachidna Cretica an potius Aracoydes Theophrasti, Ponz.

Xx

Araco

Araco *ῥατορ* Theophrasti an? Clus. ex l. 4. c. 16.

Variat semen in siliquis ad radicē, in aliis nigrum, in aliis Orobo simile, in aliis variegatum.

II. Junia, planta quæ in Angra instar frumeti feritur, ad cuius radices grana rotunda pisi magnitudine, pistaciorum sapore: Linc. par. 8. Ind. or. c. 6.

## L E N S.

**L**ENS & Lenticula, *φακὸς* Dioscoridi l. 2. c. 129. Theoph. & *φακὸς* dicitur, etsi aliquibus *φακὸς* lentem cridam: *φακὸς* verò & lentem, & lentem collam, & ipsum ex lente pulmentum significet. Dicitur autem Etymologico quasi *φακὰν*, ut sit ἡ τὴν φακὴν ἔχουσα: oculorum enim aciem hebetare Dioscorides asserit. Alii *φακὸς* ab utre qui fuit *φακός*, metathesi & mutatione unius elementi. Latinis Lens quasi lenis dicta: nam ut Plinius l. 1. c. 12. ea vescentibus, aqua inmitatem fieri apud auctores se invenisse scribit.

Genera duplex est, arvensis & palustris: hic de arvensi tantum, cuius plura genera Theoph. l. 6. Plinio l. c. duo sunt lentis genera in Aegypto, alterum rotundius nigriusq., alterum sua figura, unde vario usu translatus sit in lenticulas nomen. Recentioribus colore & magnitudine differunt: sunt enim albi majores & gratiores: ex luteo pallide cinerei: rufi minores & deteriores: sic flores albi, candidi: cinerei, purpurascetes.

### I. Lens vulgaris.

Lens, Brunf. Fuch. Dod. gal. Cord. in Diosc. Lon. Ad. Tab.

Lens vulgaris sive agrestis, & Lenticulæ primum genus, Trago.

Lens minor, Lob. Dod. Lugd. Cam. epit. Ger.

Flos in candido purpurascit: grana alia subruffa, alia ex luteo pallida, nonnulla ex cano albòve fusca & nigricantia.

### II. Lens major.

Lens sativus & Lenticulæ alterum genus, Trago.

Lens, Matth. Ang. Lob. Cxf. Cast.

Lens major, Gef. hor. Tab. Ger.

Lens Italica, Camer.

Hoc candidius & majus priore: Matthiolo tamè albū minus est & quod cinereo colore, orbe paulo majore est.

III. Frisoles & Palaros peculiare herbarum genus nuncupant, quas eo ferè loco habet quo nos Pisi, Lentesc & Fabas: Joseph. Acosta l. 4. c. 19.

## SECTIO QUARTA.

### De Leguminibus Capreolis carentibus.

**OROBUS** sive **ERVUM**; **CICER**; **LU-**  
*pivius*; *Fænumgræcum*.

**OROBUS** sive **ERVUM**.

**O**ROB & Græcū, *Ervm* Latinū: Græcorum vocem quidam deducunt *ἔρως* ἡ *ἔρως* ἡ *ἔρως* ἡ *ἔρως* quod boves eo vescantur & saginentur. Dioscor. di l. 2 c. 131. frutex est exiguus, folio angusto, tenui, in siliquis parva gerens semina: & ut Theophrastus 9. hist. 22. fructu rotundo modo piperis. Plinius l. 18. c. 15. *Ervm* vocat & cum Vicia conjungit.

Genera duo, sativum & sylvestre: illud duum generatū, candidum & rufum: Galenus tertium addit, nempe pallidum, inter priora medium: est & quartum Creticum, quod semine minore est.

### I. Orobis siliquis articulatis semine majore.

Orobis sive Ervm, Matth. Gef. hor. Ang. Cord. in Dioscor. Lugd.

Cicer sativum, Dodo. gal.

Ervm, Gef. hor. Guil. (sive Mochus) Cast. Tab. verum, Camer.

Mochus sive Cicer sativum; Dodon.

Orobis receptus herbariorum, Ad. Lob. Ger.

Flores subpurpurascetes, aliquando candidæ.

II. Orobis semine minore.

Orobis Creticus, Matth. Lugd.

III. Orobis semine obtuso triangulo.

Cicer orobizum Theophrasti, Ad. Lob. Lugd.

Semen est Orobo duplo majore, albido, pallente aut subfulvo, & ab Orobo nigredine petitiolum distans.

**CICER**

## C I C E R

**C**ICERIS qui ἰστίον & Græci, genera duo Dioscoridi l.2.c.126. sativum & sylvestre: sativi genus alterum *Xei* & (arietinum reddunt, quia *xēis* arietem significat) appellatur Theophrasto s. hist. 5. Cicer & magnitudine & sapore, & colore, & forma pleraque differentias ostendit, *οἷος κείος ὀρεοκαίου. ὃς οἱ ἀνὰ μέσον· ὅτι πῦρ δὲ τὸ ἄδρά γλυκύτερον*: h. e. veluti Arietinum, Orobeum five ervinum, & inter hac medium: præter hæc omnia sunt alba dulcissima. Galeno & simpl. duplex, Arietinum & Orobeum. Plinio l.18.c.12. est arietinum, quod album est & nigrum (in arietino candidum esse Dalechampsius in Plinium, negat) est columbinum, quod & venericum dicitur, & est candidum: est & dulcissimum quod Ervo similimum est. At Matthiolo, est Columbinum, quod candidum: est Venericum, quod rubrum: est Arietinum, quod nigrum & ceteris majus est. Anguillæ tres sunt species, albi, rufi, arietini: albi duplices sunt arietini & ervini: arietini capiti arietino similes, ervini leves ervi femini similes: ex Galeno 9. de compos. medic. secundum loca. Rubei similiter duplices, arietini & ervini. Nigri simplices sunt solo colore ab aliis differentes.

## I. Cicer sativum.

Cicer, Brunf. Matth. (cui & domesticum) Tur.

Cord. in Diosc. Lac. Cæf. Cast. Tab.

Ciceris altera species, Trago.

Cicer nigrum, Fuch. seu arietinum, Cord. hist.

Cicer arietinum, Dod. ut:

Cicer rubrum & album, Lonic.

Cicer sativum, Lugd. Ger. five arietinum, Gesn.

hor. Ad. Lob.

Flores candidi, aut ex purpura rubescentes: femina alba, vel ex candido pallescencia: purpurea vel rubra, rufæ: nigra vel ex saturato rubente purpura nigra.

## II. Cicer exoticum.

Cicer Nigritarum, Clus. exot. l.3.c.16.

Semen vel album, vel nigrum, vel rubens, vel ex albo & rubro variè distinctum.

## Cicer sylvestre.

I. Cicer sylvestre, foliis oblongis hispida majus.

Cicer sylvestre, Matth. Ang. Dod. gal. Lugd. Cast.

Cam. Ger.

Cicer syl. herbariorum, Ad. Lob.

Cicer syl. primum, Dod. Lugd. Tab.

Cicer syl. majus, Thal. qui & medium habet.

Semen parvum flavescens: at in hist. Lugdun. parvum nigrum compressum.

II. Cicer foliis oblongis hispida minus.

Cicer syl. minus, Thal.

III. Ciceri syl. minoris affinis si non idem.

an Glaux, Anguill.

Glaux, Clus. hisp. Lob. Lug. Tab. Dioscoridis, Ger.

Glaux Hispanica, Clus. hist.

Anthyllis altera lutei similis, Dodon.

Hliis flores lutei, hujus purpurascens vel exanilei.

IV. Cicer montanum lanuginosum erectum.

V. Cicer montanum *ἀγρῶνος*: utrumque in Prodromo describitur.

VI. Cicer syl. latifolium triphyllum.

Cicer sylvestre, Gesn. hor. Penæ, Lugd. latifolium, Ger.

Cicer syl. alterum, Dod. Tab. Lugd.

Cicer syl. verius, Ad. Lob.

Et Ciceris sylvestris tertii ramosi meminit Dodonæus, quod cum priore si non idem, certè ab eo parum differt.

## L U P I N U S.

**L**UPINUS *ἄλφος* Dioscoridi l.2.c.132. Theophrasto pluribus in locis & Græci ceteris. Lupinorum appellatio non aliunde ducta videtur, quàm quod sicut lupus terram appetit, & in same terra vescitur: ita Lupinus tellurem, ut Plinius l.18.c.14. ait, adeo amat, ut quamvis fructuoso solo conjectum, inter folia vepresq., ad terram tamen radice perveniat. Vel ita dictus videri potest, velut lupus expositus & relictus, ex eo quod (ut idem Plinius) impunè jaceat, vel derelictus, si non protinus imbres secuti obruant, ab omnibus animalibus amaritudine sua tutus.

Genera duo Dioscoridi, Galeno & Plinio: sativus & sylvestris.

I. Lupinus sativus flore albo.

Lupinus, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Lac. Cord. in

Diosc. Lon. Cæf. Tab. communis, Gesn. hort.

Lupinus albus, Fuchf. Tur. Camer. albo flore,

Clus. histor. vulgaris, Eystett.

Lupinus sativus, Ang. Dod. ut: Cord. hist. Ad.

Lob. (cui & Faba ficulnea Germanis à folio) Cast.

Lugd. Ger.

- II. Lupinus syl. flore cæruleo.  
 Lupinus syl. Matth. Ang. Dod. ut. Lugd.  
 Lupinus syl. fegetum flore purpureo, Ad. Lob.  
 Lupinus flore cæruleo, Clus. hist. Ger. sylvestris  
 flore cæruleo, Gef. hort. Cam.  
 Lupinus syl. flosculis è cæruleo purpureis, Cam.  
 epit.  
 Lupinus minor, Tab.  
 Lupinus syl. angustifolius fl. cæruleo, Eyst.  
 Flos ex purpura cæruleus, aut subrubens, vel ro-  
 seo colore rufescens.  
 III. Lupinus sylvestris flore luteo.  
 Lupinus syl. luteus, Dod. gal. odoratus, Eyst.  
 Lupinus Hispanicus flore luteo, Gef. hor.  
 Lupinus flore luteo, Lob. Cam. in Matth. Ger.  
 Lupinus luteus, Tab. Cam.  
 Lupinus flavo flore, Clus. hist.  
 IV. Lupinus peregrinus major vel villosus

cæruleus major, in Prodromo describitur.

Lupini Indici, etiam Cretici nomine accipi-  
 mus.

an Lupinus albus maximus, cujus flos antequam  
 aperiat subcæruleus, intus verò albus, Cam.

an Lupini genus quartum, Clus. hist.

Lupinus sativus major, & Lupinus Æthiopicus  
 quorundam, Eyst.

Huc referatur

Lupinus exoticus fl. albo, colore floris tantum ab  
 illo varians, Eyst.

V. Lupinus peregrinus pentaphyllos.

Lupinus Arabicus sive pentaphyllon peregrinus,  
 Ponæ ital.

VI. Lupinus peregrinus minor sive angustif-  
 limo folio.

Lupini Africani nomine accepimus, & sub Lu-  
 pino minimo in Prodromo descripsimus.

### F O E N U M G R Æ C U M.

**F**OENUMGRAECUM, τῆλος Dioscoridi l. 2. c. 124. Theophr. hist. 3. l. 7. c. 17. & βόκας 8. hist. 8. κιστρός & ὀξυρῆς Græci, quarum appellationum major pars à siliquarum similitudine desumpta est, quæ corniculæ  
 similes sunt: ut ceratis, à cornu: agoceros, à caprini, bouceros à bubuli cornu similitudine: quare Columella l. 2. c. 11.  
 simpliciter siliquam, Varro Siliculam, Plinius l. 8. c. 16. Siliciam & l. 25. c. ult. Fœnugracum vocavit.

Genera: unus veteres meminere, recentiores sativum & sylvestre faciunt.

I. Fœnumgræcum sativum.

Fœnumgræcum, Trag. Matth. Lac. Tur. Lon. Ad.

Lob. Dod. Cast. Cæli. Cam. Alpin.

Fœnumgræcum sativum, Ang. Lugd.

Fœnogracum, Dod. gal. Fuch. Cord. in Diosc. &  
 histor.

Siliqua vel Fœnogracum ex quo farinam, item  
 vinum multi sapore conficiunt: par. 7. Ind. oecid.  
 c. 8. & 11.

II. Fœnumgræcum sylvestre.

an Fœnumgræcum alterum quod sponte nasci-  
 tur, Ang.

Fœnumgræcum syl. Dalechampii, Lug.

III. Fœnumgræcum sylv. alterum polycar-  
 tion.

Fœnumgræcum sylvestre, Lob. Cam.

Fœnumgræcum syl. alterum, Dod. Lugd.

Hedysarum minimum, Lugd.

### SECTIO QUINTA.

**HEDYSARUM** sive **SECURIDACA**; **FERRUM EQUI-**  
**NUM**; Polygala; Ornithopodium; & Tribulus terrestris.

**HEDYSARUM** sive **SECURIDACA.**

**H**ἑδύσαρον & πικλόνιον Græci vocant, quam Latini Securidacam (vel ut Turnebus legendum censeo Securi-  
 c'atam) à seminis figura, τὰ δὲ ἐνὶ securim significat: Sic enim Dioscorides l. 3. c. 146. Hedysarum quod  
 arguntur rii Pelecium, semen rufum in siliquis corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim emulatur,  
 unde nomen accepit. Apud Theophrastum 8. hist. 10. Gaza Securinam (securi similem) reddidit: & Plinius l. 8. c. 17.  
 Securidaca quam Græci à similitudine Pelecium vocant.

Genera: Dioscorides unus meminit: at recentioribus aliquot differentie sunt.

I. Securidaca lutea major.

Securidaca major, Matth. Cast.

Securidaca, Anguil. Cast. vera, Clus. hist.

Securidaca secunda, Dodon. gal.

Pelec-

Pelecinus, Gefn. hort.

Hedyſarum, Gef. hor. Lac. Lon. ſive Securidaca major, Ad. Lob.

Hedyſarum majus, Lugd. (qui ſub 1. & 3. Dodo-  
neſi quoque exhibet) Cam.

Hedyſarum 1. Dodon. legitimum, Cluſ. pan.

Floribus eſt luteis: Matthiolo flores dilute pur-  
pureſcunt.

II. Securidaca lutea minor corniculis re-  
curvis.

Securidaca minor, Matth. Ad. Lob. Caſt. Cam.

Hedyſarum alterum, Dod. Lugd.

Hedyſarum minus, Lugd.

Securidacæ ſimilis quædam, Cæſalp.

Aſtragalus Monſpelicius, Cluſ. hiſp. & hiſt. icon.

III. Securidaca ſiliquis planis utrinque den-  
tatis.

Securidaca peregrina, Cluſ. hiſt.

Scolopendria leguminofa, Cortuſo.

IV. Securidaca dumetorum major flore va-

rio ſiliquis articulatis.

Melilotus quinta, Trag.

Bogetwicken / Lonicer.

Ornithopodium 2. vel quoddam majus, Dod.

Securidaca altera, vel alterius prima ſpecies, Cluſ.  
pan. & hiſt.

Hedyſarum purpureum, Taber.

Loto enneaphyllo non diſſimilis, Lugd.

Hedyſarum ſcorpionum, Camer.

Securidacæ alterum genus, Cæſ.

Hedyſarum majus, Ger.

Variat flore: aliquando floris folia ſuperiora di-  
lute rubent, laterum alæ niveæ ſunt, roſtrum pur-  
pureum: aliquando totus candidus eſt, vel exal-  
beſcit, vel intenſius purpureſcit.

V. Securidaca dumetorum minor pallide cæ-  
rulea.

Securidacæ ſecundæ altera ſpecies, Cluſ. pan. &  
hiſtor.

Securidaca Dioſcoridis Penxi, Eidem.

## FERRUM EQUINUM.

**A** Siliquarum figura, planta hæc Solea vel Ferrum equinum nominatur: aliquibus verò ab effectu, quòd equi  
qui diu plantam hanc virentem calcaverint ferreus ſoleis exuantur. Sunt qui ad Securidacam, alii ad Luna-  
riam, alii ad Medicam referant.

I. Ferrum equinum ſiliqua ſingulari.

Ferrum equinum, Matth. (cui & Securidaca mon-  
tana) Gef. hor. Lob. Ger.

Medicæ ſpecies, Gei. hort.

Sferro cavallo, Ad. Cæſ. Camer.

Lunaria minor, Caſtor.

Solea equinea, Lugd. cum duplici figura.

Hedyſarum ſive ferrum equinum, Tab.

Ferrum equinum vulgare *ῥαχιζαντο*, Colum.

II. Ferrum equinum ſiliqua multiplici.

Ferrum equinum alterum *πολ. ριζαντο*, Colum.

III. Ferrum equinum Germanicum, ſiliquis  
in ſummitate.

Sferra cavallo ſyl. Germanicum, Camer.

Hedyſarum minus, Tab.

Hedyſarum glyzyrrhizata, Ger.

Ferrum equinum capitatum ſive comofum, Col.

IV. Ferrum equinum Gallicum, ſiliquis in  
ſummitate.

Lotus enneaphyllos, Lugd.

Hoc priore per omnia minus eſt, ſiliquis eſt  
paucioribus & minoribus.

V. Ferro equino Gallico affinis.

Aſtragalo perſimilis palmaria puſilla planta, Ad.  
Lob.

Floribus eſt luteis, aliquando albis.

## POLYGALA.

**P**ολύγαλον Dioſcorides l. 4. c. 142. frutex brevis, palmum altus, foliis ſenticula, guſtu ſubacerbus: potus lactis ab-  
undantiam facere creditur. Et Plinio l. 27. c. 12. Polygala, &c.

I. Polygala major Maſſiliotica.

Polygala, Matth. Lugd. Tab.

Aſtragaloides herbariorum, Lob.

Aſtragalus fortè Matthioli, vel jam demum Poly-  
gala ejusdem, Eidem.

Polygala Valentina 2. Cluſ. hiſp. & hiſtor. qui &  
3. addit.

II. Polygala altera.

Polygala Valentina prima, Cluſ. hiſp. & hiſt. Lug-  
Taber.

Coronilla ſive Colutea minima, Lob.

Colutea ſive Polygala Valentina, Ger.

an Polygala, Anguil.

## ORNITHOPODIUM.

**O**rnithopodium id est avis pes à similitudine, quam siliqua aduncæ cum pedibus parva avicula habent, dicitur: quod veteribus incognitum, nisi forte ad Polygalon Dioscoridi lib. 4. c. 142. referantur.

I. Ornithopodium majus.

Ornithopodium, Dod. ut: Gef. hor. Ad. Lob. Lug. minus, Cam.

Polygala, Gef. hort.

II. Ornithopodium minus.

Ornithopodium perpusillum, Ad. Lob. Lugd.

III. Ornithopodium radice tuberculis nodosa.

Ornithopodium ruberosum Dalechampii, Lug.

IV. Ornithopodio affinis hirsuta Scropioides. Scropioides leguminosa, Ad. Lob. Lugd.

V. Ornithopodio affinis hirsuta, fructu scutellato.

Arturo, Cortuso.

Stella leguminosa, Lob. Lugd. Cast. Tab.

Vicia seiamacea Apula, Colum.

## TRIBULUS.

**T**ribulus Latinus dicitur, quod siliqua plantaq, muricata sit: & ut Theophrastus 6. hist. 5. Tribulus peculiare est quod integumentum fructus aculeatum gignit.

Genera duo sunt Dioscoridi l. 4. c. 15. alteram terrestre, alterum aquis familiare: terrestri Theophrasto genera duo, unum solium ciceris habet, nullis spinis aculeatum, alterum solii est spinosis. At Plinio l. 22. c. 10. Tribuli unum genus in hortis, alterum in fluminibus: & l. 21. c. 16. Tribulo uni cicercula sola, alteri aculeata.

Tribulus terrestris Ciceris folio fructu aculeato.

Tribulus terrestris, Matth. Cord. in Dioscor. Gef.

hort. Lac. Tur. Dod. Ad. Clus. hisp. & hist. Lob. Cæf. Lugd. Cast. Cam.

Tribulus Theophrasti, Ang.

## SECTIO SEXTA.

ONOBRYCHIS; ASTRAGALUS; OROBUS  
SYLVATICUS; GALEGA; GLYZYRRHIZA,  
ONOBRYCHIS.

**O**nobrychis: ὄνηξ: ab asini rudis nomen obtinuit: Latinus similiter Onobrychis dicitur. Dioscorides l. 3. c. 152. & Plinius l. 24. c. 16. folia lentis paulo longiora, caulem dodrantalem, florem puniceum, radicem parvam trivertem. Ad Onobrychidii classem subsequentes plantas, tanquam illi quodammodo affines, auctores referunt.

I. Onobrychis foliis Viciæ fructu echinato major.

Viciæ syl. alterius secunda species, Dod. gal.

Onobrychis, Lac. Dod. Clus. pan. & hist. Thal. Tab. Ger.

Glaux vel Onobrychis, Gef. hor.

Polygalon Rheticum, Gef. hor. app.

Caput gallinaceum Belgarum, Ad. Lob.

Lupinus syl. rusticis, Cæf.

Polygala multorum, Lugd.

Onobrychis Dodonæi fl. rubro, Eyf.

Flores communiter dilute rubent, aliquando elegantius rubent: reperiuntur & albi coloris.

II. Onobrychis fructu echinato minor: sub Capite gallinaceo minore in Prodromo describitur.

III. Onobrychis semine clypeato aspero major.

Onobrychis altera, Dodon.

Hedysarum alterum clypeatum, Lob. Lugd.

Securidaca clypeata, Camer.

Hedysarum clypeatum flore suaviter rubente Eyf.

IV. Onobrychis semine clypeato aspero minor: in Prodromo sub 1. describitur.

V. Onobrychis semine clypeato lævi: sub 2. in Prodromo exhibitur.

VI. Onobrychis incana foliis longioribus vel 3. in Prodromo.

VII. Onobrychis incana foliis rotundis.

Onobrychis quorundam, Clus. hisp.

IX. Onobrychis spicata flore purpureo.

Onobrychis prima, Clus. pan. & hist. Tab.

IX. Onobrychis spicata floribus pallidis, nigris radiis notatis.

Onobry



*Onobrychis* 3. Clus.pan. & hist. Tab. Ger.

X. *Onobrychis* floribus Viciæ dilutè cæruleis.

*Onobrychis* 2. Clus.pan. & hist. Tab. Ger.

Flores dilutè cærulei, vel ex cæruleo purpurascens.

XI. *Onobrychis* floribus Viciæ majoribus cæruleo purpurascens: vel foliis *Tragacanthæ*.

*Onobrychis* quarta, Clus.pan. & hist. Tab.

*Onobrychis montana* 4. Ger.

XII. *Onobrychis tragacanthæ foliis* floribus in globum congestis.

*Onobrychis quinta*, Clus.pan. & hist.

XIII. *Onobrychis montana* siliquis oblongis nigris Viciæ similibus.

*Onobrychis*, Cæsalp.

Duplex est, altera angustioribus foliis flore rubente coralli modo: altera latioribus flore purpureo: utraque siliquis nigris longis.

## ASTRAGALUS.

**A**στράγαλος. Latine etiam *Astragalus* Dioscoridi l. 4. c. 57. frutex parvus est, & foliis & ramis *Ciceri* similibus, flores purpurei parvi: radix rotunda raphani modo grandis &c. Plinio l. 26. c. 8. *Astragalus* folia habet longa, incisuris multis obliqui circa radicem: caules tres aut quatuor foliorum plenos, florem hyacinthi radices villosas, implicatas, rubras, præduras.

I. *Astragalus Syriacus* hirsutus.

*Astragalus Syriacus*, Lob. Lugd. Tab. Ger.

an *Astragalus*, Ang. Cæsalp.

an *Astragalus* Dioscoridis, vulgo Christianæ radix, Rauwolf. & Lugd.

Flos cæruleo purpureus, Ang. flores magni & rubri, Lob. flos sanguineus, siliquæ corniculis similes rubentes, Cæsalp. flos purpureo, fusco & cæruleo distinguitur, folliculi colutæ modo statui distendi semen continent, Rauwolf.

II. *Astragalus Bœoticus* lanuginosus radice amplissima.

*Astragalus* forte primus, Clus.hisp. Lugd.

*Astragalus Lusitanicus* Clusii, Lob. Tab. Ger.

*Astragalus Bœoticus*, Clus.hisp. & cur.post.

*Phaeolus peregrinus* Belli, Clus.cur.post.

*Phaeoli* novum genus, Belli in epist. & ad Clus. in *Apocynum* Amati Lusitani.

III. *Astragalus alpinus* Helveticus.

*Astragalus alpinus* & 2. Clus.hisp. & hist.

*Polygala*, Camer.epic.

*Cicer astragaloides* Pomæ.

IV. *Astragalus alpinus* magno flore.

*Anthyllis claviculata*, Lugd.

Flos in nostra est ex cæruleo purpurascens: at Lugd. hist. suæ flores luteos ascribit.

V. *Astragalus villosus* floribus globosis.

*Astragalus purpureus*, Lugd.

*Astragalus* 3. Clus.hisp. & hist.

Huic affinis si non idem

*Astragalus Montpellienus*, Clus.hisp. & hist.

VI. *Astragalus sylvaticus* foliis oblongis glabris.

*Astragalus*, Cord. in Diosc. & hist.

*Astragalus sylvaticus*, Thal.

*Cicer montanum*, Cordi ichol. & Cam. ad Thal.

VII. *Astragalum* Matthioli in editione secunda proposuit, in ultimis verò retractavit: eandem figuram Lacuna, Lonic. & Lug. proposuerunt an forte ejusdem *Pseudoapios*.

## OROBUS SYLVATICUS.

I. *Orobus alpinus latifolius* in Prod. descriptus.

II. *Orobus sylvaticus* purpureus vernus.

*Phaeolus sylvaram*, Lugd.

*Orobus pannonicus* primus, Clus.pan. & hist. or. pannonicus, Eyft.

*Orobus sylvestris* vernus, Thal.

*Astragalus*, Colum.

*Arachis latifolius* alter, Dod. belg.

Flos coloris purpurei elegantissimi: at ubi evalescere incipit, coloris cærulei est.

III. *Orobus sylvaticus* pallido flore.

*Arachis latifolius*, Dodon.

*Galega montana*, Lugd.

*Orobus pannonicus* 4. Clus.pan. & hist.

IV. *Orobus latifolius* parvo flore purpureo.

*Orobus Veneris*, Clus.pan. & hist.

Duplex est alteri folia dilutè virentia, flores purpurei: alteri folia ex viridi pallescencia, flores prorsus albi, utriusque semen albicans coloris oblongiusculum.

V. *Orobus sylvestris* angustifolius asphodeli radice.

*Orobus pannonicus* 3. Clus.pan. & hist.

Semen nigrum interdum maculosum.

VI. Oro-

VI. *Orobus sylvaticus* Vicie foliis.  
*Astragaloides*, Dod. altera herbariorum, Lob.  
*Orobus pannonicus* 2. Clus. pan. & hist.

an *Lupinus sylvestris*, Cæs.  
 Flos purpureus, qui vetustate in cæruleum commutatur.

## G A L E G A.

**G**alega ab herbariis cur dicatur ignoramus: à quibusdam tamen *Ruta* nomen inditum, ab effectu & virtute non verò odore. Quidam *Onobrychin*, alii *Glaucem*, nonnulli *Polemonium*, alii *Polygalam* veterum esse iudicant, quibus *Dioscoridi* descriptiones contradicunt.

I. Galega vulgaris.  
 Galega five *Ruta capraria*, Matth. Ges. hort. Lac.  
 Cast. Cam.  
*Ruta capraria*, Ges. hor. Tab.  
 Galega quibusdam sœnumgræcum syl. Dodon.  
 gallic.  
 Galega, Ad. Lob. Dod. Lon. Lugd. Ger. vulgaris,  
 Clus. pan.  
*Onobrychis* & herba gallica, Fracastorio.  
 Caprago vulgo, Cæsalp.  
 Galega fl. cinereo, fl. albo, Eysf.

Floribus est cæruleis, ex cæruleo purpureis: perennis candicantibus.

II. Galega *Ægyptiaca* filiquis articulatis.  
 Seban five *Seban Indicum*, Cam.  
*Seban*, Alpin. & Clus. ad Garz. cuius semen Anil nomine ex Alexandria accepit.  
 Seysban, Honor. Belli ep. 4. ad Clus.  
 III. Galega affinis *Sophera* dicta.  
*Hoxocoquomacelit*, Cam. Clus. cur. post.  
*Sophera Galega* proxima, Alpin.

*Sofera* Lentisci foliis, Honor. Belli epist. 4. ad Clus.

Honorio Belli videtur, suam plurimū ab ipsius Alpini disferre, quod ex descriptione & icona colligere sit: equidem Alpini figura vitiosa, duplici potissimum nomine: primum quod in costæ extremitate malè posuerit folium quod impariter facit: dein quod filiquas dependentes pinxit, cum omnes oblongæ cylindricæ sursum spectent. Non tamen differentes facio, cum & ab Honorio Belli integram plantam ex Creta, & à Prospero Alpino semina (unde plantæ enatæ) acceperim, in utraque solam differentiam in foliis notavi, quæ in *Ægyptiaca* acutiora & atrovirentia sunt. Sic & ex horto Camerarii ramum habeo, in quo peculiare observavi, quod in illius alarum cavis, qua parte costarum latior extremitas caulem amplectitur, verrucæ parvæ rubentes innatæ, quæ æstu intensissimo liquorem candidum pelliculosum exudant, ut etiam Camerarius in suo horto admonet.

## G L Y C Y R R H I Z A.

**Γλυκύριζα** id est radix dulcis, à Latine *Glycyrrhiza* & Dulcis radix, & à *Seplasiariis* barbaro nomine *Quiritia* appellatur. *Dioscoridi* lib. 3. cap. 7. frutex est exiguus, ramis binum cubitorum, circa quos folia lentius densa, pinguis, tactu glutinosa: stipes est hyacinthi: fructus pilularum Platani magnitudinis, asperior, qui filiqua habet lentium modo ruffas & parvas radices longæ, buxei coloris, subacervæ & dulces: ex quibus succus *Lycii* multat. *Plinio* lib. 22. c. 11. *Glycyrrhiza*, qui eadem scribit quæ *Dioscorides*, eo excepto quod folia echinata tribuit, pro *γίρεν*, id est, lentisco echinum *Legens*. *Theophrasto* 9. hist. 13. *γλυκύριζα* & *σενδιὰν γίζα*, dulcis & *Scythica* radix, qui aliqui *δίζα* & *κίρα* vocitant.

I. *Glycyrrhiza* capite echinato.  
*Glycyrrhiza*, Matth. Dodon. gal. Lac. Cast. altera, Anguil.  
*Glycyrrhiza Italica*, Ges. hor. vera *Dioscor.* Dod.  
*Glycyrrhiza echinata* *Dioscoridis*, Ad. Lob. Lug.  
 (qui & *Matthioli* & *Dodon.* figuram habet) Tab.  
 qui similiter duas figuras sub vulgari & echinata proposuit, Ger.

II. *Glycyrrhiza* filiquosa vel Germanica.  
*Liquiritia*, Brunf.

Dulcis radix, Trag. Tur. Ges. hor.  
*Glycyrrhiza*, Fuch. Cord. in *Diosc.* & hist. Ges. hor. Cam.  
*Glycyrrhiza Germanica*, Dod. gal.  
*Glycyrrhiza* *Dioscoridis*, Anguil.  
*Glycyrrhiza altera*, Matt. vulgaris, Dod. Cam. p.  
*Glycyrrhiza lævis*, Lac. non echinata, Lugd.  
*Glycyrrhiza* filiquosa, Ad. Lob.

III. *Glycyrrhiza* sylvestris floribus luteis  
 lescantibus.

Fœnugræcum sylvestre, Trag. Clus. pan. primum, Dodon.

Polygonum, Cord. in Diosc. & hist. Thal.

Glyzyrrhiza sylvestris, Geschor. Lugd. Cam.

Glaux, Tur. vulgaris, Ad. Lob. Clus. hist.

IV. Glyzyrrhiza sylvestris altera floribus puniceis, foliis Arachi.

Glaucæ, vel Glaux, quædam leguminosa her-

bariorum, Advers.

Flores communiter ex pallido flavent, rarius puniceant.

Glyzyrrhiza sylvestris, Thal. alia, Cam.

V. Glyzyrrhiza sylvestris primæ similis hæc sub Glaucæ leguminosa in Prodromo describitur, cujus semen Araci Bœtici nomine accipimus.

# LIBER DECIMVS.

## SECTIO PRIMA.

### DE PLANTIS CAPILLARIBUS.

PHYLLITIS; HEMIONITIS; OPHIOGLOS-

SUM; ASPLENIUM sive CETERACH; LUNARIA MINOR; ADIAN-

thum sive Capillus Veneris; Trichomanes sive Polytrichum;

Ruta muraria sive Salvia vitæ; Polytrichum

aureum; & Ros Solis.

#### PHYLLITIS.

**Q**uæ Græci φυλλίτις, quasi foliosam dicas, cum nihil nisi foliosus cesses appareat, Latini quoque, Græcum asseruerunt nomen: officinæ Lingua cervina. Dioscoridi lib. 3. c. 121. folia fert rumici similia, sed oblongiora magis, virentia, sena septenave, recta, quæ parte anteriore levia, posteriore tenues quasi vermiculos annexos ostendunt, neque caulem neque semen, neque florem profert. Theophrasto foris l. 9. c. 19. οὐκ ἔστιν ὄσπριον; Gaza Linguæ cervinæ vertic.

I. Lingua cervina officinarum.

Scolopendrium, Brunf.

Scolopendria vulgaris, Trag.

Phyllitis, Matth. Dod. ut: Ang. Lac. Tur. Cord. ut:

Geschor. Ad. Lob. Thal.

Phyllitis vulgaris, Cam. Clus. hist.

Hemionitis, Leon. Manar. Ruel. Fuch.

Lingua cervina, Ericio Cord. Lonici. Cæf.

Phyllitis sive lingua cervina, Tab. emacul.

Est & latifolia & angustifolia: sæpe etiam in for-

tibus exigua reperitur.

II. Lingua cervina multifido folio.

Phyllitis laciniata, Dodon. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Phyllitis foliis laciniatis, Tab.

Phyllitis multifido folio, Lob. multifida, Ger.

Phyllitis, Cast. ap. mucronata, Cam.

Duobus, tribus, etiam pluribus mucronibus in summo folii donatur: aliquando folia ad utrumque latus inæqualiter diffusa sunt.

#### HEMIONITIS.

**H**emionitis seu ἡμιόνιον Græci, Latini similiter, quasi Mulariam dicas & Splenium, nominatur, quod ejus folia sicut & Phyllitidis, Medicorum splenia, nimirum oblongas plagulas forma imitentur: quid si potius ab eorum usu, quod spleni medeantur, siquidem ex aceto pota lienem absumant, Dioscoride auctore l. 3. c. 152. cui, solum emittit simile dracunculi curvata in cornua lune modo sinuatum: radices habet multas easque tenues: sed neque caulem, neque semen, neque florem profert. in ἡμιόνιον Theophrasto l. 9. c. 19. Mulam Gaza vertit, quam folio Lingue cervinæ consistere & radice numerosa & tenui esse, asserit.

I. Hemionitis vulgaris.

Hemionitis, Matthiol. Dodon. ut: Ang. Geschor.

Lac. Lon. Cæf. Lugd.

Hemionitis vera, Clus. hist.

Y y

Hemio-

Hemionitis sive sterilis, Lob.

II. Hemionitis minus vulgaris.

Hemionitis peregrina, Dod. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Hemionitis, Cast. altera peregrina, Lob.

III. Hemionitis minor.

Hemionitis sive sterilis, Ad. Lob.

Hemionitis minor, Penz, Lugd.

IV. Hemionitis multifida.

Hemionitis altera Dalechampii, Lugd.

Lingua cervina ramosa, Colum.

Agleototis seu Marmorite, seu Phyllitidis aut Scolopendriae nomine, a Corauro accepimus.

Ethujus quemadmodum & præcedentis folia, parte averfa, sub flavo pulvisculo non conteguntur, qui in aliis id genus plantis cernitur.

## OPHIOGLOSSUM.

**Q**uam recentiores Οφιογλωσσον Græci vocant, Latine Lingua serpentis dicitur: quam alii veteribus indidam, quidam Ceratiam Plinii l. 26. c. 8. esse volunt unico tantum folio assurgentem, radice nodosa & magna: quidam linguam Plinii l. 24. c. 19. quam circa fontes nasci, solum scribit: sive Lingulacam l. 25. c. 11. qua circa fontes nascitur, censent: quidam inter Dracunculæ species referunt.

I. Ophioglossum vulgatum.

Serpentaria secunda, Brunf.

Ophioglossum, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Gef. hor. Lon. Thal. Lugd. Cast. Cam. Tab. Eyst.

Ophioglossum sive Eneaphyllum, Ad. Lob.

Unifolium, Amato.

Lingula vulneraria, Cord. hist. Cam.

Lancea Christi, vel Luciola, Gef. hor.

Lingua serpentina, Cæf. Cast.

Variat: aliquando folio est sinuato: ligula communiter simplex est, aliquando duplex, & etiam triplex, quemadmodum Camerarius in epic. Math. pingit: est & abortivum à Lobelio pictum, quas differentias, una figura in nostro Matthiolo emulato exhibuimus.

II. Ophioglossum anguloso folio.

III. Ophioglossum minus subrotundo folio: utrumque in Prodiomo describitur.

## ASPLENIUM sive SCOLOPENDRIA

**A**σπένιον & σκολοπενδρία quod splenem juvet: alii σπένιον & σκολοπενδριον à foliorum forma: sic enim Dioscorides lib. 3. cap. 151. foliis est Scolopendria animalis similibus, pluribus ab una radice in ambitum porfis: nec caulem, nec florem, nec semen habet: folia polydii modo incisa, subtus flavescentia hirsutaq, superne venosidula. Plinio l. 27. c. 6. Asplenium sunt qui Hemionior vocant, &c. Alex. Trallianus, Scolopendrium ab Aspleno in ratione medicamentis separat.

Ceterach officinarum.

Scolopendria, Ang. vera, Trag. Tab. emac.

Ceterach, Eric. Cord. Cæf.

Scolopendrium, Cord. hist. verum, Lon.

Asplenium, Matth. Dod. gal. Gef. hor. Lac. Tur. Ad. Cast. Lugd. Cam.

Asplenium, Cord. in Diosc. Dod. Lob.

## LUNARIA.

**L**unaria recentioribus dicta à foliis lune crescentis modo falcatis. An veteribus cognita, ambigitur: alii Ceration Plinii censent: quidam Tragium secundum Dioscoridi l. 4. c. 50. quod in montibus folio Scolopendriae dicetenni & candida nasci scribit: nonnullis σπένιον: neg. & oxycene, quia aliqui Hemionitidem Lunariam majorem, hanc verò minorem & botrytiam à plurimū racemulis utring, thyrsulo harentibus & foliorum numerum aquantibus: Epipactis quibusdam. An σπένιον quod Dioscoridi l. 4. c. 19. caule est non magno, hederae foliis, tenui aut duodenis, neque semen neg, flores proferens: radicibus tenuibus nigris gravi odore gustu satuo. Idem Plinio l. 27. c. 9. sub Epimedio quod fortè Theophrasti 7. hist. 8. Epimetrum.

I. Lunaria racemosa minor vel vulgaris.

Lunaria minor, Matth. Fuch. Dod. gal. Gef. hort.

Lon. Lugd. Cæf. Ger.

Lunaria, Trag. Dod. racemosa, Ad. Lob.

Lunaria petraea, Taura pastoiibus, quod vacca hac degustata taurum requirant, Gef. de Lunar.

Lunaria botrytis, Thal. Cam. Col. Eyst.

Lunaria major, Cast.

Lunaria botrytis minor, Clus. hist.

Lunaria vulgaris minor, Clus. histor. ap. alt. 3d lib. 5.

Ruta lunaria vel jecoraria, Tab.

Epime-

Epimedium Dioscoridis, Colum.

Folliis est denis, duodenis: novemdecim in Baldo notavimus: quare putant aliqui totidem folia habere, quot luna dies, unde nomen habeat.

II. Lunaria racemosa ramosa major.

Lunarię rarior species, Cam.ep.

Lunaria minor ramosa Camerarii, Clus.hist.& in ap. altad lib.5.

III. Lunaria racemosa multifido folio.

Lunaria ramosa Silesiaca, Cam.

Lunaria botryitis πολύφυλλοι, Thal.

Lunaria minor ramosa, Clus.pan.& hist.

IV. Lunaria minor rutaceo folio.

Lunaria botryitis πολύφυλλοι, Junger. in cat. Altorff.

V. Lunaria Magorum Arabum, Lob. quide

## ADIANTUM sive CAPILLUS VENERIS officinarum.

**A**διάντων & πολύτριχον Dioscoridi l.4.c.136. αδιάντων Theophrasto 7.hist.13. dicitur, quod αδιάντων, quod in aquis non madescat, nec quicquam humoris adhaesisse constet: velut Nicander in Theriacis, quod imbris è solo descendenti stillicidia, foliis ejus non insideant. Πολύτριχον autem quasi multicomam, quod capillos multos ac densos faciat, eorumq; desfluvia expleat. Callitrichon verò Apulejo, quasi pulchricomum, quod capillos tinget, pulchrioręq; reddat. Nec alia ratione Capillus Veneris hac herba dicta est, quàm à speciosis reddendis capillis, nec alio nomine Veneris vox adjecta est, quàm quod hac pulcherrima pingatur. Plinio l.22 c.21. Adiantum quidam Callitrichon, alii Polytrichon vocant, utrumq; ab effectu, tingit enim capillum &c. crispum densumq; facit & desfluere prohibet. Latinis Cincinalis, terra capillus, supercilium terra, crinita, Dioscoridi folia gerit pusilla coriandri similia, in extremo incisuris divisa: virgulus è quibus ea prodeunt, nigro colore nitentes, prætenues, palmum altas, neq; caulem, neq; florem, neq; semen profert: radix super vacua est.

Genera duo sunt, candidum atq; nigrum, Theophrasto l.c. Plinio l.c. duo, candidum & nigrum breviusq; id quod majus est Polytrichon: aliud Trichomanes vocant, utriq; ramuli nigro colore nitent, foliis filicu &c. ubi Plinius Trichomanes, alterum Adianti genus sc. candidum facit: cum Theophrasto Trichomanes Adianti genus non sit, sed sui generis planta. Verùm Adiantum album & nigrum, nihil differunt, nisi quod Adianto nigro, cauliculi poliotiore nitre nigricant, foliaq; saturatius virent: alba minus.

I. Adiantum foliis coriandri.

Adiantum magnum, Trag.

Adiantum, Matth. Fuch. Dod. ut: Ang. Lac. Ad. (sive Capillus Veneris verus) Lob. Cast. Lugd.

Adiantum Lugdunense, Cam.

Adiantum nigrum, Cord. in Diosc. & hist. Frac. Taber.

Capillus veneris vulgo, Adiantum album Plinii, Cæf.

Capillus Veneris verus, Ger.

Hoc variat magnitudine & foliorum crassitie: quare majus & crassioribus foliis,

Adiantum Syriacum, Taber.

Capillum Veneris Syriacum, Ger. vocat.

II. Adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro.

Adiantum pulchrum Lugdunensi simile, Thal.

Onopteris nigra, Dod. ut: Lugd.

Adiantum nigrum Plinii, Ad. Lob.

Adianti nigri aliud genus, Cæf.

Onopteris major, Tab. mas, Ger.

III. Adiantum foliis minutim in oblongum scissis, pediculo viridi.

IV. Adiantum fruticosum Brasilianum: quod in Prodomo descriptum est.

V. Adiantum mas, Taber.

Onopteris scemina, Ger.

Quid sit nondum assequor.

## TRICHOMANES seu POLYTRICHUM officinarum.

**T**ριχομανές, quod etiam nonnulli αδιάντων vocant, Dioscoridi l.4.c.137. Latinis etiam Trichomanes dicitur: officinis Polytrichum, quod nomen, secundum veteres, Adianti est. Dicitur Trichomanes à vi sua, quod rara cute fluenstem capillum expleat & subnasci faciat: parvo enim illi rarum vocant & τριχά capillum: hinc Latinis capillarius dicitur. Hoc Dioscoridi l.c. folio est Filici simili at longe exilius: foliis tenuibus, ordine utrinq; dispositu lentricula similibus, adversis inter se in virgulis iidem tenuibus, splendentibus nigricantibus, junq; acerbis.

Yy 2

I. Tri-

I. *Trichomanes* sive *Polytrichum officinarū*.  
*Saxifraga minor prima*, Brunf.  
*Trichomanes*, Trag. Matth. Fuch. Ang. Dod. ut:  
 Cord. hist. Gef. hor. Tur. Lac. Ad. Lob. Cast. Cam.  
*Trichomanes nigrum*, communiter *Saxifraga*  
*rubra*, Thal.  
*Trichomanes mas*, Taber.  
*Adiantum rubrum*, Lonic.  
*Polytrichum vulgo*, Cæfalp.

Magnitudine variat: hinc & altera figura,  
*Trichomanis maris majoris*, Tab.  
*Trichomanis maris*, Ger.

II. *Trichomanes minus & tenerius*.  
*Trichomanes candidum*, Thal.  
*Trichomanes minor mas*, Tab.

III. *Trichomanes ramosum majus & minus*.  
*Trichomanes femina*, Tab. Ger.  
*Trichomanes minor femina*, Taber.

## RUTA MURARIA sive SALVIA VITÆ.

**R**uta dicitur, ob quandam soliorum cum Ruta similitudinem, qua, ubi *Adiantum* verum, ut & *Trichomanes* defunt, aut verusua sunt uti licet: aliqui ob natales *Empetron*, alii ab effectu inter *Saxifragas* recensent: & hanc jun. enda quando Medici recentiores *Adiantum* recipiunt à *Capillo veneris* diversum.

*Ruta muraria*.  
*Capillus Veneris*, Brunf. Trag.  
*Saxifraga major 2.* Brunf.  
*Saxifraga seu Empetron*, Fuch.  
*Paronychia*, Matth. Lac. Cast.

*Ruta muraria*, Dod. ut: Gef. hor. Ger.  
*Adiantum candidum*, Cord. in Diof. & hist. Guil.  
*Adiantum album*, Lon. Cam. Tab. (Thal.)  
*Adiantum nigrum*, Gef. hor. Cæf.  
*Salvia vitæ*, Ad. Lob. Lugd.

## POLYTRICHUM AUREUM.

*Πολύτριχον* à ramulis qui capillorum instar tenues sunt, aureum verò à colore dicitur.

I. *Polytrichum aureum majus*.  
*Polytrichum majus*, Trag.  
*Polytrichum Apuleii majus*, Fuch.  
*Polytrichum aureum*, Dod. gal. majus, Lugd.  
*Muscus saxatilis aut sylvestris*, Trag.  
*Muscus terrestris* Tragi, Lugd.  
*Adiantum apuleii majus*, Thal.  
*Adiantum aureum*, Taber.  
*Muscus capillaris*, Ger.

Hoc cubitalis sæpe longitudinis instar cirrurum inflexum ex Moravia adferitur, & à circulatoribus inter radices & Theriacas suas venale circumfertur, de hoc aureos montes pollicentibus.

II. *Polytrichum aureum medium*.  
*Polytrichum nobile vel primum*, Trago.

*Polytrichum Apuleii aureum vel 2.* Lon.  
*Muscus capillaris*, Dod. minor, Ger.  
*Adiantum apuleii medium*, Thal.  
*Adiantum aureum minus*, Tab.  
*Herbula gramini similis in parietibus major & minor*, Cæf.

III. *Polytrichum aureum minus*.  
*Capillus Veneris*, Brunf.  
*Polytrichum minus*, Trag. Apuleii minus, Fuch.  
*Polytrichum aureum minus*, Dod. gal. Lugd.  
*Polytrichum aureum tertium*, Lon.  
*Musci capillaris altera species*, Dod.  
*Muscus quidam in parietibus & tegulis*, Cæf.  
*Adiantum apuleii minus*, Thal.  
 Hujus speciem *Polytrichi nigri Brocenbergii* nomine à D. Fürero accepimus.

## ROS SOLIS.

**R**os Solis & Rorella, quæ veluti stella alicujus juvare sub Sole fulget, à mirabili natura nomen adepta est: nam quantumvis diu sol fervidus estate eam illustret, ejus tamen folia semper rore & humiditate madent, eorumq; lanugo guttulis aspersa manet: & quod admiratione dignum, quod humidum illud in soliorum acetabulis contentum, ubi extremis digitis leviter attingitur, dum adhuc natali suo solo inherens, aut confestim inde evulsa soli radiis experitur, mox velut in exigua filamenta sericea aut candiuscula deducitur, quæ confestim concreta, ita postea semper perdurant. Hac ob magnam cum capillaribus affinitatem, subjungenda fuit. Recentiorum aliqui opinor, sed ab Achimilla diversum nominant, Opio enim rorem significat.

## I. Ros Solis folio rotundo.

Polytricho minori figuram sine descriptione addit Tragus.

Ros Solis, Dod. ut: Lon. Cast. Cam. (cui & Solaria) major, Ger.

Rosa Solis vulgo, Cajo Britanno.

Rorida five Ros Solis major, Lob.

Solfirora seu Sponsa Solis, Thal.

Rorella minor prima, Tab.

Rorella five Ros Solis, Eyft.

Mas & fœmina, inter Musci albicantis & subrubentis genera crescent.

## II. Ros Solis folio oblongo.

Rorella five Salsifiora, Cord. hist.

Ros Solis, lunaria quibusdam & Artemilla, Gesl. de lun.

Ros Solis alia, Dod. Lugd. minor, Ger.

Polytrichum Apuleii album, Lon.

Rorida five Solis ros, Ad. Lob.

Rorella minor 2. Tabern.

## SECTIO SECUNDA.

FILIX; DRYOPTERIS; LONCHITIS; PODIUM; HERBA VIVA; & HERBA MIMOSA.

## FILIX ET DRYOPTERIS.

**F**ILIX, *Ῥίεξ* & *Ῥίεω* Græci dicta, ab aliis avium, quarum speciem ejus folia in ramulis disposita referunt, cum foliis pennatis sit Filix: & ut Plinius, folia lateribus pennata, unde nomen Græci imposuerunt.

Duplex est, Græci & Plinio: mas & fœmina. Mas *Ῥίεξ* simpliciter dicta Theoph. 9. hist. 20. at Dioscor. l. 4. c. 186. *Ῥίεξ* & *Ῥίεω* & *Ῥίεω* dicitur, cui folia sine caule, sine flore, sine semine, eaq; ex uno pediculo cubitali ferme longitudine exeunt, incisæ & pennarum modo utrinque expansæ, subgrævi odore: radicem habet per summam cespitem nigram, quadantenus longam, multas propaggines fundentem & substringentis gustus. Vel ut Plinius l. 27. c. 9. Filicis duo genera: pterin Græci vocant, alii blechon quam marem existimant, ex una radice quamplures exeunt filices, binæ etiam cubita excedentes longitudine, non graves odore. Theoph. 1. hist. 16. Filix figura multifida, & quasi serrata sicut Abietis.

Fœmina *Ῥίεω* & *Ῥίεω* Diosc. l. c. *Ῥίεω* Theoph. 9. hist. 20. Plinio l. c. alterum genus thelypterim Græci vocant, alii nymphæam pterin: foliis est Dioscoridi filicis, quæ tamen non singulari ut illa pediculo habeant, sed è numerosis altioribus, propaginibus exeunt: radices longæ, obliquæ, numerosæ, ex nigro slavefcentes, aliquæ etiam rubræ: vel ut Plinius, est singularis, atque non fruticosa, brevior, mollior; & densior, foliis ad radicem canaliculata: radices utriusque longæ, in obliquum nigra, præcipue cum inaruerit. Theophr. l. c. differt fœmina Filix à mascula, quod folium unico artu porrectum hæc habeat, & radicem crassam & longam & nigram.

*Ῥίεω* seu Filix quærna: hæc à foliorum figura & loco natali nomen obtinuit: quæ Dioscoridi l. 4. c. 189. filici similis, at multo tenuiore foliorum incisura radicibus inter se implicitis, bisfutis gustu astringentibus & ad dulcedinem vergentibus: & Plinio l. 27. c. 9. Dryopteris filici similis in arboribus nascitur, tenuis foliorum subdulcium incisura, radice bisfuta.

## Filix ramosa.

I. Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis.

Filix sylvestris, Brunf.

Filicis majoris primum genus, Trag.

Filix fœmina, Matth. Fuch. Dod. Lac. Ad. Lob.

Cast. Lugd. Tab. Ger.

Thlypteris filix fœmina, Cord. in Diosc.

Filix mas, Gesl. hor.

Filix fœmina prima, Thal.

Filix, Cæsalp.

Filix mas major five fœmina credita vulgo, Clus.

pari.

Hujus folia communiter per ambitum non sunt dentata vel serrata, aliquando tamen folia inferiora, ad formam foliorum scabiosæ divisa reperiuntur.

II. Filix ramosa major pinnulis acutissimis non dentatis.

III. Filix ramosa non dentata florida.

Filicis majoris alterum genus, Trag. Lugd.

Filix aquatica, Dod. gal. Lugd.

Sidericis forte Ruellio.

Filix mas, Ang.

Filix latifolia, Cord. hist.

Filix palustris, Gesl. ap. Dod.

Filicis genus rarius, Gef. hor.

Lunaria major seu filix lunaria & Filicastrū, Gef. de lunar.

Osmunda, Ad. Lob.

an Filix palustris, Cæs. alp.

Hujus species tenuiter dentata reperitur.

I V. Filix ramosa minor primulis dentatis,

Pteridion masculum, Cord. hist.

Filix foemina altera tenuifolia, Thal.

Filicula petraea foemina 4. Tab. ico.

Filix querna seu Dryopteris, Ger.

*Filix non ramosa,*

I. Filix palustris maxima dentata: in Prodro-  
mo describitur.

II. Filix palustris altera subfusco pulvere hir-  
suta.

Struthiopteris, Cord. hist. Thal.

III. Filix non ramosa dentata.

Filix, Brunf. vulgaris, Trag.

Filix mas, Matth. Fuch. Dod. ut: Tur. Lac. Lon. Ad.

Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Filix foemina, Ang. Gef. hor. Cæs.

Filix mascula, Cord. in Diosc. & hist.

Filix mas altera, Thal.

Dryopteris, Matth. in epit. & Lugd.

Duplex est: altera cui primulae in ambitu sunt  
dentatae, altera cui non sunt serratae: illa

Filix mas altera: hæc

Filix mas prima, Thallio dicitur.

IV. Filix non ramosa petiolis tenuissimis &  
tenuissimè dentatis.

Filicula petraea prima, Taber.

Filicula montana mas, Ger.

V. Filix querna.

Dryopteris, Brunf. Matth. fol. Cord. in Diosc. Gef.  
hor. Ad. Lob. Cam. ep.

Filix arborea sive Dryopteris, Trag. Lugd.

Dryopteris Tragi & Pteridion foemina Cordi,  
Thal.

Filix querna, Osmundula, Lon.

Filicis genus parvum alterum in montibus, Cæs.

Filicula petraea foemina 2. Taber.

VI. Dryopteris Dalechapii apud Lugd. quid?

*Filix saxatilis.*

I. Filix saxatilis foliis non serratis.

Filicula petraea foemina tertia, Tab.

Filicis genus parvum primum in montibus, Cæs.

II. Filix saxatilis ramosa nigris maculis pun-  
data.

Filix pumila saxatilis prima vel mas, Clus. pan. &  
hist.

an Filicula candida & minor, Gef. alp.

III. Filix saxatilis non ramosa nigris maculis  
punctata.

Filix pumila saxatilis altera, vel foemina, Clus. pan.  
& hist.

an Filicula saxatilis, Cam.

Huic similis quam Gef. in hortor. appéd. Chla-  
rosthicon vocat, cujus folia supina, punctis ad lu-  
teum viridemque & album colorem mixtis sen-  
dentibus notantur,

IV. Filicula alpina crispa,

Filicula saxatilis crispa, Pon.

an Pteridion, Cord. hist. & Thal.

V. Filix saxatilis corniculata.

Filix nuda sive saxatilis, Trag. Lugd.

Filix petraea, Lon.

Holostium alterum, Ad. Lob.

Holostium petraeum, Tab. Ger.

Muscus corniculatus, Taber. Ger.

Adiantum *επιρροον* seu furcatum, Thal.

*Filicula fontana.*

I. Filicula fontana major, sive Adiantum al-  
bum filicis folio.

Dryopteris candida, Dod. ut: Lug.

Adiantum album Plinii, Ad. Lob.

II. Filicula fontana minor.

Filicula fontana, Taber.

Filicula fontana foemina, Ger.

III. Filicula maritima ex insulis Stoechadibus.

Chamae filix marina Anglica, Lob. Lugd.

*Filix aculeata.*

I. Filix aculeata major.

II. Filix aculeata minor: utraque in Prodro-  
mo descripta est.

*L O N C H I T I S.*

**Λ** *Ορχνίς* Dioscoridi l. 3. c. 161. duplex est, altera foliis porri, quam & Plinius l. 25. c. 11. *Lonchitidem* vocat: al-  
lia est quam *Ιορχνίς* *τετρακτύς* dicunt: hac forte à *τρίκτυς* lancea dicitur, eo quod folia inslar lancea in ac-



tum definant. Hac secundum Dioscoridem folia proferi Scolopendrii, seu asperiora majoraq., ac multo magis divisa, de qua in praesens.

I. *Lonchitis aspera.*

*Lonchitis aspera major*, Matth. Lugd. Cam.

*Lonchitis altera*, Ang. Lac. Cast. Lon. cui & Spicant Germanorum, fortè à radice, Indicam spicam referente.

*Lonchitis altera*, quibusdà *aspera*, Cord. in Diosc. Ges. hor. app.

*Lonchitis altera mas*, Taber.

*Lonchitis Maranthæ*, Ger. ico.

II. *Lonchitis minor.*

*Asplenium sylvestre*, Trag. Lugd.

*Lonchitis aspera minor*, Matth. Lugd. Cam.

*Lonchitis aspera*, Dod. ut. Lugd. Thal. Ger.

*Struthiopteris*, Cord. hist. icon. Thal.

*Lonchitis altera Dioscoridis*, Ges. frac. Ad. Lob.

*Scolopendrium mas*, Lon.

*Lonchitis altera femina*, Tab.

*Lonchitis altera Neotericorum*, Clus. pan. & hist.

III. *Lonchitis folio Ceterach-*

*Pseudolonchitis aspera*, Matth. Lugd. ubi titulus transpositus.

*Lonchitis 2. Dalmatica*, Ang.

*Lonchitis Maranthæ*, Lob. altera *Maranthæ*, Clus. hist.

*Lonchitis aspera Maranthæ*, Cam. ep.

*Lonchitis aspera Ilvensis*, Lugd.

*Ceterach* genus in Ilva nascens, Czf.

*Lonchitis adulterina*, Tab.

*Filicis* genus quæ *Lonchitis altera*, Clus. pan.

*Polypodium Ilvense*, Lugd.

*Filicala petra mas*, Ger. ico.

Magnitudine variat: hinc duæ figuræ apud Lug.

*Lonchitidis asperæ minoris*:

*Lonchitidis asperæ Ilvensis*.

## P O L Y P O D I U M.

**P**ΟΛΥΠΟΔΙΟΝ *Dioscoridi* l. 4. c. 188. Theophrasto 9. hist. 1. 4. Filiculam Gaza vertit: officina Græcam nomen retinere: ratio nominis ex Dioscoridi descriptione colligitur: nascitur palmi altitudine, filici simile, subirsutum & incisum, at non perinde tenui divisura: radix subjacet pilosa, cirros habens ceu polyporum, crassitudine minimi digiti: hac derafa coloris intus herbacei comperitur: & Plinius l. 26. c. 8. Polypodium quam nostri filiculam vocant, similis enim est filici: radix pilosa coloris intus herbacei, crassitudine minimi digiti, acetabulis cavernosa ceu polyporum cirri, subdulcis: in petris nascens, aut sub arboribus vetustis.

I. *Polypodium vulgare.*

*Polypodium*, Brunf. Trag. Matth. Ang. Fuch. Dod.

gal. Cord. in Diosc. & hist. Ges. hor. Tur. Lon. Ad.

Lob. cui & herba radioli Apuleii, Czf. Cast. Cam.

Tab. Gerar.

*Polypodium majus*, Dod.

*Polypodium primum*, Lugd.

Laudatur quod in queren nascitur: reperitur in fago, eorylo: in antiquis & carduis salubus, guaiamarior provenit, quæ sylvatica censetur: in

ruderibus saxosis.

II. *Polypodium minus.*

*Polypodium alterum*, Matth. Lac. Lug. primum, Tab.

*Polypodium minus*, Dod.

*Polypodium quercinum*, Ger.

III. *Polypodium exoticum foliis quercus.*

*Polypodium Indicum*, Clus. exot. l. 4. c. 17.

Hoc sub incognita Americana, à Jo. Pona Veronaceepimus.

## HERBA VIVA FOLIIS POLYPODII.

**H**ERBA Viva dicitur, ed quod si eam qui apprehendere cupiat, folia illico contrahat & sub tenues ramulos recondat, si verò qui apprehendat, subito licet, adeo marcida conspiciatur, ut exsecrata existimetur: attamen si quis manum retrahat, illico nitorem recuperat: & toties marcescit, aut revivescit, quoties comprehenditur, aut manibus ea retrahitur.

Anonymos in Malavar, Garzia, Cast.

Planta in Peru nascens, Franc. Lopez de Gomara.

Herba Sentiola, il est Sensifica Lusitanis, Linc.

Bar. 4. Ind. or. c. 17.

Herba viva, Guiland. p. p. Acofta, Clus. Lugd.

cui & herba amoris.

an Æschynomine Apollodori, Scalig. Lugd.

an planta per terram diffusa, quam si quis attingat

statim contrahitur, ut Brasica Mureiana, ex India

Occid. missa Monardi, Lugd.

HER.

## HERBA MIMOSA FOLIIS FOE.

nugraci sylvestris.

**H**ERBA Mimosa nuncupatur, quoniam manu admodum senescit & marcescit, manu vero remota, primum virorem recipit, sed non adeo celeriter ut prior: colore & sapore est Glycyrrhica & multum notum cum Fennigraeco sylvestri Tragi, Clusio monente, convenit.

Herba molle & herba delicata vulgo, Acoftæ.  
Herba mimolâ, Lug. eadem figura quæ Acoftæ.

Clusius notis suis in Acoftam diversam plantam figuram proposuit, Herbam mimosam nominans.

## SECTIO TERTIA.

## MUSCUS, LICHEN, LENTICULA PALUSTRIS.

## MUSCUS.

**M**USCUS Ῥσιν & ἑνδρόιον Græci appellantur, ut Dioscoridi l. i. c. 20. Artici Sphagnum & Hypnum: Plinius l. 12. c. 23. Bryon & Sphagnum: & l. 24. c. 6. Sphagnos five Sphacos five Bryon vocat: Muscus vocatur etiam villosa substantia, caudicibus annosis, aut saxi madidi, aut aquis palustribus, aut mari adnascens.

Differentia: multiplex est: arborum, de quo Dioscorides l. i. c. 20. Plinius l. 12. c. 23. terrestris, saxatilis, maritima, de quo Plinius l. 4. c. 99.

## MUSCUS TERRESTRIS.

Muscus terrestris repens.

## I. Muscus vulgarissimus.

Muscus hortensis, Trag.

Muscus terrestris vulgaris, Dod. Lobb. ico.

## II. Muscus vulgaris pennatus major.

## III. Muscus vulgaris pennatus minor.

Hi duo sub I. Musco in Prodro-mo describuntur.

## IV. Muscus filicinus major.

Muscus filicinus, Tab. Ger.

In hoc triplex varietas observatur.

## V. Muscus filicinus minor floridus: in Prodro-mo sub 2. descriptus.

## VI. Muscus abietis facies: qui 3. in Prodro-mo.

## VII. Muscus denticulatus major.

Muscus terrestris denticulatus, Lob. Lugd.

Muscus terrestris minor, Dod.

Muscus tertius, Tab.

Muscus minor denticulatus, Ger.

## II X. Muscus denticulatus minor.

Muscus terrestris repens, Clus. hisp.

Muscus terrestris minor alter, Dod.

Muscus terrestris denticulatus alter, Lob. Lugd.

Muscus terrestris Lusitanicus, Clus. hist.

Muscus denticulatus, Ger.

Muscus secundus, Tab.

## IX. Musco denticulato similis.

Muscus montanus, Taber.

Muscus terrestris vulgaris, Ger. ico.

## X. Muscus terrestris clavatus.

Weinfrant / Brunf. qui vinum pendulum reliquit.

Muscus terrestris, Trag. Matth. Eac. Dod. Cast.

Muscus urinus vel pes urinus, Gef. fræc.

Lycopodium, id est pes lupi, Dod. gal. Tab.

Chamaepeuce, Cord. hist. ico. Gef. Tur.

Permonaria five Pulmonaria, qua pro spica Cætica usi sunt, Ang.

Muscus clavatus, &amp; Pes leoninus, Lob. Ger.

Muscus terrestris 2. &amp; alius terrestris, Lugd.

Musci genus, quod pro spica vendebatur, Cels.

Selaginis species altera, Thal.

## XI. Muscus clavatus foliis cupressi.

Savina sylvestris, Trag. Gef. hor. Lon.

Muscus terrestris tertius, Lugd.

Chamaecyparissus, Tur. Tab. Ger.

Savina Tragi sylvestris, seu Silaginis Plinius prima species, Thal.

Plinius l. 25. c. 11. hæc habet: Similis herbæ Sabinae est Selago appellata.

XII. Herbæ Musco similes quas Terrenæ in fasciculum collectas & tuniculo satis longo colligatas in mare abiciunt ad pisces capiendas: par. 3. Ind. or.

XIII. Toucon herba apud Brasilienses quæ ad piscandum utuntur, spinas in hamorum modum componunt, lineamq; herba illa conficiunt. Lerijs dicit. Brasil. c. 11.

Muscus terrestris ramosus.

## I. Muscus erectus ramosus saturatè viridis.

Selago

Selago tertia, Thal.

Hæc inter foliola aliquando granula habet.

II. *Muscus erectus ramosus pallidus.*

*Muscus scoparius, Lob. Lugd.*

*Muscus terrestris, Tab.*

*Muscus terrestris scoparius, Ger.*

Hic claviculo vulgaris modo non infigit.

III. *Muscus terrestris candidus ramosus.*

IV. *Muscus ramosus repens spicatus.*

V. *Muscus ramosus repens apicibus candidibus.*

VI. *Muscus ramosus erectus major.*

VII. *Muscus ramosus erectus minor.*

IX. *Muscus ceranoides major & minor.*

IX. *Muscus cupressiformis ramosus.*

Septem posteriores in Prodro-mo describuntur.

X. *Muscus polytrichoides triplex: in Prodro-mo descriptus.*

XI. *Muscus parvus stellaris.*

*Muscus in ericetis proveniens, Lob. belg.*

XII. *Muscus stellaris roseus: in Prodro-mo describitur.*

XIII. *Muscus pyxiodes terrestris.*

*Muscus terrestris pyxiditatus alabastricolos imitatus, Lob. belg.*

XIV. *Muscus pyxiodes saxatilis, in Prodro-mo descriptus.*

*Muscus terrestris coralloides.*

I. *Muscus terrestris coralloides erectus incanus.*

II. *Muscus terrestris coralloides erectus cornibus rufescentibus: in Prodro-mo uterq; sub II. & 12. descriptus.*

III. *Muscus coralloides sive cornutus montanus.*

*Muscus corallinus sive Corallina montana, Tab. Gerard.*

IV. *Muscus coralloides saxatilis, cervi cornua referens,*

*Lithobryon coralloides, Colum.*

Variat: major colore virente: minor colore cinereo.

# **MUSCUS ARBOREUS.**

I. *Muscus arboreus: Ulnea officinarum.*

*Muscus arboreus, Trag. Matth. Ang. Dod. Lugd. Cast. Thal.*

*Muscus, Dod. gal. Cord. in Dioscoridis, Lon. Ta-*

*Musci quernus, Lob. Ger. (bern.)*

*Musci genus, quod privatim Splachnon vocant, Cæf.*

Unus tenuior, crassior alter, brevior, alius prolixior: omnes candefcentes, pauci rutilantes, quodque nigri.

Reperitur potissimum in quercu, populo, ulmo, betula, pomo, pyro, pinu, picea, piceastro, abiete, cedro, larice & aliis complurimis. Verum primæ nobilitatis & odorati sunt, Cedrinus, lariceus, piceus, pineus & abietinus: Secundum locum tenet populneus, sed candidus præstat, nigricans improbat: rutilans medium tenet: vilissimus quernus.

II. *Muscus capillaceus longissimus.*

*Muscus capillaceus cinerei coloris, è ramis Illicis dependens, Clus. hist.*

an *Muscus* ex præaltis arboribus ad terrâ usq; demissus, coloris viridis in cæruleum tendentis, quæ Regina in Florida cingitur, tenuibus staminibus catenularum instar invicem coherentibus: par. 2. Amer. fig. 39. quemadmodum Rex sedem suam Musco lentiscino tegit: par. 2. Amer. narrat. 4.

III. *Muscus arboreus cum orbiculis.*

*Muscus sceniculaceus, Lugd.*

*Muscus ramosus & muscus ramosus floridus, Tabern. Ger.*

*Muscus quernus fruticosus* *τεχνημα*, Col.

Potissimum in Qercu & Fago varians umbellis majoribus & minoribus: planioribus & radiis multo diametro longioribus ramosis ac hirsutis.

IV. *Muscus arboreus capitulis cavis.*

*Muscus alter* *πατυπικωδανφυλλον*, Col.

V. *Muscus arboreus coralloides.*

*Muscus alter quernus coralloides* *αφυλλον*, Col.

VI. *Muscus arboreus nodosus.*

*Dendrobryon geniculatum, Col.*

VII. *Muscus pulmonarius.*

*Pulmonaria, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Gesn. hor. Lac. Lon. Tab.*

*Pulmonaria* 1. Cast. tertia, Clus. pan.

*Pulmonaria fungosa, Lugd. vulgaris, Thal.*

*Muscus pulmonarius, Lob.*

*Pulmonaria, Lichenis quoddam genus, Cæf.*

*Hepatica terrestris, Ger. ico.*

Variat laciniis latioribus & angustioribus & hæc Lichen arboreum, Tab. & Gerar. dicitur. Arboribus præsertim Quercui, Sorbo aucupariæ & aliis adnascitur: petris quoq; sed hoc cadidius est.

IX. *Muscus crustæ modo arboribus adnascens.*

*Lichen Dioscoridis & Plinii alterum, Col.*

Z z

Procura

Procure Valesianorum.

In arborum caudicibus, in petris, tophis & testorum, regulis veluti patella adhæret: colore va-

rians, viridante, flavescente & cinereo vetustate petris adhæret: arborum caudicibus lutescens crustosa & major observatur.

## MUSCUS SAXATILIS vel LICHEN.

**A** *Εἰς τὴν Græcū, Latinū similiter Lichen sic dicitur Galeno, quia lichenes, id est impetigines curat. Dioscoridi l. 4. c. 53. λέγεται quæ petris innascitur & aliqui βίον appellant, cum muscus est roscidus petris inherens. At Plinio duplex est l. 26. c. 4. Lichen herba in Lichenis remediis omnibus præfertur, inde nomine invento nascitur in saxosis folio uno, ad radicem lato: caule uno parvo, longis foliis dependentibus: est aliud Lichenis genus, petris tantum inherens ut Muscus: qui & ipse limitur.*

I. Lichen petræus latifolius sive Hepatica fontana.

Hepatica, Brunf. Lon. prima, Tab.

Hecoraria seu Hepatica fontana, Trag.

Lichen, Matth. Fuch. Ang. Dod. ut: Cord. in Dioscorid. Tur. Lac. Lob. Lugd. Cæs. Thal.

Lichen 1. Lob. petræa, Ger.

II. Lichen petræus stellatus.

Lichen 2. Lob. Lugd.

Hepatica 2. Tab. Ger.

III. Lichen petræus umbellatus.

Lichen tertius, Lob. Lugd.

Hepatica tertia, Tab.

IV. Lichen petræus muscosus racemosus, in

Prodromo sub 15. descriptus.

V. Lichen petræus cauliculo pileolum sustinente.

Lichen Plinii primus pileatus, Col.

VI. Lichen petræus cauliculo calceato.

Lichen alter minor caule *ἄλλος ἁπλοῦς* Col.

VII. Lichen petræus minimus fructu orobi.

Lichen alter acaulis *ἄλλος ὅσῳ ἁπλοῦς* Col.

VIII. Muscus saxatilis ericoides: qui 7. in Prodromo.

IX. Muscus saxatilis repens contra spargam.

Duplex est latiore folio in aquis, qui Muscus est 14. in Prodromo: angustiore expanso, qui supra lapides Hareyoniz reperitur.

## LENTICULA PALUSTRIS.

**L** *ens sive Lenticula palustris, Dioscoridi l. 4. c. 88. φακὸς ἐστὶ τὸ τετραμήτων dicitur (quod foliolum sit lenticula forma) quæ in aquis pigris stagnantibus reperitur, muscus scilicet lenticula similis.*

I. Lenticula palustris vulgaris.

Lenticula aquatica, Brunf. Thal.

Lenticula palustris, Trag. Cæs. Tab.

Lens palustris, Mart. Dod. gal. Ang. Cord. in Dioscorid. Tur. Lac. Lob. Lugd. Ger.

Lenticula, Ad.

Lens palustris, Dod.

II. Lenticula palustris bifolia fructu tetragono.

Callitriche Plinii, Colum.

III. Lenticula aquatica trifolca.

Hederula aquatica, Lob. belg. Ger.

Hederula palustris, Tab.

IV. Lenticula palustris quadrifolia.

Lens palustris altera, Matth. Lac. Lugd. Cast. ap.

Lenticula palustris 2. Tab.

an Lenticulæ alterum genus, Cæs.

Lemna Theophrasti, Lugd.

Theophrasto 4. hist. 15. *Νύμφα* quod vocatur, altius mergitur in aqua.

V. Lenticula palustris latifolia punctata.

Stratiotes aquatica Dioscoridis, Cæs.

VI. Lenticula palustris Ægyptiaca, sive Stratiotes aquatica foliis Sedo majore latioribus.

Hayhalem elmaoin, quasi dicas aquosum sedum.

Stratiotes Dioscoridis, Alp.

Dioscoridi l. 4. cap. 102. *στράτις* sive *στράτις*, ex eo cognomentum traxit, quod aquis supernatet, & sine radice vivit: folium habet Aizoon simile, at majus. Plinio l. 24. c. 18. Stratiotes in Ægypto tantum & inundatione Nili nascitur, aizoon similis, ni majora haberet folia.

VII. Quadrifolium aquaticum nobis incognitum.

Tetraphyllum, Lugd.

## SECTIO QUARTA.

MUSCUS MARITIMUS; FUCUS sive ALGA; CORALLINA; CORALLUM; PORUS; ANDROSACE; ALCYonium; Spongia; Urtica maritima.

## MUSCUS &amp; FUCUS MARINUS.

**M**uscus Marinus sive Fucus maritimus Dioscoridi l. 4. c. 99. in saxis testisq; ad mare nascitur, capillaceus, gracilis sine caule.

Fucus Marinus sive Fucus maritimus l. 4. c. 100. quoddam latum: alterum oblongum & quadrangulum puniceum: tertium candidum, quod in Creta nascitur juxta terram, pulchre floridum, neq; corruptioni obnoxium. Et Theophrasto 4. hist. 7. & 8. pluria sunt genera: quoddam folio lato, colore herbido, quod Porrum quidam appellant, alii cingulum radice hirta, extrinsecus squamata: intrinsecus longa admodum crassa, &c. Aliud folio crinito terre ipsi adhaerens, saepe, à mari tantum alluitur. Alterum altius degit, in mari extero circa Herculis columnas nascitur, mira magnitudine & latitudine, & ut ferunt, amplius quam ut manu comprehendi possit &c. Alga verò proveniens in alto, quam Spongiarii pelagicum deserunt, in Creta insula juxta terram super saxa plurima optimaq; provenit, quae non solum vitas, sed etiam lanas vestesq; inficiunt &c. Sunt alia Graminibus proxima, quippe folio simili, radice geniculata, longa, oblique adhaerente modo graminis, & caule calamaceo ut gramen, magnitudine Alga minore. Est aliud & 6. v. dictum, folio coloris herbidi, amplo, nec Lactuca dissimili, rugosiore tamen & veluti contracto: caret caule: sed ab uno initio plura folia ejusmodi exeunt & rursus ab alio: nascitur super tegulas scissiliq;, juxta terram. Huius verbi Theophrastus Fuci marini quing. genera proposuit: Zosteria sive Prafon: capillaceum sive geniculaceum: tinctorium spongiariorum sive pelagicum: gramineum: lactuceum. Plinio qui 6. p. 1. & 2. v. 2. & confundit l. 27. c. 8. Bryon marina herba sine dubitatione est, lactuca foliis similis, rugosa veluti contracta sine caule, ab ima radice exeuntibus foliis: nascitur in scopulis maximè testisq; terra comprehensis. Idem l. 13. c. 25. (de Phucus sive Alga agens) Non habet lingua alia nomen, quod Graci Phycos vocant: quoniam Alga herbarum magis vocabulum intelligitur. Folia lata, colore viridi gignit, quod quidam prafon vocant, alii Zosteria. Alterum genus ejusdem capillaceo folio simile sanculo, in saxis nascitur, superius in vadis haud procul littore. Verno utrumque & interit autumnino. Circa Cretam insulam nato in petris purpuras quoq; inficiunt: laudatissimo à parte Aquilonis una cum spongia. Tertium graminis simile, radice geniculata, & caule qualiter calami. Aliud genus Phycorum, Bryon vocatur folio Lactuca, rugosiore tantum, jam hoc interius nascens.

## Muscus maritimus.

I. Muscus capillaceus multifido folio albidus.

Muscus marinus vulgarissimus, Lob. Lugd.

Muscus marinus 2. Dod. ac primus, Eid. belg.

Muscus marinus 3. Tab. marinus, Ger.

Muscus marinus herbaceus mollior, Cæf.

Muscus albus marinus, Imper.

II. Muscus capillaceus multifidus niger.

Fuci marini nigri repentis nomine ex mare Balthico accepimus.

III. Muscus maritimus viridis multifido folio.

Palmula marina, Imper.

Muscus marinus, Clus. hist.

Hujus diversae sunt species.

IV. Muscus maritimus tenuissimè dissectus ruber.

an Fucus sive Alga tinctoria, Lugd.

V. Muscus pennae similis.

Penna marina, Imper.

VI. Muscus maritimus filicis folio.

Myrophillum pelagicum Cortusi, Clus. hist.

VII. Muscus maritimus Adianto affinis.

Pennaria marina, Imper.

IX. Muscus maritimus Adianto similis alter,

Polypodium marinum, Imper.

IX. Muscus maritimus Gossypio similis.

Gossypium muscus, Imper.

X. Alga bombycina, in Prodromo descripta.

## Muscus Coralloides.

I. Muscus maritimus sive Corallina officinarum.

Muscus marinus, Matth. Ang. Dod. ut: Cord. in Diosc. Lac. Tur. Cast. Lugd. Cæf. Tab.

Corallina, Lob. Lon. Lem.

**Fucus capillaceus**, Lugd.

II. **Muscus coralloides squamulis loricatus**.

**Bryon thalassion**, Tur.

**Muscus marinus** 3. Dod. vel 2. Eid. belg.

**Muscus candidus coralloides squamatus**, Lob.

**Muscus marinus candidus coralloides**, Lugd.

**Corallina altera**, Taber.

III. **Muscus coralloides latifolius**.

**Muscus coralliformis**, Lob. belg.

IV. **Muscus foliolis latiusculis ambitu diffusis**.

**Muscus marinus** 3. Dod. belg.

*Fuci subrotundi.*

I. **Fucus folio rotundo**.

**Sertolaria**, Imper.

**Corallina latifolia & Opuntia marina**, Cortus.

**Lichen marinus**, Clus. hist.

II. **Lichen maritimus**, Lob. belg. Tab.

III. **Fucus umbilicus marinus dictus**.

**Umbilicus marinus**, Imper.

IV. **Fucus fungis affinis**.

**Fucus fungularis**, Imper.

Est major & minor.

V. **Fucus cava**.

**Herba cava**, Imper.

*Fucus sive Alga latifolia.*

I. **Muscus marinus Laetueæ folio**.

**Fucus marinus** 1. Diofcoridis, Theoph.

**Bryon Laetueæ foliis** Plin. & Lob.

**Muscus marinus alter**, Matth. Cast.

**Muscus marinus Theophrasti**, Dod. gal. Lugd.

**Therapidion Crateæ**, Ang.

**Bryon thalassion**, Tur.

**Fucus marinus prior**, Dod.

**Muscus marinus virens latifolius**, Dod. belg.

**Laetueæ marina**, Tab.

II. **Muscus laetueæ marinæ similis**.

**Fucus linza dictus**, Imper.

III. **Alga intybacea diversa à Musco primo**.

**Fucus sive Alga intybacea**, Lugd.

IV. **Alga longissimo lato tenuiq; folio**.

**Sub Fucus** 4. in Prodomo describitur.

V. **Alga longissimo lato crassoq; folio**.

**Fucus** 3. in Prodomo.

VI. **Alga latifolia chartæ similis costa carēs**.

**Folium grande ex Algæ genere**, quod ex Madagascariæ advehitur cum Saccharo, Cæf. cap. de Alga & de Musa.

VII. **Alga latifolia coriacea**.

**Palmifolium giganteum sive fucus giganteus**, Imper.

an **Ulack Nortmanorum**, Lob.

II X. **Alga membranacea ceranoides**.

**Fucus** 6. in Prodomo.

IX. **Alga maritima gallopavonis plumas referens**.

**Fucus** 7. in Prodomo.

*Fucus sive Alga angustifolia.*

I. **Fucus arboreus polyichides edulis**: 1. in Prodomo.

II. **Fucus alatus sive phasganoides**: 1. in Prodomo.

III. **Fucus longo angusto crassoq; folio**: 1. in Prodr.

an **Fucus Zoster**, Lugd.

**Fuci maritimi** 2. species, Dod. belg.

IV. **Fucus angustifolius figulas referens**.

**Fucus marinus alter**, Dod. belg.

V. **Alga angustifolia vitrariorum**.

**Fucus marinus primus**, Ang.

**Fucus marinus**, Lac. alter, Dod.

**Alga**, Cæf. Imper. marina, Lobico.

**Fucus sive Alga marina graminea**, Lugd. cum duplici figura.

Hæc duplex: foliis alia latioribus, alia angustioribus, utriusque folia initio virent, dein cum eticcantur albescent: verum etiam angustifolia candidissima reperitur.

VI. **Alga cornu cervi divifura**.

**Herba Cretica quæ tinctioribus Rubella**, hoc nomine Imperatus misit.

VII. **Alga gramineo folio**.

**Algæ minimum genus**, Cæf.

*Fucus sive Alga capillaceo folio.*

I. **Alga viridis capillaceo folio**.

an **Conserva Plinii**, Ang.

**Conserva Plinii**, Lob. Lugd. Imper.

**Linum marinum**, Imper. qui hoc nomine misit.

Duplex est: alia in maritimis quæ Muscus nomenotus, sive Conserva; alia in aquis stagnantibus, quæ Linum aquaticum Imper. dicitur.

II. **Alga nigro capillaceo folio**.

**Filum maritimum Germanicum in Prodr.**

III. **Alga fontalis trichodes**.

**Conserva trichodes**, vel **Trichomanes aquaticum**, Lugd.

IV. **Alga in tubulis aquam fontanam ductentibus**.

FUCI



- V. *Fucus marinus lanuta.*  
 VI. *Fucus radicella sive Vermicularis.*  
 VII. *Fucus terzola, Vermicularis species.*  
 IIX. *Fucus forcellata lumbricalis species.*  
 IX. *Fucus tremula.*  
 X. *Fucus scoparia, Pennachio marinus.*  
 XI. *Fucus vermicularis laqueus dictus.*  
 XII. *Fuci cristati sc. Quercus & Ilex marina.*

XIII. *Fucus vermicularis duplex Retusa & Sempia.*

- XIV. *Muscus marinus trifolia.*  
 XV. *Muscus marinus Alghewa.*  
 XVI. *Fucus axungiola.*  
 XVII. *Fucus aliquibus palma marina duplex vel cortice rugoso vel laevi.*

## CORALLINA.

- I. *Corallina fruticosa recta alba.*  
*Juncus petrosus, Ang.*  
*Lithophyton marinum albicans, Gef. foss.*  
*Quercus marina Theoph. Clus. hisp. & exot.*  
*Corallina alba, Lob. Tab.*  
*Corallium album, Lugd.*  
*Muscus marinus fruticosus, Cast.*  
*Corallii similes frutices, Cæf.*  
 Ligno intus durissimo & nigro cui crusta obducitur, aliis candida, aliis cinerea, aliis rubens, testacea substantia.

II. *Corallina lutea punctata.*

III. *Corallina fruticosa purpurea.*  
*Lithophyton marinum rubri seu purpurei coloris, Geln.*

*Corallina rubens Antiphatis facie, Lob.*  
*Corallina rubra, Taber.*

*Quercus marina Theoph. Clus. exot. lib. 6. c. 4.*  
*Quercus marina cum sua basi, Eid. curis post.*

IV. *Corallina rufescens exasperata.*  
*Ericæ facie frutex marinus, Clus. ex.*

- V. *Corallina nigra veluti spinis exasperata.*  
 VI. *Corallina nigra setacea hirsuta.*

*Antiphates 2. species, Ponæ.*

VII. *Corallina nigra setacea.*  
*Antiphates sive Corallina 3. Ponæ ital.*

IIX. *Corallina nigra setacea circumvoluta.*  
*Antiphatis sive Corallina 3. altera species, Pon. ital.*

IX. *Eschara coralloides, Clus. exot. lib. 6. c. 9.*  
 X. *Corallina affinis Nodularia.*

*Nodularia, Imper.*

Variat colore albo, pullo, puniceo.

XI. *Corallina facie grumoso cortice.*

*Arbuscula marina coralloides, Clus. exot. lib. 6. c. 1.*

XII. *Corallina alba nodosa : quæ 1. in Prodr.*

XIII. *Corallina cinerea rugosa, 2. in Prodr. quæ duplex est.*

XIV. *Corallina cortice reticulato maculoso purpurascens.*

*Frutex marinus elegantissimus, ad Palmæ marini genus Theoph. accedens, Clus. exot. lib. 6. c. 12.*

XV. *Corallina reticulato cortice altera.*

*Planta marina retiformis, Clus. exot. lib. 6. c. 3.*

XVI. *Corallina pallide flavescent cortice laevi : quæ 3. in Prodr.*

## CORALLUM.

I. *Corallum rubrum.*  
*Corallium, Gef. Lob. Lugd. Cæf.*  
*Corallum rubrum, Imper.*

Variat : coloris vel intense, vel dilute rubri est, vel subflavescentis, vel fuscæ.

II. *Corallum nigrum.*  
*Corallum nigrum, Gef. Cæf.*

*Antiphates sive Corallium nigrum, Lob. Lugd.*

III. *Corallium extra rubens intus nigrum, Crisalp.*

IV. *Corallium album : & Lob.*  
*Corallium album, cuius nec apud Græcos, nec Latinos mentio fit, Cæf.*

In hoc varietas est : asperum est & striatum.

V. *Corallum album ramosum.*

*Corallum album fistulosum, Imper.*

VI. *Corallum album ramosum alterum.*  
*Coralloides sive Coralli albi varietas, Lob. Lugd.*

VII. *Corallum album verrucosum punctatum.*

*Corallum album punctatum, Imper.*

IIX. *Corallum album stellatum.*

*Corallum stellatum, Imper.*

Est majus & minus.

IX. *Corallum album articulatum.*

*Corallum articulatum ex Majorica, Imper.*

Kieg.



Rog. 1109. inquit Dioscorides lib. 5. cap. 139. aliqui *Ανδροπέρι* appellantur, marina planta est, qua alto mari exempta duratur statim atque emergit, quasi à circumfuso nobis aëre lapidescat & concrescit. Probatissimum rubens colore Sandaracha, aut Sandycus saturata, ut quod in lapidis duritiem coit scabrosus, fistulosus seu concavum, præterea inane seu spongiosum, vitiosum existimatur. Quod *αντραπίς* vocatur corallium quog, est, sed specie tantummodo distans: est colore nigro, arboris & ipsum figura, at magis ramosum. Plinio l. 32. c. 2. Corallio forma est fruticis coloris viridii: bacca ejus candida sub aqua & molles, exempta confestim durantur & rubescunt quasi Corna saiva specie atque magnitudine: ajunt tractu protinus lapidescere, si vivat: itaque occupari, evelliq, retibus, aut acri ferramento præcidi: hac de causa Curallium vocitatum interpretatur (*αντραπίς* cupietur, quoniam in mari tondetur.) Probatissimum quàm maximè rubens & quàm ramosissimum, nec scabrosus aut lapideus, vel rursus inane aut concavum: authoritas baccarum ejus non minus in Indorum viris quog, pretiosa est, quam sexminis nostris uniones Indici (sed putavit Plinius baccarum formam artificio paratam sponte nasci.) Antiphrasis verò l. 37. c. 10. inter gemmas meminit, quæ nigra sit & non translucens. Hujus volunt etiam meminisse l. 13. c. ult. his verbis: *Ισίδος* plocamon, corallio similis sine foliis: præcisum multo colore in nigrum durgscere: cum cadat frangi: item alium qui vocetur *chariobelepharon* efficacem in amatoriis: hæc Plinius. Hæc posterius nigrum esse corallium, hinc quidam arbitrantur, quod olim in supercilii seminarum, color niger pulcherrimus & vetustissimus haberetur. Refert Linscottus par. 3. Ind. or. cap. 1. ad caput Bonæ spei scopulos esse, qui magna ex parte Corallio, eoq, acutissimo, asperimog, & omnifarj coloris, ut nigri, albi, æruginosi seu viridii, constant.

## PORI CORALLO AFFINES.

Plinius lib. 36. cap. 17. PORI Lapidis servandū corporibus idonei meminit: Porio similis candore & duritia, minus tamen ponderosus, qui Porus vocatur. Cùm Plinius ita breviter sit, an de his locutus ignoramus: Equidem lapides hi substantia sunt Coralliis proximi, & potissimum porositate, unde nomen habent, à Coralliis differunt.

- I. Corallo affinis Porus magnus.
- Porus magnus, Imper.
- II. Corallo albo affinis Porus ramosus.
- Porus ramosus, Imper.
- III. Millepora, Imper.
- IV. Coralliis affinis Madrepora stellata.
- Madrepora, Imper.
- V. Coralliis affinis Madrepora ramosa.
- Madrepora ramosa, Imper.
- In eadem planta varietas & in substantia & colo-

- re pro partium diversitate reperitur.
- VI. Porus facie Sabinæ, Imper.
- VII. Porus cervinus, Imper.
- IX. Porus reticulatus & Eschæra marina, Imper.
- IX. Frondipora, Imper.
- X. Porus tubularius, Imper.
- XI. Porus anguinus, Imper.
- XII. Coralliis affine Alcyonium rubrum.
- Tubularia purpurea, Imper.

## ANDROSACE.

**A**NDROSACE Dioscoridi l. 3. c. 150. herba est alba tenuibus cirris sine foliis, folliculum habens in cacumine, quo semen continetur: in maritimis Syriæ nascitur. Idem Plinius l. 26. c. 4. Androfases dicitur, quod Hydropisorum aquas ducat, vel Hydrafases, quia non nisi in aquis crescat.

- I. Androfases petræ innascens vel major.
- Androfases, Matth. Lon. Cast. Lugd.
- Musci marini genus, Guil.
- Hanc ex Istria habemus, & à sequenti cirris longioribus, folliculis sive clypeolis (sed semine carentibus) in cacumine minoribus, differt.
- II. Androfases Chamæ conchæ innascens, vel minor.
- Androfases, Cotyledon foliosum marinum, Ad.

- Lob. ico.
- Androfases, Lobel. Lugd. (& Umbilicus marinus Monpel.) Cam. ep. utramque una figura exhibet.
- Fungus marinus minimus, Czf.
- Androfase Matthioli, Tab. Ger.
- Hanc communiter conchæ, rarius petræ innascentem in stagnis circa Magalonam & Frontignanum observavimus.

A L.

## ALCYONIUM.

**A**λκυόνιον Dioscoridi l. 5. c. 136. cuius quing. genera facit: unum spissum est, acerbi saporis, spongiosa facie, insuperq. virosum, grave ac piscem olens: alterum oculorum pterigio aut spongia simile, leve & multivarium, odore fere alga: tertium vermiculi forma & colore pene purpureum est, quod Milesum quidam vocant: quartum succidia velleribus non admodum dissimile, multis inanitatibus hians ac leve: quintum figura fungi, inodorum, intus quidem asperum, quodammodo pumicosum, foris verò leve, acre. Plinius l. 32. c. 8. fit in mari & Halcyoneum appellatum, ex nidis ut aliqui existimant, halcyonium & cecyum: ut alii, & sordibus spumarum crassecentibus: alii e limo, vel quadam maris lanugine. Quatuor ejus genera: cinereum spissum, odoris asperi: alterum molle lenius odore fere alga: tertium candidi viri vermiculi: quartum pumicosius spongiæq. putri simile, penè purpureum, quod optimum: hoc & Milesum vocatur: quo candidius autem hoc minus probabile est.

- I. Alcyonium durum sive 1. Diosc. Imper.
- II. Favago Australis. Alcyonium 2. Dioscor.
- quod duplex existit, Imper.
- III. Alcyonium vermiculare, Imper.
- Alcyonium 3. Diosc. Cæf.
- Hoc non solum purpureum, sed & candidum ac flavescens reperitur.
- IV. Alcyonium molle vel 4. Diosc. Imp.
- V. Alcyonium stuposum, vel 4. Diosc. Imp.
- VI. Alcyoniū foraminosum vel 5. Diosc. Imp.
- VII. Alcyoniū forma fructus alicujus ficus.
- Alcyonium tuberosum vel 5. Diosc. Imp.
- IX. Alcyonium ingens & 3. quod ad 5. Diosc. referri potest, Cluf. exot.
- I X. Alcyonium cervi cornua cum crassi parte referens.

- Alcyoniū monstrosū sive 1. Cluf. exot. l. 6. c. 11.
- X. Alcyonium chirothecæ facie.
- Alcyonium alterum, Cluf. l. c.
- Cum 2. Dioscoridis nonnullam affinitatem habet.
- XI. Fungus auricularis, Cæf.
- Muscus saxatilis, aliquibus Alcyonium 5. Diosc. Imp.
- XII. Bursa marina & Alcyonii genus 4. Cæf.
- XIII. Rosa marina ad 5. Alcyonii speciem referenda, Cæf.
- XIV. Pila marina, Cæf. sal.
- XV. Pila marina velut ex ampullis constans ad spumæ similitudinem.
- Spuma maris, Cæf.
- Variat colore modo candido, modo rubro, aliquando flavescente.

## ZOOPLHYTA.

**Z**ῳόφυτα sunt que nec animalium, nec plantarum, sed tertiam ex utroq. naturam habent, & ut Aristoteles loquitur, τὰ ἡμιζῳοειδῆ ὡς τὰ ζῷα, que ambigunt inter plantam & animal, que Plantarum dici possunt: talia sunt Spongia, Urtica marina.

## SPONGIÆ.

**Σ**πόγγη Græcis, Spongia: Etymologicus sic describit Σπῆ τὸ αἶμα τὸ ὑγρὸν, quod humorem attrahit & combibat. Dioscoridi lib. 5. cap. 138. è spongiis alias nonnulli mares appellaverunt, que tenuibus sunt fistulis ac fuisse dense ve, è quibus rursus duriores τερπύρες nominaverunt: alias vero seminas, que contrario ac antedicta modo se habent. Et Plinio lib. 9. cap. 45. Spongiarum tria genera accepimus: spissum ac prædurum & asperum, prægos id (ab odore gravi) vocatur: minus spissum & mollius, manon: tenue densumq. ex quo penicilli (sive turres sinuosæ & cavæ ulceribus immittuntur) parantur. He sæpe ζῳόφυτα & ζῳόειδῆ dicuntur, que ut habet Plinius l. c. neque fruticum neque animalium, sed tertiam quandam ex utroq. naturam habent: ejusmodi, inquit idem, sunt Urtica & Spongia.

- I. Spongia globosa, Imper.
- II. Spongia compressa, Imper.
- III. Spongia compressa magna.
- Spongia marina alba & flava, Tab. Ger.
- Spongia compressa latissima, Imper.
- IV. Spongia hircina, Imper.

- V. Spongia velaris, Imper.
- VI. Spongia ramosa.
- Conservæ marinæ genus, Lob. Lugd.
- Corallina Britannica Penæ, Lugd. (c. 14)
- an Ifidos plocamon corallio similis Plinii l. 3.
- VII. Spongia ramosa fistulosa.

IIIX. Spon-

HX. Spongiosus fucus, Imper.

Hujus diversæ species una barbæ similis: altera arbusculæ in ramos divisæ: alia instar man-

humanæ: alia figuræ turbinatæ instar pini.

IX. Spongia forma infundibuli.

Spongia elegans, Clus. exot. l. 6. c. 11.

## URTICA MARINA, ET ALIA

**U**rtica dicta, quod admota contrahentium manuum pugnat. Sic Plinius lib. 9. cap. 45. Urtica noctu vagantur, noctuq. mutantur: carnosæ frondis huius natura & carne vescuntur: vis pruritu mordax eademq. quæ terrefrictu urtica &c. Verum Bellonius, inter pisces molles: Rondeletius, inter animalia imperfecta, & quidem genere mollia refert.

Genus duplex Aristotelis 5. hist. 16. At Rondeletio species sex sunt. Plinio lib. 9. cap. 43. alterum earum quæ soluta sunt, quas vagari scribit Plinius: alterum earum genus saxi affixum semper hæret.

I. Urtica soluta prima & secunda, Tab.

II. Urtica marina explicata & contracta, Tab.

III. Urtica 5. & 6. Rondel. (& ex eo Aldroan.

Urtica soluta 1. & 2. Tab.

II. Urtica explicata & contracta, Bello. Italis Cunnus marinus: & Tab. de his vide Gef. Bellon. Rondel. & Aldroandum, qui formas diversas pingit.

III. Pulmo marinus, Matth. Tab. Aldroand.

IV. Holothuria, Aristot. Plin. Rondel. (qui duas species habet) & Aldroan.

V. Tethya, Aristot. Plin. Rond. Bellon. Gef. Aldroando, cui sex species.

VI. Mentula marina, Rond. cui duplex est. Genitale marinum, Bellon.

Epipetron Gesneri, cum hac convenire videtur, Aldroan.

VII. Penna marina, Rondel. Gef. quæ Mentula alata piscatoribus, Aldro. cui duplex est.

IX. Manus marina, Gef. ex eo Aldroando.

IX. Arantia marina.

X. Malum granatum, Aldro.

XI. Malum insanum marinum, Rond. ex eo Aldroan.

XII. Pyrum marinum, Ald.

XIII. Cucumer marinus, Plin. Rond. ex eo Aldro.

XIV. Uva marina, Plin. Rondel. ex eo Aldro.

XV. Fungus marinus, Aldroando.

## SECTIO QUINTA. FVNGI & TVBERA. F U N G I.

**F**UNGI Græci μύκητες dicuntur: de quibus Theophrastus 1. hist. 8. & 9. Fungus pediculum longè majorem, aequalē quam Gladiolus habet & radice penitus caret: & 3. hist. 9. verum ē radicibus arboris & juxta radices erumpit: & 4. hist. 8. cum autem aqua plures inceserint fungi juxta mare rubrum quodam in loco erumpunt qui Sole tacti in lapidem mutantur. Horum origo Plinio lib. 22. c. 23. ex pituita arborum. Nam Fungi sicut & Tuberæ neque plantæ, neq. radices, neq. flores, neque semina sunt, sed nihil aliud quam terra. arborum, lignorum putridorum, aliarumq. putrilaginum humiditates superflue: id quod inde colligi potest, quod omnes Pungi & Tuberæ, maxime ea quæ edendo sunt, à tonitruibus & pluvio cæli statu frequentius nasci soleant.

Differentia duplex Dioscoridi 4. l. 23. aut enim edules sunt, aut exitiosi: hi multis de causis tales evadunt: aut quia juxta clavos rubiginosos, aut pannos putridos, aut serpentum latibula gignuntur, aut arboribus privatim fructibus noxiis ferentibus, adnascuntur. Habent verò qui tales sunt intra se lentorem quandam concretū & strigmenti modo viscosum, & terra cruti si reponantur, celeriter corrupti computrescunt. At Plinio l. c. Fungorum numerosa genera: tutissimè qui rubent callo (forte carne) minus diluato rubore quam boleti: mox candidi, vel ut apice flaminis insignibus pediculis: tertium genus suilli, venenis accommodatissimi. Quidam discrevere arborum generibus fisco, ferula (potius betula) & gummi ferentibus: nos item fago, aut robore, aut cupresso: omnium colos lividos.

Verum alii ex terra nascuntur: alii veterum arborum caudicibus subinde & eorum ramis (vix enim ulla arbor senescens in qua non conficiantur) adnascuntur: alii saxi, testis stramineis putridis lignis insident & quandoque supra finem reperiuntur. Guiland. com. de pap. xvi. p. 1. & aliter genus sive Cyema alterum dicit.

AA

I. Fun.

I. Fungus porosus.

Fungorum primum genus, Trag. Lon.

Fungorum præcipuum genus, Gef. col.

Spongiola nonnullis, Dod. Imper. Neapolitanorum, Ponæ.

Fungi, faviginosi, sive Fungi rugosi favis mellis similes, Lob. belg.

Fungus spongiosus Dalechampii, Lugd.

Fungi rugosi, Cast.

Fungi esculenti primum genus, Cluf. hist.

Fungi præcoces, Dod. belg.

Hujus quatuor sunt species: nam primus fungus parvus est, rugosus albicans, quasi fuligine infectus: 2. radicem Aristolochiæ rotundæ exiccatam refert, coloris ex rubro fusci: 3. duplo amplior plerumque orbicularis: 4. in longitudine metæ instar excrefcit.

II. Fungus apice pyramidalis & angusto.

Fungi esculenti alterum genus, Cluf.

III. Fungus in metam fastigiatus albus fusco tinctus.

Fungi esculenti quartum genus, Cluf.

Hic triplex est: primus & secundus parvus & mediocris, ambo coloris albicantis fusco tincti: tertius major magis fuscus, interdum notis distinctus.

IV. Fungus orbicularis ex albidus pratensis.

Fungi esculenti tertium genus, vel S. Gongij, Cluf.

V. Fungus angulosus pediculo exiguo.

Fungi esculenti quintum genus, Cluf.

Triplex est: 1. angulosus: 2. magis orbicularis: 3. major, in tres lacinias divisus: ad arborum radices.

VI. Fungus radice carens dimidium fungum & orbem referens.

Fungi pezizæ esculenti, Colum.

Ad Fagorum radices Agarici modo crescit.

VII. Fungi umbilicum exprimentes plures simul albi.

Fungus in populo alba, Marth.

Populnei αἰγερῆται: Dod.

Fungi esculenti sextum genus, Cluf.

Ad arborum radices, sola magnitudine differens observatur, ex ætate proveniens.

Fungorum sub Populo nascentium, qui Turini vocantur, subrubetium, pediculo candido, qui in cibis minimè probantur, Cæsalp. auctore.

Huc refertur Calucci vulgo dicti apud Porrâ,

qui bini aut tres ab uno pediculo prodeunt velut galli cristæ, acri odore, coma velut villosa.

IX. Fungus umbilicæ referens variegatus, Fungi esculenti decimum tertium genus, Cluf.

Variat: nam in primo supernè color ex cæruleo, viridi & fusco comixtus conspicitur, infernè ex albo subluteus: 2. supernè color flavescens veluti fuligine infectus, infernè albi fusci strii distinctus: 3. supernè ex albo viridis, infernè candicans & striatus: 4. supernè ex purpureo & saturatè rubro, raris albis maculis notatus; infernè candicans, fuscis striis aspersis, oris dilutè purpurascens: 5. asperior reliquis, supernè coloris ex albo fusci, inferius candicans, fuscis striis discurrentibus.

IX. Fungus orbicularis sulcatus albus fusco permixto.

Fungi esculenti septimum genus, Cluf.

Duplex est: alter tumens, coloris vel albi fusco permixti, vel maculis quibusdam aspersis: alter orbicularis candicans.

X. Fungus pileolo lato orbiculari candicante. Fungi orbiculari, vel Fungorum tertium genus. Trag.

Fungi boleti, Cord. in Diosc. Lon.

Fungi nemorum, Lob. Belg.

Fungi esculenti octavum genus, Cluf.

Triplex est: 1. minor candicans: 2. major albicans maculis fuscis & flavescens aspersis: 3. amplior adhuc ex fusco subrubens.

XI. Fungus pileolo lato orbiculari flavescens.

Fungi 4. genus, Trag.

Capreolini, Taber.

Fungi esculenti duodecimum genus, Cluf.

XII. Fungus pileolo lato & rotundo.

Fungi esculenti nonum genus, Cluf.

Hujus quatuor sunt differentiæ: supina parte candicans, infernè magis fuscus evidentibus striis donatus: 2. supernè albicans crassis striis insignitus: 3. supernè in albedine magis fuscus, pediculo crassiore nigricante: 4. rufescit & pediculo est albo.

XIII. Fungus pileolo lato & rotundo livido.

Fungi vulgares Amanitæ vel Boleti, Trag.

Fungi Marth. Lac. Lon. Dod. Cast. Lugd.

Fungi vulgarissimi esculenti, Lob. ico.

Hic ad præcedentem refertur potest.

XIV. Fungus pileolo in plano orbiculari villosus.

Fungi esculenti decimum genus, Cluf.

Duplex



Duplex est: alter colore puniceo diluore: alter coloris ex rufo fusc.

XV. Fungus pileolo magno plano orbiculato venis exasperato.

Fungi esculenti vigesimum genus, Clus.

Triples est: 1. supernè dilutè rubens, aut laterice coloris venis exasperatus: infernè pallescens, striis fuscis insignitus: 2. supernè extuberat, coloris ex albo pallido & fusco mixti: infernè candicans, striis fuliginosis distinctus: 3. major: supernè coloris ex albo, pallido, rufo & fuliginoso mixti: infernè rubescens, striis ex atro purpurascens notatus.

XVI. Fungus pileolo plano subfusco oris lateris. Fungi esculenti undecimum genus, Clus.

XVII. Fungus pileolo lato puniceo, lacteum & dulcem succum fundens.

Fungus sextus, què aliqui crudè devorant, Trag.

XIX. Fungus candidus odoratissimus orbe magno,

Fungus Richione, quasi magnum fungorum regem dicas, Portæ.

Esui tam suavis ut crudus edatur & ægris innoxie præbeat, Eid.

XIX. Fungus latus sanguinei coloris. Linguae in caudicibus castanearum, Cæs.

an ii quos Plinius scribit tutissimos, qui collo rubent, minus diluto rubore, quam Boleti.

XX. Fungus angulosus & velut in lacinias sectus.

Fungi genus magnum à figura auriculi leporinis, Gel. coll.

Arborum fungi auriculæ Judæ facie, Lob. belg. Gallinacei, Cæs.

Fungi esculenti decimum quartum genus, vel Fungus leporinus, Clus.

Duplex est: 1. supernè pallidus, flavus maculis variegatus: infernè flavescent, fuscis striis distinctus: 2. duplo major, supernè flavus: infernè striis distinctus, croceoq; colore infectus. an Fungus leporinus quem 7. facit Tragus, qui formam interaneorum vituli repræsentat, qui incanus & plumbei coloris.

XXI. Fungus orbicularis oris intrò reflexis. Fungi esculenti genus, sive suilli, Clus.

Duplex est: 1. utrinq; subalbidus veluti fuligine infectus: at supernè aliquot macule albæ asperguntur: infernè striis crassis nigricantibus notatur: 2. major cuius pars superior coloris est purpurei

rubro saturno commixti, secundum oras maculis albis aspersis: inferior ex albo fuscus, striis tenuioribus excurrentibus.

Suillo vulgo porcinos dictos, Boletis crassiores, supernè subfulvos, infernè cinereos, internè candidos, habet Cæs.

XXII. Fungus Augusti mensis.

an Fungus octavius, genus, Trag. 6. & 7. genus, Lon. Fungi esculenti decimum sextum genus, Clus.

Triples est: 1. superius colore est candicante subfusco, inferius albus striis carens: pediculus coloris ex cæruleo, viridi & fusco mixti: 2. utrinque ex flavo rubescit: 3. supernè ex fusco rubescit: infernè equalis albus.

XXIII. Fungus planus orbicularis aureus.

Volva Plinii, Elvela, Ciceroni, Boleti, Ang. Boleti Cæs.

Fungi esculenti decimum septimum genus, Clus.

Differètia notatur, què ratione ætatis cõtingit: nam cum primò erumpit, ovù cadore & figura refert, at alba cute quâ volvum vocant, lacerato, paulatim in planâ orbiculare formâ se explicat: supernè aureus est, infernè flavus, striis distinctus: hic omnium præstantissimus cõsetur.

XXIV. Fungus pileolo lato, longissimo pediculo variegato.

Fungi esculenti decimum octavum genus, Clus. an Fungus Neapolitanis Cocielle vocatur, Portæ.

an Fungus prætenis, quem quidam Scarogias vocant, Cæs.

XXV. Fungus bulbosus fuscus duplici pileolo Fungus quercinus dipsacoides, Col.

XXVI. Fungus lariceus aurei coloris. Fungus in larice præter Agaricum nascens triginta librarum, aureum per ambitum dissectus: in cibis gratissimus, Marth.

XXVII. Fungus albus acris.

an Fungus piperis sapore, Cord. in Diof. Fungus piperitis, quia instar piperis linguam vellicet, Portæ.

XXIX. Fungus minimus odoratus capitulo donatus cinereus.

Prunuli vulgo, Cæs.

XXIX. Fungus ramosus: & Imper.

Fungi esculenti decimum nonum genus, Clus.

Formæ est ab aliis diversæ, qui in tres species, colore inter se differentes, nonnihil etiâ forma, dividi potest: nam parte superna vel flavus, vel dilutè rubescens, vel pallidus albo admixto.

## XXX. Fungus digitatus major.

Digitelli genus spectabili magnitudine, ut unus sufficiat, qui in castaneis reperitur, Cæs.

Plinius forte hunc intellexit, cū inquit, mox candidi veluti apice flammis insignibus pediculis: quos Galenus Amanitas vocat, secundo loco inter innoxios. Lacinia Hermolao dicitur.

## XXXI. Fungus candidus digitatus minor.

Digitelli (vel Fungi 5. genus) Trag. Lon.

Digitelli sive Maninæ vulgo, Cæs.

Hic veluti in parvos digitos filius est.

## XXXII. Fungus maximus Ungaricus; multis lacinias squamatis incumbentibus.

Fungi esculenti genus 21. monstrosum, Cæs.

Tanta molis, ut ternos, aut quaternos palcere possit: sunt qui dicāt, non unquā tanta amplitudine ex crescere, ut bigam facile impleat. Variat colore ex rufo nigricate, vel ex albo nigro, aut multis maculis nigris in albo cōspersis notatur. an Gallinacea Neapolitanorum, Portæ: quæ mirabilis formæ & ad eam amplitudinem excrevit, ut brachiis diductis homo vix amplecti possit, pondere sexaginta librarum, ut integro universa familia velci possit.

## XXXIII. Fungus in saxis proveniens.

Fungi è lapidibus, Matth.

Fungorum postremum genus è saxis, Portæ.

Fungus in lapide pinguis Neapoli, Camer. in Matth. ger. Cæs.

Fungus petrosus, Imper.

Ex hoc fungi toto anno enascuntur, si aqua irrigetur etiam domi asservatus, crescit induratis, Cæs. Præciditur ad esum, alius subnascitur, semperq; novos producit, septem diebus perficitur: sexies anno demetur: terra dodrante operitur. Asseruntur lapides ex Vesuvio, ex Fageto, ex Partenio, ex Gargano & celsioribus montium partibus, Joh. Bapt. Porta.

## XXXIV. Fungi circa Babyloniam.

Fungi boni saporis, quos etiam crudos Æthiop. comedunt, præter quos nihil aliud circa Babyloniam, quamvis bona & pinguis terra sit, crescit: par. 3. Ind. or. c. 5. sed quales?

Fungi noxii.

I. Fungus membranaceus auriculam refovens, sive Sambucinus.

Fungus ad Sambucum, Trag.

Auriculæ Judæ vulgo,

an Fungus auricularis, Imper.

Fungorum perniciosorum 1. genus, Clus.

II. Fungus putridus arborum ramis inhaerens, plurimis simul coherentibus,

Fungorum noxiorum genus 24. Clus.

Triplex est: 1. & 2. interdum simplex, interdum plures: ille ruber, hic egregie ruber & floridus est: 3. corpore rugoso, bini, plerumq; terni, elegantiori auri colore præditi.

III. Fungus in caudicibus nascens unguis equi. Fungi igniarii, Trag.

Igniarii vulgo Esca, Cæs.

His attritu silicis ignem excipiunt.

IV. Fungus ad cutem extergendam aptus.

Fungi igniarii species, qua in constrictis prostrigili uruntur, Cæs.

Fungus fursures capitis depellens, Imper.

V. Fungus acetabulorum modo cavus radice carens.

Fungi Pezicæ Plinii, Col.

VI. Fungus Hepaticæ laxatilis forma.

Fungi Pezicæ altera species, Col.

An hi duo posteriores perniciosi sint, dubiū sum.

VII. Fungus fuligine lichenis forma variegatus.

Fungorum noxiorum 4. genus, Clus.

IX. Fungus cerasorum imbricatim alter alteri innatus variegatus.

Fungorum noxiorum 5. genus, Clus.

IX. Fungus pannis laceris similis igneus.

Fungus quem ignem sylvestrem vocant, Cæs.

X. Fungi ex eodem pede sed non conspicui numerosi.

an Prunuli, Trag.

Fungorum perniciosorum 2. genus, Clus.

Varii sunt magnitudine & forma, omnes coloris ex albo pallido & fusco commixti: sub pruno nascentes.

XI. Fungus fimetarius in plao orbicularis candidus.

Fungorum noxiorum tertium genus, Clus.

an Præolis similis, Cæs.

XII. Fungus pileo inferni subrufo aut nigricante, quæ aliqui, nec sine periculo cōedūt, Cæs.

XIII. Fungus coryleus orbicularis.

Fungorum noxiorum 6. genus, Clus.

XIV. Fungus buffonius orbicularis.

Fungorum noxiorum septimum genus, Clus.

Triplex est: 1. in metā sublaris albus, fuligine info-



infectus, in summo flavescens; parte cava fusca, nigris striis distinctus: 2. magis orbiculatus, superne modo fuscus ex albo pallescens, modo flavus fuligine infectus, maculis albis & nigris aspersis, rubetæ colorem refert: infernè albus, striis subfuscis levibus distinctus: 3. major in plano orbicularis, superius albus, rubore admixto & maculis pallescencibus aspersis: infernè pallidus, fuliginosis striis distinctus.

XV. Fungus fatuus candidus pileolo in meram assurgente.

Fungorum noxiorum undecimū genus, Clus.

XVI. Fungus betulaceus orbicularis albus.

Fungus ad betulam, Trag.

Fungorum noxiorum octavum genus, Clus.

XVII. Fungus orbicularis ex atro rufescens.

Fungorum noxiorum nonum genus, Clus.

XIX. Fungus minimus flavescens infundibuli forma.

Fungorum noxiorum decimum genus, Clus.

XIX. Fungus muscas interficiens.

Fungi muscarii, Trag. Cord. in Dios. Lon. Tab.

Fungorum noxiorum 12. genus, Clus.

Hujus quinq; species: 1. orbicularis, cui superne color vel pallescens, rubedine & fuligine admixtis: vel lividus & fuligine infectus, maculis albicantibus atro permixtis inspersis: infernè albus, fuscis striis variegatus. 2. orbicularis, superne colorib<sup>us</sup> ex purpura dilutior & saturatior, rufus, pallidus & albo variè mixtis: infernè pallidus, nigris striis fulcato. 3. ætate variat: emergens tri radicem imitatur, coloris lateritii, maculis albicantibus aspersis: adultior, orbicularem figuram acquirit, interdū per latera fissus, coloris prona parte rubri, albis maculis infecti: summa albi, cum striis levi fuligine infectis. 4. junior, minore est orbe, rubro colore saturo, in ar cōcreti sanguinis tincto, maculis plurimis talbidis aspersis: adultior multo latior, rubro colore remissior tinctus & præter exalbidas aculas veluti intercurfantibus undis, distinctus. 5. junior coloris ex rufo fusci & velut fuliginis infecti: adultior, latior in metæ formamurgens, oris valde laceris, coloris superne ex rufo, pallido, fusco mixti & id vel radiat, vel maculis inspersis: inferiore fuliginosis striis striis intersecantibus.

XX. Fungus latus orbicularis candidus.

Fungorum noxiorum 13. genus, Clus.

XXI. Fungus latus orbicularis oris intus conversis.

Fungorum noxiorum 14. genus, Clus.

Dux sunt species: magnitudine & supinæ partis colore inter se differentes.

XXII. Fungus pediculo in bulbi formam excrecente.

Fungorum noxiorum 15. genus, Clus.

Duplex est: superne pallidus, maculis dilutè nigricantibus distinctus & oris deorsum reflexis: infernè multis striis expallido fuscis distinctus: 2. tetri coloris est, radicis potius fragmentum, quam fungus videtur, quod utraq; manu vix comprehendi potest.

XXIII. Fungus clypeiformis major. (belg.

Fūgus alter venenat<sup>us</sup> clypeiformis olidus, Lob.

Fūgus alius clypeiformis perniciosus, Clus. ad.

XXIV. Fungus clypeiformis minor.

Fungorum alterius generis alter, Dod.

Fungus clypeiformis lethalis, Lob. belg.

Fungus perniciosus vulgaris, Clus. ad.

Alii albi, aut cinereis fuscisve maculis notati in cavitate nigri: nunc & plani ut acetabula: nonnulli etiam parvis similes.

XXV. Fungus latus oris laceris.

Fungorum noxiorum 17. genus, Clus.

Duplex est: colore superna parte rufo ad nigredinē cōdēre in medio flavescēte: infernè pallido, striis fuliginosis distincto: 2. colore superne ex pallescete fuliginosis, venis exalbidis maculosis: pars infima ut & fungi substantia, omnia atra, crassis nigris striis obscure apparentibus.

XXVI. Fungus oris laceris & in laciniis diffusus.

Fungorum noxiorum 16. genus, Clus. (visis.

In hoc triplex differentia occurrit.

XXVII. Fungus parvus, parvi galeriformam exprimens, rufus.

Fungorum noxiorum 18. genus, Clus.

XXIX. Fungus parvus galericulatus alter flavus.

Fungorum alterius generis primus, Dod.

Fungus parvus lethalis galericular<sup>is</sup>, Lob. belg.

Fungus exilis perniciosus vulgaris, Clus. ad.

XXIX. Fungus orbicularis secundum vias & in quercetis Autumno nascens.

Fungorum noxiorum 19. genus, Clus.

Hujus sex species sunt.

1. Superne coloris ex flavo, rufo, fuliginoso cōmixti: infernè ex pallido fusci, multis striis exarato.

10.2. amplior est, supernæ coloris vel rufi, raris maculis cōspersis, vel fusci & fuliginosi : inferi pallidi, fuscis maculis alperis, vel ex fusco omnino pallidi. 3. ex cineraceo fusci coloris, noris quibusdā distincto, lacer & hians. 4. supernè, ex atro rufescens : infernè flav⁹, maculis parvis alperis : vel fusco supernè & scissuris quibusdā albis laceris : infernè ex flavo tantum pallescente. 5. supernè tumens & latericei, infernè cinericei coloris, & hic Fungi perniciosi generis 19. species dubia, Cluf.

XXX. Fungus, ruberis figura.

Fungorum noxiorum 19. species 5. Cluf.

Hic ætate variat : junior supernè coloris fusci, infernè inbri saturi & nigricantis, oris flavis : adultior orbicularis, supernè fusci coloris, diluto rubore permixto : infernè ex rubro atro & obscuro : ipsum verò corpus contractum cærulei, virelcente intercepti est coloris.

XXXI. Fungus cyclamini radicem colore & forma referens.

Fungorū noxiorum 19. generis species 6. Cluf.

XXXII. Fungus omnium ampliss. purpureus.

Fungorū noxiorum 19. generis species 3. Cluf.

XXXIII. Fungus crallus in metam surrect⁹.

Fungorum perniciosorum 20. genus, Cluf.

Hic quadruplex est :

1. supernè cineraceus, infernè ex flavo pallens. 2. supernè, vel ex pallido fusc⁹, vel fuliginosus, infernè ochræ colore. 3. rufus : infernè ochræ colore fuligine perfusa. 4. ex rufo & fuliginoso commixti : infernè subrufo colore multis striis fuliginosis intersecantibus.

XXXIV. Fungus abietinus oris reflexis substantia rubra.

Fungorum noxiorum 21. genus, Cluf.

XXXV. Fungi dumetorum ex uno pede prodeuntium.

Fungorum noxiorum 22. genus, Cluf.

Quadruplex est :

1. seni aut sepreni orbiculati sed fornicati flavi, macula nigra distincti. 2. octo aut novè coloris flavi, rufi, lussuli : infernè flavi, macula nigra distincti. 3. majore est orbe, quindecim aut pluribus ex eodè pede nascentib⁹, supernè vel rufi, vel ex rufo dilute albescentes : infernè subalbidi, crassis fuscis striis distincti : quinta species, Cluf. 4. turbinato corpore seni aut plures, supernè cineracei ex rufo coloris aut fulci : infernè crassis nigris striis distincti.

XXXVI. Fungus truncis humi jacentibus innatus, pluribus ex uno pede prodeuntibus.

Fungorum noxiorū generis 22. spec. 3. & 4. Cluf.

Hic præcedente multo minor : & duplex 1. viceni & plures ex eodè pede supernè rufi, infernè fuscis striis exarati. 2. triceni & plures colore inter se varii, vel flavo rufo perfusi, vel omnino rufi & fusci, infernè nigricantibus striis notati.

XXXVII. Fungus orbicularis in palustrib⁹ Fungorum noxiorum generis 23. species quatuor, Cluf.

1. orbe tumido eleganter rubro infernè albica fuscis striis exaratus. 2. paulo amplior, supernè coloris rufi & ad lateritium tendentis : infernè dilutioris & striis frequentioribus distinctus. 3. coloris ex albo, rufo & fusco variè commixti. 4. orbe est inæquali, supernè ex cineraceo candicans : infernè etiam, sed fuscis striis ad extimas oras productis.

XXXIIX. Fungus fœtidus penis imaginem referens.

Phallus, Hadr. Junio.

Phallus Baravicus, Lugg.

Phallus Holandicus, Satoryon trifolium Matthioli, Pona Ital.

Fungus virilis penis arrecti facie, Lob. belg.

Fungus marinus, Dod. belg.

Fungi perniciosi 23. generis species 5. Cluf.

XXXIX. Fungus minimus ligneis tabellis areolarum hortorum adnascens.

Fungus minimus avonm⁹, Cluf.

XL. Fungus ramosus candidus.

Fungorum noxiorum 25. genus, Cluf. arboribus habetur hist. ap. alt.

XLI. Fungus ramosus coriaceus.

Fungus borfaro, Imper.

Hujus ad ignem concipiendum apud Neapolitanos usus est.

XLII. Fungus rotundus orbicularis.

Fungorum noxiorū generis 26. species 3. Cluf.

Fungus ornatus, crepitis lupi, Trag. Lon.

Fungus orbicularis, Dod.

Fungus glomerat⁹ rotunditatis, Lob. belg.

Lupi crepitis, Cast. Col.

Triplex est magnitudine, non nihil etiā forme differens. 1. initio eximicandoris, demum patens tanquam fuligine suffunditur, magis contractus pulverulentum fumum effundit.



Pezicæ Plinii in pratis quæ esculentum dicitur, Cæf. Fungus vesicarius, aliis ovum lupinum, Imper. Fungorum perthiciofori generis 26. species. 1. Clus.

2. capitis pueri magnitudine, cute cineracei coloris, tectus, quæ lacera substantiam spongiosam fuliginosam ostendit, quæ compressa pulverem effundit.

an Fungus villosus, Imper.

3. sola magnitudine à secunda differt.

an Pezicæ genus in sylvestris, aliquando humani capitis, quod sine periculo editur, Cæf.

XLIII. Fungus rotundus cancellatus.

Fungus coralloides cancellatus, Clus. hist. ap. alt. auct.

Fungus lupi crepitis vulgi efflorescens, Col.

Hunc à priore distinguere non oportet: à quo

tamen differt (quem & Clus. & Colum. peculiari figura expressere) quod huic sint radices in fibras divisæ, & quod per medium disrupto veluti florescens speciosum reticulum, vel marsipium reticulatum rubri coloris emittit.

XLIV. Fungus niger culicis figuram referens.

Fungus semiorbicularis niger, Dod. belg.

Fungi lapidei.

I. Fungus lapideus major in Nilo natus.

Fungus saxeus Nili major, Clus. exor.

II. Fungus lapideus minor.

Fungus saxeus minor, Clus. exor.

III. Fungus lapideus forma bubulæ linguæ, Clus. cur. post.

## AGARICVM FVNGVS.

**A**garicæ, sorte ab Agarica nomen sibi adscribit gentile, nam ut Dioscorides, in Sarmatia regione quæ Agaria dicitur, gignitur: vel ab Agara, quem & urbem & amnem in Sarmatia vocari tradit Ptolomæus: & n. Dioscorides l. 2. c. 1. radix fertur Silphii simili, non tamen densa summa facie veluti Silphium, sed tota rarior: ut qui plantæ radicem esse affirmant: alii ut Fungos ex putredine nasci in arborum caudicibus. Plinio l. 16. c. 8. Zallicarum glandifera (in d. Larices) maxime arbores Agaricum ferunt: est autem Fungus candidus, odoratus, in ummis arboribus nascens, noctu lucens (fabulosum hoc) signum hoc ejus quo in tenebris decerpitur. Et l. 25. c. 9. Agaricum ut Fungus nascitur in arboribus circa Bosphorum colore candido.

Genera duo Dioscoridi l. c. mas & femina: mas rotundus est & undique sui simili: femina præfertur, quæ quidem rectas intus habet pectinum modo venas & quasi divisuras. At in præfatione l. 6. Aga. ici nigri lesbalem vim habentis meminit. Sic Plinio l. 25. c. 9. mas crispior amariorq.: femina solutior, initio dulcis, mox in amaritudinem transit. Mesues feminam eligit, quia masculus malus sit, præcipue qui longus existit & niger & gravis: debet utem esse album, leve, velociter friabile, porosum & valde rarum: primum dulce, dein amarum & astringens.

I. Agaricus sive fungus laricis.

Agaricus & Agaricu, Marth. Dod. ut: Cord. in Diosf. Ang. Tur. Lac. Lob. Cast. Cæf. Lugd. Tab. Agaricum larignum, Ad.

Fungus hic Abietis, Piceæ syl. Tædæ & Larici adnascitur, sed solū Larign' intra corp' usurpatur.

II. Agarico similis fungus diversarum arbo-

rum caudicibus adhærens.

III. Agaricus qui in speluncis montium Helveticarum reperitur.

Agaricus saxatilis, vel Fungus, petre' Lac lunæ in colis à substantia alba & spumosa, Ges. in fracto. Lac lunare, Eid. lib. de fig. lapid. c. 2.

Margæ friabilis genus cuidam, ut idem.

## TUBERA.

**T**ubera, quæ radicibus, ut Galenus voluit, adnumeranda vocantur, ut va. ab imbribus, & cid va. à tumore, ab öd öd tumeo. Dioscoridi l. 2. c. 175. ut vov radix est orbiculata sine foliis sive caule, flavescens, vere foditur, ac seu cruda seu cocta esui apta est. Theophrasto l. hist. 9. Tubera radice penitus carent. Plinio l. 19. cap. 2. tubera undiq. terra circumdata, nulliq. fibris nixa, aut saltem capillamentis, &c. cortice includuntur, ut plane in terram esse possumus dicere nec aliud quam terra callum.

Genera duo eorum (Plinio l. c.) barrenosa dentibus inimica & altera sincera: distinguuntur & colore rufogroq., & intus candido &c. Sane Tuberum genera duo sunt, quæ magnitudine & colore differunt: majus & minus: majus cute quidem nigra, sed alteri pulpa candida alteri pulla (subflava alii notarunt) subest minus colore rufo insipidum & gustu injucundum.

I. Tubera,

I. Tubera, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Lac.  
Lon. Dod. Cast. Lugd. Tab. Cas.  
Tubera terræ, Tab. Ger.  
II. Tubera cervina: & Lob. belg.  
Fung<sup>9</sup> cervin<sup>9</sup>, sive Cervi boletus, Matth. Lon.  
Fung<sup>9</sup> cervini Boleti officin. Cord. in Diosc.  
Boleti cervini orbiculati, Thal.

Sic dicta quia reperiuntur iis in locis ubi cervi

ibidem suam exercent: quamvis Cordus in-  
venerit etiam in præruptissimis montium syl-  
vis, quo ne damæ & rupicapra quidem perve-  
nire possunt, ne dum cervi.

III. Tuberibus similis fructus Indicus.  
Fructus sub terra nascens, Monardi & Lugd.  
an Mamci Brassilianorum, apud Lerium par. 3.  
Ind. occid. c. 12.

## SECTIO SEXTA.

CARDUUS; CIRSIUM; CNICUS ET ATTRACTILIS; ACARNA; CHA-  
maleon sive Carlina; Acanthis; Carduus lacteus; Carduus Spherocephalus; Carduus Tomen-  
tosus; Acantha sive Branca Ursina; Scolymus sive Cinara; Carduus spinosissimus; Dipacus; Eryngium;  
Carduus Stellatus; Euphorbium & Anteuphorbium; Tragacantha; Poterium; Drypis;

Anonis sive Resla Bovis.

## CARDUUS.

Plantarum spinosarum divisionem universæ à Theophrasto partim 1. hist. 16. partim 6. hist. 3. & 4. sic expressit.  
Ἀκανθῶδες, id est, spinosa, sive aculeata alia in totum spinosa, alia non in totum: in totum spinosa, ut Ca-  
ruda, Scorpis: non in totum spinosa Φύλλον ἀκανθῶδες, id est, quæ folia omni ex parte sic in spinas divisa habent,  
ut tangenti præter spinas undique nihil occurrat, ut acorna, drypis, acanacea. Alia εἰς ὅζῳ πρὸς καὶ πρὸς  
γώνυθον, id est, mucronantur & habent latera angulosè dissecta, ut Smilax, Ilex. Alia εἰς ὅζῳ πρὸς καὶ πρὸς  
μὴ πρὸς γώνυθον, ut Ruscus. Alia sunt ἀκανθῶδες ἐκ τῶν ἀκρῶν, καὶ πρὸς ὁδὸν καὶ ὁδοῦ καὶ, mu-  
cronata & insecta pedinum modo, ut abies, pinus, picea, cedrus, juniperus. Alia πρὸς καὶ ἵχνην ἐκ τῶν ἀκρῶν  
καὶ πρὸς ἵχνην, id est, quæ spina foliis adnata, & mucrone pungunt & lateribus, ut ilex phellodrys. Alia πρὸς καὶ  
ἐκ τῶν ἀκρῶν καὶ ἐκ τῶν ἀκρῶν καὶ ἵχνην, id est, præter folium minimè spinosum bortenita, ut thamnus, tribulus, ononis,  
stabe. Alia ἐκ τῶν ἀκρῶν καὶ ἐκ τῶν ἀκρῶν καὶ ἵχνην, id est, spinas caulibus enasce-  
ntes habentia foliumq; insuper aculeatum, ut capparis Aegyptia: quadam ὁδοῦ καὶ ἀκανθῶδες, id est, arrectis spinis  
muricata, ut smilax quadam καὶ πρὸς ἀκανθῶδες, id est, uncinatis arcuatq; spinis armata. At Plinius l. 17. c.  
15. sic expressit. Spinosarum multe species: in totum spina est asparagus scorpio: nullum enim folium habet.  
Quædam spinosa foliata sunt, ut carduus, eryngium, glycyrrhizon, urtica: iis enim omnibus foliis inest aculeatus  
mordacitas. Aliqua & secundum spinam habent folium, ut tribulus, ononis, phleas, quod aliqui Stæben appellat.  
re: bipophæes spinis angulosis. Quædam in folio habent & in caule, ut Capparis. Tribulo proprietas, quod & fru-  
ctum spinosum habet. Hæc Plinio.

Verum hic non de omnibus spinosis agemus, sed potissimum de Cardui & Acanaceis: de cæteris inter arborum  
& frutices.

## CARDUUS.

Quemadmodum ἀκανθῶδες & ἀκανθα generaliter omnem spinam denotat sic & Σπῆλαιος Cardu-  
rum, Latini Carduum generatim interpretantur. Similiter Ἀκανθῶδες, etsi herba quadam sic spinosa Theophrasti  
6. hist. 1. amen eidem 1. c. 4. sic etiam dicitur illud quod in Carduorum genere, velut malum extubet. Unde  
quasi dicas Acanaceus spinam Acani genere est. Sic etiam Theoph. 6. hist. 3. illorum quæ folio constant aculeato-  
rum magna ex parte acanaceum est: acanaceum inquam, quoniam concepere & id cui flos inhaeret, aut alium  
fructus, spina vel spinaceum quicquam sit.

Carduus in pratibus humidis vineus  
& avena.

I. Carduus pratensis latifolius.  
Carduus pratensis, Trag. Ges. hor. Ab Lob. ico.  
Carduus, limonia forte Theophrasti (conjec-  
tura ex natalibus sumpta) Ges. hor.

Brassica pratensis, Lon.  
Acanthus syl. Lugd.

Theoph. 6. hist. 3. λευκώρια (Gaza male Beza)  
sylvestrem verit<sup>9</sup> in genere carduorum, ac-  
leatis foliis constar.

II. Carduus pratensis foliis tenuib<sup>9</sup> laciniatis  
Erisichalis

*Eriſthales*, Ang. Lugd.

Plin. l. 26. c. 13. *Eriſthales* eſt flore luteo , foliis acanthi.

III. *Carduus pratensis* *Asphodeli* radice latifolius.

*Leucacantha*, Ang.

*Carduus bulbosus* *Montspeliensis*, Ad. Lob. ico.

*Cirsio* quinto congener, Cluſ. hiſt.

Hujus alteram ſpeciem multis ſpinis donatam *Lobelius* notavit.

IV. *Carduus pratensis* *Asphodeli* radice, foliis profunde & tenuiter laciniaſis.

*Acanthus* ſyl. alter *Dalechampi*, Lugd.

*Jacea aculeata* ſeu *tuberoſa* vel 4. Tab.

*Jacea tuberoſa*, Ger.

V. *Carduus pratensis* *polycephalus*, ſub *Carduo* 6. in *Prodr. deſcriptus*.

VI. *Carduus paluſtris*, in *Prodromo* ſub 5. deſcriptus.

VII. *Carduus vinearum* *repens* folio *Sonchi*. *Ceanothus* *Theoph.* Ang. Lugd. Col.

*Theophrast.* l. 4. hiſtor. II. Hujusmodi verò eſt etiam ſpina *verum* non *arundinoſa*, neque *geniculata* radix hujus.

II X. *Carduus* in *avena* *proveniens*.

*Carduus* ſyl. in *avena*, *Trag.*

*Carduus avenarius*, *Thal.*

*Carduus arvenſis*, *Tab.*

*Carduus muticus*, *Ger.*

Alius *procerior* alius *humilior* : floribus ruffis roſeis, candidis.

*Carduus mollis*.

I. *Carduus mollis* foliis *Helenii*.

*Carduus montanus* foliis *Helenii* non ſpinofus, *Camer.*

*Carduus mollis*, *Camerarii*, Cluſ. pan. & hiſt.

II. *Carduus mollis* latifolius, lappæ capitulis, qui 1. in *Prodromo*.

III. *Carduus mollis* lapathi foliis.

*Carduus mollis* vel *mollior* 2. Cluſ. pan. & hiſt.

IV. *Carduus mollis* folio oblongo *Cirſii* capitulo.

*Carduus mollis* 3. Cluſ. pan. & hiſt.

V. *Carduus mollis* laciniato folio.

*Carduus mollis* *primus*, Cluſ. pan. & hiſt.

*Carduus mollis* *tenuifolius*, *Cam.*

Flos cæruleus, quandoque albus, interdum *purpureus*.

## CARDUUS CIRSIUM DICTUS.

**K** *tenore*. quod dolores *tenore*, id eſt *varicam* ſedet, *Dioſcoridi* l. 4. c. 119. quod hiſ verbis deſcripſit : caule eſt tenero, dum ſermè cubitorum, triangulari. ab imo foliis roſe puſillis circumdato. quæ quidem angulos habent ex intervalis ſpinofos. ſed molles : foliis bugloſo ſimilibus, modicè hiſſutis, longioribus, ſubcandis & per extremitates aculeatis : eſt autem pars ſumma caulis rotunda & hiſſuta, illiq; inſident capitula in ſummo purpurea, quæ in pappos ſeu lanugines ſolvuntur. *Cirſion* *Plinio* l. 27. c. 8. qui eodem ſere modo deſcripſit.

I. *Cirſium* maximum *Asphodeli* radice.

*Cirſium* maximum *montanum* incano folio vel 5. Cluſ. pan. & hiſt.

II. *Cirſium* latiffimum.

*Cirſium*, *Dod. gal.* Lugd.

III. *Cirſium* majus ſingulari capitulo magno.

*Cirſium* majus, *Lob.*

*Cirſium* tertium, *Dod.* Cluſ. pan. & hiſt.

an *Cirſium* tertium, *Cæſ.*

Variet flore, ſtaminibus purpureis aliquando niveis : foliis quæ in eadem planta alia integra ſunt, alia profundius diſſecta.

IV. *Cirſium* majus ſingulari capitulo magno : vel incanum variè diſſectum.

*Cirſium* *Anglicum*, *Lob.* Lugd.

V. *Cirſium* ſingulari capitulo ſquāmato : vel incanum alterum.

*Cirſium* 2. vel *Britannicum*, Cluſ. pan. *Anglicum* 2. *Eid.* hiſt.

VI. *Cirſium* ſingularibus capitulis parvis.

*Cirſium*, *Dod.* alterum, *Ad. Lob.* an & *Cæſ.*

*Cirſium* 3. & *montanum* primū, Cluſ. pan. & hiſt.

*Cirſium* aliud *Dodonæi*, Lugd.

VII. *Cirſium* foliis nō hiſſutis floribus compactis.

*Cirſium*, *Matth. Geſn. hort. Lac. Ad. Lob. Caſt.* Lugd. *Eyſt.*

*Cirſium* 2. *Dod.* quartum, vel *montanum* ſecundum, Cluſ. pan. & hiſt.

*Cirſium* agri *Pifani*, *Cæſ.*

III. *Cirſium* anguſtiſolium non laciniatum.

*Cirſium* *Pannonicum* 1. *pratense*, Cluſ. pan. & hiſt.

IX. *Cirſium* anguſtiſolium, in *Prodromo* ſub *Carduo* 2. deſcriptum.

## CNICUS &amp; ATTRACTILIS.

**K** Nic & Dioscoridi l. 4. c. 196. Theophrasto xñux 1. hist. 12. & xñux 6. hist. 1. 3. 4. Cnicus, Plinio: Latini, Cnicus & Cneus. Dicitur autem Cnicus, à τὸ κνίειν, quod mordere & pungere significat: vel à τὸ κνίγειν, quod pungendo pruriginem excitat, quod de sylvestri relictus, quam de sativo dici potest: an potius à flore colore, cum xñux exponatur croceus, rutilus. Dioscorides sic descripsit: foliis constat oblongis, per ambitum divisis, asperis, aculeatis: caulibus cubitalibus, & in eorum cacumine capitalis olivæ magnitudine, flore croci: semine candido, aut rufio, oblongo, anguloso. Ex his duo Cnici genera tradi colligitur, candidum scilicet & rufum. Quare Theophrastus 6. hist. 4. in sylvestrem, urbanumque, divisit. Sic enim sparsim de Cnico inquit: fructum aculeatum ac veluti rectoridum fert: florem unā cum staminibus ipsis edit: foliis aculeatis inter Acanthea excipitur, unā cum Struthis & Soncho: quamvis enim natura spinosa sint, seminis tamen conceptum non spinosum habent: multis caulibus constat & ramos fundit: sylvestri urbanoque, discernitur: sylvestris genera duo notantur: alterum urbano admodum simile, recticaulis tamen: quamobrem ex eo mulierum priscarum nonnulla colo utebantur: fructum nigrum, majusculum amarumque, parit. Verum Dioscorides, per Cnicum rufum videtur intelligere genus syl. quod ex soliorum descriptione significatur. quod forte apud Theophrastum etiam Attractylis vocatur. Sic dum Theophrastus dicit seminis conceptum non spinosum habere, de urbano intelligendus videtur, & hoc ex Plinio l. 21. c. 15. colligitur. Cnicus, inquit, differentia prima, sylvestris & sativa: sylvestrium dua species: una mitior est similis caule, tamen rigida itaque & colu antiquæ mulieres utebantur, ex illis, quare quidam Attractylida vocant: semen ejus candidum & grave, amarum (quibus verbis Plinius potius domesticum quam sylvestre demonstrat, & quia mitius, & quia semen candidum.) Altera hirsutior, porosiore caule, & qui pene hnni sepat, minuto semine: aculeatarum generum hec est. Dicitur hodie Carthamum, voce à Mauritanis mutuata, qui Kanten vocant, vel à τὸ κνίγειν quod est purgare: & Mesues, domesticum & sylvestre fecit.

Ατρεχλιδίς dicitur, quoniam eo ἀτρεχλίδι, id est fusi antiquitus conficiebantur. Dioscoridi l. 3. c. 107. spinosus Cnicus similis, sed quia in summis virgulis folia multo longiora proferat: major autem pars nuda est & aspera, quæ etiam semina pro colu utuntur: capitula etiam gerit in cacumine aculeata, floremque, pallidum: radix tenuis est & supervacua. Theophrasto 6. hist. 3. & 4. Attractylis (suisum agrestem Gaza vertit) spinosa est, & Cnico Acarnag, candidior est: habetque peculiare quod in foliis evenit, decerpta enim carnique, allata succum sanguineum effundunt, quæ de causa φόνος, id est cruor, à quibusdam spina hec est nominata, &c. Et 9. hist. 1. succus sanguineus est spina quam Attractylin vocant. At Plinio l. 21. c. 15. Attractylis idem est quod Cnicus mitior: & c. 16. Attractylis sanguineum succum fundit, quæ de causa phonos vocatur à quibusdam: & c. 21. Cnicus sive Attractylis, &c. ubi Dalechampiuses censet, Plinium & hoc & cap. 15. ineptè cum Cnico Attractylidem confundere.

I. Cnicus sativus, sive Carthamum officinarum. Cnicus urbana & sativa, Theoph. & Plinii.

Carthamus, Brunf. Trag. Fuch. Lon. flore croceo, Camer.

Cnicus, Matth. Dod. ut: Lac. Ad. Cast. sativus, Cef. (cui & Crocus Saracenicus) Eyfl.

Cnicus sive Crocus syl. Ang.

Cneus, Tur. vel Cnicus, Gef. hor.

Cnicus sativus, Theoph. Cord. in Diosc. & hist. Lob. Lugd.

Cnicus vulgaris, Clus. hist.

Flore est croceo, rarius albedo.

II. Cnicus cæruleus asperior.

Cnicus alter, Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cnicus flore cæruleo, Lob. Eyfl. cæruleus, Tab.

Carthamum sive Cnicus flore cæruleo, Cam.

Carthamus sive Cnicus, Ger.

III. Cnicus purpureus foliis non spinosis.

Attractylis purpurea, Cæf.

IV. Cnicus syl. hirsutior, sive Carduus benedictus.

Carduus benedictus, Brunf. def. Trag. (cui & Acanthus Germanicus) Matth. Lac. Gef. hor. Ad.

Lob. Lugd. Cast. Tab. Cam. Ger. Eyfl.

Attractylis hirsutior, Fuch. Dod. gal.

Attractylis sive Cnicus syl. 2. Ang.

Acanthus, Cord. in Diosc. Lon.

Cnicus syl. alter Theophrasti, Cord. in Diosc. Frac.

Cast. Cæf. Lugd. Cam.

Cnicus supinus, Cord. hist.

Cnicus vel Attractylis syl. Gef. hor.

Carduus benedictus & Attractylis altera species, Dodon.

Carduus sanctus, Attractylis Dioscoridis, Cæf.

V. Cnicus syl. spinosior.

Carduus & Diplacus minor, Brunf.

Attractylis

*Atractylis* five *Cartamus* syl. Trag.  
*Carduus vulgaris*, Matth. Lugd.  
*Atractylis vulgaris* mitior, Fuch.  
*Carlina* syl. Dod. ut: vulgaris, Clus. hist.  
*Colus rustica*, Cord. in Diosc. Ges. hor.  
*Cnicus* syl. L. Theoph. *Atractylis* Diosc. Cord. in Diosc.  
*Atractylis media*, Ges. hor.  
*Cirsium luteum Sequanorum*, Lob.  
*Carduus vulgarissimus viarum*, Eid.  
*Cartamus sylvestris*, Lon. Cæs. cui & *Cnicum* rufum Dioscoridis.  
*Cnicus* syl. prior, Lugd. *Atractylis*, Eidem.  
*Atractylis*, five *Cnicus* syl. procerior, Thal.  
*Carduus* syl. & *Scolymus* Plinii, Dod. qui *flosculos purpureos* trahit.  
*Acorna*, Lugd. quoad 2. icon.  
*Carduus* & *Scolymus* syl. Cam. ep.  
*Heracantha*, Tab. Eyst.  
*Carlina* syl. major, Ger.

an *Acarna* Theophrasti, *Acorna* Plinii, Col.  
*Vulgaris* procerior est: altera quæ rarior & pituita locis montanis reperitur.

VI. *Cnicus* syl. spinosior polycephalos.

VII. *Carduus* monstrosus figura Cornucopiæ, Imper.

#### *Atractylis.*

L. *Atractylis* lutea.

*Atractylis*, Matth. Dod. ut: Lac. Ad. Lob. Cast. Camer. Tab. Ger. vulgaris, Ang.

*Atractylis* quorundam, Lugd.

*Atractylis* Theophrasti & Diosc. sanguineo succo, Col.

II. *Atractylis* purpurea.

*Atractylis* cypria, Ang. Lugd.

*Atractylis* flore purpureo, Dod. Ad. Lugd.

Hæc aliquando non pubescit: at Cretica valde lanuginosa est.

III. *Atractylidi* & *Cnico* sylvestri similis.

*Calochiemi*, Belli ep. 5. ad Clus.

### ACARNA five ACORNA.

*Ἀκάρνα* Theophrasto 6. hist. 4. aspectu *Cnico* urbane similis est, colore flavicans, succo pinguis. Et Plinio l. 21. c. 16. *Acorna* colore tantum ruffo distinguuntur (scilicet a *Scolymo*) & pinguiore succo.

I. *Acarna* flore luteo patulo.  
*Eryngium Archigenis*, Ang.  
*Carlina* syl. minor, Dod. Ger.  
*Carlina* syl. minor Hispanica, Clus. hisp. & hist.  
*Acarnæ* five *Sequanorum* Cirsii, *Carlinae* varietas, Lob.  
*Acarnæ* similis *Carlina* syl. minor, Lugd.  
*Acorna*, Cæs. alp.  
*Carlina* sylvestris, Tab.

II. *Acarna* flore purpurorubente patulo.

*Acanthioides* parva Apula, Col.

III. *Acarna* capitulis parvis luteis in umbella.

*Acarna* five *Acorna* altera Apula, Col.

IV. *Acarna* capitulis globosis.

*Carlinae* syl. aliud genus, Clus. cur. post.

V. *Acarna* humilibus caule foliolato.

*Pienomus* Cretæ Salonenfis Galloprovinciæ, Ad. Lob. Lugd.

*Chamaeleon niger*, Tab. Ger.

Eandem suspicor cum sequente

*Acarna* Valerandi altera, Lob. Lugd. Tab. Ger.

VI. *Acarna* major caule foliolato.

*Chamaeleon niger* Salmaticensis, Clus. hisp. & hist. Dod. Ger.

*Chamaeleon* Salmaticensis, Lob. Lugd.

*Chamaeleon* Hispanicus, Tab.

VII. *Acarna* major caule non foliolato.

*Acarna* Theophrasti, Ang. Lob. Lugd. Tab. Ger.

IX. *Acarna* minor caule non foliolato.

Leo, *Carduus* ferox, Dod.

Phoenix, Leo, *Carduus* ferox, Lob.

*Carduus* ferox, Lugd. Tab. Ger.

### CHAMÆLEON five CARLINA.

*Χαμαλέον* à foliorum varietate dicitur, Dioscoride & Plinio testibus: at ille de nigro, hic verò de utroque testatur: eo quod cum terra colorem mutet: hic enim viridia, illic albicans, alicubi cerulea, nonnusquam rubra inveniuntur. Dioscoridi: at Plinio hic niger, illic viridu, alibi cyanæus, alibi croceus atque aliis coloribus.

Duplex est Dioscoridi l. 3. c. 10. & n. albus & niger, albus idem (ἐὶς) dicitur, quod quibusdam locis ruscum ad inferius radices inveniatur: At Plinio l. 22. c. 18. *Chamaeleonem* *ixiam* vocant (de utroque intelligens) duo genera, candidior, &c. & sub aliis foliorum gigni asserit, quo mulieres etiam pro mastiche utuntur, utroque monente, & Guiland. *Chamaeleonem* & *Ixiā* Dioscoridi lib. 6. qui inter venena recenset, plantis diversis facit. Et Theo-

*phraslo 9. hist. 13. una candida, altera nigra: Vernilaginem Gaza reddit. Dioscoridi albus caulem non promit, verum ex medio spinarum echino marino aut cinara similem erigit, floribus purpurascens: & Plinio serpit in terra, echini modo spinas erigens: Et Theophrasto, capite est magno Acano simili, unde quidam Acanum vocant. At niger caulem habet dodrantalem, qui umbellam gerit, floribus spinosis tenuibus, hyacinthi æmulis & versicoloribus. Verum Plinio duplex est: ex nigris, scribit, aliqui marem dixere cui flos purpureus esset, & feminam cui violaceus & una nascuntur cubitali, &c. Carlina vulgo quasi Carolina, quod credatur hanc herbam Carolo magno ab Angelo demonstratam fuisse, tanquam certissimum remedium ad pestem ab exercitu suo propulsandam.*

I. Carlina acutulos magno flore.  
& bernuræ, id est apri radix, Brunf.  
Carduus panis seu pacis, Ericio Cord.  
Chamæleon albus, Matth. Cord. in Dioscor. Lac.  
Cast. Lugd.

Ixine Theophrasti, Ang.  
Helxine Pliniana, Eid.  
Spina arabica, Dod. gal.  
Cardopatum caule nullo, Ges. hor.  
Carlina herbariorum, Ad. Lob. ob.  
Chamæleon albus Dioscoridis, Guil. pap. Lob.  
ico. Clus. hist.

Carlina humilis (vel altera) Dod. Col.

Carlina vulgo, Cæf.

Carlina scissili flore, Cam.

Flore est albo: est & purpureo.

II. Carlina caulescens magno flore.

Chamæleon niger vulgaris, Trag. Eysf.

Chamæleon niger alter, Matth. Lugd.

Chamæleon, Lon. niger, Lac.

Chamæleon albus, Fuch.

Leucacantha, Dod. gal.

Cardopatum flore albo caulem habens, Ges. hor.

Carlina sive Leucacantha, Dod.

Chamæleon albus caule donatus, Lob.

Crocodilium, Carlina caulem habens, Lugd.

Carlina major, Clus. pan. elatior, Eid. hist.

Carlina alterum genus, Cæfalp.

Carlina caulescens, Cam. ep. & hor.

Carlina vulgaris caulem emittens, Col.

Flos albicans rarissime rubeus.

Hanc aliqui à priori nihil differre censent, nisi quod caulem proferat: alii negant: certe priori congener est.

III. Carlina acutulis gummifera.

Chamæleon albus gummi, ut mastix ferens, Belli ep. ad Clus.

Chamæleon albus Apulus purpureo flore gummi fer, Col.

IV. Carlina acutulos minore purpureo flore.

Chamæleon albus seu exiguus, Trag.

Chamæleon parvus, Lon. exiguus, Lugd.

Carduus acutulis septentrionalium & Chamæleon albus Cordi, Lob.

Carlina minor purpureo flore, Clus. hist.

Chamæleon Septentrionalium exiguus appellatus, Col.

V. Carlina polycephalos alba: ad bicubitalem altitudinem excrecit, cujus folia superiora candida sunt: apud Helvetios in pascuis provenit.

VI. Chamæleon niger umbellatus flore cæruleo hyacinthino.

Chamæleon niger, Matth. Cast. Lugd.

Chamæleon niger Dioscoridis, Ang. Maranthæ, Ad. Lob. Cam. Col.

Chamæleon niger Cortusi, Dodon. verus Dalechamp. Lugd.

Crocodilium, Tab.

## ACANUS.

**D**E Acano apud antiquos pauca reperiuntur. sortasse quia vulgarissima planta, omnibusq; cognita notis describere superfluum visum fuit: à qua reliqua spinarum genera Acanacea nuncupata. Apud Theophrastum i. hist. 6. Acanus & inter φυλλοειδῶν recensetur: & 6. hist. 1. alia solius aculeatis constant, ut Acanus & Acanus, &c. Guiland. in pap. Ixina à Theophr. aliter Acanus vocatur: quam vocem & Cardium pineam Gaza exposuit. Plinius l. 22. c. 9. Sunt qui Acanon Eryngio ascribant, spinosam brevemq; ac latā herbam spinisq; latioribus.

Carduus latifolius echinos obsoleta purpurea ferens.

Acanus, Anguil. Lug.

Agavanus Cretensium, fortè Acanus Theophrasti, Honor. Belli epistol. 5. ad Clus. & Ponz Ital.



## SILYBUM five CARDUUS LACTEUS.

Σ Ἰ'αυθον. Dioscoridi l. 4. c. 159. *Spina est lata foliis Chamæleonti albo similis. Plinio l. 22. c. 22. Silybum Chamæleonti albo simile aque spinosum.*

I. Carduus albis maculis notatus vulgaris.

Carduus albus & Chamæleon, Brunf.

Carduus Mariz, Trag. Fuch. ico. Gef. hor. Lon.

Cast. Ger. vulgaris, Cam.

Carduus lacteus, Matth. Lugd.

Spina alba, Dod. gal. Lac. hortensis, Fuch.

Silybum, Ang. Ad. Lob.

Carduus Marianus, Cord. in Diosc. Tab.

Leucacantha, Lac. Cornaro.

Carduus leucographus, Dod.

Leucographus Plinii, Lugd.

Cardus syl. aliud genus & Acanon Theophrasti, Cæsalp.

II. Carduus albis maculis notatus exoticus.

Carduus lacteus Syriacus, Cam.

Carduus lacteus vel Bedeguar Arabum, Rauwolf.

Ag. Cretenfium nomine, semen accepimus.

## CARDUUS SPHÆROCEPHALUS.

I. Carduus Sphærocephalus latifolius vulgaris.

Chamæleon verus, Trag. niger, Fuch.

Spina alba altera, Matth. (at in prima edit. & epit.

Spina alba) Spina alba putata, Cam. ep.

Spina incognita, Fuch. ico.

Spina peregrina, Dod. gal.

Carduus Sphærocephalus, Cord. hist. Dod. Tab. Eyttett.

Echinopus, Gef. hor.

Crocodilium, Lac. Ad. Lob. ob.

Ritro five Rutro Theoph. Lob. icon.

Chalceios, Lugd.

Tetralix spinosa, Lugd.

Silybum, Lugd. def.

Spina alba: item Arabica, Lugd.

Ruthrum alterum, Eid.

Sphærocephalus annuus, Cam.

Carduus globosus, Ger.

numerat Theophrastus 6. hist. 3. inquit, à quibusdam vocata æstate floret: Et Plinius lib. 21. c. 16. quædam æstate florent ut Tetralix. Sed non est confundenda cum Erica, quam Athenienses Tetralicen vocant, eodem l. 11. c. 16. autore.

Α'αυθον. Δ'αυθον five Spina alba, folia fert Chamæleontis albi, sed angustiora & candidiora, aliquantulum hirsuta & aculeata: caulis bicubitalis candidans &c. in cacumine capitulum spinosum, echini marini æmulum, at minus & oblongum: flores purpurei, in quibus semen seu Cnici, sed rotundius. Dioscorides l. 3. c. 14. & Plinius l. 25. c. 12. cui Spina alba dicitur.

Α'αυθον. Α'αυθον, Spina Arabica, natura spinæ albæ similis esse creditur, Diosc. l. 3. c. 15. & Plinius l. 25. c. 12. Spinæ Arabicæ vires recenset.

Ρυθρον: Theophrastus 6. hist. 3. hæc solum habet: alia supernè cacumine tantum ramos spargit, quemadmodum Ruthrum. Sunt tamen qui velint mēdōsē pro ἑρυγγίον apud Theophrastum legi, quod ex Pliniana l. 21. c. 16. loci illius Theophrasti interpretatione colligitur, cum ibi non Ruthrum sed Eryngium legatur.

Hæc lubuit aspergere cum huic & sequentibus, hæc nomina à quibusdam tribuantur: at verborum brevis obstat quo minus certi quid statui possit.

II. Carduus Sphærocephalus cæruleus minor.

an Ritrum five Rutrum Theoph. Ang.

Ritro floribus cæruleis, Ad. Lob.

Carduus sphærocephalus 3. Dod. Lugd.

Crocodilium Monspelienfium Dalech. Lugd.

Ruthrum Theophrasti, Eid.

Spina alba putata flore cæruleo, Cam. ep.

Bb 3

III. Car-

Ι'αυθον (quam cum reliquis aculeatis plantis e-

III. *Carduus sphærocephalus capitulo longis spinis armato.*

*Spina alba, Ang. Ad. Lob.*

*Carduus sphærocephalus acutus, Dod. Lugd.*

*an Sphærocephalus maximus, Cam.*

*Hujus major & minor species five 2. & 3. Dod. & Lugd.*

IV. *Carduus sphærocephalus minimus acutissimis foliis.*

*Carduus Sphærocephalus 4. Dod. Lugd.*

V. *Carduus capite rotundo tomentoso.*

*Carduus erioccephalus, Dodon. Clus. pan. & hist. Cam. Lugd. deic.*

*Carduus tomentosus & corona fratrum, Lob.*

*Acanthium montanum Dalech. Lugd.*

*Jacea lutea, Clusii, Lugd. ico.*

*Onopordon, Lugd.*

*Spina alba, Cæsalp.*

*Flore est purpureo, interdum albo.*

*Onopordon Plinius l. 27. c. 12. si comederint alicui, crepitus reddere dicunt: de hoc idem testatur Dalechampi.*

## *CARDUUS TOMENTOSUS CAPITULO LATIORE.*

I. *Carduus tomentosus capitulo majore.*

*an Spina Arabica, Ang.*

*Carduus tomentosus, Ad. Lob. ico.*

*Spina Arabica Dioscoridis & Plinii, Matt. emend. & Cæf.*

II. *Carduus tomentosus capitulo minore.*

*Spina alba, Matth. Cast. altera, Matth. Lugd.*

*Carduus sphærocephalus quintus, Dod.*

*Spina alba altera, Cæf.*

*Hujus folia aliquando maculis albis notantur.*

III. *Carduus tomentosus capitalis minimè aculeatis.*

*Carduus aræophyllos Dalechampi, Lugd.*

IV. *Carduus tomentosus capitalis echinatis.*

*Leucacantho Monspelienfium Dalechampi. Lugdun.*

## *ACANTHION.*

**A** *Καίνθρον Dioscoridi l. 3. c. 18. folia gerit spina alba similia, in summo verò eminentias aculeatas araneas lanugine obductas, è qua collecta textaq; vestes bombycinis similes fieri ajunt. Plinius l. 25. c. 12. Spina alba similis est spina illa, quam Græci Acanthion vocant, minoribus multis foliis, aculeatis per extremitates, & araneas lanugine obductis, qua collecta etiam vestes bombycinis similes fiunt in Oriente.*

*Carduus tomentosus latifolius.*

I. *Spina alba tomentosa latifolia sylvestris.*

*Spina alba 3. Trag.*

*Spina alba syl. Fuch. Lon.*

*Acanthium, Matth. Dod. ut: Ad. Lob. Cast. Cam.*

*Lugd. qui Matth. & Fuch. figuram exhibet.*

*Onopordon Athenæi, Ang. Gel. hor.*

*Onogyros Nicandri, Eidem.*

*Acanthium vulgare, Tabern. flore albo & flore purpureo.*

*Acanthium album, Ger.*

*Silybum sive Leucacantha Loniceri, Lugd. ico.*

*Carduus sylvestris, Cæsalp.*

*Floribus communiter purpureis, aliquando albis: hinc duæ figuræ apud Tabernæmont. & Gerardum.*

*Hæc duplex: altera foliis latioribus densa lanugine: altera angustioribus, tenuiore lanugine obdita, & in hac capitula majora & innocentioribus spinis horrentia: hinc apud Dodonæum figuræ duæ, altera Lobellii, altera Fuchsi.*

II. *Spina tomentosa altera spinosior.*

*Acanos forte Bellonii.*

*Onopordon, Dod. Cam. Tabern. cui 1. & 2.*

*Acanthium Illyricum, Ad. Lob.*

*Onopyxus 3. Dalechampi, Lugd.*

*Carduus viarum, & Card. viarum fl. albo, Ger.*

*Acanthium syl. flore albo, Eyst.*

*Floris color ut prior variat: hinc duæ figuræ apud Tabernæmontanum & Gerardum.*

III. *Acanthium peregrinum, Tab. quid? Solstitialis lutea peregrina, Ger.*

## *ACANTHA sive BRANCA URSINA.*

**A** *Καίνθρον ἢ ἐρπαιόφυτον (quasi serpens spina) Dioscoridi l. 3. c. 19. folia habet lactucescens latiora multo & longiora, eranca divisura, nigricantia, pingua ac levia: caulem levem, binum cubitorum, digitali crassitudine, prope verticem ex interserviis foliis quibusdam cœu alveolis circumdatum oblongis hyacinthinis, è quibus flos prodit.*



*semen oblongum ac luteum: caput verd thyrſi ſpecie: radices ſubiacent viſcoſa, muſcoſa, ruſſa ac longa. Plinio l. 22. c. 22. Acanthos eſt topiaria & urbana herba, elazo longoꝝ, folio crepidines marginum adſurgentiumq, pulvinorum toros veſtiens. An hac ſit Acantha apud Theophraſtū 4. hiſt. ii. inter herbas, quā Gaſa Spinā vertit, de qua inquit: pari modo & ſpina qua Ceanothos ( αἰνός καὶ θάλασσα ) appellatur, ut Cyperus germinat: verum huius radix non harundinoſa neq, geniculata eſt: & utriū ea que pro Acantho exhibetur, ſit Dioſcoridis Acanthus aliqui dubitāt, qua de re ſuo loco.*

Genera duo ſunt, eſt ſativa & ſylveſtris: de hac Dioſcorides l. 3. c. 20. eſt & ſylveſtris Acantha, carduo ſimilis, aculeata brevior ſativa: & Plinius l. c. duo genera ejus ſunt, aculeum & criſpum, quod brevius: alterum leve, quod aliqui Paderota vocant, alii Melanphyllum.

I. Acanthus ſativus vel mollis Vergilii.  
Acanthus, Matth. Cord. in Dioſc. Lac. Lon. Caſt.  
Cæſſevis, Eyſt.

Acanthus verus, Trag. (cui & Branca uſina Italica vera) Fuch. Cam. (Tab. Ger.

Acanthus ſativus, Dod. ut: Gef. hor. Ad. Lob. Lug.  
Branca uſina Italorum, Guil. epiſt.

Ex plantæ ſucco glutinoſo & quaſi mucoſo quidam gummi Tragacanthæ æmulum faciunt.

II. Acanthus aculeatus.

Acanthus ſylveſtris, Dodon. ſpinofus, Eyſt.

Acāthus ſyl. Scolymo ſimilis aculeat⁹ Dioſ. Lob.

Chamaeleonta Monſpelienſium, Lob. ico.

Branca uſina aculeata, Lugd.

### SCOLYMUS ſive CINARA.

Σκόλυμος Dioſcoridi l. 3. c. 16. ſolia habet Chamaeleonis & Leucacanthæ, at nigriora & craſſiora: caulem edit longum, foliis obſitum, in quo capitulum eſt ſpinofum: radix craſſa nigra. Plinio lib. 19. c. 8. Carduus dicitur, ubi & maximi quaſus eſſe teſtatur, & ſerendi modum deſcribit. Αἰγώνη, Fralliano: κυνάρη, Galeno de alimentis: Cinara (a cinere quo ſerocari amat) Columella & Palladio.

Genera: ſativus eſt qui ſolis eſt ſpinofus & non ſpinofus: eſt & ſylveſtris, qui videtur eſſe apud Theoph. 6. hiſt. 4. καλὴ: nuncupatus. Caſtus, inquit ſtatim à radice caules repentes in terram mittit. folio lato atq, ſpinofis: caules hos Caſtos appellant, deſquamati cibo: donec ſunt fructus in quo ſemen ſpinata ſpecie eſt, &c. Et Plinio l. 21. c. 16. Caſtos in Sicilia tantum creſcit, ſua proprietate & iſſa, cujus in terra ſerpunt caules à radice emiſi, lato folio & ſpinofis: caules vocant caſtos, &c.

I. Cinara horteniſis foliis non aculeatis.  
Cardui alterum genus, Trag.  
Carduus non aculeatus, Matth.  
Cinara, Dod. gal. Lacun. Eyſt.  
Scolymus non aculeatus, Ang. Tab.  
Cinara horteniſis, Gef. hor.  
Carduus aut Scolymus non aculeatus, Lon.  
Cinara non aculeata, Matthioli & Dodonæi, Lug.  
Carduus ſativus, Gef.  
Cinara ſeu Artichochi vulgatio, Eyſt.  
Carduus horteniſis non ſpinofus, Caſt.

II. Cinara horteniſis aculeata.  
Scolym⁹, Trag. Fuch. Cord. ut: Gef. hor. Ad. Lob.  
Carduus horteniſis foliis ſpinofis, Gef. hor. Caſt.  
Cynara aliud genus, Dod. gal.  
Carduus, Lac. Tur. ſive Scolymus, Lonie.  
Carduus atiliſis, Lugd.  
Scolymus Dioſcoridis, Cluſ. hiſt.

Utramque qui eandem fecerit non repugnabimus: quia foliis eſt aliquando aculeatis, aliquando mitibus: Sic caput nonnunquam in gracileſcentē metam erigitur: nonnunquam in compreſſiorem & rotundiorem globum extuberat, laminis inter-

dum ſponte ſeſe recludentibus, interdum arctius et m. radis: caput ſquammarum nunc virides, nunc pallentes, nunc ſubrubentes in aculeum deſinētes, nunc brevē nunc robuſtū, nunc infirmum, eumq, in aliis ſurſum erectum in aliis deorſum inclinatum, nunc prope nullum. Eſt quædam capite maximo, quæ dicitur & pingitur ſub

III. Cinara maxima Anglica, Lob. ico. Ger.

Scolymo majore, Taber.

Scolymus ieu Cinara maxima, Eyſt.

Additur in horto Eyſtettentiſi

Cinara major Boloniēſis quod è Polonia allatum, foliis eſt minus aculeatis. Itē

Cinara Genueſium, ſquamis circa latera inæqualibus & aculeo infirmo.

IV. Cinara ſpinofa cujus pediculi eſtantur,

Carduus aculeatus, Matth.

Cinara ſpinofiſſima, Scolymus Dioſcoridis &

Caſtos Theophraſti, Ang.

Caſtus Matthioli, Lugd.

Cardones, Cæſalp.

Scolymus aculeatus, Taber.

Carduus horteniſis, quem Cardum vulgo, Cam. Folio-

Felliorum pediculi terra obruti candidi, à cute emundati, hyeme erudi cum fale & pipere in cibos veniunt: & licet capitulis sint spinosisimis, longissimis aculeis armatis & vix velsis, colitur tamen ut stolones teneri gulæ arrideant.

V. Cinaræ sylvestris latifolia.

Scolymus sylvestris. Ad. Lob.

Scolymus Dioscoridis. Lugd.

VI. Cinaræ syl. Cretica.

Agriocinaria, Belli ep. 2. ad Cluf.

Agriocinaria Cretica, Ponæ Ital.

an Cynara syl. Boetica, Cluf. cur. post.

Echini licet spinosissimum antequam aperiantur & crudi & elixi esitantur.

## CARDUI ALIQUOT EXOTICI.

I. Melocactus Indiæ occidentalis.

Echinomelocactus, Ad. Lob. ico. Cluf. ex lib. 4. cap. 24.

Melocardus echinatus Penæ, Lugd. Tab. Ger.

Melocactus, Eysf.

Ex melone, pepone & carduo coaluisse videtur.

II. Carduus Guyavenfis.

Spina ex Guyava ex cardui capite detracta, Cluf. exot. 1. 2. c. 6.

III. Carduus spinosissimus brachiatus ex Hispaniola.

Pithaja, Card. de variet. Gesf. hort.

Carduus pithaya Oviedi, Lugd.

Hujus fructus esitatus, urinæ sanguini similes non secus quam Ficus Indiæ fructus caulat.

IV. Carduus Insulæ Madagascar.

Cardui cujusdam elegantissimi caput sub fructu 15. Cluf. exot. 1. 2. c. 15.

V. Carduus Brasilianus foliis Aloës.

Nanas Theveti, Lugd. Cluf. Garz. & par. 3. Amer. epist. 1. de Brasil.

Strobilus five nux pinea, Monardi.

Ananas Acoftæ, Lugd. ap. Cast. & par. 4. Ind. or. c. 5. fig. 14.

Ananas, Ananafa: Brasilianis, Nana in Hispaniola. Jajama: Hispanis, Pinas, cujus duo genera, mas & tæmina, par. 6. Ind. or. c. 38.

Pinæ nuxes in America, Joseph. Acoftæ lib. 4. cap. 19.

Pinæ in arbusculis, Benzoni lib. 1. c. 28. vel par. 4. Ind. Occid.

Ananas optimus Americæ fructus, qui Panacous Brasilianis, Lerio cap. 12.

Aizoi majoris ortu persimilis exotica plâta, Lob. icon.

Aberas nomine fructus Francofurti venalis fuit.

Species hujus tres secundum Oviedum: prior Jajama: altera Bonjamateria Jajagua dicitur.

VI. Carduus Brasilianus sylvestris.

Ananas sylvestris, Acoftæ, Lugd. Cast.

VII. Carduo Ananæ similis.

Hoyriri, Theveto.

## SCOLYMUS THEOPHRASTI.

**Σ**κόλυμος Theophrasto 6. histor. 4. (Carduus à Gaza vertitur) sive Limonia inter Acanaceæ, foliis confusaculeatis: pulchre diu flores, &c. radix lacteum succum emittit: floris quoque proventus peculiari videtur: etenim circa solstitium incipit: carnosam ciboque idoneam partem crassescens sortitur: ortus autem ejus non spinosus, sed oblongus fieri assolet, &c. Plinio lib. 21. cap. 16. Scolymus flores sero & diu, Carduorum generis, ab eis differt, quod radix ejus vescendo est, decocta: mirumq, quod sine intervallo tota æstate aliud floret in eogenere, aliud concipit.

Scolymus chrysanthemus.

Eryngium Vegetii, Ang. Cam.

Alicolimbros, Bellonio,

Scolymus Theophrasti, Cluf. hisp. Ad. (& Eryngium luteum Monsp.) Lob. Czf. Lugd. Tabern. Camer.

Carduus chrysanthemus, Dod. Ger.

Atrastylis marina, Lugd.

Variat ratione loci: qui circa Monspelium provenit magis luxuriat, ramis latius sparsis & lon-

goribus: cujus folia lacteis maculis notata sunt: floribus est paucioribus, quam in ea planta quam Hispania profert: hinc dux icones à Dodonæo & Clusio in sua historia proponuntur: illa quidem nomine

Scolymi Theophrasti Narbonensis, Cluf.

Cardui chrysanthemum alterius figura, Dod. hzc

Scolymi Theophrasti Hispanici Cluf.

Cardui chrysanthemum, Dod.

## CARDUUS SPINOSISSIMUS.

**O** *ἀκνέος* à Theophrasto 6. hist. 3. & à Plinio l. 21. c. 16. inter spinosas stirpes numeratur (natura, inquit Theophrast. spinosa est) Buxum asininum Gaza vertit, quod sit cardum asini in cibo gratissimum.

I. Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus vulgaris.

Scolymus, Dod. gal.

Carduus asininus, Gef. col.

Carduus sylvestris primus, Dod.

Onopyxus Dodonæi, Lugd.

II. Carduus spinosissimus sphærocephalus rigidis aculeis armatus.

Hujus semen Cardui Arabici nomine missum fuit: excrevit caule crispo cubitum superante, foliis latis, longitudine palmum excedentibus per caulem rarioribus: capite est rotundo superne æquali, spinis oblongis atrociter pungentibus armato: flore albo odorato: in cujus lanuginoso capitulo semen continetur striatum & transversim canaliculatum, caucalidis Hæspanicæ ferè modo sed rarius & crassius. Hortis facile assuescit.

III. Carduus spinosissimus angustifol. vulgaris. Agriacantha, Ruellio.

Carduus syl. tertius, Dod. ut:

Aculeosa Gazæ, Ad.

Carduus spinosissimus vulgaris, Lob.

Polyacanthos Theophrasti, Lugd. Tab.

Onopordon, Gerar.

IV. Carduus spinosissimus capitulis parum aculeatis.

Onopyxus alter, Lugd.

V. Carduus spinosissimus segetibus frequens.

Carduus avenarius, Loais.

Drypis, Lugdun.

Capitulis est ut in Scolymo echinatis, flore alias purpureo, alias candicante, alias puniceo.

VI. Carduus lanceatus latifolius.

Carduus lanceolatus, Tab. Ger.

\* VII. Carduus lanceatus angustifolius: qui pro 4. in Prodomo describitur.

IX. Carduus vertice corticoso.

Carduus chondrilloides Dalechamp. Lugd.

## DIPSACUS sive CARDUUS FULLONUM.

**Δ** *ἰψάκος* id est sitibundus, nomen à contrario invenit: quoniam ut Dioscorides l. 3. c. 13. monet, alarum sinu concavorem vel imbrem recipiat, quo velut ad sitis injurias abigendas abutitur. Latini. Labrum Veneris, à foliorum carinato habitu, quæ se ambage anfractuosa sinuantia pelvis speciem constituunt, & intra se humorem continent. Caulem habet, inquit Dioscorides, altum spinis horridum, & solis caulem amplectentia lactuca foliorum emula, bina in singulis gemitibus aculeata, &c. in cacumine caulis singulis surculis singula capita insunt echino similia, oblonga aculeata, quæ divisa in medulla vermiculos ostendunt, &c. Plinius l. 26. ult. Labri Veneris meminit, at non descripsit: quare dubium an Dipsacum intellexerit. At l. 27. c. 11. Galedragon Xenocratis vocasse videtur. sic describens: leucacantha similis, palustris & spinosa, caule serulaceo, alto, cui summo caput inhaeret simile ovo: in hoc crescente etate vermiculos nasci tradunt, &c.

Genera: duplex est, Sativus & sylvestris: hic major & minor.

I. Dipsacus sativus.

Carduus fullonum sativus, Trag.

Labrum Veneris, Matth. Cord. in Diosc. flore candido, Cæf.

Dipsacus hortensis albus, Fuch.

Galedragon Xenocratis, Anguil.

Dipsacus sativus, Dod. ut: Cord. hist. Gef. hort.

Gerar.

Dipsacus sativus fullonum, Ad.

Carduus fullonum, Lobel. & an Spina Selenitis

Theophrasti, Guilan.

Dipsacus sive Labrum Veneris, Lugd.

II. Dipsacus folio laciniato.

Dipsacus secundus, Tab. syl. Ger.

III. Dipsacus syl. aut Virga pastoris major.

Carduus fullonum, Bruns.

Carduus fullonius erraticus, Trag.

Labrum Veneris alterum, Matth.

Dipsacus, Lac. Lon. Tab. purpureus, Fuch.

Dipsacus syl. Dod. ut: Tur. Cord. hist. Gef. hort.

Thal.

Labrum Veneris, Cord. in Dioscor. Ad. Lob. sylv.

Cast.

Labrum Veneris flore purpureo, Cæf.

Dipsacus sativus alter, & Dipsacus syl. major, Lug.

IV. Dipsacus syl. capitulo minore, vel Virga pastoris minor.

Cardui fullonii tertium genus, Trag.

CC

Virga

Virga pastoris, Matth. Ad. Lob.

Diplacus 3: & Galedragon Plinii, Dod. ut:

Diplacus minor, Gef. hor. Thal. syl. minor, Lugd.

Virga pastoris & Diplacus sativus, Cam.

Molybdena Plinii, vulgo Diplacus secundus capite rotundo, Dalech. in Plin.

## ERYNGIUM sive IRINGUS OFFICINAR.

**E**ρύγγιον & ἱρύγγιον: Græci Philosophi Eryngium, quasi ἱρύγγιον id est ructum, dictum putant, quod capra quæ morsu surculum Eryngii præciderint, vel deglutiverint, cunctum gregem pone sequentem quasi stupore attonitum sistunt, donec Eryngium ructu rejecerint. Eryngio Dioscoridi l. 3. c. 24. folia lata sunt & extremo ambitu aspera, & ubi auferunt circa complures caulium eminentias in spinas aculeantur, in quorum summitatibus globosa sunt capitula spinarum acutissimarum durarumq; ambitu stellatim circumvallata: radix oblonga &c. Plinio l. 22. c. 7. Eryngæ & Eryngion, dura fruticosa, spinosis foliis, caule geniculato, carnali & majore aliquando, alia albicans, alia nigra, radice odorata: & cap. seq. ex his candidam nostris centum capita vocant. Sunt qui velint apud Theophrastum & hist. 3. c. 3. & mendosè pro ἱρύγγιον exaratum esse, quod ex Plinio colligatur.

Genera: Dioscorides unius quidem meminit: sed capitulorum colorem alias viridem, nunc pallidum, alias album, interdu caruleum inveniri scribit: & Plinio sativum est: est & sponte nascens in asperis: & in litoribus maris durior nigriorq; folio apii.

### I. Eryngium maritimum: & Gef. hor.

Eryngium marinum, Matth. Dod. ut: Ang. Tur.

Ad. Lob. (cui & Acanos Plinii) Cast. Lugd. Cæf.

(cui & Crocodilium Dioscoridi & Plinii) Cam. Clus. hist. Eyf.

Glyzyrrhiza spinosa, Lacun.

Eryngium rotundo folio, Colum.

### II. Eryngium vulgare: & Cam.

Eryngium primum, Trag. Lon.

Eryngium montanum sive campestre, Matthioli.

Cast. Lugd.

Eryngium, Fuch. Ang. Lac. Cord. in Diof. Cæf.

Tab. vulgare, Dod. gal.

Eryngium mediterraneum, Tur. Gef. hor. Ger.

Eryngium campestre, Dod. Cast. vulgare, Clus. hist.

Eryngium campestre mediterraneum, Ad. Lob.

### III. Eryngium montanum amethystinum.

Eryngium caule & flore caruleo, Ang.

Eryngium aliud in montibus, Cæf.

Eryngium totum caruleum, Cam. hor. Eyf.

Eryngium montanum caruleum, Ad. Col.

Interdu tota planta est coloris saturate carulei, aliquando folia pars superior: cujus etiam pumila species, Cameratio monente.

### IV. Eryngium montanum pumilum.

Eryngium pumilum, Clus. hisp. & hist. Dod. Lug. Tab. Ger.

V. Eryngium montanum minimum, capitulo magno.

Carduncellus montis Lupi, Ad. Lob. ico:

Carduncellus Penz, sive Cardui minimi species, Lugd.

VI. Eryngium alpinum caruleum, capitulis dipfaci.

Eryngium alpinum, Gef. hor. caruleum, Eid. col.

Eryngium magnis latisque capitulis, Gef. hor. ap.

Eryngium alpinum caruleum, Ad. Lob. ico. Tab.

Eryngium montanum tenuifolium ambitu profunde sinuatum, Lob.

Eryngium planum Matthioli, Dod. ico.

Eryngium aliud montanum Dalechampii, Lugd.

Spina alba Dalechampii, Eid.

Herba peregrina foliis acanthi, Cæf.

Eryngium capite dipfaci, mobile dictum Gesnero, Cam.

Eryngium spurium primum, Ger. ico:

### VII. Eryngium latifolium planum.

Eryngium planum, Matth. Cast. Lugd.

Eryngium ipurium primum, Dod.

Eryngium pannonicum latifolium, Eyf. rect. Clus. pan. latifolium 1. Eid. hist.

Eryngium caruleum, Ger. 1. & 2. Tab.

Flore est caruleo: est & albo: caulis in illo purpurascens, in hoc ex viridi pallescens: à priore differt potissimum capitulis, quæ in illo oblonga lata: in hoc rotunda sunt.

### IX. Eryngium planum minus.

Eryngium pusillum planum Mutoni, Lob. Lug. Clus.

### IX. Eryngium arvense foliis serræ similibus.

Crytharus agrestis, Trag.

Critillum 4. Matth. Cast. Tab. Caman ~~arvense~~ Tralliano.

Eryngium 4. Dod.

Eryngium mont. recentioris, Ad. Lob. Lugd. Ger.

Amni quorundam Dalechampii, Lugd.

CAR-

## CARDUUS STELLATUS.

I. Carduus stellatus latifolius acaulos.  
Οὐδὲν ἔχει ὄφθαλμον, sive findens oculos, Cast. quid?

II. Carduus stellatus latifolius caulescens.  
Carduus stellatus Dalech. Lugd.

III. Carduus stellatus foliis papaveris erratici.

Eryngium, Brunf. alterum, Trag. Lon.

Calcitreppola, Matth. cap. de Eryngio: & Cæsalpino, quati caccorribulus, id est, infestus tribulus: qui Stæbe Theophrasti putat.

Carduus stellatus, Dod. ut: Ad. (sive Calcitrapa) Lob. Cam. Ger.

Carduus stellatorius sive stellario, Gesl. hor.

Polyacantha, Cord. hist.

Myacanthos Theophrasti Dalechampion, Lugd.

Spinastella, & Spinastella alba, Tab.

Hippophæstum vel Hippophæas Dioscoridis, Colum.

Carduus muricatus, Clus. hist.

Variat florum colore, communiter subrubeus, aliquando albus: hinc duæ figuræ apud Taber. & Ger.

I V. Carduus stellatus luteus foliis cyani.

Spina citrina vel lutea, Gesl. hor.

Spina solstitialis, Eid. Dod. Ad. Lob. ico. Cam.

Leucacantha quorundam, Lugd.

Calcitreppola altera, Cæf.

Carduus solstitialis, Cam.

Spina solstitialis mitior Apula, sive Carduus stellatus minor, Col.

V. Carduus caule stellato Peruanus.

Carduus, Monardi.

Arundinacea pinnata & spinosa exotica planta, Ad. Lob. ico.

Palmacea seu arundinacea pinnata spinosa r. Lugd. desc. at ipsa figura sub titulo Nerei facie t. habetur.

Calamus Peruanus asteroides, Tab.

Calamus Peruanus spinosus, Ger.

Αὐστηρία Dioscoridi lib. 3. cap. 22. radice est

cyperi amara & calida: idem Plinius lib. 22. cap. 16. Apud Theophrastum 6. histor. 4. (spina candida Gazæ) spinosa est, sed non aculeatis foliis

constat. Alii ἀγρὸς βαλάντιον spinam regiæ Theophrasti volunt, de qua r. caus. 10. Spina regia aculeis constat, & radix in caput exerciscit, ceu nepa. Utriusque descriptio brevior, quam ut quid statui possit.

## EUPHORBIIUM &amp; ANTEUPHORBIIUM.

**E**ὐφορβιον αὐτὸν Dioscoride lib. 3. cap. 96. Juba in Libya regnante primo invenum est: & ut Plinius lib. 25. cap. 7. Invenit rex Juba quam appellavit Euphorbiam, medici sui nomine & fratris Muse, à quo Divus Augustus conservatus fuit. Dioscoridi Libya arbor est ferula speciem habens, qua in Atlante Mauritania monte nascitur, acerrimo liquore referta, quem propter eximium fervorem non citra metum incola colligunt: ventres ovillos lotos arbori circumligant & è longinquo caudicem contus vulnerant, unde statim copiosus liquor effluit. Plinius scribit foliis acanthinis spectari, & colligendi & adulterandi modum ex Dioscoride subjungit, qui herbam Euphorbiam, succum vero Euphorbium vocavit. Leo Africanus inter Africa plantas describit: herba, inquit, est ex toto aculeata, qua caput cardui syl. emulatur: inter ejus ramos ab radice exeunt fructus cubitales & ampliores, crassitudine citruli, virides, granulosis quibusdam tuberculis distincti ut Citrulus, veluti caudices viginti & triginta ex eodem cespice. Rustici hos gladiis pungunt cum ad maturitatem pervenerint: effluit autem humor lacti similis, qui paulo mox densatur, & tandem ficitur utrius collectus. Vide infra lib. 12. sect. 6.

Plantam ipsam primus Dodonæus expressit, qua Bruxellis Anno 1570. est nata: quam ex Anglia unâ cum Ant euphorbio, à Lobelio accepimus.

I. Euphorbium à Dodon. Lobel. Lugd. Lon. Tabernæm. Gerar. pingitur: de ipsius succo plures egere, ut Matthioli. Cord. Lac. Cæsalp. Lugd. & alii.

Euphorbia, Cord. hist.

II. Ant euphorbium, Dodon. Lob. Lugdun.

Cast. Tabern. Ger.

Sic dictum à contrariis Euphorbio facultatibus, hoc enim adversus Euphorbii acrimoniam, indigenis remedio esse fertur. Dodonæus hanc herbam ad Telephium referri posse censet.



Et cap. 16. in ramis spinas habet appositio foliorum rursus simili, toto caule foliatum in modum coronæ: Et L. 27. c. 4. Anonim quidam Ononida malunt vocare, ramosam, similem saxnugræo, nisi fruticostior hirsutiorq; esset, odore jucundo potius ver spinosa.

I. Anonis spinosa flore purpureo.

Restia bovis, Trag. Lon.

Ægypti Cratæva, Ang.

Anonis sive Ononis, Matth. Lac. Tab.

Anonis, Fuch. Dod. ut: Tur. Cast. spinosa, Eyst.

Ononis, Cord. in Diosc. (cui & Acutella,) Gesn. hort. Ad. Lob. Lugd. Thal. Cæs.

Anonis sive restia bovis, Ger.

Flore est communiter coloris dilutionis purpureæ, raro albidæ, quæ

Anonis flore albo, Tab. Ger. rarissime luteo.

II. Anonis spinosa lutea major.

Ononis montana lutea, Gesn. hor.

III. Anonis spinosa lutea minor.

Ononis lutea syl. minima, Col.

IV. Anonis spinis carens purpurea.

Ononis perpetua lævis, Gesn. hor.

Ononis non spinosa, Clus. pan. Eyst. purpuracea, Tab. Ger.

Anonis sive Ononis sine spinis, Cam.

Anonis mitior prima, Clus. hist.

Hæc & candidis floribus reperitur, quæ Ononis candidis floribus, Ad.

V. Anonis viscosa spinis carens lutea major. Natrix Plinii herbariorum, Ad. Lob.

Anonis mitis flore luteo, Clus. pan.

Ononis lutea montana, Cam. ep.

Anonis flore luteo, Eid. hor.

Anonis non spinosa lutea, Cast. Tab. Ger.

Ononis mitis luteo flore, Eyst.

VI. Anonis non spinosa flore luteo variegato.

Ononis lutea non spinosa: aliis Melilotus major, vel syl. pinguis, Lugd.

Ononis fl. luteo variegato, mitis, Eyst.

A priori differt floris colore, qui luteus, sed palidior est & lineis subrubris variegatus.

VII. Anonis viscosa spinis carens lutea minor, vel Anonis viscosa minor flore pendulo: in Prodromo describitur.

IX. Anonis non spinosa capreolis donata. Ononis Senentis, Spigelio. Sed quid?

# LIBER VNDECIMVS.

## SECTIO PRIMA.

CYTISUS; ANAGYRIS; LABURNUM; ACACIA;  
ASPALATHUS; SANTALUM; ARBOR BRASILIA; AGALLOCHUM;  
sive Xyloaloes; Genista-Spartium; Genista spinosa sive Scorpius;  
Genista non spinosa; Chamaegenista; Spartium; Co-  
lutea; Senna & Jovis barba.

## CYTISUS.

FRUTICES & Arbores proposituri, à Cytisò ordiri lubet, qui vno & Græci dicitur, Latine Cytisus, à Cytino insula in qua, Plinio l. 13. c. 24. auctore, inventus est, unde in omnes Cycladas, mox in urbes Græciæ magno casu proveniunt, translati: Est autem Dioscoridi l. 4. c. 113. Cytisus frutex totus albus, uti Rhamnus, ramos spargens cubitales. etiam majores, in quibus folia similia Fœnugraci aut Loto trifolia, sed minora & dorsum prominentiorem habentia. Theophrasto l. hist. 9. & 5. caus. 6. Cytisus medullam duram, spissam & nigram habet: & 4. hist. 5. fruticosa est veluti Hebenus. Plinio l. c. Cytisus frutex est canis aspectu, breviterq; si quis exprimere similitudinem velit, angustioris trifolii frutex. Columella l. 9. c. 4. Sativum est & sua spontis.

Cytisus incanus vel hirsutus.

I. Cytisus incanus, siliquis falcatis.

Cytisus Maranthæ, Matth. Lob. Lugd.

Cytisus ut existimatur, Dodon.

Cytisus, Cæf. Galeni, Cam.

Cytisus tertius cornutus, Tab. septimus cornutus, Ger.

Cytisus Galeni Maranthæ cornutus, Eystett.

Lignum Rhodium, five Cytisus verus, Hon. Belli epist. 4. ad Cluf. qui huius ut & sequentis ramum ad nos misit.

II. Cytisus incanus Creticus.

Barba Jovis altera, Ang.

Cytisus Creticus *αργυρόλευκος*, id est nobile lignum, Hon. Belli epist. 1. ad Cluf.

Ebenus Cretica, Eid. ep. 4. ad Cluf. & Ponæ.

III. Cytisus incanus folio oblongo Austriacus.

Cytisus 2. Cluf. pan. quintus, Eid. hist. Eystett.

Cytisus sextus, Tab. ico. alias undecimus.

Cytisus incanus, Ger.

Pseudocytisus 2. Dod. belg.

Huius altera species angustis foliis, iisque velut in aculeum desinentibus, quemadmodum in Italia reperitur, qui

Cytisus acuminatis foliis dici possit.

IV. Cytisus incanus siliqua longiore.

Cytisus, Ad. Lob. ico. Cæf.

Cytisus prior Penæ, Lugd.

Cytisus quartus, Tab. octavus, Ger.

Cytisi syl. species prima, Cæf.

In hortos translata canitiem amittit.

V. Cytisus albicans, folio trifolii vulgaris.

Cytisus albus sylvestris, Cord. in hist.

an Cytisus alpinus Dalechamp. Lugd.

VI. Cytisus foliis subruta lanugine hirsutus. an Cytisus, Tur.

Cytisus 4. Cluf. hisp. tertius, Eid. hist.

Cytisus quartus Hispanicus Clusii, Lob. Lugd.

Cytisus 12. Hispanicus 4. Tab. icon. alias decimus.

Pseudocytisus hirsutus, Ger.

an Cytisus syl. alter, Cæf.

VII. Cytisus hirsutus major foliis pinnatis.

Cytisi secundæ species altera, Cluf. pan. 5. species altera, Eid. hist.

Cytisus septimus, Tab. icon. alias duodecimus.

Cytisus pinnatus, Ger.

IX. Cytisus incanus folio medio longiore.

Cytisus 3. Cluf. hisp. sextus, Eid. hist.

Cytisus tertius Hispanicus Clusii, Lob. Lugd.

Cytisus undecimus Hispan. 3. Taber. icon. alias novus.

Cytisus sempervirens, Ger. ico.

IX. Cytisus hirsutus flore luteo purpurascete. Cytisus magnus flore luteo purpurascete, Ponæ Italic.

X. Cytisus supinus foliis incana lanugine inferne pubescentibus.

Cytisus tertius, Cluf. pan. septimus, Eid. hist.

Cytisus 8. Tab. ico. alias sextus.

Cytisus hirsutus, Ger.

an Cytisus supinus, Cam.

XI. Cytisus supinus foliis inferne & siliquis molli hirsutie pubescentibus.

Cytisi septimi species altera, Cluf. hist.

Cytisus septimus, Eystett.

XII. Cytisus minoribus foliis ramulis tendis villosis.

Cytisus primus, Cluf. hisp. & hist.

Cytisus Hispanicus primus, Lob. Lugd.

Pseudocytisus prior, Dod. Ger.

Cytisus novus: Hispanicus 1. Tab. icon. alias septimus.

XIII. Pseudocytisus flore leucis luteo.

Cytisi facie Alysson fruticans quorundam, Lob. Lugd.

Cytisus adulterinus, Tab. Ger.

*Cytisus glaber.*

I. Cytisus glabris foliis subrotundis, pediculis brevissimis.

an Cytisus primus, Ang.

Cytisus alter minor, Ad. Lob. ico. Lugd.

Cytisus quintus rotundifolius, Tab.

Cytisus, Ger.

Trifolium arborescens, Eystett.

II. Cytisus glaber viridis.

Cytisus secundus, Tab.

Cytisus siliquosus, Ger.

Trifolium fruticans Guilandinus nominatur.

III. Cytisus glaber nigricans.

Pseudocytisus five niger, Cord. hist.

Cytisus, Lac. Ger. & apud Cordum pingitur.

Cytisus Gesneri, Lugd.

Cytisus & Cytisus minor, Gesneri hort.

Cytisus primus, Cluf. pan. Tab.

Cytisus quartus, Cluf. hist.

Cytisus niger five major, Cam.

Pseudocytisus primus, Dod. Belg.

Cytisus 1. Tabernæ. spicatus, Eystett.

IV. Cytisus foliis incanis angustis quasi complicatis.

Cyt



Cytisus secundus, Clus. hisp. & hist.

Cytisus 2. Hispanicus, Lob. Lugd.

Pseudocytisus alter, Dod. Ger.

Cytisus decimus: Hispanicus 2. Tab. icon. alias octavus.

Hic circa Monspelium foliis est viridibus, in

Hispania prorsus incanis.

V. Cytisus foliolis glabris siliquis Ornithopodii hirtiutis, in Prodromo descriptus.

VI. Cytisii in Thraciæ & Macedoniæ pratis, quam neq; Gallia neq; Italia alacris solum verbis meminit Bellonius l. 1. obs. c. 56. 60. 63. Sed quid?

## ANAGYRIS & LABURNUM.

**A**ΝΑΓΥΡΙΣ five ἀνάγυρις alius ἀνάγυρις Dioscoridi l. 3. c. 167. fructus est arboris instar, foliis & virgii Viridici affinis, perquam gravis odoris: flore brassica simili: semen in longis corniculis renum figuræ, versicolore ac folido. quod urva maturescence durefcit: Et Plinio l. 27. c. 4. Anagyros, quam aliqui Acopon vocant, fruticosa est gravis odoris: flore oleis: semen in corniculis non brevibus gignit, simile renibus, quod durefcit per menses.

**LABURNUM** M. Plinio l. 1. c. 18. alpina arbor est, nec vulgo nota, dura ac candida materie, cujus flos cubitali longitudine: apes non attingunt.

I. Anagyris foetida.

Anagyris, Dod. utr. Ang. Cord. in Diosc. & hist.

Tur. Lon. Ad. Cæs. Lugd. qui & Polyteam Theophrast. suspicatur.

Anagyris prope Arelatum, Ges. hor. Lugd. Clus. histor.

Anagyris folio foetido, Ges. hor. foetida, Ger.

Anagyris foetida arborefcens, Lob.

Anagyris vera, Clus. hisp. Lugd.

Anagyris prima, Cam. Tab.

Semina superficie glabra quidem sunt, sed colore inter se diversa: quædam enim purpureo, quædam livente, quædam in cinereo pallido.

II. Anagyris foetida altera, rotundo folio.

Anagyris Cretica, à Clusii diversa, Hon. Belli. ep. 2. ad Clus.

Anagyris, Anagyros vulgo in Creta circa Idam montem, Bellon. obs.

III. Anagyris non foetida major, vel Alpina.

Anagyris prima & major, Matth. Cast.

Egano, forte Ebeni 2. species, Theoph. Ang.

Trifolia arbor, Cord. hist. Bellon. de cult.

Laburnum, Dod. gal. Bellon. de cult. Lugd. Cam. Cæs. alp.

Anagyris latifolia, Eyflett.

Trifolia quidem communiter est, attamen sæpe quatuor, etiam quinque folia uni pediculo adherent, ut ei qui antea non observant, diversa ab altera videatur.

In horto Lugduno Batavo habetur folio longiore angustiore, solidiore & atrovirente, quod Laburnum latifolium nominant.

IV. Anagyris non foetens minor.

Faba inversa, Trag. Lon.

Anagyris altera, Matth. Lac. Cam. Tab. minor, Cast.

Anagyris alia species, Ges. hor.

Egholo. Dodon.

Anagyris minus foetens, Ad. Lob.

Laburnum alterum, Lugd.

Anagyris foetens, Ger. ico.

Anagyris angustifolia, Eyflett.

## ACACIA.

**A**CCACIA, ἀκάκια Dioscoridi & Græcis, ab ἀκός, id est, acuo, unde Acacia quasi acuta: quam Theophrastus l. 4. hist. 3. ἀκρόν id est, spinam, five ἀκρόν ἀκρόν spinam Aegyptiam 9. hist. 1. esse volunt & Dioscoridi l. 1. c. 133. spina est arborefcens fruticosa in rectum non assurgens, florem habens album, fructum vero instar Lupini siliquis inclusum: ex hac succus exprimitur & gummi ex ea spina manat: de hoc succo Plinius l. 24. c. 12. Est, inquit, & Acacia spina succus: fit in Aegypto, alba nigraq; arbore &c. Et Theophr. spina ex eo nomen accepit, quod ut arbor aculeis horret excepto caudice: nam & super germina, foliaq; aculeos gerit, magnitudine excellit, materies quippe duodenorum cubitorum, tectis: donec caditur: ejus duo genera, quædam candida imbecillis facileq; putrefcens: quædam nigra, quæ robustior & incorrupta &c. fructus in siliqua modo leguminum: flos pulcher aspectu ut coronas ex eo facerent &c. Eadem serè Plinius l. 13. c. 9. nomine spina Aegyptiace. Et Diosc. duplex est: altera longè minor humilis ac tenerior, aculeis parvorum in modum obsita, folia tuta similia habens: semen in folliculis connexis, utrumque quaternisve capsebus, lenticula minus.

I. Acacia

I. *Acacia foliis Scorpioidis leguminosa*.  
*Acantha & Acantha Ægyptiaca*, Hippoc.  
*Acacia Ægyptia*, Dod. gal. Lugd. Cam. Alexandrina, Cam.  
*Acacia prima*, Ang. Lac.  
*Acanthus Theophrasti*, Ang.  
*Acacia*, Bellon. (quæ *Akakia* in offic. Constantinop.) Dod. Cam. ep. Alp. vera. Clus. ad Garz.  
*Spina Acacia*, Dioscoridis, Ad. Lob.  
*Acacia*, Arabibus Schamuth, Schack, Halepi, Rauwolf.  
*Acaciam* i. à Matthiolo & Lugdun. propositam,

quam *Acaciam* majorem *Durantes* vocat, *Arborem Judæ* cui aculei adpositi sunt, multi existimant.  
 II. *Acacia trifolia*.  
*Acacia altera*, Matth. Do. Lut. Lac. Bellon. Rauwolf. Lugd.  
*Acacia*, Lon. altera Dioscoridis, Ad. Lob. Tab.  
*Aspalathus*, Cæf. five *Acacia* 2. Matthioli, Gein. hort. Cam.  
*Aspalathus* 2. Dioscoridis, Guil. epist. & Hon. Belli ep. 1. ad Clus. (quo nomine & Græcis indigenis hodie donatur) Ponz. ital.  
*Acacia Dioscoridis*, Ger.

## ASPALATHUS.

**A**SPALATHUS, Ἀσπλάθος aliis *Erysisceptrum*, frutex est lignosus, spinis crebris aculeatus: duplex est, alter detracto cortice rubens aut purpurascens, alterum genus candidum est Dioscoridis l. i. c. 19. At Plinius non eadem omnino tradit l. 22. c. 24. in eodem tractu *Aspalathus*, inquit, nascitur spina candida, magnitudine arborum modica, flore rosea, radix unguentis expetitur: quidam *Erysisceptrum*, alii *Sceptrum* vocant &c. & l. 24. c. 13. Orientalem, alium à Rhodio facit.

I. *Aspalathus cortice cinereo, ligno purpureo*.  
*Aspalathi* prima species Dioscoridis, Ponz. ital. à quo portionem accepimus.

II. *Aspalathus colore buxi*.  
*Aspalathi* 1. genus, Ad. & Lugd.  
*Lignū Americanū buxei coloris*, Leriō def. Brasili-  
*an Lignum aureum & flavum* in Terzera insula,  
 Linscot. 3. part. Ind. Or. c. 6.

III. *Aspalathus albicans torulo citreo*.  
*Rhodium lignum*, quibuscum *Agallochum*, *Olea æthiopica* videtur, Cord. in Diosc.  
*Agallochum* fortè, id est, *Xyloaloe* solida, quibusdam lignum *rhodium*, *rhadisium* & *aspalathum*, aliis *Oleastrum lignum*, Cord. hist.  
*Aspalathi tertium genus*, Ad. & Lugd.  
*Aspalathus Rhodius*, Lob. ico.  
*Lignum rosei odoris* in Brasilia, Leriō desc. Bras. vel par. 3. Ind. Occid. c. 12.

IV. *Aspalathus rubeus*.  
*Rhodium lignū rubescens & purpurascens* Ruelii, Cord. in Diosc.  
*Aspalathi secundum genus*, Penz & Lugd.  
*Aspalathus roseus*, Ad. Lob. ico.  
*Lignum Americanū rubrum diversū à Brasiliensi generis*, è quibus claves suas barbari conficiunt, Leriō l. c.  
 an *Lignum Sanguinho dictum*, totum rubrum & cruentulum in Terzera insula, Linscot. l. c.  
 V. *Lignum Americanum album*.  
*Lignum album ut charta*, Leriō l. c.  
*Lignum cretæ candore nivium*, Linscot. l. c.  
 VI. *Lignum Americanum violaceum*, quæ ligna solius naturæ miraculo distincta, terra illa profert, Leriō l. c.  
 VII. *Lignum Feixo & varii generis ligna præstantissima*, insula Pico promittit, Linscot. l. c.

## SANTALUM.

**S**ANTALUM multi Santalum pro Aspalatho vero sumferunt: & aliqui Agallochum, lignum rhodium, crediderunt, utrumque subjugemus.

SANTALUM veteribus Græcis inditum videtur, & Sandal Avicenna, Serapioni & Mauritani: Indu verò Sarcanda, Garzia auctore, dicitur: quod foliis est Lentisci amulis, flore ex ceruleo nigricante, fructu cæcis magnitudine nigro, insipido: trium generum, rubrum album pallidum, quæ uno in loco non proveniant: eadem Asia & Lugdunensis historia habent. Santali cinerice quog; in regni Congiani descriptione mentio fit.

I. *Santalū albū*, Matth. Lac. Lon. Cord. hist. Cast. Garz. Lugd. Tab. Ger. Linscot. p. 4. Ind. or. 30.  
*Lignum odoratum candidum*, Cæf.

II. *Santalum pallidum*, Matth. Lac. Garz. Lugd.

*Santalum citrinū*, Cord. hist. Lon. Cast. Linscot. l. c.  
*Santalum flavum*, Tab. Cæf. cui flavum quod hodie habetur, candidi medulla est & citrinum Serapioni dicitur.

III. San-

## III. Santalum rubrum, Matth. Lac. Lon. Cast.

Garz. Lugd. Tab. Ger. Linc. cot. l. c.

Lotus veterum; Sandalus rubea officinarum, Cord.

Santalum rubrum, Cord. hist. (in Diosc.

Lignum odoratum rubrum, Cæf.

Santali rubri quod in officinis Lignum aquilinum

dicatur &amp; quo in regno Cögiano febres curantur,

Pigafetta in desc. regni Congiane c. 7. meminit.

IV. Santalum cinericum, quo Scabiem Gal-

lica sanant, tanti apud eos precii, ut vel parva ejus

particula servo robusto commutetur, idē proponit.

V. Pseudosantalum rubrum sive arbor Brasilia.

Arbor Brasilia Theveti, Lugd.

Bersilicum, Lon.

Persillum rubrum &amp; citrinum, Cord. hist.

Bresilienlis arbor in Guajana: par. 8. Ind. occid.

Brasilia arbor, barbaris Araboutau, quercum pro-

ceritate &amp; ramorum copia adæquat, foliis buxeis

persimilibus: fructum non ferens: harum quad-

dam, quam vix trium: altera, quam vix octo: &amp; al-

tera quam vix sedecim hominum ulnæ amplecte-

rentur. Leri. in desc. Brasil.

VI. Arbori Brasiliænæ affinis: in regno Gui-

næ, in insula Caisco, arbores sunt, quæ vel Bras-

ilienis rubedine superant, quarum lignum instar

politiissimi speculi nitet, tantæ duritiæ, ut vix in-

genti labore inflecti possit, ut habetur in 6. parte

Indiæ orientalis cap. 56.

an Lignum Brasilianum quod flammei coloris

est, &amp; tinetur adhibetur, Joseph. Acoftæ l. 4. c. 29. meminit.

## VII. Arbores pigmentiferæ.

Arborum peculiaria genera ex quibus rubrum,

nigrum, flavum &amp; purpureum colorem extrahit

in insula Madagascar sive Laurentii. par. 4. Ind. or.

## IX. Ligno Brasiliano simile.

Lignum Sapou lanis tingendis percommodum,

Linc. par. 2. Ind. or. c. 24.

## X. Pseudosantalum Creticum.

Α'ελιζα. Abelicea foliis Alaterni, fructu piperis,

ligno rubro, cujus pulvis Santalū imitatur, Hon.

Belli epist. 2. ad Cluf. Ponæ Ital.

## X. Pseudosantalum album.

Lignum Sambarane Santalo albo persimile, Garziq.

Sambarane, Acoftæ.

## XI. Lignum ex freto Magellanico medulla

flavescente.

Lignum exoticum alterum, Clus. exot. l. c. 7.

Fructum fere nigrum myrtillis similem.

## XII. Lignum Moluccenfe foliis malvæ, fru-

ctu avellanâ minore, cortice molliore &amp; nigrican-

te, Pavana incolis, Lugd.

Lignum Moluccenfe, Acoftæ.

Lignum Pavanum, Tab.

XIII. Ligna preciosissima ex Havana &amp; insu-

la Cuba in Hispaniâ vehuntur, cujus generis sunt

Ebanos, Caovana, Granadillos, Cedrus &amp; simi-

lia: Joseph. Acoftæ l. 4. c. 30.

## A G A L L O C H U M.

Α'γαλλοχοι veteribus, at recentioribus etiam Ξυλλοχοι: Agallochum &amp; Lignum aloës. Dioscoridi l. 1. c. 21.

lignum est quod ex India &amp; Arabia deportatur, Thyæ ligno simile, maculatum, odoratum, gustu adstringens,

cum quadam amaritudine, cute verius quam cortice vestitur, aliquantum versicolore. At Garzia arbor est

oleæ instar, interdum minor, quæ non nisi in India nascitur. Tarum Plinii l. 12. c. 20. aliqui existimant, quod Agal-

lochum syl. esse, Dalechampsium, notum in Plinio, suspicatur: sed brevior est Plinius quàm ut quid pronunciare li-

ceat. Agalagen &amp; Xyloaloes, Avicenna.

Hujus plura genera Serapiol. simp. c. 197. enumerat, Indum, Mondunū, Seificum, Alcumericum: &amp; Ruellius l. 1.

c. 36. quatuor Agallochi genera recenset. Ludo. Romano triplex genus ejus arboris: primū quod Calampart vocetur:

quo alia in insula Taprobana, quorum unum Lubam, alterū Bochor nominant, quæ duo genera ad nos convehantur.

## I. Agallochum præstantissimum.

Agallochum i. quod Calampart vocatur, &amp; so-

lūm inter Reges Indiæ distribuitur, Lud. Ro-

mano.

Lignum Calamba, quod syncerum cum auro ar-

gentōve persæpe deponderatur, Linc. par. 2. Ind.

or. c. 24.

Lignū Aloës Colāba dictū, Eid. p. 4. Ind. or. c. 32.

Lignum Calambes sive Aloës, par. 8. Ind. or.

## II. Agallochum officinarum.

Agallochum esse Lignū aloës multi credūt, Ang.

Aloë &amp; Aloa, Vartomano.

Agallochum, lignū aloës, vel paradyfi, vel S. Cru-

cis, Cornaro.

Agallochus five Xyloaloes, Cord. in Diosc. Ad.

Lob. Cast. Garz. Lugd.

Tarum, id est Xyloaloes fisisilis, levis &amp; aromati-

ca, Cord. hist. &amp; Tarum crispum, Eidem.

D D

Lignum

**Lignum aloë**, Lon. Frag. Tabern. Catalp. qui Tarum Aëtii facit: at Cornarus Xyloaloën Aëtii dicit.

**Lignum aloës** quod Palo d' Agula dicitur, Linse. par. 2. Ind. or. c. 24. five Palo d' Aguilla, Eid. par. 4. Ind. or. c. 32.

III. **Agallochum sylvestre**.  
**Lignum aloës** syl. Garziz, Frag.

**Xyloaloë** syl. Lugd.

**Aquilla brava** five sylvestre, Malaice Garro, Lintic. c.

Ex illo, sed ex hoc frequentius, sphærulæ precatoriarum odoris jucunditate & precii magnitudine commendabiles conficiuntur, fiunt etiam ex alio ligni genere, quod Agallochum æmulatur, sed in odorem est.

## GENISTASPARTIUM

I. **Genistaspartium spinosum majus** 1. flore luteo.

**Aspalathus alter primus**, Clus. hisp. & hist.

**Aspalathus**, Cast. primus Monspel. Lugd.

**Acacia altera**, Ang.

**Aspalathus secunda** Monspel. Lob.

**Genistaspartium spinosum majus**, Ad. Lob. icō.

**Scorpius primus**, Tab.

**Genista spinosa minor**, Ger.

II. **Genistaspartium spinosum majus** 2. flore pallido.

**Aspalathus alter secundus**, Clus. hisp. & hist.

III. **Genistaspartium spinosum majus** 3. hirsutum.

**Aspalathus alter tertius**, Clus. hisp. & hist.

IV. **Genistaspartium spinosum minus**.

**Scorpius** 2. Clus. hisp. & hist. Cast.

**Genistaspartium spinosum alterum**, Lob.

**Genista spinosa altera** icon, Dod.

**Aspalathus alter Hispanicus**, Lugd.

**Scorpius tertius**, Tab.

**Spina Christi**, Catalp.

**Genista spinosa major**, Ger.

V. **Genistaspartium spinosum foliis polygoni**.

**Alhagi Maurorum** in cujus fronde, præcipue apud Perias, Manna colligitur, Rauwolf.

**Planta spinosa Maurorum** Alhagi, Lugd. ap.

VI. **Genistaspartium spinosum foliis lentiscalæ floribus ex cæruleo purpurascens**.

**Spartum aphyllon** fruticosum junceis aculeis latis capitulis, Ad. Lob. Lugd.

**Erinacea**, Clus. hisp. & hist. Lugd. Belli.

**Genista rotunda** alterum genus, Cast.

**Scorpius quartus**, Taber.

**Spartum aculeatum aphyllon**, Eid.

**Genista spinosa humilis**, Ger.

VII. **Genistaspartium spinosum aphyllon alterum**, tribus aculeis semper junctis, floribus luteis.

**Achinopoda Cretensium**, Bellonio.

**Echinopoda Cretica**.

**Chenopoda Plinii** l. n. c. 8.

**Echinopoda Plutarchi & Athenæi**.

an idem sit cum quarta, dubitat Clusius.

Hon. Belli,

epist. 2. ad

Clus.

## GENISTA SPINOSA

five Scorpius.

**Scorpius**, Theophrasto 6. hist. 1. (Nepam Gaza vertit) spinosa planta, tota spinis constat ut Corruca: sic bæ adulta, nullo modo foliosa est, sed spinas tantum pro foliis habet: præterea radice singulari brevique, constat, ætate æstatem non germinat. germinationem in autumnum prorogat: floret etiam post æquinoctium Autumni: florem in carne exuberante, sub extrema aculei præfert.

I. **Genista spinosa major brevibus aculeis**.

**Scorpius** five Nepa, Anguil.

**Nepa Theophrasti**, Ad. Lobel. Tabern. Camer.

**Rauwolf**.

**Scorpius Theophrasti**, Lugdun.

**Genista aculeata minor**, five Nepa Theoph. Ger.

II. **Genista spinosa major longioribus aculeis**.

**Ulex Plinii** quibusdam l. 32. c. 4. qui nullas notas addidit.

**Genista spinosa**, Dod. ut.

**Scorpius primus**, Clus. hisp. & hist. Cast.

Scorpius

Scorpius alter, sive Genista spinosa, Lugd.

Scorpius secundus, Tab.

Genista spinosa flore albo, Ger.

Floribus est luteis, ac in regionibus calidioribus rufis colore, ut rubere videantur, nitent: & ratione loci variat magnitudine & aculeorum multitudine, paucitateve.

III. Genista spinosa minor Germanica.

Genistella, Trag. Fuch. Dod. ut: Lugd. Tab.

Genista vel Genistella spinosa, Gel. hor.

Genistella aculeata, Ad. Lob. Tab. spinosa, Cam.

## GENISTA NON SPINOSA.

I. Genista angulosa & scoparia.

Genista, Brunf. Trag. Fuch. Dodon. ut: Cord. in Dioscorid. Cam. ep. Tab. Gerard. vulgaris, Bellon. Clut. hist.

Genista angulosa, Cord. hist. def. (ubi male Chamæspartii icon additur) Lugd.

Genista minor seu non aculeata, Lon.

Genista scoparia vulgi, Lob. Eyfett.

Genista quadrato junco i. Cæf.

Spartium, Tur. Ad.

Flos communiter luteus, rarius albus, hinc duæ figuræ apud Taber.

Genista & Genista alba: & apud Gerardum.

Genista & Genista tenuifolia nomine: hujus flores nondum apertos, vicini nostri in Brissonia condunt & Capparum locoutuntur.

Radici quin etiam sæpe Orobanche adnascitur, & Rapum Genista vocant.

Genistellam Tab. pingit, quam Chamægenistam Anglicam Ger. nominat, quæ sola magnitudine à priore differre videtur.

Hujus generis exiguum in alpibus lato cespite, palmaribus juncis, mollibus, sine foliis crescere, Cæsalpinus scribit.

II. Genista tinctoria frutescens foliis incanis.

Genista tinctoria Hispanica, Clut. hisp. & hist.

Genista tinctoria altera icon. Dod.

Genistella tinctoria, Lob. Ger.

Genista tinctoria Clusii, Oricella Theveti, Lugd.

Genista tinctoria Hispanica, Tab.

Sub hac, quo tempore floret, hæmodori quod-

dam Genista minor vel aculeata, Lon.

Genista minor, vel Genistella, Cast.

Genista species spinis & aculeis horrens, Clut. hist.

Coroneolæ similis suffrutex, Cæf.

IV. Genista spinosa minor Hispanica villosissima.

Genistella Monspelica spinosa in Prodomo.

V. Genista minor aspalathioides, vel

Genista spinosa Anglica, in Prodomo descripta.

dam genus elegans, brachialis interdum longitudo, floribus magnis & luteis crescit, Clut. monente.

Meminit Dodonæus Genistæ hirsutæ Hispanicæ: quam tertiam facit, cujus Calphurnius meminit: hanc non novi.

III. Genista tinctoria Germanica.

Luteam herbam Plinii l. 33. c. 5. aliqui volunt.

Flos tinctorum, Brunf. tinctorius, Fuch. Lon. Cast.

Ferula, Trag.

Lyfimachia, Leoniceno.

Coroneola, Anguil. Cæsalp.

Genista humilis, Dod. gal. Gess. hor. Lugd. Thal.

Genista tinctoria, Dod. vulgaris, Clut. hist.

Genistella tinctoria vulgi, Ad. Lob.

Genistella tinctoria, Tab. Ger. Eyf.

Chamæleuce, Cord. hist. quoad iconem, nam Hederam terrestrem describit.

Variat foliis latioribus angustioribus, ramulis modo erectis modo procumbentibus: quin etiam magnitudine, quare

Florem tinctorium minorem Lonicerus addit.

IV. Genista ramosa foliis hyperici.

Genista minima, Lugd.

Hæc variat: eam non longè Friburgo, & ad Petram pertusam frutescentem, & Mompelii humilem collegimus.

V. Genista Arabica quæ à nostra diversa, plantities ad montem Sinai obftri sunt: quæ etiam in Arabia solitudinibus nascitur, Bellon. obi. sed quid?

## CHAMÆGENISTA.

I. Chamægenista foliis Genistæ vulgaris.

Chamægenista prima, Cl. hist. sive Pannonica, Ger.

Genistella pannonica, Tab.

II. Chamægenista sagittalis.

Chamæspartium, Trag. Lon. Lugd. Tab.

Genista angulosa, Cord. hist. quoad iconem.

DD 2

Geni-

Genista minima, Gef.hor.  
 Genistella graminea montana, Ad.  
 Genistella montana, Lob.  
 Chamægenista altera, Clus.pan.& hist.  
 Genista sagittalis pannonica, Cam.  
 Genistella lagopoides, Ger.  
 Variat magnitudine, hinc  
 Chamæspartium 1. & 2. Tab.  
 Genistella lagopoides major & minor, Ger.  
 III. Chamægenista caule foliato.  
 Genista humilis, Dod.pumila, Cam.

Chamægenista peregrina, Clus.hisp.& hist.Lugd.  
 Genistella pinnata altera Hispanica, Lob.  
 Genistella pinnata, Ger.  
 Chamæspartium tertium, Tab.  
 IV. Chamægenista folio articulo.  
 Chamæspartium Narbonense, Tab.  
 Genistella globulata, Ger.  
 V. Chamægenista Cretica, in Prodromo descripta.  
 VI. Chamægenista montana hispida.  
 Genistæ minoris species, Thalyo.

## S P A R T I U M.

**Σ** Πύρενος frutex est proferens virgas longas, sine foliis, firmas, fracta contumaces, quibus vites alligantur: fert lobos seu Phaseolum, in quibus semina parva lenticula similia, florem luteum instar Leucoi, Dioscor. l. 4. c. 158. quod nusquam in Europa gigni Guiland. scribit. Et Theophr. l. 1. hist. 8. ἀνόσμονος. Linogenistam Gaza vocat, cujus cortex multiplex tunicis cadit. At Plinio l. 24. c. 9. Genista est qui easdē vires, quas Dioscorides Spartio ascribit.

I. Spartium arborefcens seminibus lenti similibus.  
 Genista, Matth. Tur. Italica, Dod. Hispanica, Ger.  
 Genista major, Cast.  
 Spartium. Matth. Lon. Lugd. alterum, Lac.  
 Spartum, Fuch. Dod. gal. Tur.  
 Genista ομαρτί Græcis. Ang. Guiland. pap.  
 Genista juncea, Cord. hist. Gef. hor.  
 Spartus vel Spartium, Gef. hor.  
 Spartium Dioscoridis, Genista Plinii sive Hispanica, sive Africana, Clus. hist. Lugd.  
 Spartium Dioscorideum Narbonense & Hispanicum, Ad. Lob.  
 Genista altera junco rotundo, Cæf.  
 Genista transalpina, Cam.  
 Spartium Hispanicum, Eyst. 1. 2. & 3. Tab.  
 Pseudospartum Hispanicum, Ger.

II. Spartium alterum monospermon semine reni simili.  
 Spartum frutex majus, Dod.  
 Spartum primū, Clus. hisp. at in hist. Spartum 2. Hisp.  
 Spartium Hispanicum alterum flore luteo, Lob.

Spartium Hispanicum alterum, Lugd.  
 Spartium Hispanicum 4. Tab.  
 Pseudospartium Hispanicum δουνον, Ger.  
 III. Spartium tertium flore albo.  
 Spartum 1. Clus. hisp. at in hist. 3. Hispanicum.  
 Spartum frutex mimis, Dod.  
 Spartum 2. flore albo, Lob.  
 Spartium aliud Hispanicum Clusii, Lugd.  
 Spartium Hispanicum quintum, Tab.  
 Pseudospartum album δουνον, Ger.  
 IV. Spartum primo affinis.  
 Genistæ Hispanicæ affinis, in Prodromo.  
 V. Spartum triphyllon.  
 Genista Ilvensis, Lugd.  
 Genistæ rotundæ genus in Ilva, Cæf.  
 Calsia Latinorum, Guilandino.  
 an Spartum minimum montanum triphyllum, Colum.  
 VI. Spartum sterile.  
 Sparti genus, in Hispania & Africa, juncus propriè aridi soli, quod neq; folium, neq; florem, neq; semen fert, quod ad varia utuntur, Guiland. pap.

## C O L U T E A.

**Κ**ολούτια Colutea, Liparia peculiaris, inquit Theophrastus 3. hist. 17. arbor procera, fructum fert in filiqua, magnitudine lentis, folium mistis sanograce non absimile, &c.

I. Colutea vesicaria.  
 Colutea Theophrasti, Trag. (cui vulgo Sena)  
 Dod. gal. (cui & Cyrtus Latinorum) Gef. hort.  
 Lob. Clus. hist. Tab. Ger.  
 Colutea, Fuch. Matth. Lac. Lon. Dod. Ad. Cast.  
 Sene Mauritanorum, Ruellio.

Sena, Cord. hist.  
 Senna syl. quibusdam malè, Gef. hor.  
 Colutea, Senæ genus non est cum nullas facultates cum Senna communes habeat, Bellon.  
 Colutea vesicaria, Lugd. (cum duplici figura)  
 Cam. Eystett.

Emet

Emeri alterum genus, Cæſalp.

II. Colutea filiquoſa ſive ſcorpoides major.  
Colutea ſcorpoides, Ad. Lob. Lug. Cam. ep. Ger.  
Colutea ſcorpoides prima, Cluſ. pan. Tab.  
Colutea ſcorpoides prima elatior, Cluſ. hiſt.  
Emerus vulgo, Cæſalp.

III. Colutea filiquoſa minor.  
Colutea ſcorpoides humilior, Cluſ. pan. Ger.  
Colutea ſcorpoides 1. humilior, Cluſ. hiſt.  
Colutea ſcorpoides 2. Tab.

IV. Colutea filiquoſa minor coronata.

Colutea ſcorpoides altera, Cluſ. pan. & hiſt.

Colutea ſcorpoides tertia, Tab.

Colutea ſcorpoides montana, Ger.

V. Colutea ſcorpoides maritima glauco folio: in Prodromo deſcripta.

VI. Siliqua oblonga cinericea granis Coluteæ.

Fructus minor 12. Paludani, Cluſ. exot. lib. 2. cap. 20.

## S E N N A.

**S**ennam, quidam Dioſcoridis Delphinium, alii Pelecinum, alii Peplium, alii Empetron, alii Alypon: alii Theſphraſti Cercidem ſive Coluteam tertiam, alii Colyteam primam eſſe putant: at rem novam veteribus Græci & Latini Scriptoris indicant, & à Mauritani primò propoſitam à Serapione ſub Senæ, & Meſue, qui domeſticam & ſylveſtrem facit, ſub Senna, cenſemus: cujus, ex Græciſ ſolus Actuarius meminit.

I. Senna Alexandrina, ſive foliis acutis.  
Senna Alexandrina, Trag. Gefn. hor. Cam. epit. & hor.

Senna Orientalis, Ang. Bellon. Ad. Cæſ. Tab. Ger.  
Senna Ægyptia ſive Alexandrina & Syriaca, quæ præſtantiſſima, Lugd.

II. Senna Italica ſive foliis obtuſis.  
Senna, Hermolao.

Senna Italica, Trag. Tabern. Ad. Ger. Camer. ep. & hor.

Senna, Matth. Fuch. Dod. ut. Lac. Cord. hiſt. Lonie. Lob. Caſt. Lugd.

Senna altera, Anguil. forte Androface.

Senna altera media dicta, Bellon.

Senna communis & vilior, Gef. hor.

Senna noſtra, Cæſalp.

## BARBA JOVIS.

**P**linius lib. 16. cap. 18. inter arbores, inquit, odit aquas & qua Jovis Barba appellatur, in opere topiario conſiliu & in rotunditatem ſpiſſa, argenteo folio. Hujus Anguillata ſpecies duas facit, alteram de qua inter Cytiſos egimus: alteram de qua in præſens.

Barbæ Jovis prima ſpecies, Ang.  
Barba Jovis, Cæſalp. Cam.

Jovis barba, Lugd. Cluſ. hiſt.

## SECTIO SECUNDA.

**JASMINUM; SYRINGA; LENTISCUS; MOLLE;**  
**THURIFERA ARBOR; TEREBINTHUS; BALSAMUM; PISTAGIA;**

*Staphylo dendron; Glans Unguentaria; Ceratix ſive Siliqua; Caſſia nigra ſive Fiſtula; Tamarindus; Lobi & Fructus exotici.*

## J A S M I N U M.

**J**ASMINUM Arabes Zambach & Sambach Serapione auctore appellat, & Græcos imitari volentes. Jeſemin, à Jaſmine Græca voce. Jaſmine autem dicta ſuit. quaſi medicatus odor, aut immutata à literâ Joſine, quaſi viola odor. Genera tria Serapio tradit: unum cui ſlos albus, alterum cui luteus, tertium cui cæruleus: etiam rubro flore in Aſiaticis hortis reperiri, Cluſius reſert: Dalechampiſ puniceum addit.

I. Jaſminum vulgatiuſ flore albo.  
Gelieminiuſ vel jaſminuſ, Matth. Caſt. Cam.  
Jeſminuſ, Anguil.  
Jaſminuſ, Dod. ut. cui & Apiaria, Cord. in Dioſ.  
Jaſmine & Sambac, Gef. hor.

Gelieminiuſ vulgatiuſ, Ad. Lob. Cæſ. cui Smilax lævis Dioſcoridis.

Jaſminuſ albuſ, Lugd. Tab. Ger. fl. albo, Eyſt.

II. jaſminuſ humilis luteuſ.

Gelieminiuſ luteuſ, Ad.

DD 3

Jaſmi-

Jasminum luteum, Lob. in icon. Tab. Ger. fl. luteo, Eyst.

Gelseminum humiliter alterum flore luteo, Cæf.

III. Jasminum humiliter magno flore.

Gesmini 3. species, Ang.

Chamae gelseminum grandiflorum, Lob.

Gelseminum humiliter primum, Clus.

Jasminum puniceum, Dalech. Lugd.

Gelseminum Catalanicum, Cam. ep. (sive Hispanicum) Eyst.

Jasminum candiflorum, Tab. majus, Ger.

Flos candidus est averfa parte rubens.

IV. Jasminum cæreuleum, Serapioni.

Jasminum cæreuleum, Tab. Ger.

In hoc genere cæreuleum nondum vidimus: an Arabes Ligustrum Orientale, quod alias Syringa cæreulea dicitur intellexerint, Cæsalpinus dubitat: alii Clematidem cæreuleam esse volunt.

V. Jasminum luteum vulgo dictum, bacciferum. Polemoniū Monipeliensium, Gel. Ad. Lob. Lugd. Cam. Eyst.

Ruta capraria Gallorum Monspel. Gel.

Trifolium fruticans, Dod. Tab.

Ruta baccifera sive trifolia, Tab.

Jasmini species trifolia non videtur ad Polemonium accedere, Colum.

Folius ludit: nam licet communiter, præsertim si in hortis colatur, trifolius sit, attamen circa Mons-pelium aliquando unico folio reperitur.

VI. Jasminum millefolii folio.

Gelseminum alterum rubrum, Cæsalp.

Quamoclit, Cam.

Gelseminum Indianum pennatum flore sanguineo, Pona Ital.

Convolvulus pennatus exoticus, Col. (post.)

Quamoclit sive Jasminum Americanum, Clus. cur.

## SYRINGA.

*Syringa licet Africum vocabulum videatur, aliquibus tamen à virgarum rectarum longitudine & inferiori medulla fungosa copia dicitur: vel potius quod ramuli exempta medulla fistulosi sint.*

I. Syringa cæreulea.

Lilac, Matth. (qui glandem unguentariam existimat) Ad.

Lillach, Dod.

Cauda vulpina Turcarum, Bellon.

Syringa cæreulea Lusitanica, Lob. Eyst.

Syringa flore cæreuleo, Clus. hist. & hist. Lugdun.

Cam. Ger.

Syringa Lusitanica, Tab.

Ligustrum orientale, forte Jasminum cæreuleum Mauritanorum, Cæf.

Ostryam Theoph. 3. hist. 10. esse aliqui volūt, auctore Lugd. historiae monente: est Ostrys, inquit, quā nonnulli Ostryam vocāt, unica species Oxye (Plin. l. 3. c. 21. τρυμναία, id est fraxino, legit) tum latu, tum cortice similis: folio pyrorū, multo oblongiore, in acutum contractiore & majore, fibris multis & crassis, à medio dorsi in modum costarū recta secundū magnā fibrā porrectis, in fibris ipsis rugato & in ambitu leviter serrato, materie dura, decolore albida: fructu parvo, oblongo, hordeo simili, flavo: radices sublimis habet. Idē ferē Plini.

Varia floris colore, qui communiter cæreuleus: aliquando cinereus & quasi argenteus: hinc figuræ duæ apud Eyst. nomine

Syringa fl. lacteo & flore cæreuleo.

II. Syringa Arabica foliis mali arantii.

Sambac Arabum sive Gelseminum Arabicum, Alpini.

Jasminum Arabicum sive Syringa Arabica, Clus. cur. post.

III. Syringa alba sive Philadelphus Athenzi.

Syringa, Dod. Cæf. alba, Tab. Ger.

Syringa flore albo, Clus. hist. Lugd. (quā Ostryam Theoph. volunt, quod Clusius negat) odorato, Cam.

Syringa Italica, Lob. Eyst.

Frutex coronarius, Clus. hist.

Flore cōmuniter est simplicis, rarius pleno, quare

Syringa Italica fl. albo pleno, &

Syringa flore albo simplici, apud Eyst.

IV. Syringæ alba æthinis.

Fructus miscellaneus undecimus, Clus. exot. lib. 2. cap. 21.

## LENTISCUS & MOLLE.

*Lentiscus fortasse dicta, quod folia lentore quodam lentescant: & Dioscoridi l. 1. c. 89. quasi & 15. & fistulosi, quod facile & frequenter in dentiscalpia findatur: quod & Diosc. tempore saccharatum, qui arborem ut notum non describit, sed ejus resinam quam & & nominari ait: de qua inter Resinas. Hujus bacca Hippo. r. de nat. m. lib. 6. & 104 (non & 104) appellat.*

I. Len-



I. *Lentiscus vulgaris.*

*Lentiscus*, Math. Ang. Dod. ut. Bellon. Lac. Lon. Ad. Clus. Lob. Cat. Lugd. Cast. Rauwolf. *Lentisci* in Chio similes sunt iis quæ in Gallia Narbonensi & Italia nascuntur: solæ tamen quæ in Chio Mastichen præbent, Bellon. obs.

II. *Lentiscus Peruana.*

Molle, Clus. in Monardem, Lobel. & lib. de Bals. Cam. Ger. Colum. addens quod si in Creta nascetur, pro Tragio supponi posset.

Mollis, Cast. arbor, Tab.

Molle arbor, Lugd. & hist. Ind. occid. p. 9. l. 4. c. 30. quæ in Moxu vocatur arbor ex Peru, quod hinc primum alio translata sit.

Moly, molle & muelle, Frag.

Variat foliis, quæ in tenella dissecta: in adultâ nec incisa, nec crenata sunt, quemadmodum ramus adtekioris arboris in Matthiolo nostro, & Clus. cur. post. exhibetur. Uvæ quoddam genus producit, unde Indi vinum premunt, Ind. occid. l. c.

III. *Arbor exotica foliis alatis.*

In vrb. apud Amazones nascens, Clus. exot. lib. 4. cap. 14.

IV. *Arbor exotica Lentisci foliis.*

Moringa, Acoftæ, Cast. Lugd.

Fructus raphani crassitie, radix unicornis vices

supplet & ejus in Theriaca usus est.

V. *Arbor exotica spinosa foliis lentisci.*

Bonduch Indorum, Ponz. ital.

Fructus peregrinus, Clus. l. 2. ex. c. 30.

Lobus, Clus. exot. l. 3. c. 15.

Mates Indorum cinerice coloris, id est, Legumen Indicum, Eid. & Ponz.

Fructus peregrinus prior, Clus. exot. l. 2. c. 30. & in tab. 2. Lugd. Tab. Ger.

Hujus fructum Milii Indici primum, dein Bonduch nomine à Pona, Veronâ accepimus, qui Avellanæ magnitudine, durissimus, iplendens & cinerice coloris.

Ex Brasilia, Java, & Virginea etiam, Pisorum nudorum nomine multi adferuntur.

VI. *Lobus orbicularis fulcis spinosis tuberculis obtectis, binos phaeolos nigros continens.*

Fructus 4. qui Indis Samparantam, ex navigatione Batavi, Clus. exot. l. 2. c. 15.

Lobus echinatus Molucensis, Ponz. Ital.

an Samparanton radix valida & amara quæ in Sunda nascitur, in Ind. or. par. 4. c. 8. hujus arboris radix est?

VII. *Arbor Malabarensium fructu Lentisci.*

Pauate, Acoftæ, Lugd. Cast. ap.

Arbor erythelipes curans, Lulitanis.

## THURIFERA ARBOR.

*Thurifera arbor*, Græci *Ἰσχυρὸς* & *Ἰσχυρὸς*: quemadmodum lachryma *ἰσχυρὸς*, quæ Hippocrati *ἰσχυρὸς* dicitur: *ἰσχυρὸς* à *ἰσχυρὸς* stillo: licet Græci fabulentur a juvene Assyrio hujus nominis, quod Deos studiosissime coleret, ab invidiis occiso & in hunc fruticem converso dici: hinc Dios thure gratius nihil esse. *Arabibus*: de qua sic Theophrastus 9. hist. 4. arborem nonnunquam, quæ quini fere cubitis attollatur & ramosam ferunt, folio pyris sed multo minore, coloris herbacei ut Ruta, cortice levi Lauri modo: 4. hist. 6. in Arabia, Syria, India nascitur: 9. hist. 2. sub cane & ferventissimâ diebus incidi referunt: 9. hist. 3. & tam sponte quàm incisa hinc prætere posse. Idem 9. hist. 4. alii thuris arborem lentisco similem prodidere, & fructum quoque, lentisci foliis tributum: Idem folia Lauri & Lavæ tribuit. At Græci, arbor est humilis folia lentisco similia habens, & Arabiæ peculiaris: Theveto pinis resiniferis similis. Non solum ipsius lachryma in usu fuit, sed & cortex arboris apud Dios. l. 1. c. 82. & *ἰσχυρὸς*, manna thuris c. 83. & *ἰσχυρὸς* fuligo. c. 84. Vide inter Resinas.

Duplex est: alia montana, alia in planis nascens Garzia, Fragosa.

Arbor thurifera Theveto, Lugd.

Thuris limpidi folium, Ad. Lob. ico. Lugd. Tab.

pingunt: & Taber. arboris caudicem cum Stagonia thure adpingit.

## TEREBINTHUS.

*Terebinthus*, Græci *Τερβινθος* nominatur, quam Dioscorides l. 1. c. 91. velut arborem cognitam non descripsit. Theophrasto 3. hist. 15. alia mascula est, alia femina: & mascula quidem sine fructu: feminæ altera dum statim rubentem edit, lentis magnitudine, qui coqui nequit: altera viridem (Plinius pallidum c. 6. vertit) deinde rubentem & cum vite maturentem, tandem nigruum saba magnitudine, resinum, odore undorem, & c. flos oleæ similis, rubens: folia in uno pediculo multa, Laurinis similia, bina veluti Sorbo, in summis ramis u-

*ramifculorum partibus imparia, nisi quod minus angulosa quam Sorbo & ambitu laurinis similiora, pinguis com-  
toso fructu: feri & illa filliculos quosdam cavaos ut Vinus, in quibus animalcula culicibus familia nascuntur. Et  
4. hist. s. Terebinthi Indica meminit. Plinius l. c. sed brevius de ea egit. Resina terebinthina ex hac colligitur de  
quacap. de Resinis.*

### I. Terebinthus vulgaris.

Terebinthus foemina altera Theophrasti.

Terebinthus, Matth. Dod. ut: Cord. in Dioscor. &  
hist. Turn. Lac. Lonic. Clus. hist. & hist. Lob. Cast.  
Lugd. Tab. Ger.

Terebinthus minor in Lombardia & Hetruria,

Terebinthus lentiscifolia minor, Ad. (Ang.

Terebinthus vulgaris, Rauwolf.

### II. Terebinthus peregrina fructu majore Pistaciis simili eduli.

Terebinthus major cujus fructum Arabes Botn  
quibir appellant, Rauwolf.

Terebinthus nostras Juglades æquas, Bellon. cult.

Terebinthus major pistaciæ folio, Ad. Lob.

Terebinthus Indica major Theoph. ex Rauwolf.

Lugd. ap.

Terebinthus latifolia, Tab. Ger.

Terebinthi majus genus ad Terebinth. Indicam  
Theoph. & Fael Serap. Avicen. & Rhafis referri  
potest, Clus. hist.

Foliis oblongiusculis à Pistaciis, quæ rotundio-  
ra habet, & fructu sive nuce brevior & rotundio-  
re differt, quo inquilini, perinde ut nos Avellanis  
vescuntur.

Gallarum genus quoddam nucis ponticæ magni-  
tutine, Terebinthi arbores in Thracia & Mac-  
donia producunt, quarum apud Turcas usus est,  
tenuissimis sericeis pannis inficiendis, Bellon.  
obf.

### III. Terebinthus peregrina fructu minore & cæruleo, eduli.

Terebinthus Syriaca, Theoph.

Terebinthus in Cilicia & Syria, Bellon. obf.

Terebinthi peregrini alterum genus, Clus. notis  
Bellon.

Terebinthus minor, quia Arabibus Botn sougher  
dicitur, Rauwolf.

Terebinthus in Mesopotamia & Armenia, Eid.

Terebinthus minor, qui ad Bel Arabum referri  
potest, Clus. hist.

Et hujus fructus, qui cum suo cortice Pilo ma-  
jori æqualis est, perinde ut nos Pineos nucleos com-  
medunt: quo & Peria plus quam bis mille annis  
ante panis usum vitam sustentarunt, & etiam nunc  
totius Syriæ incolæ iis cum pane vescuntur: &  
propter colorem inter viridem & cæruleum me-  
dium, Arabes veteres, Granum viride, Bellonio  
attestante, appellarunt.

## B A L S A M U M.

**B**alsamum, *Βάλανον* Dioscoridi l. 1. c. 18. arbor Lycii seu pyracantha magnitudine conspicitur: folia habet  
Rutæ proxima, sed candidiora multo & perpetuo magis virentia, &c. qui & *ὀνιχιάδων* *Ευλαχία* *ἰσχυρὴ*  
& *ῥατὴν* sive succum, lignum & fructum commendat: & vim efficacissimam balsami liquori tribuit: proximam  
fructus, minimū vero ligno. Et Theophrasto 9. hist. 6. arboris magnitudo, quæ malo punicea magnæ rami multi, similes  
ruta simili, candidum tamen, perpetuo virens, fructus similis terebintho tam magnitudine, quam colore, valde odoratus  
et lacrymā ipsā odoratus, &c. Plinius l. 12. c. 25. quedam alia scribit, alia ex utroque mutuum videretur.

### I. Balsamum Syriacum rutæ folio.

Balsamum, Matth. Lac. Ad. Col. Cast. Cæf. Alpi-

no, Hon. Belli ep. 5. ad Clus. Liqueor ejus Opobal-

samum & Balsamæxon, de quo & Cord. hist.

Balsamum lentisci folio Ægyptiacum, Bellon.  
obf.

Carpobalsamum veterum flavum.

Carpobalsamum & Cassamum verum, Cord. in

Dioic. & hist. Cæf.

Lignum Xylobalsamum, Cæf. sunt aliquando fe-  
stucæ tenues, quæ cum Carpopalsamo adferuntur.

At Terebinthus geminus, omnibus partibus, li-  
quori, ligno & semini succedaneum esse potest.

Fontem esse in Sumatra insula, qui Balsami pe-  
tiosissimi oleo saturari, Linicor. par. 2. Ind. oc. 2.  
scribit.

### II. Carpopalsamum nigrum Alexandrinum an Semen Hyperico simile quod à Petra Palestine oppido etiam Dioscoridis tempore adferebatur.

Carpobalsamum non legitimum, Matth.

Carpobalsamum offic. Cord. in Diosc. (qui addit,

aliquando inter ea reperi adulterinis granis ma-  
jora, odoris & saporis suavisissimi) Tab.

Bali-

Balsami veri fructus, Alpino.

### III. Xylobalsamum officinarum.

Myrtum potius quam Balsamum refert, Matth. Alterius fruticis surculi, quamvis aliquando inter eos mirum in modum odoris & saporis gratia commendabiles reperiantur, Cord. in Diosc. & hist. Xylobalsamum vulgo nuncupatum, quod ex felici Arabia deferretur cum Ægyptio convenit, Bell. obs. Lignum Balsami ex Arabia felici, Linscot. par. 2. Ind. or. 7.

IV. Balsamum Indicum, ex arbore Punicâ malo majore Xylo dicta, foliis Urticæ. Balsamum Indicum novum, Matth. Balsamum ex nova Hispania, Lacun. Balsamum ex occidentali India, Monard. Lugd. & Ind. occid. p. 9. l. 4. c. 28.

Balsami genus novum, Cæf. Frag.

Hujus generis limpidum, quod pura est exstilians lacryma, opobalsamum vocant: aliud imperfectius, quod ex ligno, cortice & foliis expressum est, aut ignis vi pollicitur, quod Xylobalsamum appellatur, Ind. occid. l. c.

V. Balsamum fructu racemoso ex Hispaniola. Balsamum novum ex Hispaniola, Auctori hist. gener. Indiz, Lugd.

Ex planta sponte nascente arboris magnitudine foliis amplius (quale Lugd. hist. exhibet) lex digiti longis, quatuor cum dimidio latis, elicitur.

### VI. Balsamum Americanum.

Balsamum aliud ex Americæ continente, Lugd. Ex arbore vasta, ramosa fructu pisii magnitudine siliqua digitum longa inclusa, quæ pingitur nomine Fructus balsami Monardis, Lugd. Lobus oblongus aromaticus, Clus. exot. l. 3. c. 18. Balsami Peruviani fructus, Ponz. Clus. cur. post. Balsamum quod ex India occidentali adfertur primum in Hispaniola inventum: arbor unde elicitur Goaconaz ab indigenis vocatur, Ovied. hist. Ind. l. 10. c. 13.

Balsamum ex Nicaragua, Bézoni, Ind. occ. p. 5. c. 16. an Balsamum ex Gueana, Ind. occid. p. 8.

VII. Balsamum Tolutanum foliis Ceratiz similibus, quod candidum est.

Balsamum de Tolu, Monardi, ex insulis Tolu, Ind. occid. p. 9. l. 4. c. 28.

Balsamum Tolutanum ex arboribus pumilibus pinis similibus, Lugd. ap.

an Balsamum album Curcas vocatum, Ind. occid. p. 8.

IX. Frutex Indiz orientalis Lavendulæ folio. Arbor Lavendulæ folio, Clus. exot. l. 1. c. 5.

## P I S T A C I A

**P**istacia Dioscoridi lib. 1. cap. 17. in Syria gignuntur pineis nucibus similia Theoph. 4. hist. 5. scrunt & in India Terebinthum esse, arborem alteri terebintho similem, cujus folia, rami & reliqua omnia, terebintho similia, fructus autem diversus similibus enim amygdalis, non magnus sed aspectu similis & suavitate amygdalis præstantior.

I. Pistacia peregrina fructu racemoso, sive Terebinthus Indica, Theoph.

Pistacia, Matth. Ang. Tur. Lac. Cord. in Diosc. & hist. Lon. Dod. Lob. Cæf. Alp. Cast. Cam. Tab. Ger. Eyf.

Pistacium, Ges. hor.

Terebinthus Indica Theophrasti, Ad.

Pistachia, incolis Fislic, Rauwolf.

Pistaciarum arbor, Dod. gal. Lugd.

Fructus dicuntur pistacia: Nicandro pistacia: Posidonio, monente Athenæo, pistacia: Latinis Pistacia: officiis & barbaris Pistici.

II. Arbor exotica fructu racemoso, Charamais dicta.

Charamais & Ambela, Acoftæ, Lugd. Cast.

Duo genera, unum pyrifolio, alterum malo minore, fructu avellanæ acido.

### III. Pistacia sylvestris.

Staphylodendron Plinii, lib. & cap. 16. est & trans alpes arbor simillima aceri, alba materia, quæ vocatur Staphylodendron: fert siliquas & in iis nucleos sapore nucis avellanæ.

Nux vesicaria, Trag. Dod. Ger.

Staphylodendron, Matth. Bellon. Ad. Lob. Lugd. Cam. Tab. Plinii, Dod. gal. Gesner. hort. Eyf.

Arbor vitis & Lacryma Ioppi, Ang.

Pistaciorum species. Scalligero in Aristot.

Pistacia Germanica, Lon. sylvestris, Cast.

Coulcoul & Hebulben Turcarum, Matth. epist.

At Bellonio obs. Hebulben semina sunt in officinis Turcarum venalia, quæ nobis in usu non sunt: quemadmodum nec Nux quædam gemini pugni magnitudine, parvis granis esui aptis, avellanæ instar dulcibus, plena, quam Coulcoul, hoc est, nucem de Coulcoul nominant.

Ex fructu sphaerulæ precatoriz fiunt.

## GLANS UNGUENTARIA.

**G**lans unguentaria, βάλανος αμυγδαλίνα Dioscoridi l. 4. c. 154. fructus est arboris Myrica similis, magnitudine Nucis Avellanae, cujus interior pars expressa, veluti amygdala amara humorem emittit quo ad pretiosa unguenta pro oleo utuntur: at Theoph. 4. hist. l. 8. c. 20. simpliciter: Balano, inquit, a fructu nomen inditum: foliis ejus Myrtosimile est: sed oblongius fructus magnitudine & aspectu capparis fructui similis, cujus corticibus confusus unguentarii utuntur, &c. Hac unguentaria nomine à ceteris glandibus distinguitur, quod ea unguentarii plerumque utantur. Plinio l. 12. c. 21. Myrobalanus Troglodytis nascens unguento, ut ipso nomine apparet fructus magnitudine avellanae nucis, &c. Arabes Habel, Ben & Granum ben nominat: inter quos Mesues qui duplex facit, aliud Ben magnum ut Avellana, quod Monardes Avellanas purgatrices esse vult: aliud parvum Ciceris magnitudine: ex quo Monarde monente, Itali oleum de Ben conficiunt.

Glans unguentaria, Matth. Lac. Cord. in Diosc.  
Clus. in corol. Dodonzi, Lugd. Cæf.  
Granum ben, Lon.  
Balanus myrsefica, Pharagon incolis ad montem  
Sinai, Bellon.

Macalepalbum, Rauwolf.

Glans unguentaria cathartica filiquata, Ad Lob.  
ico.

Balanus myrsefica, Cord. hist. Tab. Ger. Pon.  
Ben parvum, Monardi.

## CERATIA sive SILIQUA.

**K**eratia, id est filiqua, à corniculorum similitudine, à Dioscoride l. 1. c. 158. qui eam non descripsit: à Galeo & Aegineta vero κεράτια quasi cornuta filiqua, hac arbor appellatur: à recentioribus Græci Xylotrac Arabibus Charnub: à Plinio l. 15. c. 24. Siliqua (quia semen fert in filiqua leguminum modo) de qua hæc: hanc præculat esse videntur & praduces Siliqua, nisi quod cortex in iis manditur: digitorum hominis longitudinis, præm falcatis pollicari latitudine, &c.

I. Siliqua edulis.

Siliqua, Matth. Ang. Tur. def. Cord. in Diosc. Gef.  
hor. Lac. Lon. Rauw. Cast. Cam. arbor, Cæs. cui &  
Ceronia Theophr.

Siliqua sive Ceratia, Bellon.

Siliqua dulcis Alpino.

Ceratonia, Dod. ut: Gef. hor. Lugd. Frag.

Cerata vel filiqua, Adv. Lob. Tab. Ger. Clus. hisp.  
filiqua, Eid. h. f.

Ceraunia filiqua Theoph. 4. hist. 1. & Plin. l. 13. c. 8.

Dalech. in Plinium: at hist. Lugd. auctor diversam  
facit.

Fructus uet. & filiqua, vulgo Carobe nomina-  
tur: cujus semē sex grana pendens, ponderi illi au-  
ri quod Karat dicitur, nomen dedit.

II. Siliqua purgatrix.

Caroba sive Siliqua ex Guinea purgatrix, Pon. (ital.

III. Siliqua sylvestris rotundifolia.

Arbor Jude, Bellon. (quæ Græcis vulgo Concou-  
chias) Gef. hor. Dod. Ad. Lob. Rauw. Lugd. Tab.  
Cam. Ger. Eyst.

Fabago sive Siliquastrum, Bellon. Gef. hor.

Ceratia agrestis, Eid.

Siliqua syl. Bellon. Clus. hisp. & hist. Cam. ep. &  
hor. Cæf. cui Cercis Theophr.

Siliquastrum & Siliqua syl. & fatua, & arbor amo-  
ris, Cast.

Quibusdam Cereis filiquata Theoph. 1. hist. 8.  
aliis Colytea tertia Theoph. 3. hist. 14. quibusdam  
Laburnum velejus species.

Acacia vera Matthioli quibusdam videtur, quam  
spinis horridam pingit, quas commentitias impo-  
nantur.

Flores eleganter purpurei, quandoque albi &  
cortice candicante.

IV. Siliqua syl. rotundifolia Indica.

Semen nummi instar rotundum planum denti  
magnitudine, crasisusculum, rufum, à Rev. D. Te-  
rentio ex India acceptum, cum hac inscriptione: Se-  
men numulariæ æst Arboris Judæ Indicæ, caput  
flos magnus elegans & odoratus est.

V. Siliqua syl. spinosa arbor Indica.

Coral arbor, ob flores colore Corallii emulos  
Clus. appen. hist. plant. & append. altera ad ap-  
pendicem primam.

an Acacia 1. Matthioli & Lugd.

an Acacia major, Cast.

VI. Siliqua syl. similis.

Acacalis, vel Syriacè Kismisen sive Sifime, Cam.  
Acacalis Keimeisen, Bellon.

an Acacia Dioscoridis, Rauwolf.

Semē hoc Cairine & Kismisen nomine à Doct.  
Paludano ex Syria reduce anno 1579. Patris  
cepimus: an Dioscoridis Acacalis à cum hæc no-

fra foliis rotundis enata sit. Dioscoridi verò l. i. c. 18. & ex eo Æginetæ *ἀγύρια*, fructus sit fruticis in Ægypto nascentis, myricæ fructui quadantenus

similis. Valer. Cordus in Diosc. nō cognosci scribit, nisi aliquis ex Myrobalanis Emblicis sive Bellicis hunc esse existimet.

### CASSIA NIGRA seu FISTULOSA.

**C**assia Fistula ab Arabibus inventa est, & à recentioribus Græcis, ut *Ασθια* *μύλαινα* nominatur. Eabam Indicam veterum, ut Aristoboli, Valerius Cordus credidit. Siliquam Ægyptiam Theophrasti i. hist. 18. nonnulli censent.

I. Cassia fistula Alexandrina.

Cassia solutiva sive Ægyptia siliqua, Matth.

Cassia fistula, Dod. gal. Lac. Cord. in Diosc. Gesn. hort. Cast. Alpino. Frag. Tab. Gerar. Pigafette des. regni Congiani & Ind. or. p. 1. & 4.

Cassia fistula laxativa, Lon.

Cassia solutiva, Bellon. Monard. Garzia, Linnæus. p. 4. Ind. or. fig. 17.

Cassia stercoraria, Guiland. pap.

Cassia nigra, Dod.

Siliqua Indica veterum, Cord. hist. Ind. Gesn. hort.

Canna fistula seu fistularis, Linnæus. p. 4. Ind. or. c. 37.

Cassiam quæ hujus arboris fructus est, Ægyptii Chaiar-xambar vocitant, Paludanus in Linnæo.

Siliqua aut Cassia purgatrix Arabum, Ad. Lob.

Siliqua sive Cassia cathartica, Lugd.

Cassia, siliqua Ægyptia Theoph. videtur, Cz. l.

Cassia Ægyptia sive purgans, Cam.

Canna fistula, Acoftæ.

Canna fistula sive Cassia: Joseph. Acoftæ, lib. 3. cap. 22. quæ in Hispaniola copiosissima: idem lib. 4. c. 29.

Eligenda fistula insignis, plena, gravis & recens, & quæ concussa, inclusis seminibus minimè contrepatur, splendens, foris ac etiam in pulpa pinguis: vulpam (quæ non ante usum extrahi debet) florem Cassiæ & Cassiam extractam vocant.

II. Cassia fistula Brasiliiana.

Cassia siliqua Brasiliiana purgatrix compressa, Lob. in pharm. Rondel.\*

Hæc ex Brasilia advehi cepit, cujus pulpæ unia una, plus quam uncie duæ alterius Ægyptiæ, purgat.

III. Siliqua Arabica, quæ Tamarindus.

Arabicam vocamus, eò quod ex Arabia in Indiâ hincque regiones deferatur: à quibus Tamarin-

dus nominata, quasi dicas Dactylos Indos, sive Palmulas Indicas: Tamar enim illis Dactylum significat: licet arbor Palmæ similis non sit, nec ex Palmarum generibus, nisi ad fructus effigiem, quæ dactylum live digitum inflexum refert, respererint. Sunt qui velint Plinium l. 12. c. 6. de hac intelligendum esse, cum inquit: est & alia similis huic (Palmæ scilicet) dulcior pomo, sed interaneorum valetudini infesta.

Tamarindi, dactyli Indici } Mesuæo, Lac. qui à Palmæ syl. Indicæ fructus }  
Palmulis Thebaicis non differe vult.

Tamarindus Serapioni, Cz. l.

Tamarindi, Matth. Bellon. Garz. Acoftæ, Frag. Lob. qui addit perperam Oxyphœnicum appellari, Lugd. qui in ap. & alteram figuram Acoftæ exhibet.

Thamarindus, id est Acacia Indica, Cord. hist.

Palmæ syl. fructus Oxyphœnica, Lon. Cast. cum ficta figura.

Thamarindi, Cam. ep.

Tamarindus Derelide appellata, Alpin.

Tamarinio, Puly & Ambisy Indis, Linnæo Ind. or. p. 4. c. 37.

Asia sive Tamarindus: par. 4. Ind. or. fig. 15.

Folliculi recētes, cum melle aut Saccharo in India condiuntur: ex substantia intindum (Caryl vocant) parant, cum cibis itendum.

I V. Tamarindis simile semen spadicum dentatum.

Fructus alicujus semen num. 20. à Gareto, Clusio exot. l. 2. c. 16.

V. Tamarindo similis frutex.

Queillos frutex folii Tamarindi, fructu ut fabæ Romanæ subduplo longiore, quo in cibis utuntur: par. 4. Ind. or. 8.

### DE LOBIS.

**E**t si Dioscorides Smilacis hortenensis fructum λέβια, quasi siliquulas dicas, vocarit, eamq, ob causam de Lobis post Phascolos dicendum videretur, tamen cum alii sint Lobi, qui arborum fructus sunt, de aliis verò non satis infert, placuit de omnibus hic agere, usq, dum certius quid cognoverimus.

I. Arbor siliquosa Juglandis folio Brasiliana, lobo longissimo Acaciae siliquae instar distincto. Lobus Brasilianus ingens. Clus. exot. l. 3. c. 1.

Lobus cineraceus binos pedes Romanos cum tridente longus, quatuor uncias latus: semina ex albo rufescentia pene orbicularia, nuci vomicae non admodum dissimilia.

II. Arbor siliquosa Brasiliana lobo latissimo. Lobus Brasilianus alter. Clus. exot. l. 3. c. 2.

Hic Lobus duplex est: major ex fusco cineraceus, octo uncias longus, quatuor cum semisse latus, semine quasi quadrangulo: alter minor, ex fusco rufescens, semine citrii mali semini non valde dissimili.

III. Arbor siliquosa ex Virgine lobo fusco scabro.

Lobus ex Wingandeaow. Clus. exot. l. 3. c. 3.

In hoc osicula verius, quam Phaseoli, nigra, dura, Avellanae magnitudine.

Hic duplex est: alius ex Virginea fuscus, quinque vel etiam sex uncias longus, duas vel duas cum semisse latus, unam crassus. Alius ex insula Hayti sive Itabellae vicina, spadicei coloris, septem uncias longus, tres cum semisse latus.

IV. Arbor siliquosa ex qua gummi Anime elicetur.

Lobo ex Wingandeaow similis. Clus. l. c.

an Guamae Ovidii horum duorum alteruter.

V. Arbor siliquosa lobo quadrangulo fusco.

Lobus peregrinus quadrangularis. Clus. ex lib. 3. cap. 5.

Lobus sulcis distinctus, septem uncias longus, binas latus.

VI. Arbor siliquosa Africana, foliis fere pyri semine fabaceo.

Phaseolus quintus peregrinus, sive Phaseolus Coles. Clus. exot. l. 3. c. 7.

Siliquae caedidae, phaseolis longiores & majores: semina albo putamine ablato minui colorem habent & siccata in binas partes sponte finduntur.

VII. Fructus oblongus cineraceus rugosus & gibbosus.

Fructus ex Bengala ad Coles accedens. Clus. exot. l. 2. c. 14.

IX. Fructus compressus quadrangulus venis candicantibus & nigricantibus, ut Coles fructus distinctus.

Fructus 6. Parduyni. Clus. exot. l. 2. c. 12.

IX. Lobus orbicularis fuscus spinosis tuberculis oblitus, binos phaseolos nigros continens.

X. Arbor siliquosa Guinenfis lobo spadiceo, fusco.

Lobus ex Guinea. Clus. exot. l. 3. c. 4.

Lobus decem uncias longus, tres latus, grana dura ex spadiceo fusca, medulla terri odoris.

XI. Arbor siliquosa Guinenfis, fructu fabaceo, lobo longissimo.

Lobus fabae arborecentis. Clus. exot. l. 3. c. 6.

Lobus nigricans & fuliginosus, uncias novendecim, vel viginti longus, tres latus, phaseolos septem binas uncias cum semisse longos, semunciam latus, planos, ex spadiceo nigricantes & splendetes continens.

an Arbor fabas majores proferens, par. 6. Ind. or. tab. 14. lit. H.

XII. Lobus cortice cartilagineo, rugoso, fusco duplici crista sinuosa donatus.

Lobus primus cartilagineus ex insula Mauritijs. Clus. exot. l. 3. c. 9. & 10.

Hic vel uncias quatuor cum semisse, vel tres longus, binas latus: ille tres, hic duos phaseolos orbiculatos ex puniceo nigros, veluti annulo cinis, eosque duos continet.

XIII. Fructus subrotundus durus elegantior rubens.

Fructus peregrinus 10. Mates nomine acceptus. Clus. exot. l. 2. c. 30. & tab. 3. Lugd.

XIV. Lobus cortice membranaceo, atrocinidido.

Lobus niger primus turgidus. Clus. ex l. 3. c. 18.

Hic uncias binas longus, unam latus, semina nigra, plana, Acaciae fructu similia continet.

XV. Lobus membranaceus atropurpureus, planus Guinenfis.

Lobus niger 2. planus. Clus. l. c.

XVI. Lobus quadrangularis. Clus. exot. lib. 3. cap. 17.

Hic ex fusco fuliginosus, grana quadrangula in binas partes dividua continet.

XVII. Lobus aromaticus subfuscus Terribilis corniculis similis.

Lobus oblongus aromaticus. Clus. exot. lib. 3. cap. 18.

Hic sex, septem, etiam octo uncias longus, semunciam latus, tenuem pollinem nigrum tenuem, Benzoini fere odore, continet.

## FRUCTUS EXOTICI.

**F**ructus exoticos plurimos Clusius proposuit, plurimos etiam à D. Jacobo Guiljelmo Hooft *Amstelredamo ante oëlennum accepimus: quos quantum licuit in aliquem ordinem digestimus, aliquos ad arbores quibus consimiles sunt, vel saltem fructu, retulimus: alios verò ratione forma distributos, hic recensemus.*

*Fructus rotundi & orbiculares.*

I. Fructus magnus ex rotunditate compressus, cortice rugoso fulco.

Fructus crassus peregrinus, Clus. ex. l. 2. c. 7.

II. Fructus rotundus cortice fungoso subpurpurecente.

Fructus 1. à Gareto, Clus. ex. l. 2. c. 16.

III. Fructus orbicularis spadiceus lævis.

Fructus miscellaneus 3. Clus. ex. l. 2. c. 25.

IV. Fructus orbicularis fuscus, nucleo cinereo.

Fructus miscellaneus 4. Clus. ex. l. 2. c. 25.

V. Fructus orbicularis flavus maculâ subfusca notatus.

Fructus peregrinus 6. Clus. ex. l. 2. c. 29. Lug. Tab. Gerard.

VI. Fructus orbicularis spadiceus nucleo duro.

Fructus exoticus 4. Clus. ex. l. 2. c. 19.

VII. Fructus orbicularis ex ruffo nigricans.

Fructus peregrinus 3. Clus. ex. l. 2. c. 30. & in tab. altera. Lugd. Tab. Ger.

IX. Fructus orbicularis fuliginosus.

Fructus 15. à Gareto, Clus. ex. l. 2. c. 16.

IX. Fructus orbicularis ater & acidus.

Fructus peregrinus acidi saporis, Clus. ex. l. 2. c. 13.

X. Fructus orbicularis cinericeus ut Chamæriphe nucleus.

Fructus 12. navigat. Botan. Clus. ex. l. 2. c. 15.

XI. Fructus orbicularis Arantii forma cinereus.

Fructus minor 7. Paludani, Clus. ex. l. 2. c. 20.

XII. Fructus rotundus parvus putamine spadiceo flavescente, nucleo subacido.

Fructus 7. à Gareto, Clus. ex. l. 2. c. 16.

XIII. Fructus orbicularis compressus cinereus.

Fructus minor 1. Paludani, Clus. ex. l. 2. c. 20.

*Fructus orbiculares sulcis nervisque distincti.*

I. Fructus orbicularis major fuscus striatus.

Fructus orbicularis peregrinus 1. Clus. ex. l. 2. c. 9.

II. Fructus orbicularis minor cineraceus striatus.

Fructus orbicularis peregrinus 2. Clus. ex. l. 2. c. 9.

III. Fructus orbicularis subniger & splensens sulcis distinctus.

Fructus 1. è Walachria, Clus. ex. l. 2. c. 22.

IV. Fructus alter splensens quatuor sulcis distinctus.

Fructus 9. à Gareto, Clus. ex. l. 2. c. 16.

V. Fructus orbicularis in summo lineâ trigonâ distinctus.

Fructus 10. à Gareto, Clus. ex. l. 2. c. 16.

VI. Fructus orbicularis Arantium siccum referens, quatuor venis distinctus.

Fructus 2. Jacobi Plateau, Clus. ex. l. 2. c. 19.

VII. Fructus orbicularis fuscus senis nervis distinctus ex Guinea.

Fructus orbicularis peregrinus 3. Clus. ex. l. 2. c. 10.

IX. Fructus orbicularis spadiceus novem venis distinctus major.

Fructus peregrinus orbicularis nervis distinctus 1. Clus. ex. l. 2. c. 10.

IX. Fructus orbicularis minor novem venis, ut & semen, distinctus.

Fructus peregrinus orbicularis nervis distinctus 2. Clus. ex. l. 2. c. 10.

*Fructus figura oblonga ovali.*

I. Fructus ovi anierini magnitudine fusco cinereus.

Fructus peregrini pulpa, Clus. ex. l. 2. c. 13.

II. Fructus ovi anierini forma.

Fructus orbicularis peregrinus 3. Clus. ex. l. 3. c. 9.

III. Fructus ovalis fuscus nucleo avellanæ similis.

Fructus 2. à Gareto, Clus. ex. l. 2. c. 16. (mili.)

IV. Fructus ovalis putamine crasso fibroso.

Fructus 3. à Gareto, Clus. l. c.

V. Fructus ovalis fuscus.

Fructus miscellaneus 1. Clus. ex. l. 2. c. 25.

VI. Fructus ovalis lapidi Judaico similis ex ruffo nigricans.

Fructus peregrinus alter, Clus. ex. l. 2. c. 3. & in tab. 2. Lugd. Tab. Ger.

VII. Fructus olivæ ossiculum referens.

Fructus minor 5. Paludani, Clus. ex. l. 2. c. 20.

IX. Fructus ovalis spadiceus.

Nux peregrina 2. Clus. ex. l. 2. c. 13.

IX. Fructus oblongus fuscus striatus.

EE 3

Fructus

Fructus exoticus 3. Clus. ex. l. 2. c. 24.

X. Fructus oblongus arcuatus fuscus.

Fructus 1. è navigat. Batav. Clus. ex. l. 2. c. 15.

XI. Fructus oblongus fuscus splendens.

Fructus 1. Simonis Tovar Coxco cypote, id est nux five oſiculum Cypote, Clus. ex. l. 2. c. 18.

XII. Fructus oblongus cineraceus nervis cras-

Fructus 3. Parduyni, Clus. ex. l. 2. c. 22. (ſis.)

XIII. Fructus oblongus cineraceus acidulus.

Fructus 12. & Oregioella, ex quo Cacao potionem conficiunt, Clus. ex. l. 2. c. 16.

XIV. Fructus oblongus cortice flavo ſpádiceo.

Fructus 13. à Gareto, Clus. ex. l. 2. c. 16.

XV. Fructus oblongus lobum referens niger.

Fructus 13. Gareti, Clus. Lc.

*Fructus pyriformes.*

I. Fructus pyriformis major rugoſus niger, binis cellulis diſtinctus.

Fructus exoticus 1. Clus. ex. l. 2. c. 24.

II. Fructus pyriformis minor ſpádiceo cinereus.

Fructus exoticus 2. Clus. ex. l. 2. c. 24.

*Fructus orbiculares & rotundi: & ovales  
tuberculis obſiti.*

I. Fructus orbicularis fuscus tuberculis obſit<sup>9</sup>.

Fructus 2. Parduyni è Guinea, Clus. ex. l. 2. c. 22.

II. Fructus orbicularis cineraceus tribus foraminibus donatus.

Fructus 8. à Gareto, Clus. ex. l. 2. c. 16.

III. Fructus rotundus flavus tuberculis obſitus, linea eminentiore tranſverſa.

Fructus peregrinus 4. Clus. ex. l. 2. c. 30. & tab. alt. Lugd. Tab. Ger.

IV. Fructus rotundus flavus tuberculis obſitus. Fructus peregrinus 5. Clus. ex. l. 2. cap. 30. & tab. alt. Lugd. Tab. Ger.

V. Fructus ovalis ex fuſco ſubrubens tuberculis mucronatis obſitus.

Fructus 5. è navigat. Batav. Clus. ex. l. 2. c. 15.

VI. Fructus olivæ oſiculum referens tuberculis obſitus.

Fructus minor 6. Paludani, Clus. ex. l. 2. c. 20.

VII. Fructus oblongus cineraceus durus tuberculis exasperatus.

Fructus 1. Plateau, Clus. ex. l. 2. c. 19.

III. Fructus cordis formam referens, fuſcus tuberculis inæqualis.

Fructus minor 2. Paludani, Clus. ex. l. 2. c. 20.

IX. Fructus ſubrotundus rugoſus, ater.

Nux peregrina 1. Clus. ex. l. 2. c. 13.

X. Fructus Frago ſimilis.

Garnire fructus parvus & ſubtilis fragi ſimilitudine, qui globulorum vicem ſupplet, Linſcop. p. 3. Ind. ord. 21.

*Fructus angulis donati.*

I. Fructus orbicularis fuſcus triſidus granis reſertus.

Fructus miſcellaneus 5. Clus. ex. l. 2. c. 25.

II. Fructus rotundus inæqualis cineraceus ſaxe<sup>9</sup>.

Fructus 6. Camiri Indis, ex navig. Batav. Clus. ex. l. 2. c. 29. (cuj.)

Fructus peregrinus 2. Eid. l. 2. c. 29. Nucleus eſt magnitudine, putamine ſaxeæ duritie, nucleo albo amygdalino.

III. Fructus Braſilianus inæqualis ſemine fuſco ſervido.

Fructus 1. à Gareto Aratucō dictus, Clus. ex. l. 2. c. 27.

IV. Fructus anguloſus cineraceus cortice fibro-

Fructus miſcellaneus 2. Clus. ex. l. 2. c. 25. (ſo.)

V. Fructus in gibbum extuberans cortice reticulato villoſo.

Fructus peregrinus reticulato corio ex Guinea, Clus. ex. l. 2. c. 11.

VI. Fructus niger in duas partes ſeparabilis aciduſculus.

Fructus 10. à Gareto, Clus. ex. l. 2. c. 16.

VII. Fructus avellanae magnitudine putamine velut in duas partes diviſo.

Fructus peregrinus 4. Clus. ex. l. 2. c. 29. Lugdun. Tab. Ger.

\* IIX. Fructus ſubrotundus cineraceus duplici angulo.

Fructus 9. è navig. Batav. Clus. ex. l. 2. c. 15.

IX. Fructus triangularis fuſcus.

Fructus minor 4. Paludani, Clus. ex. l. 2. c. 20.

X. Fructus pentagonus tuberculis inanibus obſitus.

Fructus minor 9. Paludani, Clus. ex. l. 2. c. 20.

XI. Fructus oblongus pentagonus fuſcus.

Fructus 2. è navigat. Batav. Clus. ex. l. 2. c. 15.

XII. Fructus criſtatus ſpádicei coloris.

Fructus 11. è navig. Batav. Clus. ex. l. 2. c. 15.

*Fructus diverſarum figurarum.*

I. Fructus in orbem convolutus fuſcus.

Fructus minor 11. Paludani, Clus. ex. l. 2. c. 20.

II. Fructus eſt quatuor membranaceis foliis compoſitus nucleo orbiculari.

Fructus 17. navigat. Batav. Clus. ex. l. 2. c. 15.

III. Fructus è multis fibris cõtexus ſpádiceus.

Fructus miſcellaneus 6. Clus. ex. l. 2. c. 25.

IV. Fructus metæ figurâ referens cineraceus.

Fructus



Fructus minor 3. Paludani ad quem pro Balsami Peruan fructu missus, Clus. ex. l. 2. c. 20.

V. Fructus juli figuram quasi exprimens cineraceus, grana spadicea continens.

Fructus miscellaneus 8. Clus. ex. l. 2. c. 25.

VI. Fructus Brasilian. ex fusco cinereus acidus.

Fructus 2. Gareti, Clus. ex. l. 2. c. 17.

VII. Fructus Quittenfis.

Fructus ad Dyicenteriam, Monardi, Lugd.

#### Fructus varii.

I. Fructus in Bali iniula, sub terra Juglandis magnitudine sed durior & oleaginosior, quo ad cibos cōdiendos utuntur: Linc. p. 3. Ind. or. c. 39.

II. Fructus purpureus allii sapore: par. 6. Ind. or. c. 54.

III. Cautior fructus frequenter cibis adhiberi solitus, uberrimè in Guinea provenit: par. 4. Ind. or. 8.

IV. Gato Gambar, fructus osivis aut Areca similis in Cambaja, qui dentium dolori medetur. par. 4. Ind. or. 8.

V. Jalave Malays, arboris fructus glandis magnitudine, quem infirmi potiunculis nūscunt: l. c.

VI. Javanos fructus in Bantan: par. 3. Ind. or. 35.

VII. Indiamas fructus in Guinea: par. 6. Ind. or. 19.

IX. Lucumas fructus in India, quem nihil aliud quam lignum esse dissimulatum ajunt: Joseph. Acofta l. 4. c. 26.

IX. Madian, Main, Corassani, ex civitate Dachen importantur, ad acuendam gulam & ebrietatem facilius ciendam: par. 4. Ind. or. 8.

X. Tianco, fructus copiosè in Malacca, quem tufum cum liquore bibunt, quoties malè habent: l. c.

## SECTIO TERTIA.

### AROMATA.

**NUX MYRISTICA; MACIS & MACER; CASSIA sive CANELLA; CINAMOMUM; TAMALABATRUM sive FOLIUM; BETHRE sive Tembul; Caryophylli Aromatici; Piper; Cubeba; Fagara; Mungo; Amomum & Amomis; Grana Paradisi & Cardamomum.**

### NUX MOSCHATA.

**N**ux Moschata, qua veteribus Græcis cum sua Macis incognita fuit, at recentioribus *mozgogvor*, vel *apopuanax* dicitur: forte Nux Indica, in sustinamento moscato Actia.

I. Nux moschata fructu rotundo. Chrytobalanos Galeni quibudam. Comacum Theophrasti & Cinnamum Caryopon Plinii, Guilandino.

Nux Bandensis, lausibant Arab. Avicennæ.

Nux myristica, Matth. Cast. Lugd. qui & Acoftæ figuram in appen. habet, Clus. ex.

Nux muscata, Lac. Lon. Ad. Lob. ico. Frag.

Nux moschata, Cord. hist. Lob. (cui & odorata & aromatica) Cæf. Tab. Acoftæ.

Nux aromatites, quæ incolis Palla & lapatri, Garza. Lincot. Ind. orient. p. 4. c. 22.

Arbor in Insula Banda quæ nucè & macim profert, Pyri magnitudine, tollis laurinis, latoribus brevioribus: fructus cortice densò, ut in nostris Nucibus tegitur, cui alter tenuior reticulatus, rubescens subest, qui Macis dicitur. Fructus cum utroq; cortice muria conditus adfertur: quem & Saccharo condiunt & externum corticem in ca-

pitis affectibus cōmendant. In Iava majore, ex nucibus Contervas & Confectiones, & tam ex nucibus quam folijs, oleum conficiunt.

Siciliam in planis, quæ ad nos adfertur, aliam in montanis provenire scribitur, à cujus fructu, cum vix maturelcat, saltem Macis adimitur.

II. Nux moschata fructu rotundo parvo. Nux moschata humilis & fructu pusillo in Moluccis, Acoftæ.

Nux aromatis in fructifera in Moluccis & Zeilan, Garzizæ.

III. Nux moschata fructu oblongo. Nux moschata mascula vel major, Cord. hist.

Nux moschata mas oblongior, Lob.

Nux myristica mas, Clus. exor.

IV. Macis Officinaria.

Macis dicitur cortex alter tenuis rubescens, à Maceris Græcorum similitudine, quia aëri expositus paulatim flaveit.

Macer,

Macer, officinarum Macis, Cord. in Diosc.  
 Macis, veterum Macer seu medius Nucis mosch.  
 cortex, Cord. hist.  
 Macis, Ad. Garziaz, Acoftæ, Frag.  
 Macer, Tab. qui cum fructu pingit.  
 Bunapalla & Iaifol incolis, Garziaz, Linscot. Ind.

orient. par. 4. c. 22.  
 Macis Javanentibus Massa & Foelien, Linsc. Ind.  
 orient. p. 2. c. 22.  
 Beshale Arab. Avicennæ cui odoratz nucis in  
 volucrum est.  
 Nucum myristicarum flos, 4. par. Ind. or. c. 21.

## M A C E R V E T E R U M.

**M**acer Veterum, cortex est arboris sui nominis, res à Maci recentiorum planè diversa: de quo sic Dioscorides l. 1. c. 110. μακρὸς, cortex est Barbaria advehi solitus, subtilis, crassus & gustu perquam astringens: & Plinius l. 12. c. 8. Macir ex India (Galenum secutus) advehitur, cortex rubens radice magna, nomine arboris sue. Arbor ulmo multò major in India Orientali, præsertim in Provincia Malabar, Acoftæ.

Macer & Macir, Talisafar radice cortex, Avic.  
 Macer, arbor dysenterizæ, à radice corticis usu &  
 arbor sancta, Acoftæ, Lugd. in ap.  
 Cortex Xylocassiaz facie, Ad. Lob. ico.  
 Macer veterum, Clus. exot. l. 4. c. 4.  
 Macer Græcorum verù, ignotum putat Garziaz.  
 Macer veterum, Macir officinarum censent, Cord.  
 in Diosc. & hist.

Macer veterum est aliter cortex crassior nucis moschataz, Cæs. salp.  
 An idem.  
 Cortex ad alvi profluvia in novo orbe, Monard.  
 Arbor contra fluxum, Cast.  
 Cortex ad dysenteriam, Lugd.  
 Anonymos arbor in novo orbe foliis cordis figura, Frag.

## CASSIA sive CANELLA & CINAMOMUM.

**K**assia sive xcia, κασία τὸ ξέρον, quasi κασιόω, διὰ τὴν διοσκόριον τὴν αἰδιόω. Kassia Dioscorides l. 1. c. 12. complura sunt genera, quæ circa aromatisferam Arabiam gignitur: habet autem samentum crassius, folia vero piperis: primum locum habet xcia rosarum odorem spirans: 2. xcia indigenis, mercatoribus Alexandrinis daphnitis, odore vinoso: 3. μουσκέτης βλαστὶς, mosfleticus germen: relique viles habentur, ut quæ ἀποψύμα, nigra injucunda: & ea quæ ματὶ & δίωρα vocatur: est & quadam ἀδωροσμία illi similitima, quæ nez, acris, nez, aromatica, & corticem medulla coherentem habet, &c.

Kivavapiov plura genera Diosc. l. 1. c. 13. regionum in quibus nascuntur nominibus designata: excellit quod πολὺον dicunt, quod similitudinem aliquam habet cum Mosylitide cassia, & quæ recens colore nigrum ex vinoso cinereum vergens, nodosum, colore rubeo, aut cardamomo proximum est, hujus genera quing, recenset.

Fabulosa varia & incerta, de Cassia & Cinamomo à veteribus Græcis & Latinis, ob longas & difficiles navigationes scripta sunt. Hinc Dioscorides scribit Cassiam, esse virgulta crassi corticis, piperis solius: Cinamomi vero descriptionem prorsus omittit. At Theoph. Cassiam & Cinamomum, magnitudine Veticis, multos ramos lignosos habere. Plinius l. 12. c. 19. Cinamomum dixit fruticem esse duorum cubitorum altitudine amplissimum, palmi minimum: Cassiam fruticem esse trium cubitorum: amplitudine. Galenus 1. Antid. arcam Romam delatam Barbarorum regione tradit, longitudine cubitorum quatuor cum dimidio: & licet Cassiam & Cinamomum diversa arbores esse statuatur, scribit tamen Cassiam sepe in Cinamomum transmutari: sic Cinamomi sarculos, Cassia per similes. Genera Cassie, eadem Galenus quæ Dioscorides recenset: item Cinamomi sex à Dioscoride etiam declarata. Theophrasto 6. hist. 2. & Plinio, Cassie duo duntaxat genera sunt, candidum & nigrum. Recentiores quodammodo valens, Cinamomum officinarum vulgo Canella dictum, legitimam antiquorum Cassiam dicunt: cuius generis à Dioscoride & Galeno tradita, apud Mercatores qui magnam copiam habent, inter nosci possunt. Et in compositionibus Græcorum Xylocassiam, id est Cassiam ligneam sive Cassiam odoratam posulantibus, Canella noster adhibenda: in Mauritanorum enim medicamentis, Cassia fistula purgatrix intelligenda.

I. Cinamomum sive Canella Zeilanica.  
 Cassia, Cinamomum & Canella orientalis, Monard.  
 Cinamomum, id est lignum odoratum quasi Amomum ex Sina, Canella & Cassia idem sunt, Garz.

Darfini Avicennæ & Arabibus, quod Persus Lignum Sinense sonat.  
 Canella legitima, Matth. Lugd. Acoftæ.  
 Cassia, Ang. Lob.

Cinam

Cinamomum, Lac. (the.  
Cinamomū & Calsia unius plantæ cortices, Guil.  
Cinamomum & Calsia Græcorum, Ad.  
Cinamomum Seylenſe, Linſcotto Ind.orient. par.  
2.c.16. & par.4.c.19.

Arbor in Zeilan frequens oleæ magnitudine, foliis forma ad Citri folia accedentibus, fructu rotundo exiguis olivis simili. Canella est secundus & interior arboris cortex, in tubulos convolutus, qui singulo triennio adimitur, & ab exteriori cinerea pellicula, qua obductus est, repurgatur: In Canariis etiam insulis Cinamomi nulla est penuria, 3-part. Ind.or.c.5.

II. Cinamomum five Canella Malavarica & Javanensis.

Canella ignobilior, Garziz.

Calsia veterum forte, Clus.ex.

Canella in sylvis Malabar, Acoſtæ.

Cinamomum Malabaricum, Canella de Mato, seu ſylæcinamomum, Linſcot. Ind.orient. par.4.c.19. & figura 17.

Cinamomum ſyl. Canella de mare, 2-par. Ind.or. c.15.

Cortice est enodi cinereo in Malavar & Java: & ut Acoſta, fructus oleæ baccis par oſticulum continens, qui fructus teſſili parte, parvo calice præduntus est.

III. Cinamomum five Canella Peruana.

Canella in America quæ calices & glandes Suberis modo fert, quam ſui generis arborem, non Canellam eſſe, Garzias ſcribit.

Canella Peruana quam Gomara, Auguſt. Carate, Petrus Cieca, & ex his Cluſ. notis in Garziam proponit.

Canella novi orbis, Monardi, cui Calsia, Cinamomum & Calsia lignea, unius arboris cortices ſunt, & ſola ſoci varietate, altera alteram præſtantiorem facit: itaque Calsiam & Cinamomum ſolis nominibus diſſerre aſſerit.

Hujus fructum, qui parvo pileo ſimilis, ſua latitudine Taleri Germanici amplitudinem æquat, in uſu eſſe ſcribit.

IV. Cinamomum five Canella tubis minoribus alba.

Canella alba quorundam, Cluſ.ex.

Duplex eſt: altera majoribus, ſcioribus & craſſioribus tubis: altera tubis tenuioribus & minoribus: Idem habet,

Canellam habet & radice: &

Canellam albam ex arbore.

Lignum aromaticum Monardi, Lugd. Caſt. Frag. Cluſ.ex.

an Alſcopo, arbor lauro ſimilis, cujus cortex calidus & acris eſt, in inſul. Virgin. deſcript. vel Ind. occid. par.1.

V. Cinamomum craſſiore cortice.

Xylocalsia, Ad. Lob. qui an Pſeudocinamomum Dioſcoridis ſit, dubitat, Lugd.

VI. Calsia lignea ſuſca aromatica.

Xylocalsia ſubnigra, Lob. belg. & ico.

an Calsia Syringitis, vel Syringis Cinamomo cognata, Cord. in Dioſc.

an Calsiz genus, quod Galeno referente, junior Andromachus, Calsiam fiſtulam nominavit, quæ inanis & cava & craſſi corticis, cujuſmodi in vulgari Cinamomo frequentiffimè conſpicitur.

VII. Cinamomum ſeu Calsia craſſior, quæ præter odorem & ſaporem in officinis occurrit, Pſeudocalsiam eſſe non temerè quis dixerit.

IX. Cortex cinereus acri ſapore.

Cortex eriophorus, Cluſ. ex. l.4.c.5.

#### CINAMOMUM VETERUM.

Cinamomum veterum, à Calsia ſive Canella diverſum eſſe volunt, cujus ſe tres furculos vidiffe Cluſius aſſerit, qui recti, ſed non enodes, cortice tenui, ſubeinerei coloris, jucundi & ſuavis guſtus, acrimonia linguam vellicante: lignum verò inodorum & inſipidum.

Galenus 1. de Antidot. Calsiam quæ Zizir cognominatur, adeo Cinamomo ſimilem ſcribit, ut ejus loco divendita fuerit: & pro qualibet Cinamomi parte, duas Calsiz adhiberi poſſe.

#### TAMALAPATRUM ſive FOLIUM.

**M**ΑΛΑΨΑΤΡΟΝ & ΦΩΜΟΝ. Latiniſ ſimiliter Malabaſtrum & Folium ſimpliciter, & Folium Indicum dicunt. Dioſc. l.1.c.11. μάλΨατρον, inquit, nonnulli Nardi Indici folium eſſe arbitrantur, odoris quadam coꝑulatione decepti: peculiare genus eſt, quod in paludibus Indiciſ gignitur: folium id eſt, quod lentis patuſtris modo aqua innatât, radicem non habens, &c. Et Plinius l.12.c.26. dat & Malabaſtron Syria arborem folio convoluta, arido colore: mox ſubjungit: in paludibus India gigni tradunt, lentis modo, odoratim croco, nigricans ſcabrumq, quodam ſa-

lii gustu: minus probatur candidum. Quibus verbis Plinius diversa Malabathri genera proposuisse videtur: at Dioscorides unicum. Sed quid velint, non assequimur: nostrum enim non innat in aquis, sed in procera arbore, procul ab aquis in Cambaya nascitur, secundum Garziam: at Linscotto 4. part. Ind. or. c. 39. arbor est mediocri magnitudinis, quæ non nisi ad fluminum ripas aut lacus enascitur, in omni quidem India vulgaris, præcipue tamen in Cambaya: solius odor qui Caryophyllorum, quare aliqui male Caryophyllorum solium esse putant.

Cadegi Indi, id est, folium Indum, Arabib.  
Folium Indi Seplariariorum, Trag.  
Malabathrum, Matth. (cui & Folium) Lac. Lob.  
Tab.  
Cassia folium, Cord. in Diosc.  
Cassia aromatica, folium malè, nec Cinamomi  
folium, nec Malabathrum, Cord. hist.  
Malabathrum, Folium, & folium barbaricum, res  
differentes sunt, Ang.  
Malabathrum & Folium, medicamenta duo sunt,  
Guil. the.  
Tamalapatra, ex qua voce corrupta Malabathru,  
Garz. Clus. Lugd.

Folium nostrate, Malabathrum est, Ad.  
Folium Indicum Acoftæ, Cast. Frag.  
Folium Indum vocatum. Tembul Avicennæ, Czf.  
Folium Indum, incolis Tamalapatra.

Figuræ: fructus glandis exiguae effigie adpingitur à Clus. Lobel. & Lugdun. quem Fructum Canellæ quorundam, aliis Tembul convolvuli in India nomine à Cortuso, Clusius, uti in notis in Garziam monet, accepit: qui tamen Malabathri nostri fructum esse suspicatur.

Huc referantur  
Folia saporem Caryophyllorum referentia, in insula S. Maria, ad littus Madagascar: par. 3. Ind. or. c. 12.

## BETRE sive TEMBUL.

BETRE Mallaccensium volubilis modo arborescens, fructu lacerta caudam emulante.

I. Tembul pro Tambul, Avicennæ.

Betre, Garz. Frag. Lugd. qui in append. figuram Clusii habet.

Betre sive Betle, Aloyf. Cadamusto, Clus. ad Garz.

Betella, Lugd. Romano, Odovardo Barbofa.

Betel, Cast. Betele, Acoft.

Betle vel Betre, Tab.

Betelle sive Betre, Linscot. 4. par. Ind. orient. c. 16.

& figura 14.

Sunt qui Folium Indum putant, ut Barbofa: & Amanus utrumque confundit, cum Betre folio æcantiore & teneriore sit.

Hoc Indi Orientales perpetuo mandunt, apud quos in maritimis regionibus provenit: at in Malacca Vitis modo seritur, & additis pedamentis, Herodæ modo se sustinet.

II. Kaate, ex huius arboris ligno pastillos coccinatos cum Betello comedunt: Linsc. p. 4. Ind. or. c. 16.

## CARYOPHYLLUS AROMATICUS.

Fructus qui *Καρυόφυλλον* sive *καρυόφυλλον* (id est, si verbum verbo reddas, Nucis folium, cum quo tamen similitudinem nullam habet) Latine Caryophyllum & Caryophyllus dicitur: à Germanis & Gallis, Clavus nominatur, quod clavi modo capitatus sit. Huius, nec Dioscorides, nec Galenus meminisse videntur, licet Serapio Galenum falso ciet, forsan rectius Aeginetam, vel Sethi nominaturus. Apud Plinium 1. 12. c. 7. hæc leguntur: est etiamnum in India Piperis grano simile, quod vocatur Caryophyllon grandius fragiliusq. Verum hunc Plinius, aliqui *καρυόφυλλον* Theophr. 9. hist. 7. esse putant: Comacum, inquit, ex India & Arabia deportatur, ad unguenta idoneum est.

I. Caryophyllus aromaticus fructu oblongo.

Caryophyllon, ipse frutex, Aegin. Sethi.

Charunfel, Arabibus.

Caryophylli, Matth. Lac. Ludov. Romano, Maximiliano Transylvano de Moluc. Tab. qui & Matthioli & Clusii figuram (à Clusio tamen improbatam) exhibet.

Caryophyllus Cord. hist. Ad. Cast. Czf. qui Carpelium Q. Medici suspicatur.

Caryophyllon sive Caryophyllon, Arabibus &

plerisque Indis, Calafur, in Maluccis Chæque, Garz. Chamke in Malneo insulis, in quibus solis mactatur. Linscot. 4. par. Ind. orient. c. 12.

Caryophylla arbor quæ Arabibus Siger: fructus, Carnufel, Acoftæ.

Caryophylli, Lob. Linscot. l. c.

Caryophylli aromatici, Lugd. cui etiam in append. Caryophyllus Acoftæ.

Caryophyllus florens & Caryophylli veri, Germ. cum utraque Tabern. figura.

Arbor

Arbor est, nostris Malis, aut Pyris non minor, foliis venosis: & ut Linscottus, Lauri similibus, (mea verò ad Pyri folia accedunt) non ita angustis & oblongis, ut Lobelius, Tabernæmontanus, Gerardus ex Clusii editione prima pinxere, & Lugdun. suæ figuræ, ex Matthiolo delumptæ, folium adposuit: sic fructus non sparsim ramis inhaeret, ut Acofta, & ex eo Lugd. in append. pinxere, sed extrema parte bacillis oblongis insident, ut Clusius in notis postremis ad Garziam, Acoftam, & exot. l. i. pinxit: qui demum in Auctario ad exotic. lib. Caryophyllorum ramulum cum fructibus nudum, florem nondum expletum sustinente, & eo qui primum formari incipit, exhibet. In Maluccis ut etiam Makian & Tidore fructifera: in Zeilan, infructifera gignitur: & in Ambona insula summa diligentia nunc colitur, ut ad curas posteriores Clusii plenius habetur. Hos recte siccatos subflavescere, & ut nigriores evadant infumari, & ex recentibus aquam destillatione elici, & cum Sacchara Electuarium confici, Linscottus l. c. scribit. Fructus qui in arbore remanentes crassiores sunt, & quo Javanenses magis expectant, dicuntur.

Caryophylli mares, Avicennæ.

Caryophylli maturi seu majores, Cord. hist.

Antophylli, Lob. Lon. Tab. Ger. Linscot.

Antophylli apud Nicolaum, Cæsalp.

Sic fructus qui ab arbore deciduntur & maximè expectantur, aliqui

Flores Caryophyllorum vocant, cum fructus rudimentum sint:

Caryophyllus immaturus aut minor, Cord. hist. Ita pediculi oblongi, à quibus flores dependent, festucæ Cordo, aliis Fusti, Lusitanis Bastan, dicuntur.

II. Caryophyllus albus spurius.

Clusius in auctario ad lib. exotic. Solani Beladonæ, aut ei congeneris flores suspicatur: hoc Caryophyl. quoque nomine à J. Pona Veronæ accepimus.

III. Caryophylli odore fructus exoticus.

Fructus caryophyllum olens avellanæ magnitudine, Garzia, Fragolo.

Fructus avellanæ nucis magnitudine, cujus folio Caryophyllos odore referuat, in Baya: part. 3. Ind. ot. 15.

IV. Caryophyllus aromaticus fructu rotundo. Caryophyllon, Plinii.

Amomum quorundam, Clus. exot. l. i. c. 17.

V. Fructus fuscus formæ caryophylli aromatici majoris.

Fructus 7. ex navigat. Batavo, Clus. ex. l. 2. c. 15.

## P I P E R.

**P**IPER, *πῖπῆρ* Græcis, Arabibus Fufsel & Fulsul dicitur. Dioscoridi l. 2. c. 18. 2. arbor brevis, quæ fructum oblongum instar siliquæ profert, & c. & Plinio l. 12. c. 7. Piperis arbores Juniperis nostri similes sunt, & semina à Junipero distant parvis siliquis.

Genera: Dioscorides (& cum eo Galenus) eandem arborem & longum & candidum & nigrum proferre, & sola maturatione differre credidit: quæ pleraque & Plinius habet: quæ cum falsa sint, hic non adscribemus. At Theophr. v. hist. 22. piperis genera duo: unum rotundum Ervi modo, cute carneque constans sicuti Lauri baccæ, subrubrum: alterum oblongum, nigrum, semina parva papaveris continens. quod altero longe validius. Verum Piper ad arbores, potissimum Fausel, fertur, quas circumvolvendo conscendit, foliis latius non serratis, Betæ similibus, fructum habens ramosum, semper viventem, donec perfecte maturaverit: alia tamen est quæ Piper album, alia quæ nigrum fert, tam diversa inter arbores differentia, quantæ inter Vites, quæ uvam nigram vel album profert, quamvis Ludovic. Romanus arborem quæ album profert prociorem, crassiore caudice, majoribus foliis esse dicat. & Piper longum, non plus cum illis similitudinis habet, quam saba cum ovo.

I. Piper rotundum nigrum.

Piper nigrum, Matth. Lac. Cast. Garz. Frag. Clus. x. Lugd. qui in Append. Acoftæ fig. habet, & in Piper. Arborem piperiferam ex Theveto, Tab. Linscorto in Arabia, Filis; in Java, Sahang. 4. part. nd. orient. c. 18. & fig. 15.

Piper rotundum nigrum, Cord. hist. Ad. Cæf.

Piper nigrum in Calecut, Lud. Romano.

Piper rotundum Hippocratis, Garz.

Grana perpetuo virent, at Decembri & Januario, ubi maturari incipiunt, sensim nigrescunt: & hoc vulgatissimum est, cum albi proventus rarior sit: cum viride est, ab indigenis sale & aceto conditur.

Quid sibi velit Matthiolum cum sua figura, quam & Cast. Lugd. Tab. & Ger. habent, non assequimur. de qua figura sic Guilandinus scribit: Si frutex ille Piper est, vel etiam Amomum, ut alii so-

mmiant, parum aberit, quin vulgare Ribes, vel Piper, vel Amomum esse possit.

### II. Piper rotundum album.

Piper album, Matth. Lac. Lob. Garz. Frag. Clus. ad Garz. Cast. Lugd. Tab. Linscot. 4. part. Ind. orient. c. 18.

Piper rotundum album, Cord. hist. Ad.

Piperis alterum genus, quod in Taprobana Mola-ga vocant, Lud. Romano.

Piper alterum candidum, Czf.

Sabanh pute seu piper album, reliquis paulo exilius, in Sunda: par. 4. Ind. or. c. 8.

Hoc crassiore est grano, nequaquam rugoso & acriore.

### III. Piper longum orientale.

Piper longum, Matth. Lac. Cord. hist. Ad. Lob. Garz. Frag. Clus. ad Garz. & exot. l. 1. c. 20. Linscot. & Javanensibus Pepilini.

Piper longum Orientale, Cast.

Macropiper minus, Tab.

Hujus arboris facies longè alia existit, Linscoto, non autem Clusio.

### IV. Piper longum Occidentale dimidii pedis longitudine.

Piper, Monardi.

Piper longum Occidentale, Cast.

Piperis longi genus in India occidentali, Czf.

Macropiper majus, Tab.

Piperis longi genus ex Carthagine, Frag.

Piper longum in oculis Chiabè dictum, Linscot. 4. par. Ind. orient. fig. 20.

Hoc priore longius, acrius & veluti ex multis granulis compositum.

### V. Piper longum angustissimum ex Florida.

Piper longum, Felsel, Alpino.

Plantula peregrina, Clus. ex l. 4. c. 11.

### VI. Piper oblongum nigrum.

an Piper longum, Diosc.

Habzeli & Piper Nigrorum, Serapioni.

Piper Æthiopicum, Matth. Lob. Cast. Lugd. Tab. Crone & Granum Anescen Avicennæ, Ang.

Carpesium, Cord. hist.

Piperis aliud genus Æthiopicum, Frag.

Amomum officinarum nonnullarum & longa vitæ, Lob. ico.

### VII. Piperi similis fructus striatus.

Haernia Serapioni.

Fructus cap. de Mungo additus, forte Negundo, Clus. ad Garz.

Mungo similis fructus, Lugd.

Caryophyllus Plinianus sive Negundo, Imper. Negundo, Garzia, Acoftæ, Fragoio: mas procul aipicienti Sambuco similis: fæmina foliis populi alba: similibus: fructus utriusque piperi similis & acris.

II X. Lobus Æthiopico piperi similis, Clus. ex. l. 3. c. 16.

### IX. Piper abortivum.

Diosc. l. 2. c. 182. reperitur etiam quoddam in genere nigri, nutrimenti defectu, cassum seu inane & leve, quod *Segqua* vocant.

Bresma sive Brasma, Cord. hist.

an exotie fructus 4. ex Valachia, Clus. ex. l. 2. c. 11.

### X. Piper inane.

Piper quod lingua Malavarica à Canara nomen sumpsit, Garz.

Piper Canarynum, Frag. Lugd. Linscot. 4. part. Ind. orient. c. 18.

Hoc cæruleu est, intus cavu, in cujus spacio granula quædam cõtinentur, quod paupercula plebis usibus cedit, quare Canarynu, i. e. rusticanu vocari solet: & propter vilitatem, ad exteros nõ effertur.

XI. Piper racemosum caudatum ex Guinea. Amomum, Ang.

Piper caudatum, Advers. quod pimenta del rabo Lusitanis, Clus. ad Garz. Frag. Lugd.

Piperis nova species, Imperato.

Pimento del Rabo, Linsc. 4. par. Ind. orient. fig. 15.

## CUBEBAE; FAGARAS; MUNGO.

**Q**UAS CUBEBA Sofficina vocant, Aethiarius καυκιζας, Arabes Cubebe & Quabebe nominant: cujus arbor foliis est Piperis sed angustioribus, simili modo in altu repens, cujus fructu & forma & magnitudine piper referunt.

### I. Cubebae vulgares nec Arabum Cubebe, nec

Galenii Carpesium, Matth.

Cubeba, Lac. Cord. hist. Garz. Acoftæ, Frag. Lug. Cast. Tab. Linscot. 4. par. Ind. orient. c. 29.

Cubeba Græcorum καυκίνο, Lonic.

Cubeba officin. Piper rotundum, Theophr. Piper

simpliciter Hippocrati cui & Myrtidanum, Gaill.

Cubeba officinarum, Ad.

Cubeba vulgo, Amomi fructum putarim, Czf.

Hæ à Javanensibus, nunquam nisi prius aqua decoctæ venduntur, ne apud exteros quoque plantentur.

### II. Cubebis affinis Fagara major.

Fagaras

Fagara Avicennæ, Clus. in Garz. Lob.  
 Fagara, Cast. Tab. Lugd. Linscot. 4. par. Ind. or. c.  
 7. & fig. 18.  
 Fagara major, Imperato.  
 III. Cubebis affinis Fagara minor.

Fagara minor, Imperato.  
 I V. Fructus niger Coriandro similis.  
 Mungo, Garziæ.  
 Melle Avicennæ pro Mex.  
 Mens, Bellunenfi.

## AMOMUM &amp; AMOMIS.

**A** Momum, Græci ἀμώμω, & Arabibus Hamana sive Hamanus, & Constantinopoli in mercatorum officinis Amama nominatur. Dioscoridi l. 1. c. 14. parvus frutex est, in uva modum suapte ligno in seipsum convolutus: florem habet parvum ceu Leucoium: folia verò Bryonia similia. Differentias verò facit ratione loci, Armeniacum præstantissimum: Medicum infirmius: Ponticum racemosum fructu plenum & odore naves feriens. Et Plinio l. 12. c. 13. Amomi uva in usu est, Indica vite labrusca, uti alii existimavere, frutice myrtillo palmi altitudine, carpiturq; cum radice &c. addit: est & qua vocetur Amomis, minus venosa atque durior, ac minus odorata: quo apparet aut aliud esse, aut immaturum colligi. At sic Dioscorides: Sunt qui Amomum, herba similis qua ἀμώμις dicitur, adulterent, sed qua & modica sit & fructu careat. Theophr. 9. hist. 7. Amomum alii ex Media, alii ex India cum Nardo advehi narrant. Verum alii Rosam Hiericunticam: alii Cubebas: alii Piper racemosum: alii Piper Asthiopicum: alii quid aliud esse volunt. Vide & Adversar. auctores.

I. Amomum racemosum, quod verum credimus Amomum, Martinelli & Ponzæ, de quo Nicol. Marogna Medicus Veronensis librum Latine scripsit, quem Doct. Franciscus Pona Italianum dedit.

Amomum spurium, Clus. exot. auctario.

Fructus 5. & Walachria, Clus. exot. l. 2. c. 22.

Amomum verum Ponzæ, Clus. cur. post. & ibidem sub Amomo.

II. Amomum spurium foliosum.

Amomum, Clus. ad Garz. Lugd. Tab.

III. Amomum, arborè, foliis bryoniæ florib; violæ pingit Castor Durantes, sed quid sit ignoramus.

IV. Amomis, Clus. ad Garz. Lugd. Tab.

## GRANA PARADISI &amp; CARDAMOMUM.

**C**ardamomum, Græci καρδάμωμος (quasi Nasturtium suave) Arabibus Cordimeni nominatur: quod Diosc. l. 1. cap. 5. non descripsit, sed solum quibus in locis optimum nascatur, his verbis expressit: Cardamomum optimum est, quod ex Comagine, Armenia, Bosphoroq; devehitur: in India quoque & Arabia provenit: eligitur, quod est fragrantissimum, plenum, occlusum & caput odore tentans, gustu acre & subamarum. Plinio lib. 12. cap. 13. Simile his (Amomo & Amomidi) & nomine & frutice Cardamomum, semine oblongo &c. Et licet Dioscorides, Galenus & ceteri Græci, unius tantum meminerint, Plinius tamen quatuor genera fecit: viridissimum ac pingue, acutus angulis: proximum è rufo candidans: tertium brevius atque nigrius: pejus tamen varium, odoriq; parvi. Est autem Cardamomum aromata Indorum culinæ familiare, carnem quam elixant condientes, quod frumenti modo provenit, & ocymum plantam serè emulatur.

I. Grana paradysi officinarum. cuius folia (quæ ut & Nucis moschatæ à D. Clutio Amstelrodami accepimus) sub Melegueta in Prodro-mo descriptimus.

Cardamomum majus, Matth. Lon. Lac. (cui etiam Cardamomum hortense) Cast. Lugd.

Grana paradysi, Cord. in Diosc.

Mellegetta seu Cardamomum piperatum, Eid. hist.

Milllegueta, Ad. Lob.

Malagueta Garziæ (cui & Combazbange, Avicenn.) & ad Clus. cur. post.

Cardamomum primum, Cam. ep. alterum, Cæf.

Cardamomum Arabum majus, Tab.

Grana paradysi seu Mellegettas, Linscot. par. 3. c. 14. Hoc Cardamomi minoris loco aliqui utuntur & Melegetta dicitur, propter similitudinem, quam cum Melicæ semine habet.

II. Granis paradysi sive Mellegetæ affinis fructus.

Fructus 14. sive Melegueta spuria, Clus. ex. lib. 2. cap. 15.

III. Cardamomum majus officinarum.

Saccolaa Arabum, aut Sacoule Avicennæ, Elachi Mauritanis.

Cardamomum medium, Matth. Lon. Cast. Lugd.

Cardamomum majus, Cord. in Diosc. (cui Heyl

Arabum) & hift. Cluf. ad Dod. Linf. cot. 4. par. Ind. orient. c. 23.

Cardamomum majus vulgare, Ad. Lob. Cluf. in Garz. Tab.

Cardamomum, Garz. Frag. fecundum, Cam. ep.

Avicenæ duum generum, alterum Saccolaa quæbir, id est, magnum; alterum Saccolaa ceguer, id est minus.

IV. Cardamomum medium: Ad. & Lob. Taber.

Cardamomum mediocre, Cord. hift.

V. Cardamomum simpliciter in officinis dictum.

Cardamomum minus, Matth. Lac. Lon. Ad. Lug. Tab. Linf. cot. l. c.

Cardamomum verum, Ang.

Cardamomum minus, Cord. in Diofcor. & hift. cui & Helbane Arabum.

Cardamomum minus vulgare, Lob. Cluf. in Garz.

Cardamomum primum, Cæf. tertium, Cam. ep.

VI. Cardamomum minimum: & Lob. Tab.

Cardamomum quartum, Cam. ep.

## SECTIO QUARTA.

*RHUS; COCCONILEA sive COGGYRIA; SORBUS;*

*AZEDARAETH; FRAXINUS; NUX JUGLANS; NUX AVELL-*

*na, sive Corylus; Castanea; Fagus; Quercus; Robur; Quercus ex-*  
*crementa; Viscum; Phellodrys; Suber; Smilax*

*Arcadum & Ilex.*

### R H U S.

**P** Oūs & Hippocrati πῶς, à coccineo acinorum colore dicitur: πῶς enim ἰπὺς πῶς interpretantur, unde rufus vox Latina: Rhus, inquit Diofcor. lib. 1. cap. 147. quam aliqui Erythron, id est rubrum vocant, fructus est (fede Suprad. Junde) rbois coriaria, sic vocata, quod coriarii ea utantur ad coria spiffanda: est verò arbutuscula binum cubitorum, in qua folia oblonga subrubentia, per ambitum Illicis modo serrata: fructus autem racemulis simili, densus, cerebinthini magnitudine, quadantenus latus, cujus corticosa tunica ambiens perutilis est. At Plinio l. 24. c. 1. Rhus quæ Erythros appellatur, frutex est, & hujus semen aspergitur pro sale obsonis. Verum Plinius male à Rhoë coriariorum distinguit: de Theophrasti Rhoë vide in Viburno.

#### I. Rhus folio Ulmi.

Rhus, Matth. Ang. Cord. in Diofcor. Lac. Lugd. Taber.

Rhus coriaria, Dod. ut: Ger. & def. Virgin.

Rhus, Rhus veterum, coriaria, obsoniorum & Sumac, Bellon.

Rhus obsoniorum, Ad. Lob. Cæf. Cam. Cluf. hift. Sumach Arabum, Lon. Cast. Rauwolf.

Rhus obsoniorum, sive rubrum, sive culinarium, sive coriariorum, idem sunt: cujus seminis tunica externa quæ sapore acido est, vice salis condimentis aspergebatur.

II. Rhus angustifoliam, sub Sumach angustifolio in Prodro mo describitur.

#### III. Rhus myrtifolia Montspeliaca.

Rhus Plinii existimatus Montspeli, Gef. hor.

Rhus Plinii myrtifolia Montpelientium, Adv. Lob. ico.

Rhus sylvestris Plinii, Lob. Dod. Lugd.

Rhus myrtifolia, Tab. Cam. Cæf.

Rhus Plinii nonnullorum, alii Driophanon ejusdem l. 27. c. 9. arbitrantur.

#### IV. Rhus myrtifolia Belgica.

an Myrtus nemoralis & Dryophanon Plinii, Ruel.

Elæagnus lacus Orcomenii Theophrast. Bellon. cult.

Rhus syl. Plinii, Dod. gal.

Chamaelæagnus Dod. sed melior figura in editione Belgica.

Gagel Germanorum & Myrtus Brabantica quibuldam, Ad. Lob. vel Belgarum, Eid. Adv. vers. parte altera.

Elæagnus Cordi, Lob. ico.

Rhus syl. altera, Lugd.

Rhus herba Plinii, Cluf. hift.

Plinius lib. 24. cap. 11. nec Rhus inquit, Latinum nomen habet, cum in pluribus modis veniat: nam & her-



& herba est sylvestris, foliis myrti, cauliculis brevibus, quæ venena & tinea pellit, & frutex corarius appellatur, subruilis &c.

Variat foliis aliquando latioribus, aliquando

longè angustioribus: aliquando foliorum Arbuti instar crenatis, ut Rosochio, nomine Rosmarini Septentrionalium, seu Myrti nostratis, à Dod. Bakmeistero accepimus.

### COCCONILEA sive COGGYRIA.

**K**ΟΚΚΟΝΙΛΕΙΑ apud Theophrastum 3. hist. 16. habetur, ubi plerique ΚΟΚΚΟΝΙΛΙΑ legunt, & Gaza, Prunum transiit: de qua, ubi de ΚΟΚΚΟΝΙΛΙΑ (Arbutum & Portulacam Gaza reddit) egisset, subiungit: bis folio similis arbor parva, quæ hoc proprium habet, quod fructus in lanuginem abeat: hoc enim de nulla alia arbore audivimus. Plinius 13. c. 22. Coggygriam legit: nam cum Andrachnen delineasset, subiicit: similis & Coggygria folio, magnitudine minor, proprietatem habet fructum amittendi lanugine, pappum vocant, quod nulli alii arborum evenit (irno Salici, Populo & Nerio similiter contingit) Verum & Plinius Cotinum 1. 16. c. 18. esse voluit, de qua sic est in Apennino frutex, qui vocatur Cotinus: ad lineamenta, modo Conchilii colore insignis. Sane Allobroges Rhu vocant, & cortice (sicut & Austriaci circa Viennam) coria spissant: etiam ad pannos luteo colore tingendos utuntur: imò è radicibus pannos rubro colore inficiunt, Anguillara notante.

Cotinus, Matth. Ang. Gef. hor. Cast. Cam. Tab.  
Cotinus coriaria, Dod. Eyst. corarius Plinii, Ger.  
Rhus, Turn.

Coccigria, forte Barba Jovis Plinii, Gef. hor.

Cotinus Plinii, Rauwolf.

Coccigria Theophrasti, Ad. Lob.

Coggygria Plinii, Clus. pan. & hist. Tab. Ger. uterque bis pingit, sub Coccygria & Cotino Plinii.

Coggygria Theophrasti, Cotinus Plinii, Lugd.

Scotannum vulgo, Cæfalp.

### SORBUS.

**S**ORBUS arbor òn & òn nominatur Diofcoridi 1. c. 173. qui non descripsit: At Theophrasto 3. hist. 12. Sorbi folium rotundum prolixo nervaceoq, pediculo constat, pinnis similia è lateribus exeunt, perinde ac si id unicum folium sit, ad nervosum usque pediculum, tanquam in tacinas divisum: omnibus in postremo pediculi folium impar prominet, ambitu serrata, nec in extremum tam acutè mucronata, sed rotundiora: florem racemosum habet ex una veluti clava ex multis parvis & albis constantem: fructus quoq, cum magnus ejus proventus est, racematim corr. &c.

Sorborum genera (eidem) duo sunt, femina fructifera, mas sterilis (& 3. hist. 3. sylvestris maturior urbanâ est) fructu differt, quod alia orbiculatum, alia ovatum ferant: distant & succus: nam orbiculati magna ex parte odoratiore sunt & dulciores: ovati, sæpè acidi & minus odorati. At Plinio 1. 15. c. 21. Sorbis quadruplex differentia: alius enim rotunditas Mali, alius turbinata pyri, alius ovata species, ceu matorum aliquibus: odore & suavitate rotunda præcellunt: cæteris vini sapor: quantum genus torminale appellant.

I. Sorbus lativa.

Sorbus, Brunf. Trag. Dod. ut: Ang. Lac. Cord. in Diof. Gef. hor. Lon. Lugd. Tab. Ger.

Sorbus domestica, Matth. Ad. Lob. (qui Ostriam Theoph. 1. 3. c. 10. suspicatur) Cast.

Sorbum ovatum, Fuch. Tur.

Sorbus legitima, Clus. pan. & hist.

Sorbus elculenta, Cam.

II. Sorbus syl. foliis domesticæ similis.

Fraxinea arbor, Trag.

Brosser Wistbaum, Eid. Lon.

Sorbus sylvestris, Matthioli. Lugd. Cast. Taberni. Gerar.

Fraxinus bubula, Dod. gal.

Fraxinus aucuparia, Gef. col.

Ornus, Ruell. Gef. frac. Dod. Portæ.

Sorbi prima species, Tur.

Sorbi 5. genus aucuparium, Cord. in Diof.

Sorbus syl. alpina, Ad. Lob. Cæfalp.

Sorbus aucuparia, Bellon. Clus. pan. & hist. Thal.

aucupalis, Cam.

Sorbus torminalis, Lug.

### AZEDARAE TH.

**A**ZEDARAE Avicenna 1. 2. c. 17. arbor est nota, habet fructum similem Nabach (id est Loto) & nominant eam in Recbi, arbores Myrobalanorum, & est ex magnis arboribus. Hanc esse eam quæ subjecimus plures existimant.

Arbor fraxini folio flore cæruleo:

Scidoicomorus, Matth. Cast. Tab. Eyst.

ycomor Italorum male, Cord. in Diof. Gef. hor.

Perlaro, falso Sycomorus Italicorum, Bellon. cult.

Azedaracht Avicennæ, Gef. hor. Rauwolf. cui &

Astergir Rhæus, incolis Zenselacht.

Azeda-

Azedarach, Dod.

Azedarac, Lotus alba Pelicerio, Cluschiſp. & hiſt. Camer.

Laurus Græca Plinii & Myrus alba, Geſchor.

Zizypha candida Monſpel. Lob. Ger.

Zizyphus alba, Matthioli, Lugd.

Tuber, Zizypha Columella videtur forte & Plinii, Caſt.

Plinio lib. 15. cap. 14. de Malorum generibus agenti Tuberum duo genera: candidum & à colo-

re ſericum dictum: penè peregrina ſunt, in uno Italia: agro Veronenſi naſcentia, quæ lanata appellatur: lanugo ea obducit, &c. ex his Plinii verbis quid colligas?

Ex nucleis precatorii globulos Monachi conficiunt, hinc arbor de gli patre noſtro, Italia: Galli verò, arbor Sancta dicitur.

Variat foliis, quæ in Italica laciniata, in Gallica ſolum crenata ſunt, quod herbarii Lugdunetiſi auctor, duplici figura demonſtrare voluiſſe videtur.

## FRAXINUS.

**F**raxinus, *μυρία* arbor nota eſt inquit Dioſcorid. l. 1. c. 108. Theophraſtus 3. hiſt. 11. deſcripſit, ejusq. genera duo ſunt: unum excelſum, procerum, ligno candido, nervoſo, molliore, criſpiore, magis enodi. Alterum humilius, minus ageſcens, ſcrobrius, durius & magis flavum. Et Plinius l. 16. c. 13. inquit, Graeci fraxini duo genera fecere, longam, eundem alterà brevem, duriorē ſuſciorēq., *λατριν* ſolui. Alii ſitu diſcre: campeſtre enim criſpè eſſe: montanā verò ſpiffam.

### I. Fraxinus excelſior.

Fraxinus prior & *βυβυλα* (Fraxinus bubula Ga-  
zar.) Theophraſto.

Fraxinus bumelia, Plinio & Bellon.

Fraxinus, Brunf. Trag. Matth. Dod. ut: Geſchor.

Lac. Tur. Lon. Ad. Lob. Tab. Lugd. Caſt.

Fraxinus prima, & major, Anguil.

Theophraſtus monet Idæos exiſtimaviſſe fructu & flore carere: ferre tamen in ſiliqua fructum minutum nucis modo, qualem Amygdalæ, guſtu ſubamarum: ferre & quædam alia *ἀπὸ* *ἀπὸ*, veluti muſcos, ut Laurus: cæterum denſiores & magis compactos, globoſos, non aliter, quam Platani pilulas. Sane globoſos hos muſcos, unā cum fructu hiſt. Lugd. pingit, qui circa Veris initium obſervantur: qui veluti ex muſco glutinoſo impenſus reſiccato concreti videntur: Sic Camerario, mas floret nigris racenis ſeu granulis, ſed fructum non fert, qui abſque fructu, ut juglandium juli decidunt: quare Thallio alia ſterilis, alia frugifera.

Fructus ipſius ſive ſemen, Ornogloſſum & Lingua avis dicitur, Anguil. aliis fructus Fraxinialiſis lingua paſſeris: aliis antheris. Avicenna inter mēdullas computat.

Ex fraxino haſta, menſæ, vaſa & uſenſilia multo ſiunt: ſiunt & pocula, ex quibus ſiquis aſſidue bibat, lienem extenuari ajunt: cuius nomine & corticis decoctum quidam exhibent: quo etiam aliqui vice ligni Guajaci felici ſuccellu utuntur, Czai-pino monente: addens ejus corticem internum: quam, in qua maduerit, cæruleam reddere.

II. Fraxinus humilior, ſive altera Theophrasti: minore & tenuiore folio.

Fraxinus ſylveſtris, Columellæ.

Ornus, Bellon. cult. (cui & pumila fraxinus & *ἐρπονία*) Lugd.

Triplicem Fraxinū facit Thalius: 1. Fraxinū paſſim naſcentē. 2. Fraxinū Fago ſimile, *Βυβυλά* quæ. 3. Fraxinum durum ſeu *λεῖος* *Ετενιά* ſchem.

III. Fraxinus rotundiore folio.

Ornus, Galli Preſſani lib. de re ruſtica.

IV. Lignū peregrinum aquā cæruleā reddens. Lignū ad renū affectiones & urinę incommoda. Molligum ad Nephritidem, Lugd. (hard.

Lignum in Nova Hiſpania repertum, Caſt. Lignum ex novo mundo Pyro ſimile, Frag.

V. Arbor Indica fraxino ſimilis, oleæ fruſtu Nimbo, Garzia, Acoſta, Caſt. Lugd. Frag.

## NUX JUGLANS.

**N**uces juglandes, Dioſcoridi l. 1. c. 172. *καρύα βανδα*, nonnulli *καρύα* dicuntur: & Theoph. 3. hiſt. 18. *καρύα* Nux Juglans, Perſica & Baſilica nuncupatur, quod è Perſide à regibus translata ſit. Juglans verò quaſi *juglans*: hinc Cloatinus, Macrobio referente, Diuglandē primo vocatā ſcribit, quaſi *διὰ* *βελ* & *ov*. Arbor, *καρύα* fruſtu *καρύα* dicitur, quod caput, *νῆπε* *νῆπε*, id eſt, *τὸ καρύα* odoris gravitate offendat, ut Plin. l. 15. c. 22. habet. imo l. 17. c. 12. juglandis umbra capiti noxia: & l. 23. c. 3. aſſerit nuces juglandes Græcos à capitis gravedine ſic vocari.

Genera: Plinio l. 15. c. 22. ſola differentia generum in putamine duro fragiliore & tenui, craſſo, loculoſo, ac ſimplici. Addamus etiam: in magnitudine & parvitate: quare recentiores quinque differentias potiſſimum notant.

I. *Nux juglans* sive regia vulgaris.

*Nux regia*, Brunf. Cord. in Dioic.

*Nux juglans*, Trago, Matthiol. Lac. Gef. hor. Lon.

Dod. Ad. Lob. Cæf. Cast. Lugd. Tab. Cam.

*Nux*, Dod. gal.

*Juglans*, Fuch. Tur.

Has à duro cortice & frangendi mora, Moracias & Moracillas appellari Hermolaus tradit, & Lug. & quæ à putamine vix purgari possunt, Surdæ nominantur, Cæf. salp.

Nuces regię maxima frequentia in Virginea habentur, eæque duorum generum: unum forma & sapore parum ab Anglicis differt, putamine crassiore & duriore: alterum majus cortice scabro & duro, nucleo magno, dulci & oleaginoso, ex quibus confusus Lac conficiunt cum suis cibis miscentes: harum arborum nonnullæ octuaginta pedes longæ, part. 1. Ind. occid.

II. *Nux juglans* fructu maximo.

Nuces caballinæ, Lugd.

Ex harum cuppis, marsupia pueris gestanda fiunt.

III. *Nux juglans* fructu tenero & fragili putamine.

Nuces juglandes cortice tenuissimo, Gef. hor.

Molluica & Persica, Suevio potest apud Macrobius: cum Tarentina eadem, aut proximę nature.

IV. *Nux juglans* biteræ. (Lugd.)

Harum & Plinius meminit & in agro Patavino provenire Hermolaus asserit, Lugd.

V. *Nux juglans* fructu serotino.

Nuces S. Johannis, quia ante diem S. Johanni facrum, neque folia, neque nucis ostēdunt: cum vero id tempus adest par reliquis nucibus, quoad

fructum & folia: harum Tragus meminit: Johan. Bauhinus circa Tigurum, Dalechampius circa Lugdunum observavit, Lugd.

VI. *Nux juglans* folio serrato.

*Juglandis* genus alterum, fructu teneriore & longiore, Clu. hist.

*Arbores Indica Juglandis similes.*

## I. Arbor Indica Mamei dicta.

Mamei arbor *Juglandis* proceritate, foliis paribus, fructu duorum pugnorum, aliquando minore, Oviedo, Lugd.

Mamay, Gomarz hist. Indicæ.

Mamei arbor Castanę forma, fructu etiam maximi cydonii globum superante, Scalig. Lugd.

Mamei arbor mediocriis nucis magnitudine, fructu in Hispaniola rotundo, in continente longo, & crassiore, Benzo, Americ. lib. 4.

Mamei fructus, par. 6. Ind. occid.

Mameyen fructus Melocotones sive Persica æquant superante, Joseph. Acofta parte 9. Amer. lib. 4. c. 24. Alias dulces, alias acidi. Idem.

II. Arbor Indica foliis *Juglandis*, fructus nucis magnitudine.

Ambare, Garz. Acoftæ, Frag.

Ambares, Cast.

## III. Fructui prædicto affinis.

Fructus Brasilianus 1. & 2. Clu. ex lib. 2. c. 7.

IV. Arbor Brasiliana *Juglandis* similis nucibus Copau, Ind. occid. p. 3. c. 12. (carens.

V. Hobos, Pacayes sive Guauas multi pro nucis *Juglandis* habuerunt: læpius transplantatas, nucis Hispanicis similes gignere ajunt: part. 9. Ind. occid. lib. 4. c. 26.

## N U X A V E L L A N A.

**N**uces avellanae, *κάρνα μύρτις* & *λεωσώρνα*, Dioscoridi l. 1. c. 169. id est, *nux Pontica* & tenuis dicitur: at Theophrasto 3. hist. 15. *ἡγελαϊκὴ καὶ κάρνα*. nucis Heracleotica (quod ex Heracles Ponti translata) Julii Prænestina & Avellana dicuntur. Avellana Plinio lib. 15. c. 22. quas antea Abellinas patrio nomine vocabant: in Asiam Græciamque à Ponto venire: & ideo Pontica nucis vocantur. At arbor Latinis *Corylus* dicitur. Theophrasto 1. hist. 16. folia insecta habet ut Ulmus & Robur: 3. hist. 6. quidam florere existimant: 3. hist. 7. sed postquam fructus decidit, racemosum quiddam verius prægandum magnitudine nascitur, ex uno pediculo pingui: 3. hist. 8. julos nonnulli vocant, quod ex minutis squamis innumeris ordine nuci pinea constat &c.

Genera: Sylvestris est & urbana: amba bino genere constant, quædam enim rotundam, quædam oblongam nucem largiuntur: sed urbanarum fructus candidior est, Theoph. 3. hist. 15.

I. *Corylus sativa* fructu albo minore sive vulgaris.

*Nux avellana* rotunda, alba, domestica, Brunf.

*Nux avellana* fructu rotundo, Matth. Lac. Cæf.

*Corylus hortensis*, Dodon. gal. sativa, Lon. Lugd.

domestica, Clu. hist. or.

Avellana domestica, Fuch. Tur.

Avellanae tertium genus, Cord. in Diof.

*Corylus domestica* rotunda alba, Cast.

*Corylus* persimilis alno, Ad. Lob.

GG

Nux

Nux avellana sive Pontica, Cam.

Corylus lativa rotundis nucibus, Lugd.

Fructus major est, & snavior sylvestri.

II. Corylus lativa fructu rotundo maximo.

Avellana urbana rotunda circa Lugdunū, Gef.hor.

Avellana major Lugdunensis, Cam.

III. Corylus lativa fructu oblongo rubente.

Nux avellana domestica oblonga, rubra, Brüs. Matt.

Corylus lativa rubris oblongis nucibus, Trag.

Corylus hortensis fructu rubro, quæ nux Pontica veterum, Dod.gal.

Nux avellana urbana cute rubente, Eid.

Avellana urbana oblonga rubicunda Lombardica quibusdam, Gef.hor.

Corylus domestica longa rubra, Cord. domestica oblonga, Clus.hist.

Corylus lativa nuce oblonga, Lugd.

Nux avellana fructu oblongo, Cæf.

Pontica nux hortensis, ruffa ut plurimum membrana, Cord. in Diosc.

Hæc præstantior, & tardius rotunda maturatur: hanc quæ fructu est oblongo etiam duplicem faciunt, cujus alterius nucleus rubra, alterius alba pellicula integatur.

IV. Corylus nucibus in racemum congestis.

Corylus Macedonica, Cord. in Diosc. Gef.hor.

V. Corylus sylvestris.

Nux avellana sylvestris, Brunf. Matthiol. Lac.sive

Corylus, Dodon.

Corylus sylvestris, Trag. Matth. Dod.gal. Gef.hor.

Lon. Lob. Cast. Lugd. Clus.hist.

Avellana nux syl. Fuch.

Pontica nux in Corylo vulgari, Cord. in Diosc.

Corylus avellana, Tur.

Avellana Corylus syl. Gef.hor.

Fructu est minore, albidior & rotundior, quam lativa sit.

VI. Avellana peregrina humilis.

Nux barbata Plinii l. 9. c. 1.

Avellana punila Byzantina, Clus.pan. & hist. Ger.

Avellana Byzantina, Tab.

Variat fructu majore & minore.

VII. Avellana purgatrix.

Avellana purgatrix, Monardi, Lugd. Frag. Clus.

Avellana purgativa, Cæfalp.

Nuces purgantes, Tab. Ger.

Ben magnum Medicorum vulgo, Monard.

Ex novi orbis insula S. Dominici adfertur.

IX. Avellana Indica oticulo trifido.

Avellana Indica 2. Matth. & Lugd. adpinxit.

Mehenbethe, Lob. Clus. ad Garz. (cui Nucis guentaria genus) Tab. Lugd.

IX. Avellana prædicta affinis fructu spadicæ, velut in binas partes secto.

Fructus miscellaneus 7. Clus. ex. l. 2. c. 25.

X. Avellana quadrifida.

Avellana purgativa, Oviedo.

Fructus exotici 6. Clus. ex. l. 2. c. 16.

Hic velut ex quatuor avellanis simul connectis lavibus & spadiceus constat.

XI. Nux purgatrix.

Fructus exotici 17. Clus. ex. l. 2. c. 16.

XII. Avellana Indica 3. genus, Matth. Lugd.

Avellana Indica 2. Clusii, secundum, Lugd.

Fructus exotici 2. Clusii in Garz.

Fructus peregrinus 1. quem etiam pro Balsamo

Peruana accepit, Clus. ex. l. 2. c. 29.

Balsama fructus, Lugd.

## CASTANEA.

**C**astanea, Græcis κάστανα & καστανία, à Castano Magnesiæ urbe: vel ut Stephanus scribit, Apuliz, non procul à Tarento, unde advecta sunt. Fructus ejus καστανία βαλάνος, ἢ κάστανος, ἢ κάστανα ἢ κάστανα. Dioscoridi l. 6. c. 14. id est, Sardinia glandes, quod Sardinia ea primum provenierint: lopina, à cortice crassiore, qui Græci κάστανα dicunt: Theophr. 3. hist. 3. c. 4. κάστανα & κάστανα Nucem castaneam vertit: dicuntur etiam κάστανα κάστανα. nec castanea, Diosc. l. 2. c. 14. κάστανα κάστανα, ἢ κάστανα, distinctis locis Theophrastus nominat.

Genera: antiqui plura fecere, nominibus plerumque, à locis unde importabantur, inditus, ut ex Plinio l. 15. c. 23. colligitur: est à quo recensentur, Tarentina, figura plana: Balanitis, quæ rotundior & sponte profilit: & Salaviana plana est: & ralliana laudatior ipsa Tarentina: Metereana rubenti cortice. Sæpe fructus magnitudine & parvitate: item figura cum quadam in ventrem magis crescant, quadam in longitudinem: & sapore, differunt.

I. Castanea sativa.

Castanea domestica, Matth. Cæf. Cast.

Castanea sativa grandis, Cord. in Diosc.

Castanea crassiores, Bellonio.

Castanea majores, Gef.hor. Lugd.

At sativæ duplices sunt, grãdiore quæ Maronæ vocant, quæ divitum mentas claudunt, quæ ceteris obrutæ igne coquantur: sunt & minores.

II. C.

## II. Castanea sylvestris, q̄ peculiariter Castanea.

Castaneæ populares &amp; coctivæ, Plinio.

Castanea, Brunf. Trag. Tur. Fuch. Ang. Dod. ut:

Gef. hor. Guil. Lac. Lon. Ad. Lob. Tab. Ger.

Castaneæ minores, Matth. Lugd.

Castaneæ syl. Cord. in Diof. Cæf. Cast.

Hæ in aqua decoctæ pauperum jejunia saturant:  
& ex earum farina panis conficitur. Sic in Virgi-  
nia Castanearum magna quantitas est, & in Flori-  
da, sed Gallicis magis sylvestres: par. 2. Amer.

## III. Castanea humilis racemosa.

Castanea humilis, Joh. du Choul in hist. montis  
Pilati, Lugd.

## IV. Castanea folio multifido.

Castanea equina, Matth. Dod. Ad. Lob. Cast. Clus.  
pan. & hist. & hist. app. d. alt. Lug. Cæf. Tab. Ger.  
an sit Myrobalanus folio heliotropii Plinii l. 12. c.  
21. dubitat Cæfalpinus.

Ex Oriente primum Constantinopolim, hinc  
Viennam, ubi provenit, delata: & quia equis

anhelosis prodest, equina dicitur.

V. Castanea leporino reni similis.

Castanea Peruana, Clus. hist.

VI. Castanea purgatrix.

Castaneæ purgativæ, Monard. Cast.

Fructus cholagogus, Monard. Lugd.

Ex maritimis Nicaragua in Hispaniam delatus.

VII. Castanea ex Bali insula.

Fructus pyri magnitudine, castaneæ forma, corti-  
ce tenui minus tamen aculeato, albicans, sapore ju-  
cundo, Ind. orient. par. 3. c. 39. (sera.

IX. Arbor Mexiocana fructu castaneæ cocci-  
Arbor finium regundorum, Scalig. & ex eo Lugd.  
quia in fructu coccos, quo ad picturas utuntur, &  
in tabellis pictis, cum literas non habeant, agro-  
rum facies, finesque prædiorum servant.

an Daburi, Clus. ex l. 3. c. 19.

Bixa Oviedi, Clus. ex l. 3. c. 20.

IX. Fructus peregrinus Castaneæ similis.

Gor fructus castaneæ similis sed amarus, Scalig. Lug.

## F A G U S.

**F**agus Theoph. 3. hist. 7. δέν (Gaza Scissima vertit, quod sit in laminis scissilis) cujus fructum 3. hist. 10. describit,  
levem, glandeum, in calice echinato, placido tamen & levi non fissido ut Castanea, illi tamen dulcedine & suo  
similis. Sed præter glandem etiam baccam parvam gignit, de qua sic Plinius l. 16. c. 16. Fagi glans nucleis similis, trian-  
gula cute includitur &c. media parte folii, plerumq; gignens superne parvulam baccam viridem: cacumine aculea-  
tam. Theophrastus 3. hist. 10. & 5. hist. 8. duplex est: altera montana candida: altera campestris, nigra: sed campestris mi-  
nus utilis montana, qua ad multa perutilis.

Fagus, Brunf. Trag. Matthioli. Anguil. Dod. ut:  
Gef. hort. Lac. Tur. Lon. Ad. Lob. Cast. Lugd. Cæf.  
Tab. Ger.

Oxya, Bellonio.

Oxya Græcorum, Fagus recentiorum, Gef. de lapid.

Ornus, Pandeſtario.

## Q U E R C U S.

**Q**uercus ὄρυς: Græci: licet præſci Græci omne genus arboris ὄρυς: nomine intellexerint, à verbo ὄρυς erumpo:  
sic Latini Glandis nomine, omnē fructum cōplexi sunt, ut Jabolinus ait, exēplo Græci sermōnis ὄρυς, apud  
quos omnes arborum species ὄρυς, appellantur, ut δέν ὄρυς, sicut dictio ὄρυς, quo verbo Cæſus omnem  
fructum significari dixit. Quæ etiam glandis appellatione apud scriptores intelligitur, à Græciς βάρανες vocantur:  
sed revera ὄρυς tantum arborem glandiferam denotat, & præſertim Quercum. Glandem verò ut habet Plinius l. 16.  
c. 6. quæ propriè intelligitur, ferunt, Robur, Quercus, Esculus, Cerrus, Ilex, Suber: quāvis Roboris appellatione omnia  
genera contineri poſſe, Gaza cenſuerit: cum tamen Robur una ſolum species ſit, quæ ὄρυς generi ſubjeda ſunt. Et  
Theoph. 3. hist. 9. Quercus genera ſunt, ἡνὸς, ἀνὰ ὄρυς, ὄρυς, ἀνὰ ὄρυς: Gaza ſic vertit: Roboris  
genera habentur, placida, cerrus, latifolia, ſagus, falſicortex, quæ aliqui reſſicorticem vocant.

I. Quercus latifol. mas, quæ brevi pediculo est.  
ἀνὰ ὄρυς Idæorum & Maurorum, Theoph. la-  
tifolia, Plinio.

Glandiferarum arborum species tertia, Ang.

Platyphyllos mas, Lugd.

Glande est mediocri, calice tantum puſtulata ſca-  
bricitæ aſperato: sæpè ternis aut binis ſimul co hæ-  
rentibus, raro unica, in ſummo ramorū prodeūte.

II. Quercus latifolia fœmina.

Platyphyllos fœmina, Lugd.

Hæc per omnia minor, foliis ob denſas lacinias  
veluti criſpis gladiis interdū ſenis aut quinis, sæ-  
pè ternis aut quaternis, raro binis, rariſſimè ſingu-  
laribus, calici firmiter adnexis. Verum sæpè penè  
rotundæ imperfæcæ calyci continuæ reperiuntur,  
quemadmodum in hiſtoria Lugdunēſi plingitur.

G 2

III. Quer-

III. *Quercus latifolia perpetuo virens.*

*Quercus* ubi *Sybaris* perspicua, quæ nunquam folia demittit, Theoph. i. hist. 15.

*Quercus* in *Thurino* agro, ubi *Sybaris* fluit, Plin. lib. 16. c. 21.

*Quercus* in *Apennino* & *Andium Gallicæ gentis* agro, Lug.

IV. *Quercus cum longo pediculo.*

*Hemeris* Idæorum, Etymodrys Macedonũ, Theop. *Hemeris*, Plinio; placida, Gaza.

*Quercus*, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. Tur. Lon. Tabern.

*Quercus vulgaris*, Lob. Ger.

*Quercus vulgaris*, *hemeris*, Cord. in Diosc.

*Hemeris* etymodrys, Lugd.

Hinc peculiare, quod glans modo unica, modo gemina longo pediculo affixa dependeat.

*Quercus latifolia* amplissimæ circa *Viennâ* Clusius meminit, cujus omnes glandes è longis pediculis dependentes, quali viridi quadam excrecentia, multis inæqualibus angulis prædita, inclusæ erant, quæ resiccata gallarũ modo firma & dura erat.

*Quercus Pannonica latifolia*, rectius *Cerrus*, Cam.

Sic *Quercus præaltæ* & *vastæ* in insula *Virgineæ* & in *Guayaquil* singularis præstantiæ & longissimæ durationis: Joseph. Acosta lib. 4. c. 30.

V. *Quercus parva sive Phagus Græcorum & Esculus Plinii.*

ἐσϋλός, Σατὶν 947. v. Latinis ab *esca* vel *esū*, *Esculus*, quoddam fructus ejus dulcis sit, ac ceu *Castanea* edulis, cum cæterarum *Quercuum* fructus, suisbus tantum sapiat.

*Quercus*, sive glandiferarum arborum 1. species, Ang.

*Phagus*, *Quercus* species, Cord. in Diosc.

*Esculus* veteribus Græcis κατιφύλλος, Bellon.

*Phagus* *esculus* mas & foemina, Lugd.

*Ilicis* genus quod in *Hispania* *Enzinas* vocat, Cæf.

Foliis præcedenti angustiore, infernè candicante, glande communiter unica, raro gemina & aculeo magis pungente: quas *Hispani* sub cineribus coctas, secundis mensis apponunt.

*Quercus* genus à nostris diversum, quod veteribus ignotum arbitramur, cujus glandes minoribus fabis haud sunt majores: hæc Bellon.

VI. *Quercus calice echinato glande majore.*

αΐλαο-4. Idæorum, Aspris Maurorum, Latinorum *Cerrus*.

*Cerrus*, glandiferarum 2. species, Ang. *Ægilops* sive *Cerris* majore glande, Dod.

*Quercus* *Ægilops*, sive præcella dicta *Cerris* Plinii, Ad.

*Cerris* Plinii majore glande, Lob.

*Quercus* altera, quæ *Cerrus*, Cæsalp.

*Cerris* sive *Quercus* 4. genus, Lugd.

*Cerris* Plinii 1. Tab.

Hicæ glandibus ad pannos atro colore inficendos, gallarum vice utuntur.

VII. *Quercus calice hispidio glande minore.*

*Ægilops* minore glande, Dodon.

*Cerris* Plinii minore glande, Lob.

*Cerrus* *Ægilops* Theoph. Clus. pan. & hist. Glanditera folio sinuato deciduo tertia vel *Quercus* 3. species quæ in *Etruria* *Farnia*, Cæsalp.

*Haliphleos*, *Cerrus* foemina, sive *Quercus* 5. genus, Huc referatur: (Lugd.)

*Quercus* peregrina sive *Mauritanica* grandissima glande, cujus ex Scaligero, Lugdun. meminit.

IX. *Quercus Burgundica calyce hispidio.*

*Quercus* alia *Bauhini*, sive *Haliphleos* Sequanorum, Lugd. nisi eadem cum priore.

IX. *Quercus pedem vix superans.*

*Robur* 5. Clus. hist. hisp. (at 7. in hist.) Tab. *Quercus* humilis, Dod. Ger.

*Quercus* pumila fruticis specie, fronde *Ilicis* molliore, Lob.

## ROBUR sive QUERCUS GALLIFERA.

I. *Quercus foliis molli lanugine pubescētibus.*

*Robur primum*, Clus. hisp. & hist.

Hujus altera species, quæ folio est minus amplo, & minore glande. (ferens.)

II. *Quercus gallâ exiguæ nucis magnitudine*

*Robur* 2. Clus. hisp. at 3. Eid. hist.

*Galla*, an Theoph. *Fagus*, Ad.

*Galla* major, Lob. & Dod. *Galla*, Cast.

an *Gallæ* magnæ, quas *Ponia* de Coquo nun-

cupant, Garzia.

III. *Quercus foliis muricatis, non lanuginosis, gallâ superiori simili.*

*Robur* tertium, Clus. hisp. (at quartum in hist.) Tab. *Galla* major altera, Lob.

*Galla* sive *Robur* majus, Ger.

IV. *Quercus foliis muricatis, minor.*

*Robur* quartum, Clus. hisp. (at quintum in hist.) Tab. *Galla* minor, Lob. Dod. Ger.

V. *Quer-*

V. Quercus humilis gallis binis, ternis aut pluribus simul junctis.  
Robur humile, Clus.pan. at sextum, Eid.hist.

Quercus etiam miræ magnitudinis & amplitudinis reperitur in Septentrionali plaga Hærcyniæ sylvæ, Plin.l.16.c.2. Quercus quæ Basileæ in D. Petri nemore est, Cardanus l.6.var.rer. c.23. Bellon. Lugdun. & etiam Gesnerus meminere.

VI. Glans Virginea.

Fructus exoticus 21. vel glâdis calix ex Wingaudeaow allatus, Clus.exot.l.2.c.16.

an Mangummenauck, Virginiæ historiæ, quæ in cibum cum piscibus & carnibus cedit.

VII. Glandium vel baccharum quinque genera, quæ in diversis arboribus nascuntur.

1. Sagatemen. 2. Olâmen. 3. Pumuckoner: ex his indigenæ oleum dulce eliciunt: 4. Sapûmen dîctum, coctum Castanæ est sapore, ex hac interdum panem pinsunt: 5. Magûmenauck, glâs est Quercus illius provincie: omnibus decoctis in cibis utuntur in Virginea, par.1. Ind.occid.

IX. Quercus lapidea.

Lithoxyla sive lignea lapidea Anglica, Ad.Lob.

Lignea lapidea, Lugd.

Lithoxyla ex Cerro, Clus.pan. & hist.

Verùm & Abies, Alnus, Ulmus montana & alia quoque ligna aliquando in lapidem mutantur, monente etiam Gesnero lib.de lapidib.

Abietes integræ cum cortice in Elbogane tractu, in lapidem versæ, Agricola.

Fagus altitudine 170 ulnarum cum trunco, ramis,

foliis, in saxo cinereo durissimo sub terra in valle Joachimica reperta: & ibidem ex Alno lapis, unde cotes fiant, arte conficere docet, Jo. Kentmannus lib.de foissilib.

Quercinum lignum sub terra defossum, in cotem lapideam mutatur, manibus suis eruit Langius.

Arbores integræ petrificatæ, stantibus adhuc ramis, cortice, medulla ac radicibus, sæpissimè in Bohemiæ & vicinis locis subterraneis invenias, Agricola auctore.

Narrat Porta lib.2. Magiæ natur. alicubi succum abundantem petrificum ab arboribus per radices & trunci poros exsurgere: atque radices ipsas, truncum, ramos, folia & flores in lapidem convertere.

Amnes & rivuli sunt in Anglia ubi pali lignei, ridice, aut conti, si immergantur, aliquot mensibus lapidescunt, imò ferè ferrescunt, &c. Adversar. quod in Pannonia quoque, Clusius notavit. Sic in Tercera fons quoque, qui omnia vel illapsa, vel injecta, in solidissimum lapidem commutat, Linscot.3.par.Ind.or.6.

Similiter in Java majore affirmant incolæ, flumè præterlabi, in quod si ligna quæcunque immergantur, ea in lapides mutari. 2.par.Ind.or.22.

Et Plinio l.2.c.103. in Ciconum flumine & in Piceno lacu lignum dejectum, lapideo cortice obducitur: & in Surio Colchidis flumine, adeo ut lapidem plerumque durus adhuc integat cortex: Similiter in flumine Silaro, non virgulta modò immerfa, verùm & folia lapidescunt, alias salubri potu ejus aquæ.

## QUERCUS EXCREMENTA.

Quercus præter glandem plurima alia gignunt, Theophr.3. hist.8. & Plinio l.16.c.7. auctoribus.

GALLA Græci γάλλα: dicta, sorte a γάλα id est fuligine: quod Gallarum, pannis nigro colore tingendis, magnus usus sit. Et licet Plinius l.16.c.6. voluerit Gallâ omnes ferre quæ & Glandæ. Quercubus tamen magis peculiaris est, adeo ut Dioscorides l.1.c.126. Gallam Quercus fructum appellarit: quam Græci ὑπὸ πικρῇ fecere: Dioscoridi altera ὑποκίττης. parva, tuberosa, gravis, nulloamine pervia: altera plana, levius & perforata, quæ major est. Theophr.3. hist.6. altera candida & exigua, quæ cum aliqua non majores fabis evadunt: altera nigra, & magnitudinem mali nonnulla capessunt: & cap.8. Quercus præter fructum gignit Gallam parvulam, atq; alteram resinofam & nigram: & Plin.l.24.c.4. Galle genera facimus, solidam, perforatam: item albam, nigram: majorem & minorem. Hic notatu dignum, quod Matthiolus in comment. addit: majores Gallas illud peculiare sibi vendicasse, ut quotannis, aut annonæ fertilitatem, aut sterilitatem, aut pestilentem autam prænuncient: nam si integræ rumpantur quæ perforatæ non sunt, aut musci, aut araneus exit: si musca evolat, futuri belli: si repat vermiculus, annonæ penuriæ: si currat araneus, pestilentium morborum præsagium esse. Gallarum genera, Taber. & Gerard. quatuordecim proposuere. Tragus scribit, Quercus peculiare genus esse quod Gallam ferat, nec in Germania provenire.

I. Gallæ maximæ orbiculatæ.

Gallarum 1. & 2. genus, Tab.

Gallæ ex Oriente: & Provinciales, Lugd.

Gallæ orbiculatæ, Ger.

Harum aliz sunt Orientales, aliz Provinciales, & Illyricæ.

## II. Galla oblonga: &amp; Ger.

Gallæ ex Iſſria, Lugd.

Gallarum 3.4. &amp; 5. genus.

## III. Galla minor.

Gallarum 6. genus, Tab.

Galla viridis five omphacitis, Ger.

## IV. Galla galericulata: &amp; Ger.

Excrementa duo fungum quodammodo exprimentia, Lugd.

Gallarum genus 12.13. &amp; 14. Tab.

## V. Galla angulosa.

Gallarum genus 7.8.9.10. Tab.

Galla viridis five omphacitis, Ger.

## VI. Galla umbilicata.

Excrementum umbilicatum, Lugd.

## VII. Galla Brasiliæna quinqueangula.

Fructus miscellaneus 10. Clus. ex. l. 2. c. 25.

*Alia Quercum Excrementa.*

## I. Excrementum moro simile.

*Συμφυμῶς*. Theoph. 3. hist. 8. specie mori, sed durum & fractu admodum difficile: quædam veluti mora fert, Plin. l. 16. c. 7.

## II. Excrementa pudendi virilis effigie.

*Αἰδιῶς*. five colis effigiem repræsentans, Theoph. Veretrum, Lugdun.

## III. Excrementum tauri caput referens: &amp; Lug.

*Ταυροκεφάλιον* durum & perforatum & tauri caput quodammodo æmulans, quod præruptum nucleï oleæ speciem intus ostendit, Theophr. Tauri caput imitantia, Plinio.

Gallarum genus undecimum, Tab.

Galla asinina, Ger.

## IV. Pilulæ lanatæ: &amp; Lugdun.

*Πῖλον* pilum quidam appellant: pilulæ sunt lanuginosæ, molles, nucleum duriore æmplexæ, quibus ad lucernas utuntur, Theoph. Pilulæ nucibus non absimiles, intus habentes floccos molles, &c. Plin.

## V. Pilulæ capillatæ: &amp; Lugd.

*Σφαίρον χιτῶν*. pilula comam habens, quæ inutilis Theoph. pilula alia inutilis cum capillo, verno tamen tempore mellei succi, Plin.

Bedeguaris effigie excrementum spongiosum &amp; muscosum, Lob.

## VI. Pilulæ in alis ramorum.

*Σφαίρον μαγανθῆς*, in ramorum alis pilulam aliam gignit, line pediculo, concavoque, sessilem & verficolem &c. Theoph. gignunt & aliæ ramorum pilulas, corpore, non pediculo, adhærentes, candicantes umbilicis, Plin.

Pilulæ sessiles, Lugd.

Capita multis squamis constantia, Clus. in Cerni historia: vide &amp; Thaliū in Quercu.

## VII. Pilulæ è foliis convolutis.

*Σφαίρον φολιῶν*. pilula è foliis compressa & convoluta, Theoph. è foliis convolutæ pilulæ, Plin.

Pilulæ foliolæ, Lugd.

an idem cum *χίχρυ* Theoph. 3. hist. 7. & Cachry Plinii l. 16. c. 8.

## IX. Pilulæ aquosæ: &amp; Lugd.

*Σφαίρον ὑδατώδης*: super foliis tergo adhærentem pilulam fert candidam, aquosam dum tenera est, in qua culices & maturescens in modum parvæ Gallæ durefcit, Theoph. in folio rubente aquosi nucleï, candicantes & translucidi, &c. Plin.*ὕδατος*, Galeno.

Pilulæ asinina, Trago.

Quercus vulgaris cum suis excrementis suagoli, Lobel.

## IX. Pumex quercinus.

*Αἰδιῶς* pumiceum lapillum quoq; gignit, quam raro: Theoph. aliquando & pumices gignit, Plin.

Pumex, Lugdun.

## X. Quercus excrementum villosum.

*Σπλῆγος*, Diosc.*Φάπτος*, Theoph. 3. hist. 9.

Panos arentes, muscoso villo canos è ramis dependentes, Pinius l. 16. c. 8. vocat.

Sphagnos &amp; Bryon, Plin. l. 12. c. 23.

Splanchnon &amp; Hypnum, Lugd.

Uinea, Arabum.

## XI. Foliorum quercus gemæ foraminulæ.

## XII. Coccus Quercuum.

Coccus cochlearii exilium in similitudine in Ciliæ Quercubus, Diosc. l. 4. c. 48.

## XIII. Verruca seu nodi Quercus.

## XIV. Quercus albumen.

## XV. Uva Quercina.

Uva Quercina à me inventa, quæ nihil præstans in dysentericis etiam deploratis, Encelius l. 3. de lapid. c. 51. vide &amp; Schenck.

Uva Quercina in annosarum Quercuum truncis Thali in Quercu.

an Hypodrys fungus rubens, ad Quercus radices eodem modo quo Hypocistis sub Cisto palustris solet, Solinander consil. sect. 4. consil. 24. &amp; 25.

XVI. Boleti Quercus qui è radicibus &amp; circa radices gignuntur, Plin. l. 16. c. 8.



XVII. Quercinum Agaricum vel Fungus.  
de Boletis & Fungo inter Fungos actum est.

XIIX. Quercus excrementum purgans : &  
Lob.ob.

## VISCUM ARBORUM.

**V**ISCUM licet multis arboribus adnascatur, quia tamen in Quercubus optimum provenit, unde Ton poët. a sudorem Quercus vocavit, idcirco Quercus excrementis illud subungere lubet. Viscum è ἰξῆς Aristoteli 1. gen. an. 1. dicitur, unde Latini Viscum fluxit : ἰξῆς Theoph. 3. hist. 9. & 16. quod nomen commune, at Stelin Euboeicum, Hyphear Arcadium vocabulum esse scribit. Dioscoridi 1. 3. c. 103. ἰξῆς ( sic glutinum quod ex eo fit appellat ) è fructu quodam rotundo, fruticis in Quercu nascentis, foliis buxo similibus conficitur. ἰξῆς quidam derivari dixerunt ab ἰξῶ significante xpaῖς, quasi ἰξῆς à futuro ἰξω.

Genera Visci: Plinius l. 16. c. 44. in abiete ac Larice ( pino Theophr. ) Stelin dicit Euboea, Hyphear Arcadia nasci scribit: Viscum autem in Quercu, Robore, Illice, Pruno syl. Terebintho, nec aliis ( & aliis Theoph. ) arboribus adnasci plerique: vide Theoph. 2. c. 11. 23. & 3. hist. 16. At Dioscoridi l. c. gignitur quoque in malo, pyro & plerisque aliis arboribus: atque etiam apud fruticem quorundam radices reperitur. Quare recentiores observarunt in abiete, acere, butila, castanea, cerro, corylo, cotoneo, cynosbato, Illice, Larice, mespilo, nuce, olea, oxyacantha, oxyedro, pomo, populo nigra, pruno syl. pyro domestica & syl. quercu, robore, rosis, salice, subere, sorbo, terebintho & tilia. Veteres arbutum sunt, Visci acinis à Turdo comestis quod ad pulsam pertinet, concoqui: quod seminis est incoctum ab alvo deijci, fistili, in arboribus illis, in quibus isti quiescere consueverunt. Sed quasi cornua ex ossibus animalium: sic ex arboribus viscum educi, cum Scaligero exerc. 168. credimus.

### I. Viscum baccis albis.

Viscus, Brunf.

Viscū, Trag. Matth. Fuch. Dod. uti Cord. in Diosc. Ang. Tur. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæs. ( qui fruticem dicit ) Clus. Cast. Tab. Ger.

Lignum Visci quercini & Lignū S. Crucis, Gentilis & Jacobus de partibus, vocant.

Quercinum omnes commendat: quidam & quod Castaneæ adnascitur, probant: quod verò malo ac pyro syl. ac domestica, penitus inutile scribunt: & ut Bellonius refert, nulla Quercus est inter mœtem Athon & urbes Ceres & Tricala, quæ Viscum nō alar & à rusticis Oxo nuncupatur: nam tenaciissimum Viscum ex ejus baccis, quemadmodū Rhodienses ex fructu Sebesten conficiunt.

### II. Viscum baccis rubris.

Viscum baccis rubris in oleis circa Hierusalem, Bellon. Cast. Lugd.

Viscū baccis purpureis, in olea, Clus. hist. & hist. qui & Visci oxycedri meminit.

### III. Viscum racemosum.

Viscum polyoccon, Cam. ep.

Hoc à vulgari solum baccarum racematim cohererentium copia differt.

### IV. Viscum latifolium senis circulis utringque insculptis.

Viscum Indicum, Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger.

### V. Visci modo arboribus Indicis adnascens.

Peruviana alia Aloës facie, arboribus innascens

Visci ritu, Ad. Lob. Lugd.

Planta Peruviana Visko similis, Tab.

Viscum Peruvianum, Ger.

## PHELLODRYS.

**Q**uam Φελδρυσ Arcades nuncupant, natura est inter Illicem & Quercum media, atque adeo Illicem femininam quidam esse putaverunt. Theoph. 3. hist. 18. auctore. Dicitur Phellodrys quasi Suberiquercus, nomen ex Subere & Quercu saclo, quod natura utriusque participem esse ostendit. Hac Theoph. l. c. Illice mollior ac subtilior, Quercu durior ac spissior: colore ligni decoricati, candidior Illice, sulvior Quercu: folio similis ambobus, verum majori quam Ilex, minori quam Quercus: fructu Illice minore, at Quercu majore. Plinius lib. 16. c. 8. eandem cum Subere existimasse videtur, ut qui Theophrasti de Phellodrys verba ad Seber transulerit.

### I. Phellodrys candicans latifolia molliter aculeata.

Phellodrys alba latifolia, Lugd.

an Suberella, Cæs. fap.

Phellodrys, Matth. Ad. ( & Ilex femina ) Cast. Lug. Tab.

sub Subere latifolio ramus serratis foliis apud Lob. pingitur.

### II. Phellodrys candicans angustifolia serrata.

Phellodrys alba angustifolia folio serrato, Lugd. Cerroia.

Cerrofugaro Matthioli, Clus. hist.

III. Phellodrys nigricans latifolia incisuris spii.  
Phellodrys nigra latissimis foliis, Lugd.

IV. Phellodrys nigricans angustifolia.

Phellodrys nigra mediocribus foliis, Lugd.

V. Phellodrys foliis muricatis.

Phellodrys foliis muricatis calyce glandis echinato, Lugd.

## S U B E R.

**S**UBER *φύλλος Γρακίς à φύλλοις fluctuo*, Suberis modo, quod aquis semper innatet: qua ratione etiam i. *Isis*. Quod semper altum petat dicitur. Theophrasto 3. hist. 16. arbor est caudicosa, parumq; ramosa, proceratamen, autuq; insignis, ligno robusto, cortice unico crasso, disrumpiq; solito: folio fraxini, crasso, oblongiori & deciduo, humilis glandoso Agria simili: corticem detrahunt, inversumq; dividendum censent: alioqui arboris deteriore efficiunt: rursus vero intra triennium repletur. Plinius 1. 16. c. 6. Suber inter glandiferas recenset: & cap. 8. corticis usum in hyberno seminatorum calceatu: quare non infacetè Græcos, corticis arborem appellasse scribit.

I. Suber latifolium folio deciduo, & Theoph.

Suber, Matth. Lac. Bellon. Cæf.

Phellos sive Suber Gazæ, Ang.

Suber Aquitanicum folio deciduo, Clus. hisp. & hist.

Phellos sive Suber in Aquitania, Dod.

Suber folio brevioris & latioris, Lugd.

II. Suber latifolium perpetuo virens.

Suberifera latifolia Ilex glande echinato, Ad.

Suber Hispanicum latifolium perpetuo virens, Clus. hisp. & hist.

Phellos sive Suber in Hispania, Dod.

Suber latifolia, Lob. Cast. latifolium, Tab. Ger.

Videntur hæc duæ species saltem in eo differre, quod altera, quæ circa Pyrrhenæos montes, foliis hyberno tempore exuatur, quod Theophrast. de *φύλλοις* Pyrrheno scribit: altera vero perpetua fronde in Italia ac Hispania vireat.

III. Suber angustifolium non serratum.

Suber 2. & angustifolium, Matth. Cast. Tab. Ger.

Suberifera angustifolia Ilex, Ad.

Suber folio longioris & angustioris, Lugd.

Suberis latifoliae ramus dexter, apud Lob.

Suber alterum oblongis angustisq; foliis, Clus. hist. IV. Suberi affine lignum fomitis vicem præbens.

Lignorum duo genera Brasiliæ habet, quorum alterum est molliusimum, alterum clarissimum, quibus ad ignem excitandum utuntur hoc modo: virgam ex præduri illius ligni, pedali longitudine ab altera parte ad fusi modum excavant, hujus cuspidem in mollis illius ligni frusto defigunt, virgam maxima celeritate volvunt, quasi ligni suppositi frustum perforaturi, sicque non modò fumus quem Tataton vocant, sed etiam ignis qui illis Tata excitatur, & gossypio, vel foliis siccis admotis, ignis concipitur, Leriis in hist. Brasiliæ c. 17. an Lignum fomitis vicem præbens, Clus. exoc. 1. 1. c. 8.

Ligna in Brasilia quæ Urakuciba vocant, quæ efficcant, dein invicem terunt, ex quo attritu pulvis derafus inflammat. Stadium par. 3. Ind. occid. c. 6.

V. Lignum leve fungosum è Java majore.

Lignum cotis vicem præbens, Clus. l. c.

At Gein. lib. de lapide est, ubi adeo lignum induratur, ut vel Cortes ex eo fiant, aut fieri possint.

## ILEX & SMILAX ARCADUM.

**I**LLEX Diof. 1. 1. c. 144. & Theoph. 3. hist. 16. *φύλλον* quia ferra propter duritiem secanda sit. Est autem Theoph. l. c. folio Quercus sed minore aculeatior: cortice levioris quam Quercus: arbor magna instar Quercus assurgit: materies spissa & robusta: radix alba admodum atque multiplex: fructus glandosus, sed glans ipsa pusilla est: vitem novus occupat, nam sero maturefcit, quamobrem bisera à nonnullis existimata: fert præter glandem granum quiddam puniceum, & viscum atque hypbear habet &c. *Σμυδάριον* Arcades vocant arborem Ilici similem, folio tamen non aculeato, sed molliori profundiori: nec materia ut illo solida spissiq; sed soluta molliq; &c. Theoph. l. c. At Plinio 1. 16. c. 6. Ilicis duo genera: exiis in Italia folio non multum ab oleis distant, Smilacæ à quibusdam Græcis dictæ: in provinciis Aquifolia &c.

I. Ilex oblongo serrato folio.

Ilex, Matth. Ang. Lac. Bellon. Cæf. Lugd.

Ilex arborea, Ad.

Ilex angustifolia, Tab.

Sanè Phellodryn, si faciem & folia perpedas, Ilicem quampiam dixeris: ipsum autem lignum mollius & laxius Ilice, & fructus major quam Ilicis.

II. Ilex folio angusto non serrato.

Smilax

*Smilax humilis angustifolia*, Lugd.

III. *Ilex folio rotundiore, molli, modiceq; sinuato*, sive *Smilax Theophrasti*.

*Ilex major*, Clus. hisp. & hist.

*Ilex major glandifera*, Dod.

*Ilex arbor*, Lob.

*Ilex*, Tab. glandifera, Ger.

*Ilex lacifolia*, Cam.ep.

*Ilicis alterum genus*, Czf.

*Ilex in Gallia Narbonensi*, Lugd.

*Smilax Arcadam glandifera*, Lugd.

Fructu est majore & longiore Hispanica: at Narbonensis minore & brevior.

Huc referri debet

*Ilex Londinensis duplex*, quas Clusius in sua historia descripsit: qui etiam in *Ilice Monspeliaca*, aliquando granum ex puniceo nigricans, & interdum tenue & capillaceum muscum cinereum, è ramis dependente, non verò *Viscum* aut *hyphæar*, observavit.

IV. *Ilex aculeata cocciglandifera*.

*Ilex hæc à Dioscoride* l. 4. c. 48. *κόκκος βακινῆς*, à Theoph. 3. hist. 16. communi nomine *πείθε*: à Plinio l. 16. cap. 6. *Ilex aquifolia*, & cap. 6. *Ilex parva Aquifolia*: à quibusdam *Phellodrys coccifera* appellatur. Est autem Dioscorid. l. c. frutex parvus è cremiorum genere, cui grana cœu lentes adhærent, quæ decerpta reponuntur: hæc ille. Etenim in foliorum supina parte, nonnunquam sed rarius, in furculorum quoque nodis, granum quoddam rotundum, parvum rubens, sanguineo colore plenum infascitur, quod Diosc. & Theophrast. *κόκκος φοινίκης*: Paulanias, Coccum: Plinius, granum, coccum, quiskilium (cuscilium aliqui legunt.) Arabes, Chermes: officinæ granum tinctorium, nam in ipso grano vermiculus nascitur, ex quo Chermesinus conficitur: alii *Scarlatum* vocant: ex hoc quoq; *Monspesuli confectio Alkermes* conficitur.

Coccum insectarium, Math. Lacun. Bellon. cult.

Coccus insectaria, Cord. in Dioscor. Ad. Lobel. Cast. Tab.

Cocci insectarii arbuscula, Lugd.

Granum & coccus Baphica, Ang.

*Ilex in quo coccus baphica*, Bellon. & *Ilex pumila*.

Granum tinctorium, Lon. Czf.

*Ilex minor coccigera*, Dod.

*Ilex coccigera*, Rauwolf. Clus. hispan. & hist. Gerard.

*Ilex coccifera*, Bellon. Cam.ep. Tab.

*Ilex aquifolia*, Lugd.

*Ilicis species*, Fragoso.

*Ilicis alterum genus*, Quiquerano.

Huc referatur ex Anguillara

*Agria* quam Plinius *Aquifoliam* vocitat, quæ foliis est *Ilicis* aliquantulum spinosis, glandemima & quæ in agro Patavino provenit.

an *Milax* sive *Acylaca*, *Ilicis species* Bellon.

V. *Ilex aculeata baccifera folio sinuato*.

Hæc Theoph. 3. hist. 4. *ἀγρία* (*Aquifoliam Gaza* vertit) quam perpetuò virere & in montibus nasci scribit: & Plinio l. 16. c. 21. *Aquifolio*, folia non decidunt, & montes amat.

*Aquifolia*, Trag. Dod. gal. quibusdam *Ruscus* syl.

*Aquifolium*, Ruell. Math. Bellon. Gesl. hor. (quibusdam *Palma aculeata*) Lobel. Cast. Lugdun.

Thal. Tab.

*Agrifolium*, Guiland. (forzè *Cræægus* Theoph.)

Dod. Czf. Cam. Ger.

*Aquifolium* sive *Agrifolium Septentrionis*, Ad.

*Paliurus* 2. Lacun.

*Ilex aquifolia*, Lonic.

an sit *Hedera rigens* Plinii dubitat Czf. alp. at Plinii l. 16. c. 34. hæc sunt: est & rigens *Edera*, quæ sine adminiculo stat, sola omnium generum ob id vocata cissos.

Hæc multis in locis tam pumila, ut ad frutices referenda sit: aliis in locis injustam arborem attollit: hinc apud Tragum,

*Aquifolia arbor*, & *Aquifolia frutex*.

Hæc per ætatem redditur folio nequaquâ simbrato, nec pungente, sed solum extremitate acuminata, & hæc est

*Aquifolii alia species levi folio*, Gesl. hor.

Rustici ex cortice radicibus detracto *Viscum* parant.

HH

SE.

## SECTIO QUINTA.

*TILIA; ULMUS; OSTIRYS seu OSTRIA; BETULA; AL-  
NUS; EVONTMUS; VIBURNUM; POPULUS; GOSSYPIUM  
sive Xylon; Acer; Platanus; Jassias & Ricinus.*

## TILIA.

**T**ilia, Theophr. 3. hist. 10. φιλύρα dicitur, quod in tenuis assulas sive phyliras discerpatur: & inter corticem & lignum, alia tenuis interiores cortices sunt, & veluti membrana, a quibus aliarum quoque arborum cortices interiores, Tilia & Phylira vocantur: quod ex Plinio l. 16. c. 14. & l. 22. cap. 8. colligere est. Theophrasto l. c. altera mas est, altera femina: differunt inter se cum tota forma, tum ligno: & quod mas sterilius est & sine flore: femina, florem & fructum gignit, & c. folium figura Hederae folio simile, verum sensim magis rotundatur, & juxta pediculum id quod velut in gibbum prominet, a folii medio, longiore tractu, in acutum magis cogitur: per ambitum crispata & serrata folia sunt & c. & Plinio l. 16. c. 14. Tilia mas & femina, qua omni modo differunt, & c.

I. Tilia mas foliis Ulmi.

Tilia mas, Brunf. Dod. Lugd. quoad descriptionem, non iconem, quae Ulmi est.

Hæc cum non semper fructum ferat, à quibusdam sterilibus existimatur: interdum siliquas rotundas, cōpressas, coacervatas, cū fissura in summa parte editæ, quarum singulae & singulis petiolis dependent.

II. Tilia montana maximo folio: an mas Theophrasti?

Tilia sylvestris sive montana, Thali.

In monte nostro Mureto provenit, in qua nullum hæcenus fructum observavimus.

III. Tilia femina folio majore.

Tilia femina, Brunf. Matth. Fuch. Ang. Dod. gal. Gef. hor. Ad. Lob. Cæf. Lugd. Tab.

Tilia, Tur. Lac. Lon. Dod. lativa, Trag.

Phylira Græcis, Tilia Latinis, Guil.

Phyllirea, Cast. ico.

Extiliarum cortice funes & ut Bellonius refert, in monte Aeshou etiam lagenæ fiunt.

Mirum profecto quod Plinius l. 17. c. 16. scribit Tiliam juxta Tiburtes conspici omni genere pomorum onustam, alio ramo nucibus, alio baccis aliunde vite, ficis, pyris, punicis, malorumque generibus, sed cui vita brevis fuit.

Ad tiliarum antiquarum radices sæpenumero simile observatur ei, quod ad Quercus radices Uva est, Thaliomonte.

IV. Tilia femina folio minore.

Tilia sylvestris, Trago.

Tilia minor, Gef. hor.

Hæc per omnia minor est, & fronde nigriore.

## ULMUS.

**U**lva Latine ulmus, ὕλη Dioscoridi l. i. c. 111. & Theophr. 3. hist. 14. qui genera duo fecit: unum ὕλην montium Gaze, ulmus montosa, Plinio) alterum ὕλην (ulmus campestris Plinio) interest quod ulmus fruticosior est, montium auctor: folium individuum leviter circumferratum, oblongius quam pyræ, scabro neque laevi: materies flava, robusta, nervosa deformis, quia tota cor est: sterili putatur. At Plinio l. 16. cap. 40. semen ferat latiusculum, rotundum tenue: qui l. 16. c. 17. Ulmi quatuor genera fecit: Græci, inquit, duo ulmi genera notare: mimosa, quæ sit amplior: campestem, quæ fruticosior. Italia Atinia vocat excelsissimam, & ex in siccanæ præfert, quæ non sunt rigua: alterum genus Gallicas: tertium nostras, densiore folio & ab eodem furculo numerosa: quartum sylvestre. Theophr. 3. hist. 8. ulmus mas, ferit & folliculos quosdam: & 8. hist. 8. ἐν καρπῶν (ὡς Dioscoridi) in folliculis gummi gignit & animalia quedam culicibus similia (& ut Dioscorides, humor in dam, exiccatur, in animalicula culicibus similia resoluitur) Nam si ulmus verno tempore pluvius, subitoque calore solis infestetur, ipsius folia protinus corrugantur, & vesica seu folliculi feroti humani figurâ generantur, quibus humor initio lentus, mox in gummi concrevit, ens includitur, qui dum fsecatur in vermiculos, qui cinpes, culices & multos appelluntur, volant. Addit Theophr. Cæbryn (amenta Gaze) etiam edere peculiarem, autumno, multam minutam, nigram. Semen à Plinio Samora vocatur.

I. Ulmus campestris & Theophr.

Ulmus nostras sive Italica, Plinii.

Ulmus vernacula, Columellæ.

Ulmus, Trag. Matth. Dod. ut: Bellon. Lac. Turn.

Cord. in Dios. & hist. Gef. hor. Lon. Ad. Lob. Cæf.

Lugd. Cam. Gluf. hist.

Ulmus

Ulmus in planis proveniens, Ang.

Ulmus 1. Tab. qui & 2. habet, quæ Ulmus, Ger.

Huc referri debet ea, cujus foliis averfa parte folliculi adnascuntur, quæ dicitur

Tilia mas, Matth. Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Carpinus nigra, Cast.

Ulmus aut ei similis cum folliculis, quam aliqui pro Tilia mare offerunt, Dodon.

Notatu omnino dignum quod Clusius observavit, nempe Ulmorum, juxta Thormim amnem in Hispania nascentium, quasdam radices in tenuissima stamina desinere, quæ cum à præterlabentibus aquis perluntur, rubescentem colorem contrahere, in quibus exigua quædam animalcula, exiguis locustis similia nascuntur & laitant, quæ pilcatores in escam capiendis pilcibus colligunt:

quæ verò adolefcunt ex radiculis emergentia, instar terrestrium locustarum avolare: postea certotempore in aquas ad suum genus conservandum remeare. Sic Bellonius ex Ulmi cortice legenas confici scribit.

II. Ulmus montana.

Ulmus latifolia, Trag. Ger.

Ulmus montana, Matth. Ang. Cast.

Ulmus alterum genus, Cord. in Diosc. Cæf.

Ulmus 2. Dod. tertia, Tab.

Ulmus similes arbores.

I. Cortex arboris Ulmo similis ad catarrhos.

Arboris cortex ad rheumatismos, Mon. Lug. (m.)

Arbor vasta Ulmo similis cū amplitudine, tū for-

II. Pacal Indis arbor jam descripta minor, Monard. Lugd.

## OSTRYS sive OSTRYA.

**O**strys, quæ nonnulli βούρα vocant, inquit Theoph. 3. hist. 10. est unica species, Oxyæ (id est Fago, Scissima Gaze) cum satum cortice simile, folio pyri non multo oblongiore, in acutum contractiore & majore, fibræ multæ & crassæ, à medio dorsi in modum costarum rectâ secundum magnam fibræ portæ, in fibræ ipsis rugato & in ambitu leviter serrato: materia dura, decolor, albida: fructu pusillo, oblongo, ordo simili, flavo: radices sublimis habet. Et Plinio l. 15. c. 21. Ostrys quæ & Ostrya, arbor similis Fraxino cortice & ramis, foliis pyri, paulo tamen longioribus, crassioribus, ac rugosis, incisuris, quæ per tota discutuntur: semine hordeo figura simili & odore.

I. Ostrya Ulmo similis fructu in umbilicis foliaceis.

Ornus, Trag. Lon.

Carpinus, Matth. Dod. Ad. Lob. Tab. Cam.

Carpinus alba, Cast.

Ulmus 3. species, fortè Ulmus syl. Plinii, Dod. gal.

Ostrya Cordi, Gein. de lapid. Bellon. Thal.

Ostrys Theoph. Fagulus herbariorum, Clus. hist.

Fagus sepia, Ges. hor.

Ulmus Aetia, Lugd.

Fago similis altera, Cæf.

Betulus, Lob. in icon. Ger.

Carpinus, Matth. quæ Ostrya satis repræsentat, Cæf.

II. Ostrya Ulmo similis fructu racemoso lupulo simili.

Fago similis prima, Cæf. salp.

Hæc Italis, illa Germanis frequens, quam alii ad Ulmum, ad Fagum alii, alii vero ad Carpinum Plinii, q̄ Aceris species est: alii ad Ostryam Theophrasti referunt.

## BETULA.

**B**etula vel Betulla, quæ quibusdam sic dicta videtur, quod bitumine scateat: Theophrasto 3. hist. 14. βούρα. folio est Caryæ (forte Oxyæ) paulo angustiore, cortice versicolore, materia lavi, nec nisi ad baculos utilis: ac Plinio l. 16. c. 18. Betula arbor est Gallica mirabilis candore atq; tenuitate, terribili magistram virgū, (idcirco arborem sapientie appellare consuevimus) &c. Hujus corticis liber albus subest (qui liber Betula) tenuis, candidus, chartæ nostræ modo, cui veteres opera sua, ante chartæ nostræ usum reperiunt, inscribebant.

Betula, Trag. (qui papyri speciem veterum censeat) Matth. Dod. ut: Ang. Bellon. Lon. Ad. Lobel.

Lugd. Cast. Tab. Ger.

Populo albæ similis in alpinis, Cæf.

Hæc sæpè in arborem altam & crassam assurgit: aliquando pumila reperitur: hinc

Betula arbor, &

Betula pumila, Thalia.

## ALNUS.

**A**lnus, quod amne alatur: αλνθα Theoph. 3. b. 14. sterilis est & unius generis, recta arbor natura, ligno molli, medulla tenera, folio pyri sed ampliore nervosioreq; cortice scabro, intus rubese, quo coria tingunt: radice est per summa terra

HH 2

sparsa,

*sparsa, nec major quam Laurus: & 3. hist. 4. tum sterili, tum fructifera florescit. Verum Theophrastum aliquando eas steriles vocat, quæ fructum non conspicuum, aut inutilem ferunt: quidam & cortice & fructu viridi, gallarum vice ad scriptorium aramentum utuntur. Plinium l. 16. c. 24. Alnus folia crassissima tribuit: & cap. 26. nullum semen aut fructum ferre scribit: fortè Aristotelis auctoritate motus, qui inter naturæ miracula retulit quod Alni in folia Creta non sint steriles: sed ne apud nos quidem infructifera sunt.*

I. Alnus rotundifolia glutinosa viridis.

Amedanus, Crecentio.

Alnus, Brunf. Trag. Matth. Ang. Dod. ut: Tur.

Lon. Ad. Lob. Cæf. Cast. Lugd. Thal. Tab.

Alnus vulgo Schlitro in Creta, Bellon.

Alnus vulgaris, Clus. hist.

Ad hujus radices quandoque excrecentiam ramosam, Ulxæ quercinæ similè observavimus. Ex hujus ligno pali in aqua ædificiorum fundamentis subacti lapidescunt, cujus causam Vitruvius refert.

II. Alnus folio oblongo viridi.

III. Alnus folio incano.

Alnus hirsuta, in Matthiolo nostro picta & descripta.

an Alnus altera, Clus. hist. qui figuram ex Lobelii iconibus habet.

IV. Alnus alpina minor.

Hæc cum prima convenit quidem sed per omnia minor & humilior est, nec folia ita lento hu-

more aspera sunt: quæ in Alpibus Austriacis provenit.

*Alnus baccifera.*

I. Alnus nigra baccifera.

Avornus, Crecentio.

Saulbaum, Trag.

Frangula, Matth. Dod. Lugd.

Alnus nigra, Dod. gal. Ad. Lob. Cam. Thal.

Jovis barbæ species. Bellon. cult.

Alnus nigra baccifera, Lugd.

Alnus baccifera, Tab.

Arbor fortida, Lon.

Siler Plinii quibusdam monente, Lugd.

Hæc dum pusilla est in locoq; pingui folia oblonga & magna fert. Cortice interno multi pro Rhabbarbo utuntur.

Sunt qui & hirsutam notant.

II. Alnus nigra pumila Thalii quid?

III. Alnus nigra polycarpus.

Kreugbeer: Lonic.

## EVONYMUS.

*E'vonymus: (Theoph. 3. hist. ult.) arbor, nascitur magnitudine mali punici, atq; folia ejusdem, majorem Vinca pervinca: & molli ut punice: flos odore alba viola similis, odore infestus, fructus cum putamine juxta Sesamiam proximus, intus solidus, præterquam quod in versus quaternos dividitur.*

I. Euonymus vulgaris granis rubentibus.

Fulanus, Crecentio.

Carpinus, Theoph. Trag. Lon.

Euonymus, Matth. Dod. ut: Ang. Tur. Gein. hort.

Ad. Lob. Thal. Cast. Tab.

Anonymos aliis Euonymus, Cord. hist.

Siler Plinii. Cæf.

Tetragonia Theophrasti, Lugd.

Theophrasto 3. hist. 6. *παραγυρία* (Quadratonia Gaza verti) serotino germine cõstat, sicut Thuya & Taxus: hæc Theoph.

Fructu est communiter rubescente: rarius albo.

II. Euonymus granis nigris.

Euonymus alter, Clus. pan. & hist.

Euonymus pannonicus, Tab. Cam.

III. Euonymus latifolius.

Euonymus Pannonicus prior, Clus. pan.

Euon. primus sive latifolius, Eid. hist.

Euonymus latifolius, Tab.

IV. Euonymo similis Ægyptiaca, fructu baccis laurifili.

Bon vel Ban, ex cujus semine Ægyptii potum Canova conficiunt, Alpin. & Palud. notis in Lincoe p. 2. Ind. or. c. 28. sed Choana vocat.

Buncho Avicennæ & Bunca Rhafis ex cujus fructibus Turcæ potionem Chaube parant, Ranzwolf.

Buna ex qua in Alexandria potio fit, Clus. notis in Garz. Lugd. Tab. Belli ep. 4. ad Clus.

Elkarie nonnullis, Pancio.

## VIBURNUM VULGO.

*E'vonymus alicujus singularis planta nomen non sit, sed cujusq; virgulti fructus sive proprium, Straboni & Nemesiano testibus, cum tamen vulgo huic, nomen hoc tribuatur, asserere placuit.*

Alnus

R. *Reiner Maßbaum/Trag. Lon.*

Viburnum, *Math. Ges. hor. Cam. Cast. Lugd.*

Spiraea Theophrasti Dalechampii, *Lugd.*

Viurna vulgi Gallorum & Ruellii, *Lob. Cast.*

Lantana, *Ges. hor.* (quod lenti sint rami) *Guiland.*

*Dod. Cæf.*

Rhus coriariorum Theophrasti & Plinii Cæsali-  
pino videtur.

Rhus (ait Theophr. 3. hist. 18. Fluidam Gaza  
vertit, nomen illi à *ῥήν* positum fuisse existim-  
amus) alia mascula, alia formina, quia alia sterilis,  
alia fructifera: nec virgas longas gerit, neq; cras-

sas: folium Ulmo simile, nisi quod parum oblon-  
gius densumque aliquantulum: ramulorum no-  
vellorum folia paribus internodiis conjugatim  
condita adhærent, & planè à lateribus ordo ver-  
sus conspicitur: flos candidus racematim enas-  
cens: hic ubi defluxit cum labrusca rufescit  
fiuntque ceu lentes tenues congestæ: figura his  
quoq; in modum uvæ, &c. Plinio l. 24. c. 11. Rhus  
frutex est coriarius, subrutilis, cubitalis, crassitu-  
dine digitati, cujus aridis foliis, ut Malicorio co-  
ria perficiuntur, &c. & alibi inter Syriæ arbores,  
Theoph. describit.

## POPULUS.

**P**opuli tria genera Plinius l. 16. c. 23. fecit, albam nigram & Lybicam: Theoph. 3. hist. 4. *λευκή, αἰγύρη & ἡ καρκία*:  
Gaza sic reddidit: primam quidè simpliciter nomine populi, 4. hist. 9. aliquando populi albae 3. hist. 6. Alteram,  
populi nigrae, 2. hist. 3. at 3. hist. 1. voces *λευκή & αἰγύρη*, reddidit populum tam albam quam nigram. Tertiam, al-  
pina nomine: nam 3. hist. 14. ἡ καρκία ἢ παρ' ἡμῶν τῇ λευκῇ, alpina, populo alba non absimilis: quamvis Gaza  
3. hist. 6. ubi habetur *λευκή, αἰγύρη*, vocem posteriorem non reddiderit. Sic apud Dioscoridem lib. 1. cap. 109. & 113.  
*λευκή & αἰγύρη* legitur: ubi interpretes nomen populi addidere.

I. Populus alba (quæ *λευκή* ab albedine dici-  
tur) majoribus foliis.

Populus alba, *Matth. Dod. ut: Cord. in Diosc.* (cui  
& Farfarius antiquorum) *Bello. Lac. Ad. Lob. Cæf.*  
*Cast. Lugd. Tab. Ger.*

Populi albæ alia species, *Trag.*

Populus alba latifolia, *Lob. ico.*

Populi prima species, *Ang.*

Populus alba Arabibus Haur, Rauwolf.

Uvas lanosas quædam fert: quædam sterilis, ut  
etiam non floreat. Dioscorides *φασέων*, id est pi-  
lularū, prima foliorum germinatione erumpen-  
tium meminit. Theoph. 2. caus. 21. *τὴν λευκὴν ἔχει  
γερῶν & φασί* i.e. populum albam in nigrā transire  
ferūt, cum fronde tum etiā tota specie: & 4. caus. 6.  
populus alba in totā nigræ dissimilis, fronde for-  
māq; tota est, sed in senecta similima efficitur.

Muscus quandoq; etiam adnascitur, quem Po-  
puleum muscum Dioscorides & Galenus, un-  
guentis & oleis inferunt.

II. Populus alba foliis minoribus: & *Lob. in ico.*

III. Populus nigra.

Populus alba, *Trag.* (cui & 1. five vulgaris) *Lon.*

Populus nigra, *Math. Dod. ut: Cord. in Diosc.*

*Bellon. Lac. Ad. Lob. Cæf. Cast. Lugd. Tab. Ger.*

Populus secunda, *Ang. Tur.*

Quædā floret, & fructum nō fert: quædam fru-  
ctum fert, & non floret: flos instar amenti, colore  
rubente, aut candicante: fructus, racemulus oblon-

gus ex plurimis granis viridibus compositus, in  
quibus lana candida continetur: nonnunquam  
etiam ramis nodi quidam duri adnascuntur. Ex  
gemmarum (oculorum) viisicō & flavo humo-  
re, Unguetum populeum in Vere paratur. Resina  
*ῥητίνη* ex hac colligitur Dioscoridi, qui & *ῥητίνον*,  
i.e. lachrymam destillatā concrefcere & Electrum  
fieri ex aliorum sententia monet.

IV. Populus tremula.

Populus Lybica Plinio, alpina, Gaza.

Populus nigra, *Trag. Lon.*

Populus Lybica, *Matth. Dod. ut: Bellon. Ad. Lob.*  
*Cast. Lugd. Thal. Tab. Ger.*

Populus alpina, *Bellon.*

Populi 3. species, *Ang. Cord. in Diosc. cui & Tre-*  
*mula Latinorum.*

Populo nigræ similis in alpinis, *Cæf.*

Cercis Theophrasti sive Populus Lybica Plinii,  
*Chuf. hist.*

Hæc *καρκία* Theophrasti volūt, de qua 3. hist. 14.  
ἡ καρκία παρ' ἡμῶν τῇ λευκῇ, sic Gaza, Alpina populo  
albæ non absimilis est, cum magnitudine, cum ve-  
rò quod ramis albicantibus spargitur, folio hede-  
ræ, sed parte altera sine angulo, altera oblongo,  
inque angulum acutum exeunte, colore parte re-  
supina, pronaque ferè simili: pediculo prolixo re-  
nuisque annexo, quare non erecto sed inflexo, cor-  
tice asperiori, quam populus alba, &c. Sunt qui  
*καρκίαν* à crepatu, non *καρκίαν* dicendum censent.

Aliqui Cratzgum Theophrasti volunt, Lobelio monente. Plinio l. 16. c. 23. populus quæ Lybica appellatur, minima folio, ac nigerrima, fungis quæ enascentibus laudatissima.

V. Populus rotundifolia Americana.

Populus novi orbis. Ad. Lob. Cast.

Populus America sive Peruana, Lugd.

Populus Americana, Tab. Ger.

*Populo similes exotica.*

I. Arbor populo similis resinosa.

Focot Guebit, i. e. lignum expetitur, Frag.

Tocot Guebit, i. e. lignum desiderii, Clusius Monar.

## G O S S I P I U M sive X Y L O N.

**V**T Græcè Ξύλον & Γοσσίπιον, ita Latinis Xylon & Gossipium nominatur. At Theophr. 4. hist. 9. & 10. λέγει οὗτον δicitur: in Tylo inquit, insula multa sunt arbores lanigera, quæ folia vitæ habens, verum minus fructum fert in quo lana continetur mali magnitudine, vere nascitur occlusum, quod cum maturum est aperitur & lana excipitur, quæ velas texunt. Plinius l. 2. c. 10. de his arboribus paulo aliter egit: & forte seq. cap. 11. eadem sunt arbores, quæ Gossipinos vocari tradit: qui alias inter lini genera l. 9. c. 1. recensuit, his verbis: frutex quem aliqui Gossipion vocant, plures Xylon & ideo lini inde facta Xylina: parvum est, similemque, barbata nuclei desert fructum, cuius ex interiore bombyce lanugo nescit: nec lini sunt eius candore molliori præferenda.

I. Gossipium frutescens semine albo.

Coto & Bombax, Serapioni.

Xylon sive Gossipium, Matth. Guisl.

Xylon, Fuch. Dod. gal. Gesl. hor. Lac. Lon.

Gossypium, Turn. Dod. Rauwolf. Ad. Lob. Cast.

Cæsl. Lugd. Cam. Tab.

Bombax Officinarium.

Gossipium p. 4. Ind. occid. c. 15. & p. 8.

Algodon, Catoen sive Gossypium in arbusculis tam magnis quam minoribus nascitur: aliud densum & crassum, aliud molle & tractabile, par. 9. Ind. occid. l. 4. c. 23.

Gossipium in sylvarum humilibus arboribus copiose, Lincot. Ind. or. p. 3. c. 9.

II. Gossipium arboreum caule lævi.

Arbor in India occident. ex qua Idola conficiunt sub cuius cortice, gummi Thure candidius, cuius loco etiam utuntur.

II. Arbor popule similis resinosa altera.

Tacamahaca colligitur in nova Hispania ex arbore odorata, magna ut Populus, cuius fructus coloratus ut Præonia est, Monard. Frag. Lugd.

Tacamahaca 9. hist. Ind. occid. l. 4. c. 29.

Gummi Taccamaca ex arbore quæ foliis longis angustis, fructu paucorum magnitudine, 4. par. Ind. orient. 7.

Gossipiū perēne & arboreū, sive Asiaticū, Bellon. Gossipium arboreum, Gotne Mægiar appellatum, Alpin.

III. Gossipium arboreum caule spinosa.

Gossipium Brasiliannum, Bellon. & Belli.

Bombax Indica, Ponz ital.

Xylo, Stadio in Brasil. par. 3. Ind. occ. c. 38.

Xyliferæ arbores, Leriopar. 3. Ind. occ. c. 12.

Hujus semina nigra sunt, in dena vel duodena granorum modo congesta: cum Asiaticum singula grana separata habeat.

IV. Gossipium javanense falcis folio.

Cylz, Oviedo.

Lanifera arbor peregrina, Clus. exot. l. 1. c. 14.

an Lanifera arbor, Bellon.

## A C E R.

**A**CER Græcè σφινδαμ & dicitur. Theophrasto 9. hist. 11. σφινδαμ (Acer Gaza vertit) alii bina, alii tria genera faciunt: unum quod communi nomine σφινδαμ (Acer) vocant: alterum (Carpinus) tertium vero αμυγδαμ (Lestitotriam Gaza) At 3. hist. 4. σφινδαμ quæ in monte Cypri. quæ in pluvio γαλιν (Gallicum Gaza) vocari tradit. Plinio l. 16. c. 10. Aceris plura genera: album, quod precipue candore vocatur Gallicum: alterum genus (Zygias Theoph.) crispum macularum discursu, qui cum excellentior fuerit, à similitudine caudæ pavonis nomine accipit: & viliori genere crassiveniū (clinotrochon Theoph.) Græci situ discernunt: campestre candidum esse, nec crispū, quod glinon vocat: montanum vero, crispū durumque: & tertium Zygiam, & c. quod aliis generis proprii esse volunt & Latine carpinum appellat. Verum sic distinguere licet, quod Spendamnus acer sit nigrum & album: Zygias vero, flavum & crispum: clinotrochus, flavum & non crispū: glinon, candidū, minus crispū.

I. Acer montanum candidum.

Platanus, Trag. Lon.

(Dod. gal.

Aceris species folio majore, Carpinus videtur,

Sycomoros Ruellii, Gesl. hor.

Aceris prima species, Ang.

Acer, Cord. in Diosc. Cæsl.

Acer



Aceris species Platanus Gallorum, Bellon.

Acer major, Cord. hist. Gef. in hort. Dod. Ad. Lob. Cam. ep. Thal.

Acer, *κινερόξος* antiquis, Ad.

Acer latifolia, Clus. pan.

Acer montanum, Gef. hor. five Gallicum, Lugd.

Hujus turiones lacte sciant, ut Ficus: sic quædam floret, quædam non floret, nec fructum fert.

II. Acer montanum flavum sive crispum.

Acer crispamateria, Acer montana Asphendânos

rusticis Cretensis, Bellon.

Aceris altera species, quæ fortè Zygia Theoph. Ad.

Opulus montanus, Lugd.

Acer montanum in marem & feminam distinguunt: mas colore magis flavo, ligno duriore & venosiore, magisq; crispo, citiusq; floret: femina tardius, & ligno est pallidior, minusque crispo. Germani ob flexuosos venarum discursus ad opera lautiora utuntur, lignum nobile vocantes, ex hujus radicibus cochlearia pulchra conficiuntur.

## PLATANUS.

**P**latanus *ἡ δάρυς* Græci, à latè diffusis ramis nomen sortita est: *ἄκτω* enim dilato & speciosum reddo, significat: hujus apud Diosc. l. 1. c. 109. nulla descriptio: at Theoph. l. hist. 16. platanus folia ampla tribuit: & 3. hist. 2. semen manifestum producit: edq; gignitur: quam (l. hist. 15.) in Creta insula apud fontem stare asseverant, quæ nunquam folia deperdat: & Plinius l. 2. c. 1. de Platano multa habet, ostendens quomodo mero assuso enutritur: sicq; & arborescens vino potare: Aelianus scribit (cum adeo patulus ramus diffundatur) Xerxen adeo ipsius umbra delectatum, ut in Lydia diem integrum, cum maximo exercitu sub ea consumpserit.

I. Platanus, Matth. Ang. Dod. ut: Cord. in Dios. Bellon. Gef. hor. Tur. ico. Lac. Ad. Rauwolf. Lob. Cæf. Cast. Lugd. Tab. Clus. hist.

Fructus ipsius *σφακία* Dioscorides, pilulas Plinius l. 2. c. 1. vocat.

Ex hujus truncis orasis montis Athon incolæ

naviculas conficiunt, Bellonio eas describente:

II. Arbor Platani folio fructu peponis magnitudine eduli.

Mamœra ipsa arbor: at fructus Mamaon ab uberius forte similitudine, Lusitanis in America est mas sterilis, femina fructifera, Clus. cur. post.

## SASSAFRAS.

Arbor ex Florida ficulnea folio:

Pavane Indorum, Monardi, Lugd. Frag.

Sassafras arbor, Mohardi, Lugd.

Sassafras, Cast. Capevaccio, cui & Indica Salsitra-

Lignum ex India occidentali, Sassafras vocant, Cæf.

Sassafras, ab indigenis in Virginea; Winauck ap-

pellatum, par. I. Ind. occident.

Ex Florida, novi orbis provincia, adfertur: fructum oblongum, rugosum, longissimis pediculis donatum habet. Hujus folia fructumq; Diosc. Doldius p. m. unâ cum infinitis aliis ad me Norinberga misit.

## RICINUS.

**R**icinus, Dioscoridi lib. 4. cap. 164. *Κινὴ καὶ ῥότον*, à similitudine *Crotæ* vel Ricini animalis, quod semen ejus refert: quod animal, Plinius lib. 11. cap. 34. & lib. 30. cap. 10. descripsit. Alii Pentadactylus & vulgo Palma: Christi, à figura foliorum, quæ palmam digitis expansis emulantur, Mauritani Cerva: Dioscoridi arbutula est ut parva ficus, habens folia Platani, at majora, leviora ac nigriora, ramis radicibusq; cavi barundini modo: semen in uru aspersis. At Plinius l. 15. c. 7. Cici arbor in Aegypto copiosa, & in Hispania repente provenit, altitudine olæ, caulibus foliaceo folio vitum, semine uvarum gravidum, & c. meminit & lib. 5. 22.

I. Ricin-

## I. Ricinus vulgaris.

Granum regium majus, Mesuzo.

Ricinus, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut. Ang. Cord. in Dioscor. & hist. Gesn. hort. Lac. Lon. Adv. Lob. (Gallis Palma Christi) Cæs. Cast. Lugd. Tab. Cici, Gesl. hor.

Kikaion S. Jonæ: Alkaroa & Kerua Arabibus: Mira sole Italij, Guiland. epist.

Ricinus vulgaris, Cam.

Phaselus Romanus Thuscis, Mar. Virgilio.

Ricinus, Kerua Tripoli, Rauwolf.

Cerva aut Cataputia major, Frag.

Ricinus major, Eyst.

Folij lœdit: quare Theophr. i. hist. 16. Crotonis folia initio cum proveniunt, rotunda sunt, deinde in angulos formantur tanquam perfectæ articulata. Ratione loci magnitudine variat: nam hominis crassitudine in Hispania Clusius, & magnas arbores in Creta, Bellonius vidit ut scalis ad motis conscendi debeant: ex quo apud Hispanos oleum conficitur, quod oleum ficus infernalis nominant, Monardi & Fragofo monentibus. Fit etiã in horto Eyfsterensi, mentio Ricini mi-

noris, qui omni ex parte prædicto magnitudine cedit.

II. Ricinus Americanus major semine nigro. Ricinus Americus, Curcas incolis, Clus. notis ad Monard. Lugd. Tab.

Ricinus Syriacus, Cam.

III. Ricinus Americanus minor.

Eraway: ricini pusillum genus, Clus. exot. lib. 2. cap. 21. &

Ricini semina exigua l. 2. c. 25. sub fructu nono.

IV. Ricinus Americanus falso creditus. Dende Serapionis, & Abelmoluch Mauritiorum, Imperato.

Serapioni species tres sunt, Seni, Sahati & Indi: æ Imperator legit, Chinenle, Indianum & Sahatenle, quod minus probatur.

V. Ricino affinis fructus.

Exoticus fructus 4. Clus. ex. l. 2. c. 24.

VI. Curcas Malavarensium: Carpata, Cambayensium, Garziæ: fructus est magnitudine Avellanæ cum suo putamine, candidus, gustu quali sunt tubera cocta: forte Habilculcul Serapioni.

## SECTIO SEXTA.

## Pomiferæ Arbores.

MALUS; MALUS CYDONIA; CITRIA; LIMONIA; ARANTIA; PUNICA; PYRUS; PERSICA; PERSEA; AMYGDALUS; ARMENIACA; Prunus; Myrobalani; Sebesten; Jujube; Cornus; Lotus; Guajacum; Ebenus; Cerasus; Chamæcerasus; Styrax; Aria & Hamomilis; Cotonaster & Chamæesspilus.

## POMUS sive MALUM.

**E**t si Pomi nomen apud Latinos latius pateat, quàm μήλον apud Græcos: attamen usus obtinuit, ut Pomi pro Malo arbore, & Pomum pro Mali fructu capiatur: quamvis Plinius l. 15. c. 17. etiam ipsam arborem Pomum appellat. At Græci, si nullum Adjectivum addatur. Malus μήλα, & Malum μήλον nominatur: derivatur autem μήλον, à verbo μίλω. quod idem atque oporteo. sive curo sollicitusq; sum, denotat: quia de ipsis præsertim mortales solliciti fuerunt cura, seduloq; studio digna judicant: & id forte propter insignem usum alimentarium cibariumq;. Pomum autem, cujus primus inventor Dionysius ab Athenæo statuitur, forte sic dictum quod eorum plurima etiam sitim tollant, ita ut simul sint cibo & potui.

Genera malorum Dioscoridi sunt l. 1. c. 159. & seq. vulgaria, cotonea, persica, armeniaca, medica sive citria, quæ Adjectivo addito distinguuntur. At vulgaria eadem sunt, verna, melimela, epirotica, sylvestria. Sic Theophrastus 6. caus. 24. sunt tam sylvestria quàm urbana: & 4. hist. 15. sunt verna, ex omnibus infirmissima: 1. hist. 19. & 4. hist. 2. malus punica: & 4. hist. 4. malus persica & malus medica. Et Plinius l. 15. c. 14. multa genera enumerat, citria, xilipha, tuberes, & quæ lanata vocantur: in summa genera 29. recenset. Mala inquit habent originem à Martino, Celsioq; & Manlio: item Claudio: quin & Cotonæ, insita ab Appie, Appiana cognominata, ideo his cotoneæ nomen magnitudo quæ Claudianis: sunt & Sceptiana ab inventore Libertino. Cato adjicit Quiriana, & quæ tradit in dolis condita.

condi, Scantiana: sunt parva gratissimi saporis, quæ Petisia nominantur: patrias nobilitavere Camerina & Gracula. Cetera è causis traxere nomen: germanitatis coherentia & Gemella, nunquam singula in fetu, coloris Serica, cognationis Melapia (quod malorum & pyrorum quandam speciem habeant.) Mustea à celeritate mitescendi: quæ nunc Melimela dicuntur à sapore melleo. Orbiculata, à figura orbis in rotunditatem circumacti, quæ Greci epiritica vocant: Mammatarum effigie Orthomastica: à conditione castrati feminis, quæ Spadonia appellant Belgæ. Melosoli folium unum, aliquando & geminum erumpit è latere medio. Celeritè in rugas marcescunt Pannucea: solidè tument Pulmonea: sunt quibus sanguineus est color, origine ex Mori insitu tracta. Sunt & parva gratia saporis atque etiam acutiora odore, sylvestria. Dacii ferme vilissimi nomen, quanquam primis adventu, decerpiti, properantibus: hæc Plinius: & Columella l. 5. c. 10. de malorum generibus egit: sic & Ruellius l. 1. c. 95. & ex eo Lugd. historia, bis Plinii diversas species Gallis familiares adjicit. Nam singula regiones plurimas malorum differentias habent: sic Valerius Cordus in sua historia, supra triginta genera recenser: Tabernamontanus viginti tres figuras habet: & J. Bauhinus frater, in suo de balneo Bollenfi libro sexaginta genera, cum suis figuris & descriptionibus exhibet. Nostris, in primis magnificiunt ea quæ Grumichei id est Prasomila (quæ duplicia, nobiliora & vulgariora) nominantur, quæ colore sunt in viridi pallido, figura oblonga, sapore ex dulci & acido mixto, quæ ferius cruda comeduntur, quare per totam hyemem durantes, egris asservantur, in cibis & medicamentis commendantur, quæ fortè Malactria Ruellii & Lugd. Secundum locum tribuunt illi, quæ Curtipendula vulgo Gallis dicuntur & apud ipsos principatum obtinent, (quæ hodie prime commendationis, ad nobilem Alkermes confectionem, Ad.) Sic in Hetruria præstantissima quæ Apiole & Milerose vulgo appellantur, Matthioli notante. Et Scaligero, ut ex eo Gefnerus lib. de hortis, Mala apiole Italii dicta, quæ dulcia quidem, sed tam jucundè fragrant, ut universas Indias sua suavitate superent. Sed subsisto, quis enim posset in tanta Malorum varietate, nominumq; pro cuiuslibet regionis & rustici placito diversitate, & cum quotidie novo insitionis ingenio, velut nova prodeant, sine errore ea recensere? nec etiam opus est, cum arbores valde similes sint: licet fructus variet, siquidem poma magna sint & exigua: rotunda oblonga: candida, viridia, lutea: quædam rubedinis aliquid, alia multum habeant, & quædam foris tantum, alia & intus, & quidem vel rubris tantum notis, vel lineis oblongis aspersis: sapore quoque alii acido, aquoso, austero, alii dulci: alii in dulci subacido, vel vinoso: alii subacido vinoso: alii inter dulcem & acescentem medio. Sunt denique præcocia, media, serotina. Sic malorum quædam genera, ramis & brachiis suis in latitudinem diduci solent, ita ut recti cuiusdam speciem, pedamentis in orbem digestis, sustentata, præseferant: peculiaria tamen videntur sequentia.

I. Malus pumila, quæ potius frutex quam arbor.

Mala præcocia, Trag. Tab.

Malus humilis, cuius fructus pomum Adami, Gef. hor.

Hæc duplicia rubentia & candida

II. Malus exigua pallidis floribus.

Malus arbor cuius fructus poma nana, Cam.

III. Malus fine semine interius in fructu, Cam.

IV. Malus non florens, fructificans tamen, Gef. hor. ap.

V. Malus folio pyri.

VI. Malus flore pleno.

Poma fl. multiplici seu pleniflora, Eysf.

VII. Mala sylvestria, quæ & alba & rubra: majora & minora.

Mala syl. rubentia, Tab.

Malus syl. rubens, Ger.

Malus syl. major albus, Tab.

Malus syl. alba, Ger.

Malus syl. minor, Tab. Ger.

Arbores pomifera exotica.

I. Malus Maluccensis nonnihil spinosa.

Mala Indica, Acoftæ, Lugd.

Ber, Bor, Garzia, Frag.

In hujus ramis formicæ alarum Laccam conficiunt.

II. Mala Goënsia fructu octangulati pomi vulgaris magnitudine.

Carambolas, Garz. Frag. Acoftæ, Lugd. Lincot. 4. par. Ind. or. 10.

Carambolas, Camarix, Carabelli, Chamarocho, Bolunbac, Palud. in Lincot.

III. Mala Guianensia.

Pinas, quæ totius mundi poma superat, nec ullibi meliora quàm in Gujana, par. 8. Ind. occident.

IV. Mala Americana pyri specie.

Pomi peculiare genus in Nicaragua, nulli alteri India parti concessa, par. 5. Ind. occident. c. 16.

Pomum Nicaragua Bentzoni, Lugd. Clus. exot. l. 2. c. 28.

V. Pomum similis Brasiliiana.



Cotonea magna & Pyra cotonea, Gefhor.  
Mala cotonea oblongiora & majora, Dod.  
Pyra cotonea, Cæf. Pyrum cydonium, Ger.  
Cotonea majora five Struthia, Cam.ep.  
Struthia & Pyra cotonea, Caft.

III. Mala cotonea media.

Mala cotonea milviana five notha, quia proveniunt ex  
Coroneis quæ Struthieis, vel e contra infita fuere, Matth.  
Caft. Lugd.

Cydonia milviana, Tab.

Maiores sunt primis: at fecundis minores.

IV. Malus cotonea fylvestris: & Cord. in Diofc. & hift.  
Hæc fativæ per omnia fimilis, ramis minorib. & fructu  
minore, quod fponfe fua in Danubii petrofis ripis in col-

libus proveniat.

V. Cydonia exotica.

Cydonia è Bengala, Gatz.

Serifolia, Fragof.

Marmelos de Bengala, Caft.

Mala cotonea five Mermelata ex quo fructus quem Ca-  
potes five Chicocapotes nominât, par. 9. Ind. occ. l. 4. c. 25.  
Chicocapotes eadem ferè cum Capotes facie in nova  
Hispania, Idem.

Fructu est coroneo fimili, foliis verò perficæ.

VI. Arbor Indica cydonii facie fructu melonis effigie.

Melo corcopali, Scalig.

Arbor cydoniæ magnitudine & foliis cuius fructus Cor-  
copal, Theveto & Lugd.

## MALUS CITRIA.

**M**alus Citria, Græci *μᾶλα κίτριά*. malus Medica & Assyria dicitur, utroq; nomine à regionibus ducto, ut  
habet Theoph. 4. biff. 4. Etenim Citrus apud Medos & Persas in primis frequens: dein Paladus diligentia in  
Italiam translata fuit: postea in Hispania in usum devenit, ut nemora & campos occupavit: fructus *μᾶλα κίτριά* à  
Theoph. addit Dioscorides l. i. c. 166. ἡ καὶ πόμολα. Latinis citria, citrea & citromela. Folium habet (Theoph.) simile  
& penè equale Adrachne (Portulaca Gaza) aculeos quales pyrus, aut spina acuta, sed tenues & vehementer acu-  
tos & validos. Et Plinio l. 12. c. 3. Malus assyria quam alii vocant Medicam, folium ejus est Medoniu intercurrenti-  
bus spinis: Pomum ipsum (idem & Theoph.) alias non manditur, &c. Malum (Dioscoridi) oblongum est, rugo-  
sum, aureo colore, cum gravitate odoratum: semen habet pyri. Sanè hujus pomis olim non vesciebantur, sed propter  
odorem tantum & medicamenta erat in usu, arbore nimirum adhuc inculta: peramaras & acetosos fructus ferente.

I. Malus medica.

Citrum, Brunf. Citria, Trag.

Citrangula, Monardi.

Citrus, Ang. Tab. Cæf. Ind. or. par. 9. lib. 4. cap. 31.  
arbor, Cord. hift.

Malus medica, Matth. Turn. Lac. Cord. hift. Dod.  
Lob. seu Citria, Eyst.

Malus citria, Dod. gal. Gefn. hor. Lugd. Lon. Caft.

Cluf. hift. Cam. & Ind. occid. p. 3. & Ind. or. p. 3.

Citria & Mala Medica, Bellon.

Citrones, Rauwolf.

Mala citrina & poma citria, Ind. occid. p. 8.

Cedrus Theoph. at Dioscor. Medica malus, five  
Cidromela, Ad.

Fructus magnitudine variant: quædam in mo-  
lem excrescunt Melopeponibus parem, ita ut ad  
pondus librarum decem quandoque perveniant,  
ut Cardanus & Gesnerus notant, quæ nullo fe-  
rè succo sunt, & ex Liguria & Adriatici maris in-  
sulis adferuntur: alia minora: alia Limonum ma-  
gnitudine, aut paulo majora, & à lacu Benaco  
àportantur, quæ potissimum in cibis expetuntur,  
& Pomcires, quasi Poma citri vocari, Lugdun.  
asserit: sic alia prælonga, alia rotundiora. Ete-  
nim hominum industria, translatione, infusione,  
omni denique cultus mangonio, Citria in plures  
formas digessit, ut remissiore sapore & vehemen-

tiore: item dilutiore, saturatioreque colore dif-  
ferant, non multum tamen naturâ & viribus,  
veluti Limonia, Arantia, atque ea quæ Poma  
Adami vulgo nominantur. Quare Monardes  
lib. de Arantiis scribit, Citriorum genera mul-  
tiplicia fuisse infusione: ita ut reperiantur tot ge-  
nera Limonum & alia, quæ nec Citro, nec Li-  
monibus conveniant: quemadmodum Zambos  
Torongas, Limas, Limones, quæ omnia nec præsci  
cognoverunt.

Sic citrum monstrosum maximum, calceum  
Turcicum referentem, in horto Stutgardiano na-  
tum, Joh. Bauhinus in suo lib. de thermis pingit.

II. Malus medica maxima pulpa plurima.

Ponzires, Cæf. qui à citriis melopeponis magni-  
tudine distinguit, & Ponzires inter Limonem &  
Arantiam ambigere scribit.

Hæc gustui non ita placet, sed quia pulpa mul-  
tò plus habent, officinis expetuntur, saccharo vel  
melle asservanda.

III. Malus medica fructu ingenti tuberoso.

Melangua quæ aliis Citrangula, Cæf.

Citrii mali genus quoddam in Provincia, huma-  
ni capitis magnitudine, Cam.

Citranguli nomine volunt Monachi in Mesuen  
cap. de oleo è pomis Citranguli, nō solum Citria,  
sed etiam Arantia & Limonia intelligenda esse.

II 2

IV. Ma-

**I V.** Malus medica ab Imperatore Carolo V. ex Ungaria in Hispaniam delata, quæ omnium mali Medici generum acidorum suavissimum, ut Cinsius in sua hist. refert.

**V.** Malo Medicæ affinis Javanensis folio rotundiore.

Samaca fructus citri magnitudine, acidus, succulentus, granis nigricantibus, Linscot. par. 4. Ind. or. & fig. 14.

*Malus Limonia.*

**I.** Malus Limonia acida.

Malus limonia, Matth. Dod. Lou. Lugd. Cast. Tab. & Ind. occid. p. 3. & orient. par. 3.

Limones, Dod. gal. Cord. in Dios. Bellon. Rauw. Tur. Ad. Lob. Cæf. Cluf. hist. & Ind. occid. p. 9. l. 4. c. 31.

Limon arbor ex citrii genere, Cord. hist.

Tum facie, tum facultate Citria referunt: cujus plures differentia, quædam oblongiores, asperiores, cortice crassiore, Cucumeris aut Melonis effigie, & Limæ Adversar. dicuntur: alii cortice læviore tenuiore, succo acidior. Cordo quadruplex genus, 1. anserini oui forma & magnitudine: 2. minus, globosum, utroque capite veluti umbilico insigne: 3. oui gallinarum figura & quantita-

te: 4. tertio æquale, globosum, superficie æquale.

**II.** Malus Limonia major dulcis.

Limones dulces, Cæf.

Limones dulces oblongis Limis similes, Cluf. hist.

**III.** Malus Limonia minor dulcis.

Limones pusilli dulcissimi in Zeilan, Scaliger, Lugd.

an Limonis genus in Hispania, vix nucis amplitudine, Cæf.

**IV.** Malus Limonia folio serrato, fructu oblongo cortice tenuissimo.

Limas primum genus, Cluf. hist.

**V.** Malus Limonia fructu rotundo orbiculato.

Limas alterum genus, Cluf. hist.

**VI.** Limones prægnantes alium fructum minorem in se continentes, Cluf. hist.

**VII.** Limones variarum figurarum toti sæt carnei, Cluf. hist.

**IX.** Limones citrii mali grandioris magnitudinem æquantes, Cluf. hist.

**IX.** Limomum syl. in Syria provenientium, Scalig. & Lugd. meminere.

Limones sylvestres non majores ovo columbino, circa Cairum, Bellon.

## MALUS ARANTIA.

**A**urantia, fortè à corticis colore, qui colore auri velucet, ut Aurea mala verè nominari possint: sive ab Arantia oppido dicta: veteribus ignota, insitione ad nos devenerunt. Citrus enim arbor, in Aurantio inserta, ad magnam proceritatem pervenit: Arantium verò in Citro, tam humilis, ut Aurantius unius cubiti magnitudinem non excedat.

**I.** Malus Arantia major.

Pomum Arantium, Trag. Eyf. sive Nerantium, Rauwolf.

Aurantia mala, Matth. Lac. Cæf. Lon. Cast. Lugd. Tab. Cam.

Aurea & Arantia mala, Bellon. & Ind. or. part. 1.

Aureum malum, Gesl. hor. Dod. gal. (cui & malû heipericum) Cluf. hist. & Ind. occid. p. 3. & p. 8.

Arangia, Cord. in Diosc.

Arangius sive Citrius arbor, Cord. hist.

Arantia, Tur. Lob.

Malus anarantia, Dod.

Aurantia: nonnullis in locis Indiæ integræ sylvæ sunt arborum aurantia ferentium: in par. 9. Ind. or. l. 4. c. 31.

Genera plura sunt ab insitione prodeuntia: hinc pleraque cortice amaro, crasso, aureo: alia

subvirente: alia cortice tenuissimo, subrubente, medulla dulci: aliqua & cortice dulci: aliqua in uno pomo duo genera horrorum habent: alia absque semine sunt. Sic & pulpæ sapore differant, cum aliis acidis, aliis dulcibus, aliis vinosis, sive media sit.

Sic in regno Congiano habentur, quæ nec dulcia, nec nimis acris: & in insula Fayel, suavissima & sapidiissima: par. 3. Ind. or. c. 7. & in China poma aurea, quæ dulcedine sacchari vincunt, par. 2. Ind. or. c. 25.

Ex floribus aqua elicitur, quam Lanfam vocant.

**II.** Malus Arantia humilis.

Aurea malus pumilio, Cluf. hist.

Poma Aurantia Nana dicta, Eyf.

**III.** Malus Arantia cortice dulci eduli.

Aurantia

Arantia in Indiæ insula Zeilan, cortice dulci & suavi, Scalig. & Lugd. ●

Aurea malus eduli cortice, Clus.hist.

IV. Malus Arantia unico grano.

Aurea malus *αυρομαυροσπορη*, Clus.hist.

*Malo Arantio similes exotica.*

I. Malo Arantio parvis fructibus similis.

Aracinappil Indorum.

II. Arbor peregrina Aurantio simili fructu,

Clus.hist. l. c. 13.

E' Nigritarum regione delata, pulpa fungosa, nonnullis granis ut in ficulneis permixtis.

III. Coru foliis mali aureæ, flore luteo, Acoftæ: at Garzias & Fragosus, & Castor, folia mali perficæ, flores candidos tribuunt, uterque radicis cortices ad ventris profluvia commendat: Lusitanis Herba Malaurua, Castori.

IV. Carcapuli, Acoftæ, Lugd. app. Cast. fructu malo aureo æmulo.

Carcapuli, Linc. 4. par. Ind. or. cui fructus cerasi magnitudine: & fig. 17. iconem exhibet.

V. Guyabo pomifera Indica.

Guyabo arbor, at fructus Guyaba dicitur. Oviedo.

Guajava, Scalig. Lugd. Clus.hist. ap. r.

Guayavas, Monardi, Lugd. ap. Frag.

Guayavos, Gomarz, & par. 4. Ind. occid. cap. 28.

Alia sativa, alia sylvestris: sic alia pomis longiusculis aut rotundis, luteis aut viridibus: pulpa aliis rubra aliis candida.

*Malus Adami.*

Adami pomum vulgo dicitur, quia cortex rimis quibuldam exasperatur, ac si dentibus demorsus esset, quare pomum, quod Adamus in Paradiso degustavit, esse existimant.

Pomum Adami, Matth. Cord. in Diosc. Bellon. (qui à Citriis sive Ponciis distinguit) Rauwolf. Cast. Lugd.

Citrius altera, Cord. hist.

Malus Assyria, Dod. Tab.

Pomum Assyrium, Ad. Lob.

Poma Adami quæ Gallis Ponciis, Clus.hist.

A Limonibus natura & viribus non multum differt, foliis Limonii, floribus Citrii fructu Arantii, sed duplo triplo majore.

## MALUS PUNICA.

**M**alus punica, Græci *βοιά*. Dioscoridi l. c. 151. & Theoph. *βοιά*. quo nomine & fructus donatur. Hippocrates l. 16. de nat. mulieb. *αδύ* appellat. Plinio l. 13. c. 19. Africa circa Carthaginem punicam malum cognomine sibi vendicat, aliqui Granatum appellant. Communiter malum granatum, ab interiorum granorum multitudine: aliis a Granata Hispania regione, quod in ea copiose proveniat. Hanc Theoph. l. hist. 3. sic descripsit: radicem habet brevem & per summa terra adhaerentem: l. hist. 5. caudices multos: l. hist. 8. sed contortiores & breves: l. hist. 14. verum in ramos spargitur & molem superiorem grandioremq; gestat: l. hist. 6. folia angusta sunt: l. hist. 17. fructus ex humore & cute constat: l. hist. 18. & acinos habet: l. hist. 22. verum super fructum ipsum florem insidentem emittit: l. hist. 23. & ex annotinis fructus gignit, &c.

Genera: Dioscorides dulcia acida & vinosa recenset: & Theoph. l. hist. 19. succus acidus est: & 2. hist. 3. & 4. in Aegypto acidam in dulcem quodammodo, aut vinolentiam converti: in Cilicia omnes sine nucleo surgunt, neglecta vero in sylvestrem transit: l. caus. 15. nonnunquam etiam fructum secundum ostendit: 5. caus. 16. & punica dulces magis putrescunt quam acida, &c. Plinius l. c. divisit in genera. Apyrion vocando, cui lignosus nucleus adest: sed candidior ei natura & blandiores sunt acini, minusq; amari distincti membranis: alia structura eorum, ut in saavis. Communium & nucleos habentium quinque species, dulcia, acida, mista, acida, vinosa. Samia & Aegyptia distinguuntur erythrocoxis & leucocoxis: vide & lib. 23. c. 6. Verum cum plures partes huius in usum medicum veniant, nominibus distinctæ, de his pauca.

Flores sativæ punica. *αλυσ* dicuntur Diosc. l. c. 152. & Gal. 6. simplic. at Gal. 6. *αλυσ* τὸ πῶς, Cytinus fructus rudimentum est, quod deciduo flore primum apparet & formatur: qua Celsus, mali punici capitula vocat: & Plinio l. 23. c. 6. primus pomi huius pars ut florere incipientis, Cytinus vocatur Græci: & in hoc ipso Cytino flosculi sunt, antequam scilicet malum ipsum prodeat, erumpentes, quos Balaustia vocari diximus. Verum Balaustia, sylvestris punica flos est Dioscoridi l. c. 154. cujus complura sunt genera, candidum, rutilum & colore roseo: & ex Cytino ac Balaustia, velut ex Hypocistide succus ad eandem efficax elicitur. At officina citra distinctionem Balaustia nominant, quibus Cytinorum appellatio de sativis ignota est.

Mali punici putamen, quod tanquam corium sit, cortice durius, nucis involucrio tenerius, Malicorium vocant, mod Græci, nunc *αδύ* Diosc. l. c. 153. monente, nunc τὸ τῆς βοιάς ἄδύμα, ἀπὸ τῆς ἀδύς dicitur. Marcellus medicus,





I. *Pyrus sativa.*

*Pyrus*, Brunf. Dod. ut: Cord. hist. Gesn. hort. Lon. Cæs. Lugd.

*Pyrus*, Tur.

*Pyrus*, Mat. Ang. Cord. in Diof. Lac. Ad. Lob. Cast.

II. *Pyrophylla*, ad imitationē Plinii l. 15. c. 14.

Malorum genera recensens, *Meliosolia* nominat quibus folium unum aliquando geminum erumpit à latere medio.

*Pyrus* è quorum medio corpore folium exoritur, Dalech. in Plinium, Cam.

III. *Pyrus*, quæ comesta ventrem subducit,

IV. *Pyrus sylvestris.* (Cam.

Αἴχης & ὄχην dicitur: ὄχην quidem à verbo ὄχων strangulare, quod acerbitate sua propemodū strangulat: attamen inter αἴχης & ὄχην sunt qui differentiam faciunt: Achradem pyri speciei quādam facientes ex Dioscoride (ut Cæs.alp. & Lug.) quæ spinis quidem agrestis modo, horrida sit, sed fructu pulcherrimo & optimo: ὄχην verò, spinis armata, omnino syl. fructu pusillo, nec eduli, aliquando mediocrius altitudinis, sæpius humilis arbuscula. Quamvis Αἴχης Aristoteli 8. hist. 6. de pyro syl. & ὄχην, Homero etiam de pyro hortensi dicatur. Deducitur autem αἴχης, ab α privativo & χης, id est, usu: eo quod ejus fructus usus nōdum esse coeperit inter alimenta humani corporis, nisi forte extrema fame urgente.

*Pyraster* Gazæ, αἴχης, Theoph. l. hist. 13.

*Pyrus sylvestris*, Ang.

*Pyrus sylvestris major*, Tab.

*Pyrus* syl. & *pyrus syl.* minima, Tab. Ger.

V. *Pyrus syl.* Cretica.

*Pyrus exigua* à Cretensibus Achlades nominata, à nostris diveria: apud quos aliās *pyrus syl.* Agatuga appellantur, Bellonio.

*Pyrus similes exoticae.*

I. *Pyrus similis ex Guinea.*

Lata, fructus exotici 7. Clus. ex. l. 2. c. 22.

II. *Pyrus similis fructus in nova Hispania nucleo magno.*

Palto arbor cuius fructus benè maturus *pyrus majusculum* refert, qui maturus butyrum æmulatur, in insula S. Dominici: at in Peru grandiores sunt, cute duriuscula: in Mexico minores cute teneriore, par. 9. Ind. occident. l. 4. c. 24.

Melocotones seu *Pyrus Indica* sunt Mameyen, Guyanen, & Palten, Idem.

III. *Pyrus similis fructus alter in nova Hisp.* Annona sive Guanavano pyri magnitudine, pulpa butyri modo, cui grana plurima nigricantia includuntur: Joseph. Acosta l. 4. c. 25.

Mangier blanco est Annona sive Guanavana, p. 9. Ind. occident. l. 4. c. 25.

IV. *Pyrus similis fructus in Virginea.*

Metaguelinaux, fructus pyriformis & magnitudine, impensè foris & intus rosas: par. 1. Ind. occident.

V. Fructus in insula S. Mariæ, *pyrus* majora referens, intus muculentum: par. 3. Ind. or. 10.

## MALUS PERSICA.

**M**alus Persica, Græci περσική ὄβλη: & Persicus, Palladio: & fructus Persicum malum, περσικὸν μήλον, Diosc. l. 1. c. 164. At Theoph. 2. hist. 3. πέρσικον (Persicum Gaza reddit) Aegypti sterile scit: 3. hist. 5. sed aliquando ibi & loci proximi fructificat: quanquam in Rhodō usq. florent duntaxat devenit: sed distinguere oportet à Persica, quemadmodum ex Theoph. 4. hist. 2. colligere est: & Plinius l. 15. cap. 13. apertissime distinguit: falsum est (quod Nicander & Socrates prodidere) venenatam cum cruciatu in Persis gigni: id enim de Persæ diligentiores tradunt, quæ in totum alba est, myxis rubentibus similis, nec extra orientem nasci volunt. & c. semper autem solia habet & poma subnascensibus aliis. Et Rauwolfius commemorat, Persas etiam hodierna die Persæam à Persica errore distinguere, quamvis etiam à Persicorum usu abstineant. Nimrod vencescio infesta & noxia effecta opinantes, Plinius l. 15. c. 13. in totum quidem Persica peregrina etiam Asia Graciāq. esse ex nomine ipso apparet, atq. ex Perside advecta: & max. Persica arborescens & cum difficultate transeunt, ut quæ in Rhodō nihil ferant, quod primum ab Aegypto earum fuerit hospitium: & lib. 16. c. 26. Persica arbores in Rhodō florent tantum.

Genera: Plinio l. 15. c. 12. persicorū palina duracius: nationū habent cognomen Gallica & Asiatica. At Persi: orū differētia plures sunt, quæ magnitudine (siquidē alia majora, alia minora sint) figura, q̄lā orbiculata, rimula quadā latere q̄lā in rotunditate oblonga, Carior cognominata: colore: sapore, dulcia, acida, vinosa, austera, amarifcula: maturationis tempore & ratione usus differūt. Sunt enim alia p̄ocia, alia serotina: p̄ocia, alia sapore mali Armenia: alia admodū dulci & suavi. Serotina alia majora, etiā pugni magnitudine, ut Ungarica: alia minora: majora vel alba, vel flava, vel modico rubore aspersa sunt, quæ Soli spectant, & intus in osu cōtactu, vel buxæ, & q̄d pulpa candida, tu-

*didā, lutea rubea. Sic minora, vel rubra sunt, vel flava. Ratione usus: sic in aliis integer & facile à carne recedit: in aliis à carne separari nequit, & quidem in aliquibus nucleus disruptus, in quibusdam per medium divisus reperitur. Persica Persiani Hel dici, Rauwolfius monet.*

I. Persica molli carne & vulgaris, viridis & alba.

Persicus, Brunt.

Persica arbor & ejus 1. genus, Trag.

Persica, Fuch. Ang. Lac.

Persica malus, Gesl. hor. Ad. Lob. Lugd. Tab. quæ alba, & Ger.

Malus Persica, Dod. ut: Tur.

Persica viridia & alba, Matth. Cast.

Persicus alba & popularis, Lon.

Persica 1. genus, Cæf. & vulgare, Lugd.

II. Persica succo quasi sanguineo.

Persica tertium genus, Trag.

Persica sanguineo succo madentia, Matth.

Persica Ungarica sanguineo succo, Gesl. hor.

Persica in totum saturato colore rubentes, Dod.

Persica Carota, Cast.

Persica rubra, Lon. Tab. sive sanguinea, Cam. ep.

Persica præcocia, Ger. ico.

Hæ duæ species lanatæ sunt, carnem succosam & flaccidam habent, quæ communiter à nucleo tota recedit: & alia sunt magna, alia parva: quædam prorsus viridia, quædam alba: quædam maculis rubris picta: alia carne alba flavescente: alia rubra, ut sanguinolenta videantur: & hæc nucleo est alias foris rubente, alias nigro.

III. Persica dura, carne candida, aliquando ex albo subrubente.

Rhodacina, Ægin. Aëtio.

Persica duracina, Matth. Ang. Bellon. Gesl. hort. Lon. Cast. Cæf. alp.

Persicorum 2. genus sive duracina, Lugd.

Duracina alba, Tab.

Duracina ob carnem duriorem sic nominata, quæ Rhodacina dicta, aut ob odoris suavitatem, aut quod plerumque rubro colore alterna sui parte nitent: aliquando pugni magnitudine, & fructu anguloso, circa os rubente, quod aliquando per medium divisum, aliquando in partes disruptum reperitur, & à nostris Persica moichata dicuntur: Horum ut & sequentium caro dura & nucleo tenacissimè adhæret: quæ aliquando etiam intus saturatè rubet.

IV. Persica dura carne buxæ.

Persica cotonea, Matth. Cast. Lugd.

Persica Ungarica colore aureo, Gesl. hor.

Persica buxæ à Cotoneis denominata, Cæf.

Persica cydoniaria, Tab.

Persica lutea, Ger.

V. Persica æstiva Armeniacis similia, sive

Persica S. Johannis.

Persica 4. genus, Trag.

Persica pumila, Cam.

Persica præcocia, Tab. Persica rubra, Ger.

an Persica minima, Cord. hist.

Saporem pene similem cum Armeniacis habent, sed ex eo genere non esse, nucleus scaber & striatus ostendit, &c.

VI. Nucipersica, quod nucum juglandium faciem repræsentet.

Nucipersica, Matth. Lugd. Cast.

Persica nux, quæ Antipersica Avernæ, Ang.

Persica præcocia, nucipersica, Cæf.

Hæc etiam nulla lanugine pubescunt, & colore & sapore Persica cotonea referunt.

VII. Persica Amygdaloides.

Persica amygdala, Matth. Lugd. Cast.

Amygdalus persico insitus, Gesl. hor.

Amygdalopersicus, Cam.

Pulpa Persici, nucleus Amygdalam dulcè sapit.

*Persica similes exotica.*

I. Persica æstiva in Taprobana.

Arbor Gehnop Indis Cobban, Thev. Lugd.

Fructus est rotundo, in quo nux Avellanæ par, nucleo amaro: gumi ex arbore utilissimum manat.

II. Persica similis putamine villosa.

Magnas. Garz. Cast. Frag. Acoftæ, Linc. p. 4. Ind. or. c. 7. fig. 14. item 5. & 8. par. Ind. orient. Rauwolf. Manga. Scalig.

Manges, par. 7. Ind. orient.

Exoticus fructus 4. Mangas, Clus. ex. l. 2. c. 16.

an Mangenas fructus: par. 5. Ind. orient.

Fructus verò Ambo & Amba vocatur.

Genera ejus plura, aliquando ab una arbore colore diverso prodeunt, subvirides, flavi, & viridi rubentes: sine nucleo ejus generis reperiri Acofta scribit: biferæ meminit Garzias.

III. Mangas aliud genus.

Mangas Recheadas sive Mangas in Achar, Linc. scot. 4. par. Ind. orient. 7.

IV. Mangas fructu venenato.

Mangas syl. aliud genus, Acoftæ, Lugd.

Mangas bravos, Palud. in Linc. scot.

V. Persica



historia. Sic Gesnerus meminit Amygdali nuces rotundas ferentis. Nunc dulces habemus duplices, vel duro, vel molliore putamine.

II. Amygdalus sylvestris.

Amygdalus syl. in sepibus Tripolitanis, Rauwolf.

III. Amygdala Peruana.

Fructus exotici Hispanensis 2. Clus. ex. l. 2. c. 18.

IV. Amygdala Guyanensis, Clus. ex. l. 2. c. 6.

V. Amygdalo similis fructus Peruanus fuscus vel spadiceus, linea candida.

Fructus peregrinus 9. five Pepitas del Peru, id est, acini Peruviani, Clus. ex. l. 2. c. 30.

Fructus peregrinus 9. in tab. 3. Lugd. Tab. Ger.

VI. Amygdalis similis Guatimalensis.

Avellana Mexiocana cujus fructum indigenæ Ca-

cao appellant, quæ Palmarum naturam obtinet, Guiland. pap. (& 17.

Cacavate Bézoni, Lug. Ind. occid. p. 5. vel l. 2. c. 16. Cacao, lof. Acoftæ, vel Ind. occid. p. 9. l. 4. c. 22. Clus. ex. Lug. Tab.

Fructus filiquis inclusus Amygdalarum speciem refert, cujus integræ novæ plenæ ex Guatimala afferuntur, cum hac in nova Hispania mercatores negotiantur, cum ipsis monetæ usum præbeat & elemosynæ ioco pauperibus distribuunt: quare per universam Americam multi usus: imò ex eo potum conficiunt quem Chocolate nuncupant Benzoni, Lugd.

VII. Amygdalis similis cortice spinoso.

Amygdala ex Andes: par. 4. Ind. occid. l. 4. c. 26.

## MALUS ARMENIACA.

**M**alus Armeniaca, *malha armenian*, & fructus *malha armenian*. Dioscorides l. 1. c. 165. Perseus subiungit: *minora quæ armenianæ*, Romanis *παρὰ κρημ* dicuntur: Latini præcocia, quod ante alios sugaces fructus maturescant: nominantur & Præcocia: Galenus inter Persicæ reposit, ut & Plinius l. 15. c. 12. inquit: *post autumnum* (scil. Persica) *maturescunt, æstate præcocia, intra triginta annos reperta, & primo denarius singula venduntur*. Supernatica & Sabinis veniunt: popularia undique: pomum innocuum expetit aegris. Hic verbis Plinium duo Præcocium genera indicare, Dalechampi voluit: alterum Sapernas, amplum & magnum, quod è Sabinorum locis advehebatur, vulgo Armenium majus: alterum vulgare, parvum & strigosum, etiam Armenium dictum.

I. Mala Armeniaca majora.

Armeniaca, Ang. malus, Matth. Lac. Bellonio ab Armeniis dicta.

Armeniaca majora, Cam. Tab. Eyf.

Armen. major Baracocca vulgo, Cz.

Malus Armeniaca major, Matth. ep. Ad. Lugd.

Mala Armeniaca maxima, Geshor.

Hæc mole corporis & suavitate præcellunt, & sapore differunt à minoribus quæ sapore austiore sunt, quæ sine cultura & insitione exigua sunt.

II. Mala Armeniaca majora, nucleo dulci.

Malus Armeniaca candicante nucleo oblongo

dulci ut in Amygdalis, Gesnero.

III. Malus Armeniaca minor.

Præcocia, Brunf. Ang.

Persica minora, Brunf.

Persicus præcox vel Armenia, Ges. ap.

Persici 4. genus, Lon.

Armeniaca minora, Matth. Cam. Tab.

Mal<sup>a</sup> Armeniaca, Dod. at: Tur. Cord. in Diosc. Lo.

Malum Armenium vel præcoquum commune, Ges. hor.

Malus Armeniaca minor, Ad. Lugd.

Armeniaca, Cz. salp.

## P R U N U S.

**P**RUNUS *ροκκινυμδα*. Dioscoridi l. 1. c. 17. 4. nota arbor est, cujus fructus esculentus est. Fructus *ροκκινυμδα* pruna dicuntur. Theoph. 3. hist. 16. folia similia habet Arbutio & Andrachne, arbor parva: 1. hist. 13. semen habet ut ne & nucleo interjacente: 1. hist. 29. succum dilutum: 1. hist. 22. super fructum ipsum florem insidentem emittit: 3. hist. 7. radice numerosa. At 4. hist. 3. est & alia quædam arbor *ροκκινυμδα* magna, fructum ferens similem mespilo, majorem, nucleum habens rotundum &c. Eidem 9. hist. 1. *ροκκινυμδα* (pruno Gaza) humor in lachryma modo gignitur.

Genera: Dioscorides Syriacorum, & eorum quæ Damasci nascuntur, meminit. At Plinio l. 15. c. 13. Prunorum ingens turba versicolor, nigra, candicans: bordeacea appellata: alia eodem colore majora asinina cognominata: sunt & nigra, ac laudatiora cerina atq. purpurea: nec non Armeniaca &c. sic nucibus insita, ab utroque nuciprana appellata, &c. nuper in Bætica malina appellari cæperunt, malis insita, & alia amygdalina, amygdalis: his intus in ligno nucleus amygdala est: in peregrinis arboribus dicta sunt Damascena &c. & pruna omnia post Catonem capisse manifestum est.

Recent.

*Recentioribus, pro diversitate regionum plures sunt differentia, & quidem inexplicabiles, vario cultu & studio inferendi (cum & nuci, & malo, & amygdalo inferantur, quæ faciem parentis, sive cum adoptionis, ut Plinius dicit, exhibet) inventa: nam variant magnitudine, figura, colore, sapore: magnitudine sunt magna, media, parva. Figura, longa, rotunda, acuminata. Colore, alba, viridia, lutea, cæca coloris, rubra, ex punice rubentia, castaneæ coloris, cerulea, ex ceruleo nigricantia. Sapore acida, dulcia, medii saporis, austeriora: sic caro in quibusdam ficior, facile ab offe separabili, aliis humidior & pertinacius adherens. Ita alia alvum solvunt, quæ dulcia: alia eam cohibent, quæ austera & acerba. Sunt carne Pruni & cute subviridi Pruni, sed nucleo Persici quæ Prunopersica, Adversæ.*

I. Prunus, Brunf. Trag. Matth. Dod. ut: Tur. Lon. Cast. Lugd.

Prunus sativa, Fuch. domestica, Lob. Ger.

II. Pruna magna dulcia atrocærulea.

Brabyla, Theocrito.

Pruna Damascena, Trag. Matth. Dod. gal. Cord. in Dioic. Lugd. Ger. del.

Palma datur Damascenis, quæ ex Syria Venetias sicca adferuntur, quæ nucleo sunt longo & plano potius quàm rotundo, Bellonio monente: secunda quæ ex Pannonia (Ungarica quæ etiam Damascena, Cord. in Dioic.) & Transylvania adferuntur, ex Matthiolo Lugdun. at Dodonæus ex Thoma Jordano, Moravica magis ad alvum lenientiam commendat. Pruna Ungarica & Moravica, Cam. quæ

Pruna Brunensis, Clus. hist.

Pruna Ungarica duplicia, majora & oblongiora, alia minora, rotundiora & dulciora, Math. Gesn. hort. Lugd.

III. Pruna parva dulcia atrocærulea: hæc nucleum parvum, non inulto Cerasio majorem habent, & à nostris Damascenula vocantur.

Pruna D. mascena nostratia, Bellon.

IV. Pruna magna crassa siliacida.

Pruna Ungarica præstantissima, Damascena forte, Gesn. hort.

Huc referri possunt Pruna acida in insula S. Clara, Ind. occid. p. 9. additam.

V. Pruna oblonga cærulea.

Prunida styli, Trag.

Prunida styli purpurea & ovata, Lugd. qui Norberdiana & Juliana addit.

Hæc oblonga sunt, nucleo oblongo, aliquantum incurvo, quæ etiam condita Vesuntio, ubi Dastylj vocantur, adferuntur.

VI. Pruna nigra carne dura.

Pruna Iberica & Perrigona vocata, Trag.

Pruna Hispanica, Dod. gal.

Pruna Perdigona, Lugd.

Pruna perniconæ vulgo, Cæsalp. quibus addit

Massiniana, iis grandiora.

VII. Pruna coloris cæcæ ex cædido in luteum pallefcente.

Pruna cerea & Ceriola, Trag. Dod. gal. Lug. Tab.

Pruna cerea, Cord. in Dioic. Gesn. hort.

Pruna amygdalina, Gerico.

Hæc duplicia; præcocia, quæ majora, & serotina, quæ minora. Camer. epit. Reperiuntur quoque magnitudinis ovi gallinæ, aut etiâ anserini, Gesn. hort. sic quæ juxta pediculum in longitudinem extenuantur, ut Damascena & Catelana colore subviridi, Cæf.

IX. Pruna magna rubra rotunda.

Pruna asinina, Trag. (& Pedicularia) Dod. gal. Lugd.

Pruna asinaria, Cæf. quibus addit Gubia ingustabilia.

IX. Pruna rotunda, flava, dulcia, mali amplitudine.

Pruna à malis cognominata, Cæf. salp.

X. Pruna Augusto maturefcentia minora & austeriora.

Pruna Augustana & Albanula, Cæf. salp.

XI. Pruna parva præcocia.

Pruna præcociora, à tempore avenaceæ dicta, Gesn. hort.

Prunus asenaria, Tab.

XII. Pruna parva ex viridi flavescentia.

Pruna parva serotina, cereola, Gesn. hort.

an Pruna viridacia, Gesn. & Verdacea, Cam.

XIII. Pruna amygdalina Plinii

an Coccimelea, Theoph.

Amygdalina pruna, Lob. belg.

XIV. Pruneoli albi, oblongiusculi, acidi.

Pruna Galatensis, sive Perani pruneoli, Clus. pan. & hist.

XV. Pruna ex flavo rufescentia mixti saporis gratissima.

Pruneola quæ Brignolæ in scatulis reposita copiose reperiuntur, Rauwolf.

Pruna de Brignioles dicuntur à loco natali in

Galliis, unde enucleata (nucleo parvo sunt) & exsiccata adferuntur, & in officinis nostris habentur, & tam cruda, quàm cocta comeduntur. Verùm & in hortis nostris habentur.

XVI. Prunus fructu rotundo nigropurpureo dulci.

Prunus cognominata Myrobalanus, Clus. pan. & hist. Cam. Tab. Ger.

Prunus Myrobalanus rotundus, Eyst.

Est majore & minore fructu, hicq; pulpam dulciorem habet.

*Pruno similes exotica.*

I. Pruna Congiana lutea.

Ogegha arbor fructu luteis prunis simili, Pigafetta dec. reg. Congiani: vel Ind. or. par. 1. 2. c. 1. an Lanca fructus in Gilolo prunis cereis similis: par. 8. Ind. or.

II. Prunus Brasiliانا.

Hyuourae Thevero, Clus. in Monardem.

Huourae Brasiliانى, Guajaci species, Lerio par. 3. Ind. occid. c. 12.

III. Pruno similis fructus Chinenfis.

Lechyas fructus prunis similis, 2. part. Ind. orient. c. 25.

IV. Pruno similis ovalis, cortice & nucleo cinereo.

Guayavenfis fructus 2. Clus. ex. 1. 2. c. 6.

V. Pruno similis oblongus spadiceus pulpâ albâ.

Guayavenfis fructus 3. Clus. l. c.

VI. Pruno similis fructus subfuscus ex Guynæ.

Fructus exoticus 1. à Clutio, Clus. ex. 1. 2. c. 23.

VII. Pruni figura fructus Guinenfis.

Fructus exoticus 2. à Clutio, Clus. ex. 1. 2. c. 24.

II X. Pruno cereo similis fructus Africanus.

Ergen arbor foliis myrti, fructu pruni cerei, osse amygdali magnitudine lineis binis distincto: in præfat. par. 1. Ind. or.

IX. Prunus Hiericonthica folio angusto spinoso.

Zaccon, quia in planitie Hierichontis non longè ab ædibus Zacchæi crescit, Cast.

X. Pruna infana spinosa.

Nux infana, ab effectu Prunula infana nautis Belgis, Clus. ex. lib. 2. c. 26.

Fructus prunis nostratibus minoribus similis mē-

tem capiens, 4. par. Ind. orient.

XI. Pruno similis spinosa.

Jangomas, Garz. Frag. Lugd. Linscot. 4. part. Ind. or. 10.

Jangomi, Acoftæ.

Fructus pruni facie, sed loco nuclei granulis turget.

XII. Pruno similis foliis, Laccam ferens: alii ex Sorbi vel Mespili vel Myrti ramis colligi volunt, Garz. Vide inter gummata.

*Prunus sylvestris.*

Prunus sylvestris, Græcis κεκουμυλη. ὄρεια, sive ἀγροκεκουμυλη dicitur, quod rotunditate & magnitudine Cocci, mala ferat; Virgilio 4. Georgic. Spinum dicitur: fructus Dioleorid. 1. 1. cap. 174. ἀγροκεκουμυλην: & Galenus 2. aliment. testatur in Asia αεγύμων appellari, Latine Prunum sylvestr. Prunellum & Prunulum vocant. At Theophrastum 3. histor. 7. αφοδιόδα, vel ut apud Athenæum lib. 2. legitur, αφοδιόδα vocari volunt. Spodias, inquit, velut sylvestris prunus habetur. Et Plinio 1. 15. c. 13. pruna sylv. ubique nasci certum est.

I. Prunus sylvestris.

Prunus sylvestr. Brunf. Matthioli. Fuchsi. Dodon. ut: Tur. Cord. in Dioleorid. Bellon. (cui & Spino) Gesn. hort. Lonic. Ad. Lobel. Cæsalp. Cast. Lugd. Tab.

Prunus sylv. vulgaris, Trag.

Huic peculiare, quod deflorescens, simul ac imbres contigerint, fructus in oblongum & inane corpus convertitur, quos Itali Turcas vocant, Cæsalpino & Camerario monentibus.

Fructus alii sunt magni, alii exigui, nonnulli rotundi, quidam oblongi: cujus succus pro Acacia usurpatur, unde stirpi Acaciæ Germanicæ nomen factum.

II. Pruna sylv. præcocia.

Pruni sylv. altera species, Trag.

Hæc majora sunt & Augusto maturantur, quare Germanis Haberschleben, reliqua Schleben simpliciter nominantur.

In sylvestri lativaque pruno reperitur limus arborum, quem Græci Lichena appellant, Plinius lib. 23. cap. 7. at Dioleorides Gummi vocat. Muscum qui innascitur, Chirurghi nostri magnificiunt.

## MYROBALANI.

**M**Yrobalani, qui veteribus Græcis incogniti fuerunt (quâvis Bellonius Chrysobalanos Galeni velint) ab Arabibus vero inventi, & ex recentioribus Græcis, Aëtuario cogniti: hos Avicenna, generis nomine Dilegi, & Serapio Hartileg donavit: quorum interpretes, cum viderent quodammodo ad glandis formam accedere, improprie Myrobalanos verterunt. Officini Myrobalani & Myrabulani.

Genera quinque sunt, quæ Aëtuario *μυροβάλανος* & *ἐραδὲ*: καβάλαν: ἰνδία ἢ δαμοσίνια: ἰνδαμνῆ: βαλεππὶ & dicuntur: & arborum genera quinque, diversa, quæ in regionibus sexaginta aut centum leucis à se distantibus nascuntur, Garzia monente, quæ Pruni magnitudine sunt & omnes sponte nascuntur. Myrobalanos ex Palmarum genere esse, Cæsalpinus censet. At Cordus scribit Arabibus recentioribus tres tantum cognitæ fuisse, Indas, Chebulas & Citrinas, quæ ab una eademque arbore desumantur: Belliricas ex peculiari arbore esse: & Emblicas peculiare genus dicit. Arabes fructibus Saccharo conditi utuntur, & Chebulorum major est gloria: & ad nos duo potissimum genera cõdita adferuntur, Chepula sive Kebula & Bellerica. At Clus. in Garziam, Chepula rarior ad nos adferuntur. & non nisi dura & male condita: Emblica vero copiosè recentissima & optimè condita. Sed de Myrobalanis inter Indicos scriptores consule Garziam, Acoftam, Fragosum.

I. Myrobalani maximi oblongi angulosi pituitam purgantes.

Arabibus Quebolia & Quebulgi.

Myrob. Cepula, Mesii. Clus. in cor. Chepulæ, Aëtuario, Matth. Garz. Ad. Lob. Lugd.

Myrobalani Chebuli, Lac. Cord. hist. Gefn. Lon. Cæs. Cast.

Myrobalani Chebulæ, Tab. Ger.

Myrob. Chebuli vel Quebuli, Indis Aretan: Linscot. 4. par. Ind. or. 38. qui tab. 16. sub Mirambolan majore quæ alias Aretica vocetur, figurâ exhibet.

Arboris folia Persicæ similia.

II. Myrobalani teretes citrini bilem purgâtes.

Myrob. lutei, Aëtuar. flavæ, Garz. Lob. Lug. flavæ, Matth. & lutea, Clus. in cor.

Myrob. citrea, Mesicitrini, Cord. histor. Lac. Lon. Ad. Cast. Ger.

Arabibus Azafar.

Myrob. flavæ, citrinæ, luteæ, Tab.

Myrobalani citrini, Bellon. Cæsan Chrysobalanum Atclepiadis.

Myrobalani citrini, Indis Arare, Linscot. 4. par. Ind. orient. 38.

Arbor Sorbi folio.

III. Myrobalani rotundæ belliricæ.

Arabibus Bellerégi: bellileg: bellegu.

Myrob. belliricæ, Matth. Cord. hist. Clus. in cor. Garz. Ad. Lob. Lugd. Tabern. Ger. bellirici, Lon. Cast. bellerici, Lac.

Myrob. bellerici Gallæ modo rotundi, Cæs.

Myrobalanus belliricus, Cord. in Dioic. qui an Acacalis sit bellericus, vel emblicus dubitat.

Myrob. Bellirici, Indis Guti, Linscot. 4. par. Ind. orient. 38.

Arbor est foliis laurinis subcinericeis.

IV. Myrobalani nigra octangulares.

Arabibus Afiar.

Myrob. nigra, Aëtuario, Mesii. nigri, Ad.

Myrob. Inda & Damafonia & nigra, Clus. in cor.

Myrob. Indicæ, Lob. Tab. Ger. seu nigra, Matth. Lon. Garz. Lugd.

Myrob. Indi, Cord. hist. Lac. Cast. Cæs. qui addit: nullo intus nucleo (quemadmodum & lequêtes) manifesto.

Myrob. Indici, Indis Resonalle, Linscot. 3. part. Ind. or. c. 38. (no.

Arbor foliis est Salici similibus, fructu octogono.

V. Myrobalani Emblicæ.

Arabibus Embelgi: Embleg: Ambegi.

Myrob. de Seni, Serapioni: Senitica: Avicennæ.

Myrob. Empelica, Matth. empelica seu emblica, Clus. in corol.

Myrob. emblici, Lac. Cord. histor. Lon. Ad. Cast.

Cæs. qui addit, figura parvi mali, sed in parva fragmenta dissecti.

Myrob. emblicæ, Lob. Lugd. (qui inquit potius fragmenta esse, quam integra pruna, quadantenus triangula) Tab. Ger.

Myrob. Emblici Indis Amuate, Linscot. 4. part. Ind. or. 37.

Arbor est palmæ magnitudine, foliis minutim incisilis & nonnulli fructu minimo nascuntur.

Duo posteriora genera Phenicobalanos dici posse Cæsalpinus existimat: siquidem nullo intus ligno spectentur, & cum maturi sunt, nigrescant, ut Plinius l. 12. c. 22. testatur. Qui autem os intus habeant ad Thebaicos & Arabicos Myrobalanos reducendos: de iis enim Plinius, in totum arentes

Thebaides & Arabicæ macro corpore, exiles & aësiduo vapore torrentes, crustam veriùs quam cutem obducunt.

VI. Myrobalanis flavis similis fructus.

Hovos fructus in nova Hispania, Gomara, & Clusius in Garz. Fragofo.

Hobus sive Hovus, Benzoni par. 4. Ind. occid. c. 28. & Oviedo.

*Fructus Myrobalano similes.*

I. Fructus Myrob. oſiculo ſimilis niger acerb.  
Fructus minor 10. Paludani, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

II. Fructus ſiſcuſ erratus Myrobalani forma.  
Fructus 11. Gareti, Cluſ. ex. l. 2. c. 16.

III. Fructus Myrobalani nigri oſiculo ſimilis, nucleo ſubſiſco.

Fructus 10. è navigat. Barav. Cluſ. ex. l. 2. c. 15.

## PRUNUS SEBESTEN.

**P**runus Sebesten à Dioſcoride & Galeno præteritur: at Aegineta, Aëtius & Aſſurnarius frequenter meminere. Dicitur ωζα: fructus verò ωζα. μωξα, ωζαδεα: a pom. mucoso lentore: Græci enim mucum μωξ & ωζα Arabibus & officiis Sebesten. Plinius l. 15. c. 13. ſimul dici poſſunt populares eorum Myxa, qua & ipſa nunc caput Romæ naſci iſta Sorbi: & l. 13. c. 5. pruna in Damasco monte nata, & Myxa: utrumq; jam familiare Italia: ex Myx in Aegypto & vina facta.

I. Sebestena domeſtica: an δμωαζις Athenæo.

Sebesten, Trag. Lac. Bellon. Rauwolf. domeſtica, Alpino.

Prunus Sebestena, Matth. Lugd.

Myxa vel Sebaſta, Cord. hiſt.

Sebestena, Geſ. hor. Caſt.

Myxa, Dod. Ad. Lob. Cæſalp.

Sebesten, Myxa ſive Myxaria, Tab. Ger.

Myxos arbor, ſive Sebestena noſtra, Lugd.

Diſert à ſequenti foliis latioribus & craſſioribus: fructu majore, perfectione & meliore.

II. Sebestena ſylveſtris.

Sebesten ſylveſtris, Alpino.

## ZIZIPHUS seu JUJUBE.

**A**rbor, Ziziphus Columella l. 9. c. 4. dicitur: fructus verò Græcis recentioribus, ut Aſſurnario & Simeoni Sebestena. ζιζιφα, & ζιζιφα Latinis Zizypha: officiis Jujube. Sunt qui ζιζιφα Galeni 2. alim. eſſe vident, & quidem primus Serapio: at Guiland. in ſuo Theone, Zizypha & Serica diſtinguit. aliqui Tuberum genus, a colore Sericum, cognominatum, Plinii l. 15. c. 14. cum tamen Plinius a Ziziphis diſtingerit. inquit enim, æque peregrina eſſe Zizypha & Tuberes, qua & ipſa non pridem venerint in Italiam: hæc ex Africa, illa ex Syria: & lib. 17. c. 18. Zizyphas grano ſeruntur menſe Aprilis: Aliis Paliurus Africanus & Lotus ſecundus Polybii, Lobelio: Paliurus Theophaſed non Africanus ſorte Paliurus Dioſcoridis & Plinii, Cæſalpino.

I. Jujubæ majores oblongæ.

Jujubæ, Trag. Cord. hiſt. Lon. Ad. Cæſ. Tab.

Jujubæ domeſticæ: quas Lotum Athenæi, Lotum in Pharide Theoph. & Lotum oſſeum Plinii Anguillara ſuſpicatur.

Jujuba Paliurum Africanum Theoph. eſſe propemodum certus ſum: Lotus Homeri 9. Odyſſ. Guil. l. c.

Jujubæ Arabum, Lob.

Zizypha, Matth. Lac. Caſt.

Zizyphus, Dod. ut: Geſ. hor. rutila, Bellon. (Græcis vulgo Zizyphia, Cluſ. hiſt. & hiſp.

Zizyphus punicea, Lugd. rubra, Cam. Rauwolf.

Jujubæ, Zinziphia Cretenſibus, Bellon.

II. Jujuba ſylveſtris.

Jujubæ & Paliurus 2. Theoph. Ang. Ad.

Zizyphus ſylveſtris, Cam.

Zizypha, Caſt. ap.

III. Jujubæ minores rotundæ.

Jujubæ minores. Tuberes Plinio, Cord. hiſt.

IV. Jujuba Indica: folia huius ſubrotunda, ut vulgaris venoſa, ſeſquiunciam lata, duas longæ, marginem crenis exaſperata parte averſa, mollioreſcente lanugine teſta: hæc Boræ nomine, cum ejuſdem ramulo cui Lacca adnata erat, ex India Reverend. D. Terentius miſit.

## CORNUS.

**C**ornæ Latinis Cornus, Dioſcoridis l. 1. c. 172. κωνία arbor ſortis. fructum ſerens olivæ modo oblongum. primo viridem, maturum verò flavum, aut cereum, eſculentum. Theoph. 2. hiſt. 12. & 5. hiſt. 5. κωνία, quedam quædam



quædam semina, quam *Ἀμυγδαλίς* vocant: folium habet *Amygdala* (alii male legunt) nisi quod pinguis crassiusq; corticem nervosum, & tenuem, caudicem non nimis crassum: semina virgas parvas, &c. Macedones ambas fructificare asserunt: sed semina fructum ingustabilem esse, &c. Plinio l. 16. c. 26. Cornus circa Solstitia, reddit primo candidi, postea sanguinei: ex eo genere semina post Autumni fert baccas acerbæ & ingustabiles cūctis animaribus: ligno quoq; fungosa, inutili, cum mas & fortissimis quoq; sit: ita differentia ab eodẽ genere fit: vide & l. 15. c. 24. & 26.

## I. Cornus hortensis mas.

Cornus, Brunf. Trag. Matth. Ang. Lac. Lon. Dod. Ad. Lob. Cæf.

Cornus mas, Dod. gal. Bellon. Gef. hor. Tur. Lug. Tabern.

Cornus sativa & mas, Cord. in Diofco.

Cornus vulgaris mas, Clus. hist.

Fructus maturus colore variat; nam communiter rubet, & ossiculo longiore est: aliquando ceræ colore: rarius albet: saturatius etiam rubet, ossiculumq; habet crassius & brevius; & hoc est Corni maris aliud genus, Clus. hist.

## II. Cornus sylvestris mas.

an Cornus femina, Cord. hist.

Cornus sylvestris, Cam.

Cornus mas pumilio, Clus. hist.

Hic in sylvestribus Thuringæ & Austriæ inferioris provenit, solum frutescit, sed cultura in arboream pulchram exurgit: fructus dulciores

sunt, quàm urbanæ, Hermolao, & plerunque etiam majores, Camerario monente.

## III. Cornus femina.

*Ἀμυγδαλίς* Theophr. quibusdam *Ἰδὲρπρία* id est, falsa Cornus: Cornus femina, Plinio: quibusdam Virga sanguinea ejusdem, l. 24. c. 10. at nullas notas addidit.

Ligustrum, Brunf. ico.

Hartriegel / Trag.

Virga sanguinea, Matt. Ruell. Gef. hor. Dod. Cæf.

Cornus femina, Dod. gal. & (Opulus Columellæ) Tur. Gef. hor. Ad. Lob. Thal. Lugd. Tab.

Cornus femina veteribus Macedonibus, Sanguineus frutex Gallis, Bellon.

Pseudocrania, Cord. hist. ico.

Sanguen vulgo, Cæf.

Sanguis & lingua sanguinea, Cast.

Ostea, Lon. Cast.

Cornus sylvestris, Lon.

## L O T U S.

**L**otus arbor triplex est Dalechampia in Plinium: prima quæ *λωτὸς Ἰνδῶν* Dioscoridi l. 1. c. 171. quam dicit stirpem bene magnam, fructum ferre pipere majorem, dulcem, edulem, stomacho aptum. Et Theoph. 4. hist. 4. *λωτὸς* (Celtis Gaza) magnitudine quam a pyrus, aut paulo minore, folium incisuræ habet, ut Ilex, cujus genera plura fructibus inter se discreta traduntur, &c. Plinio l. 13. c. 17. arbori Loto quam Celtis vocant, magnitudo quæ pyri, folio ilicis, fructu dulci, nunc exosse, nunc durum nucleum ambiente, colorem uve modo mutante, cum maturefcit, è quo vinum exprimitur. Arbor Syrtica eidem l. 24. c. 2. Altera *Ἰδὲρπρία* Theoph. l. 3. c. 13. (Jovis flamma Gaza) quam improprie Loton vocant, ob fructus dulcedinem Ceraso similem, nucleo duro: & Plinio l. 16. c. 30. lotos sive suba Græca &c. & l. 24. c. 2. Tertia, quæ Theophrasto secunda, quæ *Λαυτοκράσις* quibusdam: quæ sententia Clusio non placet. Addi potest quarta, ipsius Polybi apud Athenæum l. 14. Sunt qui Guajacanam, Tuberum alterum genus Plinii, quorum inter Mala meminit, velint.

## I. Lotus fructu Cerasi.

(Dod. Cast,

Lotus, Matt. Ang. (& arbor del perlaro) Lac. Lon.

Lotus arbor, Bellon. (Cacavia Cretensibus) Gef.

hor. Ad. Lob. Cæf. Cam.

Lotus arbor sive Celtis, Tur.

Lotus Celtis arbor, Lugd.

Lotus domestica, Cast. app.

Bagosarus Tridentinis, Guil.

## II. Lotus Africana latifolia.

Diospyros, Theophrasti.

Lotus sive Faba Græca, Plinio.

Lotus Africana altera, Matth.

Guajacum Patavinum Fallopio, Gefn. hort. Ad.

Lob. (& Lotus vera Theophrasti) Ger.

Guajacum, Cord. hist. icon. Lon. ico.

Guaicana, Bellon. cult. Eyf. vulgo, Cam.

Ermellinus, Cæfalp. qui Tuberum alterum genus

Plinii suspicatur.

Diospyros sive Faba Græca latifolia, Lugd.

Pseudolotus Matthioli, Tab.

Variat: nam in fructu Patavii, semina bina aut terna plana & spadicei coloris observavimus: at quæ Viennæ & Bononiæ coluntur, etiam ex semine Italico natæ, fructus semine expertes, sola pulpa constare, Clus. in sua hist. notavit.

## III. Lotus Africana angustifolia sive femina.

Pieu-

Pseudolotus, Matth. Cam. Tab.  
 Diospyros live Faba Græca angustifolia, Lugd.  
 Lotus Africana, Tab.  
 Ziziphus Cappadocica, Ger. ico.

IV. Loti Africanæ similis Indica.  
 Indica Occidua palmæ sanctæ similis arbor, Ad.  
 Lob. ico.  
 Palmæ sanctæ similis arbor, Lugd.

## LIGNUM GUAJACUM.

**G**uajacan nomen est Indicum, quod nunc Guayaci sive Gajaci nomine, per universum orbem cognitum est, quod alii Ebenum esse dicunt. à quo sola summa nigredine disidere videtur: quæ in Ebena summo splendore nigricat: in illo verò albescent: alii Buxi speciem: Sed novum est arboris genus, quod ex America, sive India occidentali affertur. Duplex est, magna matrice & propomodum sine matrice: non tamen diversarum arborum lignum esse censemus.

### I. Guajacum magna matrice.

Guayacan lignum Indicum ex Insula S. Domini-  
 ci, Monardi, Lugd. & par. 4. Ind. occid. 29. sive li-  
 gnum sanctum, par. 9. Ind. occid. 1. 3. c. 22.

Guajaci 1. genus, Monardo & Matth.

Guajacum, Bellon. Ad. Cæf.

Gayco & Gayacan, palus Indicæ Hispaniæ, Frag.

### II. Guajacum propomodum sine matrice.

Guayacan genus alterum, quod lignum sanctum,  
 illo præstantius, & ex insula S. Johannis de portu  
 divite affertur, quo maximè utuntur, Monard.  
 Lugd.

Guajacum, Lac. Cord. in Diosc. & hist.

Palma aut palus sanctus Indicæ Occidua, Penz.

Guajaci 3. genus, Monardo & Matth.

Guajaci alterum genus, Cæf.

Hoc in plura genera ab aliquibus dividitur, eò  
 quod non unum colorem habeat: quoddam enim  
 nigricat: quoddam etiam spadicæo colore flave-  
 scit: quoddam præterea omnes istos colores dis-  
 cretos habet: Quare Manardus & ex eo Matthio-  
 lus, tria genera notarunt, quæ licet colore, magni-  
 tudine & pondere inter se discrepent, unius tamen

esse arboris, contra quàm Fallopius credidit, Mat-  
 thiolus statuit, & causam refert in ligni maturitatè,  
 quò enim maturius, eò nigrius, & quò minus  
 adoleverit, tantò magis albicare asserit: probatur  
 maximè, quod ruffum, spadicæum flavum, livi-  
 dumque colores simul mixtos habet.

### III. Guajacum foliis lentisci.

Guajacum cujus ramulum cum floribus & fructu  
 pingit Clus. notis ad Monardem.

Lignum Ebenum sive Guajacum in insula S. He-  
 lenæ, par. 1. Ind. or. c. 1.

Fructus (quos copiosè cum suo gummi, Amstel-  
 rodano à D. Hofst accepimus) variant, nonnulli  
 loculamentis sunt geminis, quorum alterum ple-  
 num, alterum inane: alii tribus, in quibus ossicula  
 dura, longiuscula.

### IV. Guajacum Orientale.

Palma aut Palus sanctum, Ad.

Guajacum foliis plantaginis, Cæf. Alp. Frag.

Lignum sanctum, Cast.

### V. Guajaco viribus similis Indica.

Maggai, Indi morbum Gallicum curant, ejus sus-  
 simigio sudores movendo, Fragosus.

## E B E N U S.

**E**benus, Græcis Ἐβένος. duplex Dioscoridi l. 1. c. 129. Aethiopica nigra, venarum: pectinatumve expers, cornu elabo-  
 rato levore similis, &c. Altera Indica, lineis candidis & sulsis intercurrentibus, idemq; maculis prædita.  
 Theoph. 4. hist. 5. Ebenus India peculiaris est: cuius duo sunt genera, unum laudata materie pulchrumq;, alterum igno-  
 bile, &c. Plinio l. 12. c. 4. Hebenus rara arbor, Neroni principi allata, quam nullam aliam nisi palmæ marum generis esse  
 docuerint, cuius duo genera esse scribit: & l. 16. c. 40. spississima ex omni materie, ideo & gravissima prædicatur: quæ ne-  
 que cariem neque vetustatem sentit: quæ ut idem l. 6. c. 30. Aethiopia sylva meridiano cardine maximè virent.

I. Ebenus Theveto in Indicæ insula Palmobo-  
 tere præstantissima & nigra, & in 9. par. Ind. oc-  
 cid. 1. 3. c. 22. in Hispaniola.

Ebenus, Matth. Cord. in Diosc. Cæf. Alp.

Hebenum sive Xyloaloes officin. Ad.

Eben<sup>9</sup>, Lug. qui vult officinas pro Xyloaloes habe-

Valer. Cordus in Diosc. scribit, quosdam Gu-  
 jacum lignum, Ebenum esse contendere: & Pen-  
 censet officinarum Ebenum, speciem Guayaci esse.  
 Ebenus, Castori, qui eandem figuram habet, quæ  
 pro Ligno sancto posuit.

Ex hac in Italia sphaerulæ precatoriæ conficiuntur.

II. L.

II. Lignum pice ferè nigrius & polito ebore  
lavius: arbor crasso cortice vestita, in cuius inti-  
mis Ebenus clauditur: ejusdem generis ligna ru-

bentia, & alia ceræ modo flaventia reperiuntur: in  
insula Mauritanica, 5. par. Ind. or.  
Ebenum picis modo nigrum, 4. par. Ind. or.

## LIGNA DURISSIMA FERRI DURI- tiem æmulantia.

### I. Ebenus Indica.

Lignum de Mangles, ex quo navium malos & an-  
tennas, ferri duritiem æmulantes, condunt: par. 9.  
Ind. occid. l. 4. c. 30.

an Lignum de Cochi, quod ejusdem cum ferro  
ponderis, ex quo anchoras conficiunt, & à Lusita-  
nis Paio di ferro, h. e. lignum ferreum vocatur:  
par. 7. Ind. or. c. 44.

II. Lignum Teixo dictum, adeo durum ut  
ferrum æquet, in Pico insula, quod valde pre-  
tiosum & utile, interius coccinum undulatum  
expressissimè referens, ex quo instrumenta fiunt,

Linfcot part. 3. Ind. orient. cap. 6.

III. Angelina arbor apud Cacinum, ex cu-  
jus continuo trunco naves Tonas vocatas ex-  
truunt tam grandes, ut unâ 20. vel 30. dolia aqua-  
tica vehi possint, cuius lignum adeo durum ut fer-  
rum atterat, Linfcot. par. 4. Ind. orient. c. 14. & par.  
7. cap. 27.

an arbor cujus pars ima crassitie 24. orgyarum  
in Guineæ insula Formosa: par. 6. Ind. oriental.  
cap. 4.

an Angelina arbor, cujus solum nomen apud A-  
costam, cap. de ligno colabrino.

## C E R A S U S.

**C**erasus vocatur Theoph. 3. hist. 13. fructus xerōn. Dioscoridi l. 1. c. 157. Cerasia & Cerasa. Dicitur autem à Ce-  
rasus fapor: principatus duracini, quæ Pliniana Campania appellatur: in tipis etiam Rheni: tertius in color è nigro ac  
rubenti viridiz, similis maturiscentis semper. Minus quinquennio est, quod prodere quæ vocant Laureæ, non ingrata  
amaritudinis insita in Lauro. Sunt & Macedonica parva arboris, raroq; tria cubia excedentis: & minore etiamnum  
frutice Chamaecerasi: hæc Plinius. Verum nō solum apud Gallos & Italos, sed etiam nunc apud nos magna Cerasorum  
fructu rubente, subæ magnitudine, &c.

Genera: Plinio l. c. Cerasorum, Aproziana maximè rubent: nigerrima sunt Altiæ, ut & Caciciana rotūda. Julianis  
gratus fapor: principatus duracini, quæ Pliniana Campania appellatur: in tipis etiam Rheni: tertius in color è nigro ac  
rubenti viridiz, similis maturiscentis semper. Minus quinquennio est, quod prodere quæ vocant Laureæ, non ingrata  
amaritudinis insita in Lauro. Sunt & Macedonica parva arboris, raroq; tria cubia excedentis: & minore etiamnum  
frutice Chamaecerasi: hæc Plinius. Verum nō solum apud Gallos & Italos, sed etiam nunc apud nos magna Cerasorum  
fructu rubente, subæ magnitudine, &c.

Sunt enim pomi figura turbinatiore, longiore, rotundiore, majore, minore, cordii etiam figura: &  
alia pediculo longiore alia brevior: singulis, vel pluribus una cœuntibus ita ut ex uno petiolo vel singula, & quidem  
communiter, vel terna quaterna quina dependant: vel in tacemi modum coacerventur. Co'ore albo sed rarius par-  
tim rubro partim candicante, & quedam in maturitate parum ex candido rubent, quedam magis: quedam plane  
ceræ, quæ pruno insita sunt: rubro, rufescente, nonnunquam in atrum vergente, nigro etiam quedam nigerrimo &  
succo sanguineo, labia & maxis infusione. Sapore dulci, acido, austro, ex dulci & acido admixto: alia amaritudinis  
quid retinent, non tamen ingrata, Amarina dicta: sic alia nimia sua dulcedine fastidium pariunt: alia ob nimium  
acorem respuuntur: alia ob aquei succi redundantiæ insipida sunt. Similiter quedam carne sunt prædura, alia carne  
molliore, sive teneriore & aquosa conflant: & quibusdam caro pertinacius nucleo heret, qui in aliis fragilior, & nu-  
cleo non insuavi est. Sylvestria etiam variant, quorum quedam licet in hortis à nostris colantur, sylvestria tamen di-  
cantur, quia in nemoribus & sylvis, nonnunquam in dumeris reperiuntur: & quidem in sylvis altissimis, fructu par-  
vo & exigua carne, avium potius quam hominum cibis, ob acerbum simul & amarum gustum. Sed aliquas tan-  
tum differentias subiiciemus.

I. Cerasa sativa, rotunda, rubra & acida, quæ  
nostris, Cerasa sativa.

Cerasa Aproniana, Plinii.

Cerasus acida, Brunf. Matth. Lug. Tab. & aliis vul-  
garis, Ger.

Cerasia acida & vulgaris, Trag.

Cerasa quæ Gallis Griottes, cujus arborem Cha-  
mæcerasum dici, putat Ruellius.

Cerasa austera & majora, Cord. in Diof.

Cerasia, Cord. Gei. hor. Lob. Cast.

LL

Cera-

Cerasus, Ad. tertia, Dod.

Cerasa Agriotta appellata, Cæf. qui Macedonica Plinii suspicatur.

Hæc in mediocri arbore crescunt, brevisque pediculo & carne suis dura donantur: colore communiter rubro, aliquando nigricante; quoddam & quasi albidum quod rarius esset quæ in alia ejusdem generis arbore infra, magna admodum Cerasa, ex brevibus pediculis dependentia, gignunt.

II. Cerasa sativa majora.

Cerasia Hispanica, Lob. Tab. Ger.

III. Cerasa acidissima sanguineo succo.

Cerasorum primum genus, Trag.

Cerasa austera, Matth. (cui & acidorum 3. genus) Cast. Lugd.

Hæc in altiore arbore proveniunt, & longissimi pediculi habent, ex quibus communiter nostrates (qui *Wichsten* vocant) Vinum cerasarum conficiunt.

IV. Cerasa crassa carne dura.

Cerasa duracina, Plinio.

Cerasa quæ primo maturitatem sentiunt, Ruel.

Cerasorum 4. genus quæ forte Juliana Plinii, Trag.

Cerasa maroba & duracina, Matth.

Cerasus altera, Dod.

Cerasa pulpa duriore, Duracina vocata, Cæf.

Cerasia Pliniana, Tab. præcox, Ger.

Nostris *Grafion* vocant, quæ vel rubent, una tamen parte albidior, vel nigricant.

V. Cerasa carne tenera & aquosa.

Cerasa Juliana, Plinio.

Cerasa aquea, Matth. Tab. Gasconica, Ger. ico.

Cerasa pulpa aquosa, Cæf.

VI. Cerasa alba dulcia.

Cerasa dulcia, Trag.

VII. Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficente.

Cerasa Actiana, Plinio.

Cerasia nigra, Trag. Tab. Ger.

Cerasa Corbine, quod Corvorum modo nigricent, an Cæciliana Plinii, Matth.

Cerasus prior, Dod.

Hæc nostris *sylvestria*, & à Cordo in Dioscor. Cerasa dulcia dicuntur, & duplicia habentur, rubra & nigra, ex quibus tam viridibus, quam exsiccat's, ossis conficiunt. Et in Florida Cerasa sylvestris aperiuntur, an his similia?

IX. Cerasus paucissimis foliis donatus.

C. rasa sine foliis, Lob. ico.

IX. Cerasus hortensis flore roseo.

Cerasi species major pauciores fructus edēs, Lob.

Cerasus multiflora 2. Tab. (ico.

Cerasus flore plenissimo instar parvarum rotarum, Cam.

Cerasus multiflora pauciores fructus edens, Ger.

X. Cerasus hortensis pleno flore.

Cerasus vulgaris duplici flore, Lob.

Cerasus multiflora 1. Tab.

Cerasus multiflora fructum edens, Ger.

Cerasus flore pleno, Eyf.

XI. Cerasus folio laurino.

Cerasus Trapezuntina, Bellon. Ges. hor.

Laurocerasus, Eid. cult. Ges. hor. Clus. pan. & hist. Cam.

Lotus 2. Theophrasti, Lugd.

Variat: nam communiter sub pulpa ossiculum durum continet: at in eo quem Clusius Byzantio, Tarbison curmasi, id est Trapezuntia dactyli nomen accepit, non nucleus, sed semina bina aut terna, plana, spadicei coloris, nullo putamine includuntur.

XII. Cerasus pumila.

an Cerasus Macedonica, Plinii.

Chamæcerasus, Matth. Lob. Dod. cui & Cerasus 4: Lugd. Clus. pan. & hist. Cast. Tab. Ger.

Chamæcerasus syl. Cord. in Diosc.

Cerasus humilis, Ges. hor. cui & Chamæcerasus, vel Macedonica Cerasus Plinii.

Chamæcerasus urbana, Ges. ad Cordi historiam.

In horto Sturgardiano Cerasum pumila, scilicet cubitalem, fructu acidissimo, foliis quam in Austriaca à Clusio picta, majoribus & longioribus, observavimus: an hæc

Cerasus Macedonica, Clus. hist.

XIII. Cerasus racemosa hortensis.

Cerasus racemosa, Matth. Lugd.

Cerasi genus quintum, Dod.

Cerasa uno pediculo plura, Lob. Lugd. Ger.

Cerasa uno pediculo binos aut ternos fructus ferens, Cam.

Cerasi species uno pediculo plura producēs, Cast.

Cerasa uno pediculo plura, Tab.

Aliquibus ab uno pediculo terna, quaterna, quinque poma dependent: quædam racematim aut modo propendent: hinc duæ figuræ in Lugdunensi historia proponuntur, sub Ceraso ex uno pediculo plura, & Ceraso racemosa.

XIV.

XIV. *Cerasus racemosa* syl. fructu nō eduli.*Cerasi foliis arbutula* syl. Gel. hor.*Pseudoligustrum*, à quibuidam *Pseudoagnos*, (id est *Vitex talia*) Dod.*Cerasus racemosa*, Ad. Lob.*Cerasus avium racemosa*, Lob. ico.*Cerasia racemosa rubra & nigra*, Tab. Ger.*Padus* Theoph. Lugd.*Cerasus avium*, Clus. hist.*Cerasus racemosa* syl. Eyf.an *Cerasus* syl. Czislp.*πάδς* (*padus*) gaudet vehementer umbrosis, Theoph. 4. hist. 1. nec plura habet.XV. *Ceraso altiss.*an *Cerasus* syl. vestris, Trag.*Mahaleb*, Matth. Cast. Lugd. Tab. Clus. hist. & append. 2. lib. 1. Cam. qui addit *Chamaecerasum* pe-*tracem*, aut *Petrocerasum* Gesnerum, vocare.*Macalep Arabicum*, *Cerasi* sylv. genus, Bellon. cult.*Macholebum*, Cord. hist.*Chamaecerasus Dalechampii*, Gesl. ad Cordum & hort. cui & *Chamaecerasus Syriaca*.*Macaleb*, Ang. Lob.*Vaccinium* Plinii, Lugd.Aliquibus Theophrasti *λακίζα* (*Lacaria Gazza*, aliqui *Lacatham* legunt) quam 3. hist. 4. in Macedonia plana etiam descendere: & 3. ejusd. 7. auctu facillimum esse scribit. Sic & Plinii 1. 16. c. 18. *Vaccinia*, quæ scribit in aquosis provenire, Italiae in aucupis satam: Galliae verò etiam purpurea, tingedi causa, ad servitiorum vestes. Verum & Theoph. & Plinius brevior est, quam ut aliquid statui possit.

Fructus ex Syria advehitur, quamvis in Gallia, Bellonius: in Italia Anguillara: in Helvetia Geinrus (apud nos rarius) observavit.

## CHAMÆCERASUS SPURIA.

I. *Chamaecerasus alpina* fructu rubro gemino, duobus punctis notato.*Chamaecerasus montana*, Gesl. ad Cord. histor. & hort.*Periclymenum rectum* vel mas, Eid.*Chamaecerasus alpigena*, Ad. Lob. Lugd.*Xylosteum alterum*, Dod. Eyf.*Periclymenum rectum* 3. Clusii hisp. (at 4. in histor.) Lugd. Tab.*Chamaecerasus*, Cast.*Idæa* ficus nostra, vulgo *Frangula*, Lugd.an *Corno* simiis frutex in albis, quæ *Cornus* femina Theoph. etiam dici posset, Cast.

Fructus aliquando geminus in uno longo pediculo rubens, aliquando ex toto coeuntibus seminibus in bipartito conceptaculo, in quolibet duo aut tria sine offe.

*Ficus Idæa* *αἰκλὴ αἰὲρ τῶν ἰδῶν* Theophrast. 3. hist. 17. & Plinii 1. 15. c. 18. historia Lugdun. censet.*Xylostium* aliis, quasi lignum osseum, ob ligni duritiem dicitur.II. *Chamaecerasus alpina* fructu nigro gemino.*Periclymenum rectum* 2. Clus. pan. & hist. Lugd.*Periclymenum nostrum* 2. Sabaudicum, Tab.III. *Chamaecerasus montana*, fructu singulari cæruleo.*Periclymenon primum*, Clus. pan. rectum 3. Eid. histor.*Periclymenum rectum* 4. Tab.IV. *Chamaecerasus dumetorum* fructu gemino rubro.*Halimus*, Trag. Lon.*Caprifolii* tertia species. Dod. gal.*Periclymeno* cognatus frutex, Gesl. hor.*Xylostium*, Dod. Thal. Cam.*Periclymenum alterum* *Allobrogum*, *Cornus* feminae effigie, Ad.*Periclymenon* *Allobrogum*, Lob.*Periclymenum rectum* fructu rubro, Clus. pan.*rectum primum*, Eid. hist.*Periclymenum rectum*, Tab.*Periclymenum tertium*, Lugd.*Xylostium* fl. atbis vulgatus, Eyf.Fructus gemelli instar exiguorum *Cerasorum*, plerunque æqualis magnitudinis, sæpe altero eorum minore, eo tamen pleno remanente.V. *Chamaecerasus folio aceris*.*Chamaecerasus montis Generosi*, Gesl. hor. Lugd.

## STYRAX &amp; NARCAPHTHON.

Σ *Τύρεξ* Dioscor. 1. c. 79. *lacryma est arboris malo cotoneo similis: & Theoph. 9. hist. 7. Styra* ad unguentum utilis est: plura non habet: & Plinio 1. 12. c. 25. proxima *Judeæ Syria supra Phœnicem Styracem* gignit: *arbor est eodem nomine cotoneo malo similis, lacryma &c. sed de lacryma inter resinas.*

I. *Styrax folio mali cotonei.*

*Styrax*, Matthiol. Ang. Lac. Bellon. Lon. Ad Lob.  
Cast. Lugd. Tab. Rauwolf. Cam.

*Styrax* arbor, Gef. hor.

*Styrax* liquida, Cast. ico.

Serapio fructum tribuit candidum avellanæ majorem, & ex interno nucleo oleum exprimi.

II. *Styrax folio aceris: in Prodromo describitur.*

III. *Storax rubra officinarum.*

*Styrax* rubra, Græcis hodie Maurocapno, Bellon.

*Narcaphthum*, Cord. hist.

Tegname, Italis: Bufuri, Siculis, Guil.

Cortex est arboris, quem Thus Judæorum & Thymiana vocant, quo Judæi in suffragiis frequenter utuntur.

an *Narcaphthum* five *Argemone* Dioscoridis l. c. c. c. quod ex India deferetur corticosum, mori libro simile, quod jucundi odoris gratia sufficit.

*Narcaphthum* Dioscoridis, Lignum aquilæ Lusitanis dici, Amatus scribit.

Nucis moschatæ extimum corticem, *Narcaphthum* Dioscoridis, Castal. p.

IV. Frutex rotundo argenteo folio Cyani flore. Pulcherrimus frutex, Honor. Belli ep. 2. ad Clau. quo ex Creta accepimus.

Cyanus fruticosus Candiz, Ponz Ital.

## ARIA &amp; HAMAMELIS.

A<sup>PIA</sup> Theoph. 4. hist. 8. similis ex toto est Lauro: 5. hist. 4. materies durissima est ut Roboris: 5. hist. 5. & natura perpetua est: 5. hist. 10. carbones optimos ejus spississima materies facit.

I. *Alni effigie lanato folio major.*

*Aria* & Metallum Italicorum, Ang. Lugd.

*Sorbus torminalis* Gallorum Alisier, Bellon.

*Sorbus alpina* vel pilosa, Gef. hor.

*Aria* Theoph. effigie Alni, Ad. Lob.

*Aria* Theophrasti, Tab. Cam. qui lanatam Cordi vocat.

*Sorbus Aria* cognominata, Clus. pan. & hist.

*Sorbi torminalis* alterum genus, Cæs.

II. *Alni effigie lanato folio minor.*

*Alnus* effigie & *Alnus*, Athenæo.

*Diospyros* q̄ *Sorbis* cognominata vide<sup>2</sup>, Gef. hor.

*Pyrastrer* Idæus vel petreus, Eid. append.

*Myrtomelis*, Eid. in epist.

*Codomo* Cretensium, Bellonio.

*Amelancher* Galloprovincie montanæ, Ad.

*Amelanchier*, Lob.

*Vitis Idæa* 3. Clus. pan. & hist. 4. Tab.

*Hamamelis* Athenæi, Lugd.

*Bagola* quasi bacculæ alterum genus, Cæs.

Duplex est, alia foliis obtusis & latioribus: altera acuminatis & angustioribus.

## COTONASTER &amp; CHAMÆMESPILOS.

I. *Cotonaster folio oblongo serrato.*

an *Agriomelea*, Bellonii.

*Cotonaster* forte *Gesneri*, Clus. pan. & hist.

II. *Cotonaster folio rotundo non serrato.*

*Cotonaster* & *Cydonago*, Gef. in epist.

*Epimelis* altera, Lugd.

III. *Chamæmespilus Cordi, Thal. Cam.*

*Chamæmespilum*, Gefn. ad histor. Cordi, Ad. Lob. ico.

*Chamæmespilus* *Gesneri*, Clus. pan. & hist.

*Epimelis*, Lugd. qui *Dioscoridis* vult, & *Mespilum* *Anthedon*, Theoph. 3. hist. 12.

Fortè eadem cum priore: quàmvis illa foliis majoribus, nec baccis adeo rotundis.

## LIBER DVODECIMVS.

## SECTIO PRIMA.

MESPILUS; BERBERIS; GROSSULARIA & Ribes; Sambucus & Ebulus; Ficus; Sycomorus; Morus; Arbutus; Laurus; Tinnus; Laureola; Chamelæa; Thymelæa; Cneoron & Nerion.

## MESPILUS.

**M**ESPILUS arbor, Græcis μήσπιλον & μέσπιλον: fructus μέσπινον dicitur. Cujus Dioscorides l. i. c. 169. & 170. duo genera facit, alterum quod à nonnullis Ἀρπύρια vocatur, spinosa est, foliis similibus πύρενον: fructum fert exiguo malo similem, suavem, continentem tria oscula, à quibus nonnulli τριανκον appellunt. Alterum genus in Italia nascitur, quod nonnulli ἄνθος. alii Setanium nominant: arbor est malo similis & foliis, nisi quod minoribus: habet verò fructum rotundum, esculentum, latiore umbilico. At Theoph. 3. hist. 12. Mespili tria genera, ἀνθόδον, μεσπίλον, & ἀνθόδον (anthedon, satanea, gallica) ut Idæi dividere consueverunt. Fert Satanea fructum grandiore, candidiore, laxiore & qui nucleos habet molliores: reliquis minor est fructus, odorator &c. flos omnibus Amygdala, sed utcumque pallidus. Anthedon haud procera est arbor, in orbem comosa, folio valde fisso, Apio in extrema parte simili, majoribus incisuris rigido &c. fructu ex longo ac tenui pediculo pendulo, qui antequam solia decidant vehementer rubet &c. Plinio l. 15. c. 20. Mespilus tria genera, Anthedon, Setania: tertium degenerat, tamen si Anthedoni similis est, quod Gallicam vocant, &c.

I. Mespilus Germanica folio laurino non serrato: sive Mespilus sylvestris.

Mespilus Setania fuit Satania, Theoph. & Plin.

Mespilus altera quæ Epimelis Dioscoridi, sic dicta, quod ubi sponte provenit semper malum agrestem vicinam habeat.

Mespilus, Brunf. Trag. (qui Cratægum Theophr. censet) Tur. Gef. hor. Lon. Ad. Lob. Dod. Cæf.

Mespilus altera, Matth. in edit. cum magnis figuris, Dod. gal.

Mespili altera species sponte proveniens, Cord. in Diosc.

Mespilus vulgaris, Clus. hist. Cam. ep.

II. Mespilus folio laurino major.

Mespilus fructu præstantiore, Trag.

Mespilus altera fativa, Cord. in Diosc.

Mespilus ox yacantho infusa, Dod.

Mespilus domestica, Lob. ic.

Mespilus setanea, majoribus vulgari fructibus, Camer.

Mespilus setanea infusione mitior facta, Lugd.

Hæc infusione in Pyrum sylvestrem, maxime C, nosbatum, sive Oxyacanthum, mitecit, po-

lum majus edit, nec spinis horret: & singula mala, ut & prioris quinos nucleos complectuntur, nisi fortè interdum præter naturam, aut plures aut pauciores contineat.

III. Mespilus Italica folio laurino serrato.

Mespilus altera, Matth. edit. 2. & icon. Lac.

Mespilus setania, Ang. Lugd.

Mespilus altera, Cast.

IV. Mespilus Virginiana colore rutilo.

Mespilus, qui colore est rutilo ut ceraia & valde dulcis, par. i. Ind. occid.

V. Mespilus fructu albo.

Mespilus colore albo mali magnitudine, Scalig. Lugd.

VI. Mespilus Apii folio laciniato.

Mespilus Aronia, Dioscoridis.

Anthedon Theoph. & Plinii.

Paliurus Africana, Ruellio.

Mespilus prima, Matth. Lac. Cast.

Mespilus Aronia, Dod. ut: Ang. Beñon. Gef. hort. Ad. Lob. Lug. Tab.

Mespilus propriè dicta quæ tricoccos, Cord. in Dioscor.

Paliurus Africana vinosa, Gef. hor.

Azarolus, Cæf. Cast.

an Mespilus Gallica, Cam.

Hæc spinosa est, sed ubi magis domestica, spinis caret, etiam Theophrasto monente.

VII. Mespilus Apii folio syl. non spinosa, sive Sorbus Tormalinis.

Sorbi quartum genus, Trag. Cord. in Diosc.

Sorbus tormalinis, Matth. Cord. hist. Gef. hort.

Tur. Dod. Lon. Ad. Thal. Cæf. Tab. Cam.

Sorbus tormalinis Plinii, Lob. Clus. hist.

Cratægus Theophrasti, Ang. Lugd. qui duplicem figuram habet, sub eodem titulo.

Mespili Aroniæ syl. species, Gef. hor.

Sorbi syl. altera species, Cast.

Hypomelides Palladii, quibusdam.

Κεράυρος ἢ κεράυρων, Theophrasto 3. hist. 15. folium habet Mespili (scilicet Aroniæ) rigidum, sed majus, latius, longius, ejus modo laciniatum: arbor est non admodum procera, nec crassa: lignum varium, solidum, flavum &c. fructus ejus est magna ex parte rotundus, qui maturefcens flavescit & utrumque nigrescit, succo & gustu mespili: quare syl. Mespilus videri potest. Plinio 1. 15. c. 21. Sorborum 4. genus tormaline appellatur, remedio tantum probabili, alsiduum proventu, minimumq; pomo, arbore dissimili, foliis pene platani: & l. 27. c. 8. Theophrastus arboris genus intelligi voluit Cratægonon sive Cratægona, quam Itali Aquifoliam vocant.

II. X. Mespilus apii folio syl. spinosa sive Oxyacantha.

Οξυάκανθα arbor est similis Pyraestro, minor ve-

ro & spinosa valde: fructum fert myrto similem, plenum, rubrum, fragilem, intus nucleum habentem, radicem multifidam & profundam, Dioscoridi, l. 1. c. 122.

Mespili 3. genus Plinii videtur: interdum ait, degenerat, cunctis Anthedoni similis est, quod Gallicum vocant. Theophrastus Anthedonidem nominat, quasi speciem Anthedonis.

Cynosbates Theophrasti, Trag. Lon.

Oxyacantha, Matth. Lac. Tur. Bellon. Ad. Lob.

Rauwolf. Cæf. Lugd. Tab. Cam. Thal.

Oxyacantha Dioscoridis, Dod. gal. Cord. in Diosc. (& Latinis veteribus simpliciter Spina) Gef. hor. Sorbus aculeata, Cord. hist.

Spina acuta quorundam, spina alba vulgo, Ang. Spina appendix Plinii (& ejusdem Spina simpliciter) Gef. hort. Clus. hist. cui & Oxyacantha vulgaris.

Mespilus sylvestris, Cast.

In hanc Mespilus optimè inferitur.

IX. Oxyacantha Dioscoridis, sive Spina acuta pyri folio.

Oxyacantha legitima, Ang.

Pyracantha, Ad. Lob. Clus. hist.

Rhamnus tertius Diosc. Lob. ico.

Acuta spina, Cast.

Uva ursi Galeni, Lugd.

X. Mespilo similis fructus venenatus.

Arbutuscula in littore, quarum poma mespilis nostratibus similia, Lerio par. 3. Ind. occid. c. 12.

XI. Mespilo similis fructus fuscus.

Fructus octavus ex navigat. Batav. Clus. exot. lib. 2. c. 15.

## B E R B E R I S.

**A**N apud Theoph. 3. hist. 17. arbor circa Idam proveniens, quam Colyteam vocant, genus aliud fruticosum, ramosum, alosum, inventu rarum, folio laui. 120. ulmeo simili, oblongius tamen: colore parte altera herbida, serena albedo, nervosa, cortice non levi, sed quasi vitu vestitur: ligno duro spisso, radices majorem in modum flavas &c. Spina appendix est appellata, quoniam bacca puniceo colore in ea appendices vocantur. Plin. l. 24. c. 13.

I. Berberis dumetorum.

Berberis, Brunf. Dod. gal. Tur. Gef. hor. Lac. Lon.

Ad. Lob. Cast. Lugd. Rauwolf. Cam. cui & Amir-

baris Avicennæ.

Berberis vulgaris, Bellon. cult. Clus. hist.

Spina acida, Brunf. 4. Dod.

Oxyacantha, Hermolao, Ruel. (cui & Spini vinea) Trag. Fuch. E; stett.

Oxyacantha Galeni, non Dioscoridis, Cord. in

Dioscorid. Taber.

Crespinus, Matth. Cæfalp. cui & Ribes Scario-

nus fortè.

Oxyacanthus Galeni, Cam.

II. Berberis sine nucleo.

Berberis *ααααα*, Clus. hist.

III. Berberis alpina Cretica.

Lycium Creticum, Hon. Belli epist. 1. ad Clus. & Ponæ: hoc ab utroque accepti.

GROS-



## GROSSULARIA &amp; RIBES OFFICINARUM.

**T**heophrastus 3. hist. 17. post Rhamnos, 1006 (aquum Gaza vertit) vel ut alii asos memorat, his verbis: Aequorum alia candida, alia nigra: & flos fructusque utrique pro ratione discriminis. alius candidus, alius niger: nonnulli etiam mediis quodammodo sunt, quibus flos in purpurea candicans: nec enim fulvus, nec exalbidus est, &c. Non candidum, nonnulli uvam crispam existimant: hæc ille. uvam crispam ab intortis & veluti crispis foliis & acinis quos producit, vocant.

I. Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris.

Uva crispa, Trag. Dod. ut: Fuch. Gefn. hort. Lon.

Ad. Lob. (cui Vitis precia Plinii) Tab.

Uva spina, Matth. Lac. Cæs. Cast.

Grossularia, Ruellio, Bellon. Thal. alba, Lugd.

Crispina uva, Cord. in Diosc.

Rocella Cardano l. 6. de var. rer.

Ceanothus spina, Theoph. 4. hist. 11. vel Ceanothus asper, Gein. hort.

Grossularia vulgaris, Clus. hist.

Fructus maturus flavesceat, nonnunquam subrubet.

II. Grossularia spinosa fativa.

Uva crispa fructu Cerasi magnitudine, Gef. hor.

Grossularia majore fructu, Clus. hist.

III. Grossularia spinosa fativa altera foliis lactioribus. (hist.)

Grossularia fructu obscure purpurascens, Clus.

Est & fructu ex atrocaeruleo, frutice leviusculis spinis armato; alia fructu hirsuto.

IV. Grossularia simplici acino caeruleo non spinosa, nu. ne in hortis habetur.

V. Grossularia multiplici acino sive non spinosa hortensis rubra, sive Ribes officinarum.

Ribes hortense, Trag. vulgaris fructu rubro, Eyst.

Ribes vulgaris domestica, Matth. Cast.

Ribes, Fuch. Lon. Lac. Tab. rubra, Ad.

Ribes vulgo, Ang. Bellon. Cæs.

Uva ursi, Dod. gal.

Ceanothus levis, Gef. hor.

Ribesium fructu rubro, Dod.

Ribes Arabum, Lob.

Grossularia rubra, Lugd.

VI. Grossularia hortensis majore fructu rubro.

Ribes rubro flore, foliis & fructu majoribus, Clus. pan. & hist.

Ribes baccis majoribus, Camer.

Ribes major fructu rubro, Eystett.

Cultura aliquando in arbusculam abit, & acinis avellana majoribus acidissimi saporis Florentiæ visam, Gesnerus lib. de hortis refert.

VII. Grossularia distinctis baccis.

Ribes monocarpus, Clus. hist.

XII. Grossularia hortensis fructu margaritis simili.

Ribes vulgaris fructu albo, Clus. hist.

Ribes fructu albo, Eyst.

IX. Grossularia vulgaris fructu dulci.

Ribes candidioribus foliis, Lob. ob.

Ribes vulgaris fructu dulci, Clus. pan. & hist.

Ribes minor fructu rubro, Eystett.

X. Grossularia syl. rubra.

Ribes syl. Matth. Gef. app. Lon. Cast. Cam.

Ceanothi levis genus syl. Gef. hor.

Grossulariæ rubræ genus syl. Lugd.

XI. Grossularia non spinosa fructu nigro.

Ribes sylvestre, Trag. Thal.

Ribes nigrum, Dod. gal. nigra, Ad. Lob. ico. Tab.

Amomum falsum & Pseudoamomum, Gef. hor.

Ribesium fructu nigro, Dod.

Ribes vulgaris nigro fructu, Clus. hist.

Ribes baccis nigris, Cam. fructu nigro. Eystett.

Frutex Ribi similis fructu nigro, an arbor Piperis in Italia Plinii, myrto similis, Cæs.

Grossularia nigra aliis Pipirella, Lug.

Variat baccis minoribus & majoribus.

XII. Ribes Arabum foliis petalidis.

Ribes Arabum cum suis capreolis, Rauwolf. & Lugd. app.

Ribes legitima Arabum, Clus. hist.

Ribes Serapionis, Cam. hor.

An idem cum hæc,

Ribes Serapionis foliis oxylapathi, Bellonio de coniferis, Dodon. & Lugd. un.

XIII. Ribes Rauwolfiæ congener planta, Clus. ev. l. 4. c. 21.

## S A M B U C U S.

**S**A M B U C U S, quæ Græci ὀξυλάθυ, sic videtur Hermolao à Sambuca, musico instrumento, quod, aliis peltida, alii magadin vocant: & hoc ab auctore cui nomen Sambyx fuerit: Sabyus & Sereno.

Genera

Genera duo Dioscoridi l. 4. c. 174. & 175. unum quod in arborem assurgit &c. alterum genus χαμαίεξ vocatur, id est, humile atque longe brevius, & ad genus herbaceum accedens. &c. Theoph. 3. hist. 13. Sambucum arborem pluribus verbis descripsit: verum utriusque descriptiones, tanquam arboris notissima praterire lubet. Plinius l. 24. c. 8. utriusque meminit, addens Sambucum habere alterum genus magis syl. quod Graeci Chamaellen, alii helion (id est, palustrem) vocant multo brevius &c.

I. Sambucus fructu in umbella nigro.  
Sābucus Brūf. Matt. Fuch. Dod. ut: Cord. in Diof.  
Bellon. Gei. hort. Tur. Lac. Lon. Lob. icon. Cæf.  
Sambucus vulgaris, Trag. Thal. (Tab.  
Sambucus fructu in umbella, Ang.  
Sambucus domestica, Cast.  
Sambucus campestris sive vulgaris, Cam.

Arbor aliquando, aliquando frutex est.

II. Sambucus fructu in umbella viridi.  
Sambuci aliud genus, Trag.  
Sambuci altera species, Dod. ut:  
Sambucus fructu albo, Lob. ico.  
Variat baccis viridibus, in aliis albis, vel & albo  
flor. centibus.

III. Sambucus racemosa rubra.  
Sambucus syl. Trag. Lon.  
Sambucus montana, Matth. Gef. hor. Cast. Cam.  
Sambucus racemosa, Ang.  
Sambucus 3. Tur. 4. Dodon.  
Sambucus montana racemosa, Ad. Lob. ico.  
Samb. montana seu sambucus, Thal.  
Samb. syl. sive montana, Lugd.  
Samb. cervina (quod hujus folia cervus maxime  
expetat) Tab.  
Samb. genus aliud minus, Cord. in Diof.  
Sambuci alterum genus, Cæf.  
an πικρὴ Theoph. l. 3. c. 4. montibus autem pro-  
pria quæ in planis nasci nequeunt, abies, pinus, pi-  
cea, aquifolia, tilia, carpinus, pygus, &c. quam  
postremam arborem Gaza in sua translatione omisit.  
an Sambucus montana Plinii, quam in montibus  
nasci tradit.

IV. Sambucus laciniato folio.  
Sambucus foliis laciniatis, Lob. Lugd.  
Sambucus laciniato folio, Dod.  
Samb. laciniata, Tab.

V. Sambucus humilis sive Ebulus.  
Chamaæte, Dioscoridi.  
Ebulus, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac.  
Bellon. Ad. Lob. Cast. Cæf. Lugd. Tab.  
Ebulus sive humilis Sambucus, Dod. ut:  
Ebulus sive parva Sambucus, Cord. in Diof.  
Ebuli & Sambuci alterum genus, Lon.

VI. Sābucus humilis sive Ebulus, fol. laciniato.  
Ebulus laciniata, Ponæ ital. qui ex horro Nobilitate  
Contareni ad me misit.

VII. Sambucus aquatica flore simplici.  
an θαυμαλὸν Theoph. 3. hist. 7. inter sylvestria ra-  
dicibus multis constat: & 4. hist. 1. & umbrosio-  
sis vehementer gaudet, veluti Taxus.  
Opulus, Ruellio.

Aceris species tertia, quæ Platanus aquatica, Ang.  
Sambucus aquatica, Trag. Matth. Lob. ico. Cast.  
Lugd. Thal. Tab. Ger.  
Sambucus palustris, Dod. ut: Cæf. foemina, Cam.  
Lycostaphylō (i.e. uva lupina) foemina, Cord. hist.  
Sambucus palustris, vel aquatica sylv. quibusdam  
Chamaëplanus, Gef. hor.

IX. Sambucus aquatica flore globoso pleno.  
Lycostaphylus maicula, Cord. hist. Gef. hor.  
Sābucus palustris vel aquatica hortensis, Gef. hor.  
Sambucus rosea, Ad. Lob. ico.  
Sambucus palustris 2. Dod. mas, Cam.  
Sambucus aquatica cultu densissima, Lugd.  
Sambucus aquatica polyanthos, Tab.  
Sambucus rosea, Ger. Eyflett.  
Floribus est pilæ in modum cōglobatis, & com-  
muniter albis: rarius purpurei coloris, quæ  
Sambucus palust. hortens. flor. purpurei coloris  
Gef. hort.  
Sambucus rosea flore purpureo multiplici, Tab.  
Sambucus rosea flore purpurante, Ger.

## F I C U S.

FICUS arbor, ουκὴ Græcis, & fructus οὖρα appellantur. Genera, Dioscoridi l. 1. c. 183. & 184. & Galeno l. 1. simpl. duo sunt: alia ficus est sativa, ουκὴ νικη: alia sylvestris, πικρὴ ἀγρὴ & πικρὴ c. Plinio l. 15. cap. Caprificus. Theophrastus de Ficu, in libro de historia & causis plantarum, plurima habet: qui & Aegypcia & Indica & Cyprica (ut & Dioscorid.) & Caprifici meminit: & Plinius, qui libr. 15. cap. 18. Ficum genera vagantem novem proposuit: vel a figura, vel a gente, vel auctore derivata, ficus inter pomorum genera referens: & quædam pyræ magnitudine æmula esse scribens: quæ omnia, cum brevitati studeamus, praterire lubet. Verum primæ  
fructu

fructus, tam sativæ, quam sylvestris δαυδ & Latini Grossus nominatur: ut ficus sicca in furno, aut sole exsiccatæ, quæ quibusdam passa dicuntur, ἰσάρι. Latine Carica, & Aginetæ: quamvis Carica, ficus peculiaris species sit in Syria proveniens, ut ex Plinio colligere est. Sic ipsa grana in fructu, Græci κρυγερῶδες frumentum Plinius L. 15. c. 19. alii ficaria vocant. Hujus et Mori foliis Antiochia Bombyces aliæ, et albae mori arbores et ficus pumiliones ejus nomine coli, Bellonius scribit.

### L. Ficus communis.

Ficus, Brunf. Trag. Math. Ang. Dbdon. ut: Cord. hist. Bellon. Gesl. hor. Lac. Tur. Lon. Ad. Lob. Rauh. wolf. Cæf. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Ficus sativæ, Fuch.

Fructus forma & colore differunt, nonnulli longiores alii breviores: alii pyri forma, alii tæsilis sunt, alii inter hos medii. Colore, albæ, pallidæ, virides, luteæ, purpureæ, subruæ: ex cæruleo saturatè purpureæ, nigrae, aliæ denique vario colore spectantur. Sunt & albæ quoad pulpam interiorem. Siccarum sive passarum, triplex differentia adfertur, prima in sportheis, magnisq; corbis: secunda, in cistis & similibus sportis lauri foliis immixtis: 3. in parvis & turbinatis corbis è sparto contextis, Malsiliensium cognomento, cæteris magnitudine quidem inferiores, saporis verò generositate superiores. Sic in regno Congiano, eximie magnitudinis, magnasq; copia: maxime verò in insula S. Helenæ. Tria Ficuum genera (ut rectè Scaliger in Theoph. 5. caus. plant.) fert Ficus: unum, valde tempore præcoccem, què idcirco Græci περῖσσοτος quasi præcursorem vocant, atq; is edendo est, Bolas Veneti vocat, Galli Florones: Columella, communi voce, priorem fructum: Plinius, præcoces. Aliud genus eorum est, quod postea prodit, cujus duæ species sunt: una quæ maturatur, Ficum dicimus, Græci σίκαν: altera semper cruda est, & prius cadit quam absolvetur: eos Plinius aborlus vocat: alio nomine Grossi dicuntur, Græci ἀβρόχας vocant.

Variant etiam Ficus in India pro regionum diversitate: nam in Provincia bonæ spei, fructus perpetuò ferunt (par. 8. Ind. occid.) & in Peru summa earum ubertas (par. 9. Ind. occid. l. 4. c. 31.) Adit Josephus Acosta l. c. in India Occidentali diversas esse valles quæ integro anno fructus promant: sed admiratione dignius esse, quod in Peru arbores reperiantur quæ uno semestri ex uno latere, altero ex alio fructus protrudat. Sic in Mala 13. miliariorum intervallo à civitate de Los Reyes, Ficus est, quæ parte dimidia, quæ Austrum spectat, frondes & fructus fert, quando in monta-

nis æstas viget: altera verò pars, contrario anni tempore, cum in planis æstas est, idem cap. 32.

Ficus arbores Monardæ referente, ex Hispanica in Peruanas Provincias delatæ, plurimos & optimos fructus gestant: & ut folia isthuc non depolant, Deus singulariter voluit, quo semper præsens remedium adesset contra insecta, quæ Araneæ appellantur, quorum ictibus virulentis, lac ex foliis Ficus manans, bis tervè in vulnus instillatum, remedio est.

### II. Ficus humilis.

Ficus pumila, Math. Dod.

Chamæficus sive humilis ficus, Lob.

Chamaelyce arbor, Lugd.

### III. Ficus sylvestris Dioscoridi.

Caprificus vocatur è sylvestri genere Ficus, inquit Plinius l. 15. c. 19. nunquam maturelscens, sed quod ipsa non habet aliis tribuens, &c.

Caprificus, Ang. Cord. in Diosc. & hist.

### IV. Ficuum specie fructus Peruanus.

Papaie fructuum genus ficuum specie, 6. par. Ind. occid. 18. qui & Ficuum exiguum Tunne nominatum meminit.

### V. Fici similis arbor fructu oblongo.

Ficus Nigritatum, Thevet. Lugd.

Est folio Ficus, fructu pedes duos instar Cucurbitæ longo, quem tanquam Melones esitant.

### VI. Ficus prædictæ similis fructu magno Meloni par.

Chivet, quod Syriacè Ficum significat, in insula Zipangu, Thevet. Lugd.

### VII. Arbor Malacensis multis radicibus prædita.

Arbor contrariis prorsus facultatibus donata: nam quæ solem orientem spectat, adversus omnia venena valet: quæ verò occidentem, venenum præsentaneum sunt. Ignotio Franciscano in itin. novi orbis: ex quo Clus. in Acosta cap. 41.

### IX. Ficus Indica foliis Mali coronæ similibus, fructu ficibus simili in Goa.

Ficus Indica Theoph. 4. hist. 5. Indica, ait, regio arborem Ficum vocatam sortitur, quæ è ramis radices demittit singulis annis, non ex novellis, sed

M M

ex anni.

ex anniculis, atq; etiā vetustioribus: illæ seferæ coniungentes, ceu sepem circa arborem faciunt, ita ut veluti tabernaculum condatur, quo etiā morari homines solent, &c. Plinio l. 12. cap. 5. Ficus Indica exilia poma habet: ipsa se semper ferens, vastis diffunditur ramis, quorum imi in terram curvantur. &c. & l. 7. c. 2. sub una Ficu turmæ conduntur equitum.

Arbor Indica admirabilis, Straboni.

Ficus Indica, Clus. ex. Lugd. Tab.

Mangle forte, Ovied.

an Mangel. Ferd. Lopez.

Arbor de rayz, id est, radicosā, Linscot. par. 4. Ind. or. 14. & fig. 12.

Enzanda, Pigafetta, par. 1. Ind. or. c. 4.

Arbor Coa sive Indica, Ger.

Ex cortice vestes conficiunt.

IX. Ficus Indica folio spinoso fructu majore.

Ficus Indica, Matth. Dod. ut: Cardano, Lac. Gef. Lob. Cast. Cæf. Eyf.

Carduus Indicus & Ficus Indica, Clæor. ad Dod.

Pala sive Ficus Indica, Bellonio.

Tuni ficifera Indorum, Ad.

Ficus Indica species, Tunc Indorum, Frag.

Anapallus Bellonii, Card.

Tunes, Oviedo, Card.

Tunc, Opuntia, Lon.

Ficus Indica spinosa, Tab.

Tunc & Tunas Indorum, Lugd.

Opuntia vulgo habita, Cam.

Tunal in nova Hispania, nonnullis locis Cardis: par. 9. Ind. occid. l. 4. c. 23.

Tunales qui fructus bonos promunt; & magni qui in India æstimantur, Tunas vocari solent, Idē. Arbor Nepal: fructus, Nuccti in insula Cuba, Ferdi, Cortesio, Cardan.

Opuntiam nonnulli credunt, de qua Theoph. l. hist. 12. sic: huic (Ficui Indica) similis est, vel potius quodammodo mirabilis, si qua ex folii radicem mittat, qualem circa Opuntem herbulam esse ajunt, quæ & est suavis est. Plinio l. 27. c. 7. item circa Opuntem, Opuntia est herba etiam homini dulcis: mirumq; è folio ejus radicē fieri, ac sic eam nasci: Aliis Pala Plinii, & Tala Arriano, Guil.

Colore fructus variat, virides internæ purpurei, cerei, albi variegati.

X. Ficus Indica grana.

Cochinillia sive Grayn vermiculus sub folio Tunal: par. 8. Ind. occid. l. 4. c. 13.

Quidam Tunas (id est fructus) nullos gignunt, sed sub foliis fructum alium Greyn dictum edunt, vermiculum scilicet foliis adhærescentem & tenui pellicula obductū, & hæc celebratis. Indica Cochinillia, qua Grayne colorantur, Idem.

Arbor Cochenille, Claud. Dureto.

XI. Ficus Indica spinosa sylvestris.

Cardis seu Tunades syl. fructum nullum protrudentes: si verò proferant, meris spinis horrent: par. 9. Ind. occid. l. 4.

XII. Ficus Indica folio spinoso fructu minore. Indorum ferruminatrix, Advers.

Opuntia octo collos, quos artuum fracturis & luxationibus proffit: de qua & Author hist. generalis Indiarum.

Arbor rupturas consolidans, Ovied. qui suspicatur Carduum Tunes in hanc arborem transmutari.

XIII. Mippi nonnullis Indis Caiababa, quæ ossiū fracturis alligata ea ferruminare solet, Clus. ex. l. 4. c. 14.

XIV. Cereus Peruanus spinosus fructu rubro nucis magnitudine.

Cardui species, quem Christiani Cereum appellant, Oviedo.

Euphorbii arbor Cerei effigie, Ad. Lob. ico.

Euphorbium, Cast. ico.

Cereus spinosus, Lugd. Ger.

Cereus Peruvianus, Tab.

Stipites spinosi hastæ altitudine, Linscot. 4. par. Ind. or. fig. 21.

XV. Ficus Indica lævis pilosa: hæc ex Creta missa: eaq; duplex, altera folio rotundo, altera folio oblongo.

XVI. Ficus Indica humilis: hanc ex herbo Doctoris Saltzmanni Poliatri & Profess. Argentinenfis habeo, quæ pedem vix superat, ramis est reflexis & veluti repentibus, flore magno, luteo: de qua in historia.

Ficus Indica minima, aliis Lichen marinus, vel Opuntia marina, de Bry.

**Σ**ΥΚΑΜΟΡΟΝ, aliqui etiam *συράμωρον* vocant, est arbor magna, fico similis, largo succo abundans, foliis Mori: fructum ter quaterve anno proferens, non è summi ramis, sed è caudice ipso *καὶ ἐκ τοῦ κορυφῆ* id est, caprifico similem, grossius dulciorem, sine grani interioribus, Diosc. l. i. c. 81. At Theoph. l. i. h. i. c. 23. *συράμωρον* ἐν ἀγρῷ: peculiaris vel maxime ortus, si quis fructus caudici proferat, ut Moro Aegyptia: hanc enim ex caudice ferre nonnulli affirmant: alii grandibus ex ramis eam fructificare: & 4. h. i. 2. & similis quodammodo moro nostrati est. quippe solio magnitudine aspectus, proxima: pomum est magnitudine ficus, grani internis carens, &c. Plinio l. 23. c. 8. Mora in Aegypto & Cypro sui generis, largo succo abundans, summo cortice desquamato &c. & l. 13. c. 7. eadem fere quae Theoph. habet, Ficus Aegyptiam vocans.

I. Ficus folio Mori, fructum in caudice ferens.

Sycomorus, Matth. Dod. ut: Lac. Lon. Ad. (five Moroficus) Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Sycomorus, Ficus Pharaonis, vocant, Bellon. Gesl. hor.

Sycomorus Giometz appellata, Alpino.

Pothel Theveti, Lugd.

Sycamine Theoph. Cast.

Ficus Aegyptia. Rauwolf.

II. Ficus folio Sycomori, fructum non in caudice gerens.

*Συκὴ ἐν κορυφῇ* gignitur, arbor specie differens, quippe quæ Ulmis cum sit, folia Sycamini refert: fructum verò gerit prunum magnitudine, & quàm pruna ipsa dulciorem, Dioicorides, l. i. cap. 182.

Fici Aegyptiae similis quadantenus, quæ vocatur Cypria ficus in Creta: nam & illa in caudice ipso fert pomum, & ramis cum in crassitudinem adolevere: sed hæc germina emittit sine ullis foliis radicis similia, &c. Plin. l. 13. c. 7.

Ficus Cypria in Sycomori genere, Matth.

Sycomorus in Cypro, Cord. in Diosc.

Ficus cypria, Dioscoridis, Sycomorus Græcorum, Mumeitz Arabum, Rauwolf. Lugdun. append.

III. Sycomorus foliis minoribus.

Sycomoro similis fructu flavescente sine grani in Mayo insula: 4. par. Ind. or. fig. 19.

IV. Ambulon, Scalig. Lugd. Aruchit insula fert arborem, cujus è cortice fructus exit candidus, saccharite specie, & magnitudine coriandri, Ambulon ei nomen est.

## MORUS.

**Q**UAE arbor *Μορῆ* ἢ *συράμωρον*. Latini Morus, fructus *μοῖρον* ἢ *συράμωρον* Morum dicitur. Diosc. l. i. cap. 180. arbor est nota: at Theoph. l. i. h. i. c. 15. Sycamnos (Morus Gaza) serotina germine esse solet, sed nibilo tardius quam alia folia deperdit: l. h. i. c. 19. succus vinosus est: l. h. i. c. 21. flores sunt lanuginei, &c. Plinio l. 15. cap. 24. nec alio modo quam pomi magnitudine differunt mora Ostiensis & Tusculana: & l. 16. c. 22. arborum dicta sapientissima, quia novissima urbanarum germinat, nec nisi exacto frigore: quare l. 18. c. 27. cum germinare videri Morum, injuriam postea frigoris timere nolito.

I. Morus fructu nigro.

Morus, Brunt. Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Lacun. Tur. Lon. Rauwolf. Ad. Cast. Lugd. Tabern. Ger. vulgaris, Cam.

Morus arbor fructu nigro, Gesl. hor.

Morus nigra, Cord. in Diosc. Bellon. Cast.

Morus rubra, Ang.

Morus celsa officinis, Lob.

Celsa quasi excelsa dicitur, ad differentiam Rubi, cuius fructus etiam Mora, sed bati, dicuntur.

II. Morus fructu albo.

Morus alba, Matth. Ang. Gesl. hor. Lac. Ad. Cast.

Lugdun. Cam. Tab. Ger. Rauwolf. cui Tut Tripolitani.

Morus alba, Gallis perperam Sycomorus, Bellon.

Morus candida, Cord. in Diosc. Dod. Lob.

Morus primum ex Hispania in Indiam propter bombyces illata: par. 9. Ind. occid. l. 4. c. 32.

Hæc non solum colore & magnitudine, sed etiam sapore à nigris differunt. Folia in hac quando adhuc humilis est, lacinata & altius insecta habet, & non sicut in nigra, quæ

Chamaemorus augmenti carditate tantum à vulgari discrepans, Cam.

**A**rbutus Dioscoridi l. i. c. 175. *ῥόμυλος*, arbor est cydonia affinis, tenui cortice, fructum habens pruni magnitudine, nuclei expertem, quæ *ῥόμυλος* vocant, qui ubi maturuit subsilvius, aut rubicundus est. Theophrasti 3. hist. 16. Comarus, quæ nemecylum cibo idoneum ferit, magnitudine non nimium præstat: corticem tenuem tamarici similem habet: folium inter ilicem & laurum: flores singulari appendice parte postrema racemati coherent, specie quisque myrto oblongo similis, non foliatus, concavus, tanquam ovum excelsum ore aperto. &c. Flin. l. 15. c. 24. pomum duobus nominibus appellant Græci, Comarum & Memecylon, & apud nos alio nomine Arbutum &c. & l. 23. c. 8. Arbutus sive unedo, fructum fert difficilis concoctionis.

#### I. Arbutus folio ferrato.

Arbutus, Matth. Dod. ut Bellon. Cord. in Dioscorid. Gesner. hort. Lacun. Tur. Lon. Rauwolf. Clus. hispan. & hist. Cæs. Cast. Lugd. Tab. Camer. Ger.

Arbutus Theophrasti, non Dioscoridis, Ang. Oinaris & Conarus sive Arbutus & Unedo Theophrasti. Guil. pap.

Arbutus sive Unedo, Ad. (Galeno perperam E-pimelis) Lob.

Arbor vastæ magnitudinis in Creta, cum alibi fruticet, Bellonio monente: & in fructu differentia, quidam parvi mali magnitudine, rubore magis nigricante, mollior & suavior in mediterraneis: quidam avellanæ magnitudine, flavior & asperior, in maritimis tractibus, Cæsalpinus.

#### II. Arbutus folio non ferrato.

Andrachnes, Bellonio.

*Ἀνδράχνης* Cretensium, Hon. Belli apud Clusium.

Adrachne Theophrasti, Clus. hist.

*Ἀνδράχνης* (Portulaca aliquando, potulaca Ga-

zæ) folio Arbutu similis est, magnitudine non nimium præstans, cortice albo circumrumpi solito, fructum arbutu similem parit, Theophrasti 3. hist. 16. Adrachne syl. arbor est, similis Unedoni, folio tantum minore, & nunquam decedente, cortice non icabro quidem, sed qui circumgelatus videri possit, Plin. l. 13. c. 22.

#### Arbuti folio exotica.

##### I. Jambolones, Garzia.

Jambolins, Acoftæ, Frag. Lugd.

Jambolyn. Palud. in Linscot. 4. par. Ind. or. 10.

Arbustum simile Myrto, Garz. Frag. foliis Arbuti (foliis oxycanthæ Paludano) fructu olivæ Cordubensi simili, qui muria conditur.

##### II. Carandas, Garzia.

Caranda, Frag.

Auzuba, Oviedo, Frag. at Clusius, Carandæ se se similem Oviedum describere, ait.

Fructu est exiguo malo persimili, gratissimum varum sapore, qui muria, etiam aceto, tum in continente, tum in Balagate conditur.

## L A U R U S.

**D**aphnem, Ladonius filiam formosissimam fuisse, Poëtæ fabulantur, quam cum Apollo deperiveret, & ut potiretur celeri cursu fugienti in staret, ab eotandem capta, matrem tellurem precatur, ut in sinum sese suum reciperet. Votus ac precibus tellus excita, confectum arborem edidit. Re confecta deterritus Apollo, arborem gentili nomine donavit, & vulsero sese coronavit. *Δάφνη* ipsa arbor, & bacca *δαφνίδα* Dioscoridi l. i. c. 106. dicuntur, quæ aliam folio tenuiore, alteram latiore scribit: & Theoph. (qui hinc inde multa de Laurus habet) 3. hist. 12. alia est tenuifolia, figura similis Sorbis: & 3. hist. 13. latifolia, folium molle atq; oblongum habet, sicut Sambucus: & 3. hist. 1. Laurum uvam producit & fructifera est, quanquam non omnis sed genus quoddam, verum sterilis copiosius, quam masculam nonnulli appellant. Plinius l. 15. c. 13. Lauri genera tradens, meminit ejus quam Muscaceam vocat, folio maximo, staccidoq; & albicante. Delphica, quæ aequali colore, viridior, maximè baccæ viridis rubentibus. Cyprica, quæ folio brevi, nigra, per margines imbricato, crispâ. Tini, quæ aliquibus silvestris Laurus, carulea bacca. Regia, quæ amplissima & arbore & folio. Baccata, quæ vulgarissima est, baccarumq; fertilissima. Sterilis, quæ triumphalis sit. Asperi & alia genera, nomine potius, quam generis societate communicantia.

#### I. Laurus latifolia *δαφνίς* Dioscor.

Laurus regia amplissima, Plinio.

Laurus latiore folio, Matth. Cast. Lugd.

Laurus latifolia, Cord. in Diosc. Bellon.

Laur<sup>9</sup> regia foliis ad Malū Medicā accedētib. Cæs.

Laurus latifolia mas (quæ sterilis & fœmina) Tab.

#### II. Laurus vulgaris.

Laurus, Brunf. Trag. Dod. gal. Gesner. hor. Lac. Lon.

Lob. Eyft.

Laurus tenuif. Matt. Cord. in Diosc. Lug. Cæs. Cæ.

Laurus

Laurus altera species, Dod.

Laurus vulgarior baccifera, Ad.

Laurus mas (quæ sterilis & fœmina) Tab. & Ger.

Præter has Tabernæmontanus pingit

Laurum tenuifoliam marem.

Laurum tenuifoliam bacciferam, quæ Laurus  
Laurum angustifoliam marem. (mas, Ger.

Laurus quædam floret tantum flore copioso racemoso, uvam Theoph. vocat & fructum nõ fert: alia fructum fert, in quo etiam differentia: alterius, in rotundo modicè oblongus est: alterius oblongus, gracilis & utrinq; ovato mucrone turbinatus. Lauros alibi frutescentes, in Achaon monte ingentes arbores fieri Bellonius scribit, qui in Græcia quinque genera notavit. Et in Indiæ occidentalis insulis Nicaragua, & nova Hispania Lauri venustæ & editæ exurgunt.

#### Laurus sylvestris.

Laurus sylvestris *sz p. n. 3 ei* Theoph. i. hist. 15. inter perpetuò virentes è sylvestribus: Plinius l. 15. c. 30. hujus inter Lauri genera meminit, inquit: Tinus, hanc sylvestrem Laurum aliqui intelligunt, nonnulli sui generis arborem, cui cæreula est bacca: & M. Cato lib. de re rust. 8. Lauri sylvatici nomine intelligere videtur.

I. Laurus syl. Corni fœminæ foliis subhirsutis. Tinus primus, Ang. Clus. hisp. & hist. Cam. Tab. Laurus syl. live Tinus. Ger. hor. Cam. Laurus tinus cæreula bacca, Ad. Lob. ico. Tinus, laurus syl. Cam. ep. Laurus tinus Dalechampi, Lugd. Tini aliud genus Corni fœminæ proceritate, Lob. Lentago, Cæalp.

II. Laurus syl. foliis venosis. Tinus 2. Clus. hisp. hist. Lugd. Tinus, Laurus syl. Dod. Tinus Lusitanica Clusii, Lob. Tab. Thinnus, Castapp. Laurus tinus Lusitanica, Ger.

III. Laurus syl. folio minore. Laurus sylvatica, Ang.

Tinus sive Laurus inodora & Italarum Lentago, Tinus tertius, Clus. hisp. & hist. Lugd. (Bello. Laurus regia, Cast. Tinus alter, Tab. Laurus tinus, Ger.

#### Lauri folio exotica.

I. Laurifolia Magellanica cortice acri. Cortex Winteranus, Clus. Lugd. Tab. Lauro similis arbor, cortice piperis modo acri in Pinguinum insula: 9. par. Ind. occid. Cortices acerrimi: in 9. par. Ind. occid. addit. Magellanica aromatica arbor, Clus. ex.

II. Laurifolia Americana, pomis capitis magnitudine. Cohyne in America Theveti, Lugd. Maraka & Tamaraka fructus, Clus. notis in Garz. Arbor fructu Struthio camelii ovum adæquante, Lerio par. 3. Ind. occid. c. 7. & 12. arbor Choyne. Fructus instar Cucurbitæ, per quæ baculû figut, & Tamaraka instrumentum fit, Stad. in def. Brasil.

Ex fructu non eduli pocula cõficiunt: Brasiliiani perforato, lapillis aut milio inditis, pro crepitaculo utuntur, quod instrumentum Maraca nominare, Lerius cap. 15. refert.

III. Laurifolia Javanensis. Mangestans foliis laurinis fructu exigui mali aurei suavissimi, Garziæ & Clus. qui addit folia mali formam magis referre.

Mangostans prunorum syl. modo crescit: 4. par. Ind. or. 6. sed figura, quæ tab. 15. habetur est Ligustri Ægyptiaci.

IV. Laurifolia Guinenensis. Arbor peregrina ex Guinea, Clus. ex. l. i. c. 9. Fructus instar mali magni ex flavo spadiceus, nigro polline plenus.

V. Laurifolia Guinenensis altera. Arbor peregrina Laurocerasi folio, an Bravas, Clus. exot. l. i. c. 12.

VI. Laurifolia Terenensis. Beretinus fructus, Clus. ex. l. 2. c. 17. Tab. Beretinus arbor, Lugd.

## LAUREOLA.

**L** Aureola à similitudine cum Lauri foliis dicitur, quæ mas est & fœmina, & à Dioscoride l. 4. c. 148. & 149. sub Chamædaphne & Daphnoide proponi à multis creditur. *καὶ αὐτὰν* virgas promittit singulari ramulo constantes, cubitales, rectas, tenues ac leves: & huic folia similia Lauro, at leviora multo & tenuiora, & viridiora: fructus verò rotundus rubens foliis annexus. *Δαφνοειδὲς* fruticulus est cubitalis, ramos multos habens à medio sursum modo flexiles & foliosos: cortex verò circa virgas viscosus valde: folia Lauro similia, at molliora, validiora & fructu continuata, mordentia & accendentia os & fauces: flores candidi: fructus verò nigri ubi ematurvit: radix super-

*vacua. Plinio l. 15. c. 30. est & Chamadaphne syl. frutex: & l. 24. c. 15. Chamadaphne unico ramulo est, cubitali sere folio tenui, lauri similitudine: semen rubens. At Daphnoidem Lauri genus fecit: sic enim l. 15. c. 30. Daphnoides frutex est ramosus, crassiore ac molliore quam Laurus folio, cuius gustatu accenditur os atque guttur: baccæ nigro rufis: & l. 23. c. 8. Daphnoides sylvestris Laurus est.*

I. Laureola semper virens flore viridi, quibusdā Laureola mas.  
Thymelæa foliis viridibus, Mesuæo.  
Laureola, Brunf. Gesl. hor. Dod.  
Thymelæa, Trag.  
an Chamadaphne, Matth. Lacun. Lon. Cast. cui & Laureola minor.  
Daphnoides, Dod. gal. Ang. Gesl. hor. Tab. cui & Daphnoides alterum genus.  
Daphnoides sive Laureola, Ad. Lob. Lugd.  
Daphnoides Dioscoridis, Cæf. cui & Mezereon, Arabum.

Baccis rubris dicit Matthioli: nigris in Silesia Camerarius.

II. Laureola folio deciduo flore purpureo: officinis Laureola femina.  
Chamælea sive Mezereon, Trag.  
Chamælea Germanica, Dod. ut: Cam. Thal.  
Daphnoides, Fuch. Tur. Cam. ep. flore purpureo, Tab.  
an Daphnoides, Matth.

Relicta aut Germanorum, Bellon.  
Daphnoides nostrum vulgare, Gesl. hor.  
Piper montanum, Ang. Gesl. hor.  
Laureola major, Cast.  
Thymelæa, Cord. in Diosc.  
Daphnis alterum, Lon.  
Chamadaphne sive pusilla Laurus, Ad.  
Meiereum Germanicum, Lob.  
Laurus pusilla, Eid. icon.  
Laureola femina & Daphnoides crocea, Lugd.  
Aliis Cneorum album Theophrasti ejusdem Daphnoides fructu croci colore: aliis Chamadaphne, id est humilis pumilave Laurus Dioscoridis videtur: licet Dalechampius Dioscoridi ignotum fuisse censet.  
Flore est subpurpureo, rarius albo: habetur major & minor, hæc q; Piper alpinum minus Gesl. lib. de hortis dicitur, ab hoc Cordus voluit granum Cnidium, quod Coccognidium appellatur, colligi: quæ cum maturaverint rubens, reliccata nigricant.

## CHAMELÆA.

**X** *Ἀμαλία, quæ Latinis etiam Chamelæa, quasi humilis olea, à similitudine cum Olea, & Oleago, & Oleastella: Mauritanis & hæc Thymelæa, & præcedens Laureola. Mezereon dicitur. Dioscoridi l. 4. c. 172. ramosa habet dodrantales, frutex est extremiorum genere, folia habet olea similia ac tenuiora & densa & amara, quæ gustum mordent, & arteriam abradunt. At Plinio l. 15. c. 7. Chamelæa frutex furculosus, non altior palmo, foliis Oleastris bacchiq;: & l. 24. c. 15.*

I. Chamelæa tricoccos.  
Thymelæa foliis magnis & tenuibus, Mesuæo.  
Chamelæa latifolia vel alba, Serapioni.  
Chamelæa, Matth. Dod. ut: Lac. Cord. in Diosc.  
Bellon. Gesl. hor. & ap. Lon. Clus. hisp. tricoccos, in hist. Lob. Cæf. Cast. Lugd. qui figurā Matthioli & Dodonæi exhibet.  
Thymelæa, Ang.  
Mezereon Arabum, Ad. Lob. ico. tricoccos, Tab.

Chamelæa vera, Cam.  
Flores pallidi, aut lutei: Hispanica candidior & brevior ipsa Gallica.  
II. Chamelæa alpina folio infernè incano.  
Chamelæa, Cneoron Galeni, Alypias Aëtii, Ang.  
Chamelæa alpina incana, Ad. Lob. ico. Lugd.  
Chamelæa incana Bononiensium, Lob.  
Chamelæa altera, Clus. hisp. & hist.  
an Chamelæa altera folio duro, Cæf.

## THYMELÆA.

**(-)** *ῥυμολία, quæ & Latinis Thymelæa, quasi Tithymelæa, ex Tithymalo & olea mixta facie, quā aliqui Diosc. l. 4. c. 173. scribente, Chamelæam aut Cneoron vocant, ex quo Cnidium granum, quod ipsius semen est colligitur: hæc, ut idem, virgas edit speciosas, numerosas, tenues, bicubitales: foliis Chamelææ sed angustioribus & pingentioribus: floribus candidis, ac inter ipsos fructu ceu myrti parvo rotundo, &c. Plinio l. 13. c. 21. & in quo nascitur granum Cnidium, quod aliqui linum vocant: fruticem verò Thymelæam, alii Chamelæam: est similis oleastro, foliis angustioribus, gummi si si mordeantur, myrti magnitudine, semine, colore & specie sativæ, ad medicinam tantum usum.*

I. Thy-



I. *Thymelæa foliis lini.**Thymelæa foliis parvis, Mesuæ.**Chamelæa tenuifolia & nigra, Serapioni.**Thymelæa, Matth. Dod. n. Lacun. Bellon. (cui & coccum gnidium) Lonic. Clus. hisp. & hist. Lob. Cæf. Cast. Lugd. qui tres figuras apposuit.**Thymelæa, Matth. ep. quoad folia, non fructum qui Chamelæa est.**Thymelæa vera, Gesl. hor.**Thymelæa grani Gnidii, Ad. Lob. ico.**Thymelæa 1. & 2. Tab. nam Matthioli & Clusii figuram exhibet.**an Thymelæa foliis lini, Cam.**Kaspey (Cassia Gaza vertit) Theoph. 6. hist. 2. esse, cuius duo genera proposuit, Guilandinus voluit, alterum Chamelæam, alterum Thymelæam.*II. *Thymelæa foliis acutis capitulo Succisæ, sive Alypum Montpelientium.**Alypum montis Ceti, sive herba terribilis Narbonensium, Ad. Lob.**Alypum Penæ, Lugd. Tab.**Empetron phacoides, Lugd.**Hippoglossum Valentinii, Clus. hisp. & hist. Tab. an Alypum, Matth. Lacun. Cam. Lugd. & Alipia, Lonic. quia Penæ dicit apud Matthiolum picturam corruptam esse.*III. *Thymelæa polygalæ glabris.**Sanamunda viridis vel glabra, in Prodomo.**Thymelæa species Myconi, Lugd.*IV. *Thymelæa foliis Chamelæa minoribus subhirsutis.**Sanamunda prima, Clus. hisp. & hist. Rauwolf. Lob. Cæf. Tab.*V. *Thymelæa foliis Kali lanuginosis salis.**Empetron, Ang.**Sanamunda 2. Clus. hisp. & hist. Lob. Cæf. Tab.**Cneoron, Cæf.**Cneoron nigrum Myconi, Lugd.**Sesamoides minus Dalechamp. Lugd.**Phacoides Oribasii quibusdam, Eid.*VI. *Thymelæa foliis candicantibus serici instar mollibus.**Tartonnair Galloprovinciæ Mafilienfium, Ad. Lob. ico.**Sesamoides majus mntorū Dalechampii, Lugd.**Sesamoides majus Scaligeri, Tab.**Sint qui cum sequenti eandem velint.*VII. *Thymelæa tomentosa foliis Sedi minoris.**Sanamunda 3. Clus. hisp. & hist. Cæf.**Cneoron Pantii.**Erica Alexandrina, Lob. Tab.**Sanamundas vocat Clusius, Granatenses Mauritanos imitatus, quia his ad corpus purgandum frequenter utuntur : & quia Thymelæa facultatibus pollent, huc retulimus.*

## CNEORON.

**C**neorum de multis plantis dici, non modo Plinius lib. 13. cap. 21. testis est, qui Thymelæam Cneoron à quibusdam appellari scripsit : & lib. 21. cap. 9. Cassiam ab Hygino vocari : & mox, Cneori duo genera sunt nigri atque candidi, hoc & odoratum, ramosa ambo, florent post æquinoctium Autumnii : que ex Theophrasto translata. Sed recentiores alii ad Laureolam, alii ad Chamelæam & Thymelæam : alii ad Rosmarinum, alii ad alios referunt. Theophrast. 6. hist. 2. Cneoron (Cassiam vertit Gaza) inquit genera duo, unum album, alterum nigrum : albo-solum est cutaneum, oblongum, figura oleæ quodammodo simile : nigrum, quale ramaricis, carnosum. Album supra terram miris se attollit & parum quid olet : nigrum valde odoratum est : radix utriusque in profundum descendit magna : rami multi, breves & lignosi, qui à terra, vel paulo supra dividuntur, lenti admodum, &c. Et Guiland. Cneorum utrumque, Chamelæam & Thymelæam esse, ex Aretæ, Dioscoridis, Galeni, Aëtii & Plinii traditione statuit.

I. *Thymelæa affinis facie externa.**Cneoron, Matthioli cap. de Cinam.**Cneoron alterum Matthioli } Lugd.**Oleander tyl. Avicen. Myconi }**Cneorum Matthioli, Clus. pan. & hist. Cam.**Cassia Matthioli, Chamelæa species, Tab.**Thymelæa minor, Cord. hist.*II. *Cneoron album folio oleæ argenteo molli.**Cneoron album Dalechampii, Lugd.**Dorycnium, Imperati**Dorycnium ex Sicilia, Cæf.**Dorycnium verum Plateau, Clus. hist. ap. 1.**Dorycnium quorundam seu potius Convolvulus rectus Creticus, Ponæ ital.*III. *Cneoro albo affinis.**Dorycnium forte Dioscoridis, Ponæ ital.*

NE.

## NERION.

**N**ῆριον ἢ ἰοδὸν Ἄρδον Græci vocant: alii ἰοδὸν ὀνόμαζον, à flore rose simili & foliis laurini: quare Apuleius, Rosa laurea. Rhododendros, inquit Plinius lib. 24. cap. 11. quia ne nomen quidem apud nos Latinum invenit, Rhododaphnen vocant, aut Nerium. Dioscorid. l. 4. c. 82. frutex est foliis amygdaliniis longioribus & crassioribus flore roseo & siliqua fructui amygdalino proxima, quæ de hiscens lanosa natura, acanthii pappos representante plena reperitur, &c. Plinio lib. 16 cap. 20. Nerion semipiterna fronde, rosea similitudine, caulibus fruticosum.

I. Nerion floribus rubescentibus.

Nerion, Trag. Cord. in Diosc. Ad. Lob. Tab. flor. rubro, Eysf.

Nerium, Matth. Fuch. Dod. gal. Turn. (qui 1. & 2. habet) Gef. hor. Lac. Lon. Cast. Lugd.

Oleander flore rubro, Ang.

Oleander, Desfe circa Tripolim, Rauwolf.

Rhododendron, Bellon. Gef. hor. Dod.

Oleander, Laurus rosea, Lob. ico.

Rhododaphne, Gef. hor. Cæf.

Nerion sive Rhododaphne, Cam.

In nonnullis Crætæ insulis ad ædicularum tra-

bes conficiendas aptum est, cum alibi pavum fir, Bellon. (Cam.

II. Nerion floribus albis: & Lob. Lugd. Tab. Nerion candidis floribus in montis Idæ conval- libus, Bellon.

Oleander flore albo, Ang.

Nerium sive Rhododendron flore albo, Eysf.

III. Nerio similis arbor: & Tab.

Nerfi facie arbor, Ad. Lob. Lugd. apud quem tim- lus transpositus est.

IV. Fructus Nerii siliquæ figura.

Kaye Baka, Clus. exot. l. 3. c. 19.

## SECTIO SECUNDA.

## CISTUS; CHAMÆCISTUS; LEDUM; LEDUM

Alpinum.

## CISTUS.

**K**ῖστος, κίστρος & κισσάριον, Latinis similiter Cistus & Cisthus dicitur, fortasse quod ejus species aliqua cissus id est Hedera, foliis rotundis sit.

Genera duo: Cistus non ladanifer, & Cistus ladanifer, qui Ledum dicitur. Cistus Dioscoridi lib. 1. cap. 126. frutex est ramulosus, foliosus, non altus: folia habens rotunda, nigra hirsuta: flores masculo, veluti mali punice, semina vero albi. Plinius l. 24. c. 10. sic ait, Græci vicino hedera vocabulo, Cisthon appellant fruticem majorem Thymo, foliis ocimi. Duo ejus genera, flos masculo roseaceus, semina albi. Verum Plinius Cisthum cum Cisso, id est Hedera, confundit, Theophrasti 6. hist. l. 1. lectione immendata, ubi cissus pro cissu habetur, deceptus: & Gaza, Hederam pro Cisso reddidit.

Cistus mas.

I. Cistus mas folio rotundo hirsutissimo.

Cistus mas, Matth. ep. Ang. Tur. Lac. Lon.

Cistus, Cæf. mas 4. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cistus mas folio rotundiore Matthioli, Lugd.

II. Cistus mas folio oblongo incano.

Cistus mas, Gef. hor. Ad. Lob. Cam.

Cistus, Dod. mas 1. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cissi alterum genus, Cæf.

Cistus mas latifolius, Tab.

Flos colore rubro est, eoque nunc saturatiore, nunc dilutiore.

III. Cistus mas angustifolius.

Cistus mas 2. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cistus mas angustifolius 2. Clusii, Lob.

Cistus mas angustifolius, Tab.

IV. Cistus mas folio brevior.

Cistus mas 3. Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd.

V. Cistus mas foliis Chamædrys.

Cistus mas 5. Clus. hisp. & hist. Lob. ico. Lugd.

Cistus mas supinus sinuatis & fimbriatis foliis, Lob.

Cistus mas tertius, Tab.

Cistus semina.

I. Cistus semina folio Salviæ.

Cistus, Cord. in Diosc. Cæf.

Cistus

Cistus fœmina, Matth. Dod. ut Ang. Gefn. hort. Lacun. Tur. Lonic. Advers. Lob. Clus. hisp. & hist. Castor. Camer. & Lugdun. qui & Matthioli & Clusii figuram exhibet, ut & Tabernæmontanus.

Cistus flore albo, Rauwolf.

Variat: est enim elatior & rectis virgis: est & supinus humi sparsus: in utroque flos candidus, quandoque luteus ochræ colore.

II. Cistus folio plantaginis.

Tuberaria major Myconi, Lugd.

Majorem & minorem Lugdunensis pingit.

III. Cistus fœmina portulacæ marinæ folio, latiore obtuso.

Cistus folio halimi 1. Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Cistus fœmina folio portulacæ marinæ, sive Githmi, Lob.

IV. Cistus fœmina portulacæ marinæ folio angustiore mucronato.

Cistus folio halimi 2. Clus. hisp. & hist. Lobel. Lugd. Tab.

V. Cistus folio spicæ.

Cistus folio lavendulæ, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd.

Cistus, Tab.

VI. Cistus folio Sampfuchi incano.

Cistus folio Sampfuci, Clus. hisp. & hist. Lobel. Lugd.

VII. Cistus folio Stechadis citrinæ.

IX. Cistus folio Majoranæ.

Cistus folio majoranæ defluxis floribus, Advers. Lob. ico.

Helianthes species Penz, Lugd.

IX. Cistus folio Thymi: & Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd. Tab.

X. Cistus folio Salicis.

Cistus annuus 1. Clus. hisp. & hist. Lugd.

an Hydrophyllon herba Athenæ, Clus.

Cistus annuus folio Salicis, Lob.

Cistus annuus, Tab.

Variat: 1. foliis amplioribus, floribus majoribus: 2. foliis angustioribus, floribus minoribus.

XI. Cistus flore pallido punicante macula insignito.

Cistus annuus 2. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cistus annuus guttato flore, Penz.

Helianthemum flore maculoso, Colum.

Variat: est enim flore maculoso, macula ex nigro rufescente, sive puniceo: vel non maculoso.

XII. Cistus Ledi folio.

Cistus annuus folio Ledi, Lob. Tab.

Cistus annuus alter Lobeli, Lugd.

Alyssum trigonum, Eidem.

XIII. Cisti folio arbor exotica.

Arbor exotica Cisti folio, Ad. Lob. ico.

Cisti vel Ledi arbor peregrina Penz, Lugd.

Arbor cisti folio, Lob.

Cisti folio exotica arbor, Tab.

Cistus exotica, Ger.

## HYPOCISTIS.

**C**um è Cisti radicibus veluti germen quoddam expulset, id quod Hypocistis dicitur, de eo paucis. Cisti, inquit, Diosc. l. 1. c. 127. radicibus adnascitur, quod ~~varius~~ dicitur, nonnullis ~~poëta~~ ~~poëta~~ ~~poëta~~, & mali punice cytino simile est: quedam rufa: altera herbacea, tertia candida cernitur.

Hypocistis sub Cisto.

Hypocistis, Matth. Dod. Gal. Ang. Cord. in Diosc.

Lon. Cast. Cat. Clus. hisp. & hist. Ad. Lob. Lugd.

Tab. Ger.

Limodori genus, quod Hypocistis, Dod.

Succus qui extrahitur, etiam Hypocistis & officinis Hypocistidos, dicitur.

Sub Cisto Hispanico rubra: sub Cisto folio halimi, lutea: & sub Ledo quem octavo loco recensuimus, varii coloris, pallecente, lineis purpureiscentibus & nonnihil virescentibus distincto Clusius notavit: & hanc posteriorem ~~aiquod~~ ~~aiquod~~ ~~aiquod~~ sive Cynomori genus nuncupat.

## CHAMÆCISTUS.

I. Chamæcistus vulgaris flore luteo.

Hyssopus campestris, Trag.

Panax Chironium, sive Flos solis, Matth. Cast.

Lugd.

Panax Chironium quorundam, Ang.

Gratia Dei, Dod. gal. Gefn. hort. cui & Hyssopoides.

Helianthemum, Cord. hist. Lob. Thal. fl. luteo, Eyst.

Consolida aurea Chirurgis, Cordi schol.

NN

Hyf

*Hyssopus montanus* five *syl.* Lon.

*Flos solis*, Dod. (cui & *Cisti* & *Ledi* quædam species) Cast. Cam.

*Helianthemum* vulgo dictum, Clus. hisp.

*Helianthemum* Plinii, Clus. pan.

*Chamæcistus* 1. Clus. hist. qui ad *Cisti* sœminæ tertiam classem reducit.

*Helianthemum* Germanicum 2. Tab.

*Helianthemum* five *flos solis*, Lugd.

*Chironia*, Cæs.

Hoc quibusdam *Panax Chironium* Diosc. creditur. *Nastur* *χερσίνιον* folia habet amaraco similia, flores aureos, radicem tenuem neq; altam, gustu acrem: sic Diosc. l. 3. c. 37. Ab aliis *Helicanthe* Plinii l. 24. c. 17. censetur: *Helicanthen* scribitur vocari in Themiscyra regione, & Ciliciæ montibus maritimis, folio myrti, sed quid in hac brevitate pronunciare licet?

II. *Chamæcistus* vulgaris flore albo majore.

*Helianthemum* albis floribus, Lob. ico. Eyst.

*Chironia* flore candido, Cæs.

*Helenium* minus Dioscoridis, Lugd.

A priore differt floribus colore albo, ejusque magnitudine, Ladani specie.

III. *Chamæcistus* Friscus foliis Nardi Celticæ.

*Hirculus* Friscus Dortmanni, qui *Chamæcisti* genus, Clus. cur. post.

Hunc à Dortmanno quoque accepimus.

IV. *Chamæcistus* foliis minoribus & incanis.

*Flos solis*, Lob. Dod. utrique quoad iconem.

*Cistus humilis* 1. Clus. hisp.

*Helianthos* five *Flos solis*, Ad.

*Cistus* parvus Clusii, Lob.

*Chironia* aliud genus, Cæs.

*Chamæcistus* 5. Clus. hist. ico. at 4. descr.

*Helianthemum* 1. facivum, Tab.

*Helianthemum* Anglicum luteum, Ger.

V. *Chamæcistus* foliis Thymi incanis.

*Panax chironium* minus, Cam. epi.

*Chrysanthemis*, Erica minima, Ad.

*Cistus humilis* angustifolius, Lob.

Erica chrysanthemos minor, Lob.

*Cistus humilis* 2. Clus. hisp. Lob. ico.

*Chamæcistus* 5. Clus. hist. descr. at 4. icon.

*Helianthemum* peregrinum angustifolium, Tab.

Ger.

Huc referatur

*Helianthemum* Germanicum 3. Tab.

*Helianthemum* album Germanicum, Ger.

VI. *Chamæcistus* quadrifolia.

*Helianthemum* Sabaudicum, Tab. Ger.

VII. *Chamæcistus* foliis myrti minoris incanis.

*Chamæcistus* 2. Clus. pan. 3. Eid. hist.

*Cistus humilis* latifolius, Tab. Ger.

IX. *Chamæcistus* angustifolia.

*Chamæcistus* 1. angustifolius, Clus. pan.

*Chamæcistus* 6. Eid. hist.

*Cistus humilis* angustifolia, Tab. Ger.

IX. *Chamæcistus* serpillifolia floribus canis.

an Rosa alpina altera foliis minimis, Gesl. hor.

Alpina altera, Ad.

*Anonymus* altera, Clus. pan.

*Chamæcistus* 7. Clus. hist.

X. *Chamæcistus* hirsuta.

*Chamæcistus* 4. Clus. pan. 8. Eid. hist.

*Cistus humilis* Austriaca, Tab. Ger.

XI. *Chamæcistus* repens serpillifolia lutea.

*Chamæcistus* 3. Clus. pan. 2. in hist.

*Cistus humilis* serpillifolia, Tab. Ger.

XII. *Chamæcistus* ericæ folio luteus.

Cori similis frutex in maritimis, Cæs.

Erica chrysanthemos, Lugd.

Coris Dioscoridis Guilandino dicebatur.

Hujus duæ species altera brevioribus foliis & humilior, altera quadruplo longioribus & elatior.

## CISTUS LEDUM.

**C**isti alterum genus, inquit Dioscorides l. 1. c. 128. à nonnullis *λεδον* appellatum frutex eodem quo *Cistus* nascens sed foliis longioribus ac nigrioribus, quæ pingue quidpiam verno tempore contrahunt, ex quo conficitur. Plinio l. 12. c. 17. sunt qui herbam in Cypro ex qua *Ladanum* fiat, *Ledon* appellant: etenim illi *Ledanum* vocant, huc pingue insidere, &c. *Ladanum* esse aspidem hircorum barbis gemibus, villosis inhaerens, &c. *Ladanum* colligendis rationem Dioscorides & Plinius l. c. referunt: quomodo verò in Creta colligatur, Bellonius l. 1. observat. & ex eo Clusius descripsit.

I. *Cistus*

## I. Cistus ladanifera Monspeliensium.

Ledum, Matth. ep. Lac. Cast. Lugd. Tab.

Ladanum, Matth. Ang. Cæf. Tab.

Cisti species secunda, Dod. gal.

Cistus ladanifera, Tur.

Lada &amp; Ladon cisto similis frutex, Cord. in Diosc. &amp; hist.

Ledon alterum cisti genus, Gef. hor.

Laudanum, Lon.

Ladanum latifolium, Rauwolf.

Cistus ledon, latifolium, Ad. def.

Ledum latiore folio Italicum, Cam.

Cistus ledum Matthioli, Ger.

## II. Cistus ladanifera Hispanica incana.

Cistus ledon, Dod.

Cistus ledon primum, Clus. hisp. Lobel. Lugdun. Ger.

Ledi species Bauhini, Lugd.

Ledon Clusii 1. Tab.

Cistus ledon primum angustifolium, Clus. hist.

## III. Cistus ledon foliis laurinis.

Cisti ledi 1. altera species, Clus. hisp. &amp; hist. Lob.

Ladanum alterum, Cæf.

an Cistus maritimus, Lugd.

## IV. Cistus ledon foliis populi nigrae major.

Ledon 2. Clus. hisp. Lugd. Tab.

Ledon latifolium 2. majus, Clus. hist.

Cistus ledon 2. Clusii, Lob. Ger.

## V. Cistus ledon foliis populi nigrae minor.

Cisti ledi 2. altera species, Clus. hisp. Lugd.

Ledon 2. latifolium minus, Clus. hist.

Cistus ledon populnea fronde alter, Lob.

Cistus ledon 3. populnea fronde, Lugd.

Cistus ledon populnea fronde, Tab. Ger.

## VI. Cistus ledon Cretense.

an Cistus mas, Matthioli. in magnis figur. &amp; Lugd.

Cistus è qua Ladanum in Creta colligitur, Bellon.

Ledon 3. Clus. hisp. Lob. Lugd.

Ledon 3. Cyprium, Clus. hist.

Plantæ ex qua Ladanum Cretenses colligunt foliis &amp; floribus cisti feminæ, Alp.

Ledon à Græco diversum &amp; longè majus in monte Olympo, Bellonius notavit.

## VII. Cistus ledon folio myrti.

Cistus ledon latifolium, Ad. ico.

Cistus ledon Rusci aut Myrti folium, Lobel. ico.

Cistus ledon aliud latifolium Penz., Lugd.

Cistus ledon myrtifolium, Tab. Ger.

## II X. Cistus ledon hirsutum.

Ledon 4. Clus. hisp. &amp; hist. Lob. Lugdun. Tabern.

Ger.

Ledon alterum angustiore folio, Cam.

## IX. Cistus ledon foliis oleæ sed angustioribus.

Ledon 5. Clus. hisp. &amp; hist.

Cistus ledon, Ad.

Ledon Narbonense, Lob.

Cistus ledon Narbonense, Tab.

Cistus ledon Lobelii, Ger.

Cistus flore albo, Eyst.

## Huic similem sub

Cisto adulterino pingunt, Tab. &amp; Ger.

## X. Cistus ledon angustis foliis.

Ledon 6. Clus. hisp. &amp; hist. Lob. (qui in iconibus hunc cum priore junxit) Lugd.

Ledum quintum, Clusii, Lugd. Ger.

Ledon Clusii nonum, Tab.

## XI. Cistus ledon foliis rorismarini hispidis.

Ledon 7. Clus. hisp. &amp; hist. Lobel. Lugd. Tabern. Ger.

## XII. Cistus ledon foliis rorismarini subtus incanis.

Ledon octavum, Clus. hisp. &amp; hist. Lob. Lugd.

Ladani species foliis Rosmarini, Rauwolf.

Ledum Clusii quintum, Tab.

Cistus ledon sextum, Clusii, Ger.

## XIII. Cistus ledon foliis rorismarini sed non incanis.

Ledon nonum, Clus. hisp. &amp; hist. Lob. Lugd.

Ledum Clusii sextum, Tab.

## XIV. Cistus ledon foliis Thymi.

Ledon decimum, Clus. hisp. &amp; hist. Lob. Lugd. Ger.

Ledum Clusii octavum, Tab.

## XV. Cistus ledon foliis rorismarini ferrugineis.

Rosmarinum syl. Matth. Cast.

Chamaepeuce, Cord. in Dioscor. &amp; hist. descr. Lugd.

Ledum foliis rosmarini alterum, Lob.

Ledum Sileiacum, Clus. pan. &amp; hist. Tabernæm. Ger.

Ledum rorismarini folio, Tab. Ger.

Rosmarinum syl. sive Bohemicum Matthioli, Lugd.

Rosmarinus syl. Dod. belg.

XVI. Cistus ledon foliis salicis angustifolia.

Chamaerhodendros montana Allobrogum lentiscifolia, Ad. Lobico.

Rosmarinum syl. minus, Cam. ep.

Rosmarinum syl. a. equ. } Clus. pan. & hist.

Cistus Silesiacus

Chamaerhodendros alpina angustifolia, Tab.

Chamaerhodendros montana, Ger.

XVII. Myrtocistus Pennæ, Clus. pan. & hist.

Ger.

Myrtocistus Clusii, Tab.

*Ledum alpinum.*

I. *Ledum alpinum* hirsutum.

Alpigenæ Chamaerhodendri varietas, Lob.

Balsamum alpinum Gesneri, Lobelico, Tabern. Cam.

*Ledum alpinum*, Clus. pan. & hist. Tab.

Cistus ledon alpinum, Ger.

II. *Ledum alpinum* foliis feræ rubiginem nigricantibus.

Frutex in alpinis roseo flore, Gesn. ad Cordum cap. de Chamaerio.

Rosa alpina, Gesl. hor. & Fractio, potius *Ledum alpinum*.

Nereum alpinum, Gesn. de lunar.

Chamaerhodendros alpigena odora, Ad. Lob.

Ledi alpini genus alterum, Clus. pan. & hist.

Rhododendron alpina quibridam, Cæf.

Evonymus Theophrasti 3. hist. 18. Lugd.

Chamaerhodendros alpina latifolia, Tab.

Chamaerhodendros alpigena, Ger.

Hujus ramis tubercula gallarum instar adnascuntur: & floris colore variat, communiter dilute rubentis: at in Pyrenæis, flore tantum albo reperitur.

## SECTIO TERTIA.

*MIRTUS; RUSCUS; VITIS & RADIX IDÆA;*

*BUXUS; OLEA; SALIX; AGNUS CASTUS; SPIRÆA;*

*Ligustrum & Phillyrea.*

### M Y R T U S.

**M**YRTUS & Murtus Latinis: Græcis μύρτη & μυρτίνα nominatur, à Myrsine Asbeniensi pœdia, pulchritudine & robore insigni, amica Palladi, quam juvenis ab ea cursu & palestra superatus interemit, invidia ductus, quod elegantia, ceterisq; natura dotibus, reliquis virginibus præstaret: arbuscula in demortua locum successit, semper Minerva, ut olea chara. Græcum ei nomen remanet, ut Plinius lib. 15. cap. 29. scribit, quo peregrinam esse appareat. At quibusdam sic dicta, propter emulam Myrrhæ quandam odoris gratiam, quæ in ejus bacis recentioribus, observatur. Et Theoph. Myrti pluribus in locis meminit, nulla tamen descriptione addita.

Genera Myrti multa sunt: est sativa & sylvestris: sativa aut nigra aut candida: sylvestris alia lera alia spinosa: illa, quæ sativa opponitur, itidem vel nigra, vel candida. Dioscoridi haud dubie cognita, ut cui lib. 1. cap. 155. μύρτη sativa nigra, medicina utilior candida: quæ & Plinius lib. 23. cap. 9. habet. Theophrastus non videtur differentias agnovisse, siquidem l. 6. caus. 27. scribat, Myrtum Aegypti odoratam esse, quanquam cetera inodorate sint, verum hoc propter loca servida evenire. Plinius l. 6. alia patriâ alia blebeia: addens: Catoni tria genera, nigra, candida, conjugalis: nunc & alia distinctio, sativa aut sylvestris & in utraque latifolia: in sylvestri propria oxymyrsine: sativarum genera topiarii faciunt. Tarentinum folio minuto, nostratem patulo, exoticam densissimo, senio foliorum versibus: ramosa utraque alia: conjugalem existime nunc nostratem dici: hac ille. Bacca μύρτη Græci, Latini Myrta & Murtia, officina Myrtilli dicuntur.

I. Myrtus communis Italica.

Myrtus, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Gesn. hor. ap.

Lon. Cæf. Lugd.

an Myrtus alba, Ad.

Myrtus communis Italica, Cam.

Alia est nigra, colore tantum fructus different.

II. Myrtus latifolia Romana.

Myrtus nostras cum conjugali eadem, Plinio.

Myr-

Myrtus Romana, Matth.

Myrtus major, Dod.gal.Ad.

Myrtus altera, Dod.

Myrtus sativa, Cast.

Myrtus laurea maxima, Lob.

Myrtus latifolia, Bellon. Clus.hisp. & hist.

an Myrtus exotica Plinii, Cæf.

Hanc & sterilem & fructiferâ Bellonius notat.

I II. Myrtus latifolia Bœtica 1. vel foliis laurinis.

Myrtus Bœtica latifolia domestica 2. Clus.hisp. & hist.

Myrt. Bœt. latif. domest. five laurea secunda, Lob.

Variat: hæc enim foliis est minoribus & paulo densioribus: alia majoribus & paulo tenuioribus.

I V. Myrtus latifolia Bœtica 2. vel foliis latis confertim nascentibus.

Myrtus Bœtica latifol. exotica, Clus.hisp. & hist.

V. Myrtus latifolia Belgica.

Myrti classis altera five latifolia triplex, & Myrtus media, Clus.hist.

Varietates hujus sex Lobelius proponit.

VI. Myrtus angustifolia Bœtica.

Myrtus exotica, Matth.Cast.Lugd.

Myrtus tertia, Dodon.

Myrtus Bœtica angustifolia exotica, Clus.hisp.an. & hist.

Myrtus exotica Plinii pluribus foliorum versibus, Lob.

an Myrt. baccis magnis cinereo cæruleis, Rauw.

VII. Myrtus sylvestris foliis acutissimis.

Myrtus syl. Matth.

Myrti majoris quinta species, Lob.

Myrtus Bœtica syl. Clus.hisp. & hist.

Myrtus latifolia, Eyst.

sub Myrti ramulo cum flore ac semine pingitur apud Dodonæum.

I I X. Myrtus foliis minimis & mucronatis.

Myrtus albis baccis in Asia, Bellon.

Myrtus domestica fructu albo, Clus.hisp. & hist.

Myrtus prior, Dod.ico.

Myrtus nona angustifolia, Lob.

Myrtus Hispanica angustissimi folii, Cæf.

Myrtus minima angustifolia, Lugd.

Hujus & altera species, folio per omnia teneore, exiliore & angustiore.

I X. Myrtus minor vulgaris.

Myrtus Tarentina (à Tarento Apuliz urbe) Matth.

ast. Lugd. Cam. Clus.hist. Eyst.

Myrtus minor, Dod.gal.Ad.

Myrtus minor & Tarentina, Clus.hisp.

Myrtus minor vulgaris, Lob. qui differentias quatuor facit.

Myrtus, Tab.

Myrtidanum *μυρτίδαρον* Dioscoridi l. 1. c. 156. est quod Myrto adnascitur, inæquabile, verrucosum & concolor: & perinde quasi manus Myrti caudicem amplectitur. Sed Plinio l. 14. c. 16. & l. 23. cap. ult. Myrtidanum est vinum, ex sylvestris Myrti baccis factum.

Myrti coccus.

Myrti excrementum five granum kermesinum, ejusdem ferè cum Cocco baphica naturæ, Myrti minoribus ramis adnascens, unico animali vivo vesiculæ inclusio, Bellon.

X. Pseudomyrtus, frutex myrto admodum similis Bellon. quid?

XI. Myrtus Indica.

Avacari, Garz. Frag. Cast.

In India orientali, in montibus Malavar.

*Myrto similes exotica.*

I. Myrto similis Indica fructu racemoso.

Coca, Ciecæ, Monard. Lugd. Clus. in Garz.

Coca herba, Benzoni p. 6. Ind. occid. l. 3. cap. 10. & p. 9. l. 3. cap. 20. & l. 4. c. 22. ubi habetur Indis hujus folia pro pecunia esse.

Coca occidentalis, Fragosus.

Arbor pumila foliis Myrti, vel ut alii Rheis coriariorum, cujus in tota Peru usus est, folio ore detento, famem & sitim aliquandiu inter peregrinandum levantes.

II. Arbor tristis myrto similis.

Arbor tristis, Garz. Acoftæ, Frag. Clus. ad Garz. Lugdun. (qui & Acoftæ & Clusii figuram licet diversis exhibet) Tab.

Arbor tristis, in Malacca Singady aliis parificatocapul, quart: Turcis, gul: Linscot. part. 4. Ind. orient. 15.

Arbore triste de Dia. par. 8. Ind. or.

Arbor foliis Myrti Clusio: prunaliis: cujus flores singulis noctibus renascuntur, qui albi, pediculo luteo aut rubeo si mati, quo Indi Croci loco utuntur, & ex floribus aquam exillant, quam Aquam de Mogli appellant.

De arbore tristi Garzias & Fragosus agentes, cum ejus flores gratissimi odoris sint, duorum adhuc florum meminere, & Linscotus peculiare genus exhibet.

I. Mogoripriores dicti, mali aureæ floribus odoratiore, quarum stillaticius liquor eundem apud istos usum obtinuit, quem apud Hispanos aqua florum mali aureæ.

II. Champe dicuntur alii flores, quorum etiam magnus apud illos usus est, odore graviore, quam Liliū album, Garz. Frag.

III. Fulle, floscolorum genus apud Indos ex arbore quadam toto anno durans, suavissimi odoris, Lincot. 4. par. Ind. or. 10.

IV. Flos Indicus arboreus liliorum specie. Floribundio, ex arbore quæ solum flores, fructus nequaquam gignit, Joseph. Acostæ 1. 4. cap. 27.

## R U S C U S.

**R**uscus Dioscoridi l. 4. c. 146. *μυρτὴν ἀγρία*, myrtus sylvestris dicitur: alii *ἰσχυρὴν*, acuta myrtus & Myrtacantha. Plinius l. 23. cap. 9. inquit, Castor Oxymyrinen myrti foliis acutis, ex quæ sunt ruti scapa, Ruscum vocavit. Theophrastus hist. 17. *κρυπτομυρτὴν*. Huius fructum Arabes Cubebæ vocant, existimantes Carpesium apud Galenum 7. simpl. & 1. de Antidot. esse, quia nihil de Carpesio apud Dioscoridem, ut nec de Rusco apud Galenum invenitur: sed revera Rusci fructum à Cubebæ differre, ut rectè Leoniceus notavit.

Ruscus, Trag. Matth. Cord. in Diosc. Gesl. hort. Bellon. Lac. Ad. Lob. Cæf. Lugd. Cast. Cam. Tab. Eyttet. Ger. five Bruscus. Ruscus verus, Lon.

Ruscum, Dod. ut. Centromyrini Theoph. & Oxymyrine, Ang. Myrtus syl. Tur. Myrtacantha, murina spina, Lob. ico.

VITIS IDÆA sive MYRTILLUS,  
& Idæa Radix.

**A** *Ἰδαία* & *Ἰδαία*, sive Vitis ea parte Idæ, quam vocant Phalacra, nascitur: est fruticosa, virgo parva & ramulus cubit alibus pene exportigitur, quibus acini ad latera adherent, nigri, saba magnitudine, acerbis, vinaceorum instar aliquid continentes: solum rotundum, individuum, parvum. Idem pene Plinius l. 14. c. 3. Myrtilli autem dicuntur à forma baccarum, quæ Myrti baccis similes sunt.

I. Vitis Idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante.

Myrtillus, Matth. Lon. Cast.

Vaccinia nigra, Dod. ut: Ad. Lob. Ger.

Radix Idæa fructu nigro, Ang.

Vitis Idæa nigris acinis, Gesl. Fract.

Myrtillus Germanica, Lugd.

Vitis Idæa vulgaris baccis nigris, Clus. pan. & hist.

Theophrasti, Eid. hist.

Vitis Idæa nigra, Cam.

Vitis Idæa 1. Tabern. & Vitis Idæa 2. major, Eid.

Bagolæ 1. genus, Cæf.

Fructus exigui, Gallis Bleuete: par. 2. Amer.

II. Vitis Idæa foliis oblongis albicantibus.

Myrtillus grandis, Trag.

Vitis Idæa nigra major, Thal.

Vitis Idæa 2. Clus. pan. & hist.

Vitis Idæa 3. Tab.

Vaccinia Pannonica, Ger.

III. Vitis Idæa foliis oblongis acuminatis bacis rubris insipidis.

Vitis Idæa rubra Bavarica, Cam.

IV. Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis baccis rubris.

Myrtillus exiguus, Trag.

Vaccinia rubra, Dod. gal. Ad. Lob.

Radix Idæa fructu rubro, Ang.

Vitis Idæa species altera acinis rubris, Gesl. hort.

Vitis Idæa rubra sive Vaccinia rubra, Dodon.

Rhus Plinii minor, Emilii, Thal.

Idæa vitis, Lugd.

Vitis Idæa rubra, nonnullis Rhus minor Plinii, Cam. ep.

Vitis Idæa buxeis foliis, Clus. hist.

Folius est buxi interdum levissimè ceu serratis marginibus.

V. Vitis Idæa foliis subrotundis exalbidis.

Vitis Idæa altera, Clus. pan. & hist.

Vitis Idæa Geisneri major, Cam.

VI. Vitis Idæa foliis carnosis & veluti pæatis, sive Idæa radix Dioscoridi.

Uva urfi Galeni, Clus. hisp. & hist. Lob. Tab.

Vaccinia urfi, Ger.

Dioscor. l. 4. c. 44. *ἰδαία πίττα*, oxymyrine (id est Rusco) folia similia habet: juxta ipsa verò caproli



preoli exigui sunt, ex quibus etiam flos erumpit: radix præclare adstringit.

Αἰθλοῖαουλ Galeno 6. de comp. med. 1. 4. in Ponto nascitur planta humilis & fruticosa, folio Memecyli (five Arbuti) fructum ferens rubrum, rotundum gustu austerum.

Hanc ex Hispania foliis longioribus quidem accepi, apud nos tamen ad montem Crenzacensem provenit.

VII. Vitis Idæa palustris

Vaccinia palustris, Dod. ut: Ad. Lob.

Oxycoccum, Cord. hist. Clus. pan. Cam. Th. Eyst.

Acinaria palustris, Gef. hor. in Rosâ alpina.

Serpillum acinarium, Gef. col.

Erica 6. baccifera, Lugd.

Vitis Idæa 3. in palustribus, Clus. hist.

An Samolus Plinii l. 2. c. 11. sit, Dodon. edit. gal. dubitat, Samolū, inquit Plinius, herbā nominavere, nascentem in humidis, nullas alias notas addit.

IX. Frutilla in Chile.

Ceraforum ferè sapore, fructus est non arboris sed plātē, coloris mori nō satis maturi: p. 8. Ind. occid.

## B U X U S.

**B**uxus & Buxum, Græcis πύθος, διὰ τὸ πυκνὸν τὸ ξύλον. à densitate ligni dicitur. Theoph. 3. hist. 15. Buxus, magnitudine est haud procera, folium ei Myrto simile: loci frigidus & asperus nascitur.

Genera tria Plinio l. 6. c. 16. Gallicum quod in metas emittitur, amplitudineq; prociora, Oleastrum in omni usu damnatum, gravem præfert odorem. Tertium genus nostrates vocant sylvestre, ut credo mitigatum satū: diffusius & densitate parietum virens semper ac consile. Sic apud nos quadam frutex tantum est, quadam in arborem magnam assurgit: & ex ejus radice ob varias maculas, & intortos linearum discursus, cochlearia, cultellorum manubria, & imagnicula in monte Jura ad S. Claudium conficiuntur: Sunt qui florere negent sed malè.

I. Buxus arborefcens.

Buxus, Brunf. Matth. Dod. ut: Fuch. Bellon. Gefn. hort. Tur. Lon. Ad. Lob. Cxf. Cast. Lugd. Cam. Tab. Eystett.

Buxus vulgaris, Trag.

II. Buxus foliis rotundioribus.

Chamæpyxos, Trag. Taber.

Buxus humilis. Dod.

Hòc ad areolas hororum muniendas frequenter utuntur.

III. Chamæbuxus flore Coluteæ.

Fruticulus exiguus foliis myrtinis, floribus papilionaceis ferè, diversis coloris, Cord. obs. syl.

Rhus myrtifolius Plinii Gefneri, Cam.

Chamæbuxus, Gef. col.

Anonymos flore Coluteæ, Clus. pan. & hist.

Anonymos Pervincæ folio, Cam.

Pseudochamæbuxus, Eyst.

an Myrtus tenuifolia, Thal.

Varia floribus colore & odore: colore, quia flavescunt, vel ex purpura rubescunt: odore, quia in odori majori ex parte, nonnulli odori sunt.

## O L E A.

**O**lea, Græcis λαιά dicitur, quod à τὸ λαίον h.e. lave vel lubricum deducitur: aut à λαίω, id est, lavigo, lubrico, quod producat id quod levigat, lubricatq; videlicet oleum, cujus quavis lubricandi vis est. Sic & bacca, arboris nomine λαιά, Latine oliva vocantur: quas cum nigrescere incipiunt Drupas, Græcos Drypetas vocare, Plinius l. 15. c. 1. scribit: & Druppa l. 12. c. 27. Arborem Dioscorides non descripsit: at Theoph. multa hinc inde habet, inter quæ hæc placet: Olea arbor est multifida, l. 1. hist. 5. medullam parvam & incertam gerit ut buxus, l. 1. hist. 9. nodosa est gongros γόνγρος: à quibusdam vocatos habet, l. 1. hist. 13. viret perpetuò, sed non semper eadem durans folia, sed alia proveniunt. alia exarescunt, l. 1. hist. 15. & angusta sunt, l. 1. hist. 16. semen carnosum & nucleus interjacet, caro enim in nucleo est, l. 1. hist. 8. succus pinguis, l. 1. hist. 19. flores foliati, sed pusilli l. 1. hist. 21. & circa fructum ipsum producantur, & prostrati perforati spectantur, l. 1. hist. 2. Olive alia fructum nulla carne, sed oleo refertum producant: alia carnosum sine oleo præstant, 2. caus. 4. Genus alterum quod Aegyptium appellamus, ubertate ac magnitudine fructus excellit. Tandem 4. hist. 8. olea maritima meminit, quæ folia similis Aria habeat, fructum proximum his olivis & lachrymam emittere, ex qua Medici medicamentum sistendi sanguinis componant.

Genera: Dioscorides Olea sativa & olivarum colymbadum: Olea sylvestris & olea Aegyptiaca l. 1. c. 137. & seq. meminit. At Virgilio, etiam Plinio l. 15. c. 1. reserente, Olivarum tria genera, Orchites, Rhadios & Pausas: nec plura genera Hetruriam agnosce, inquit Matthiolus. Flin. l. 15. c. 3. prima colligitur Pausa, cui plurimè carnis: mox Orchites, cui olii, post Rhadios: subjungit Liciniam, Cominiam, Contiam, Sergiam, quam Sabini regiam vocant: &

mox:

*nox: regia ab aliis majorina, ab aliis phaulia, grandissima, alioquin minimo succo: & in Aegypto carnosissima, olei exiguum: Decapoli verò Syria perquam parva, nec Cappari majores, carnes tamen commendantur. Colymbades franguntur, eademq; herbarum viridium succo condiuntur (ut in Gallia Narbonensi, saniculo) Sunt & praulces, per se tamen siccate, uvuq; passu dulciores, admodum rara in Africa & circa Emeritam Lusitania. Sic Columella decem genera, Pausia, Lucinia, Sergia, Radius, Nevia, Culminia, Orbites, Algiana, Murtea, Circites. Sanè Olearum differentia ex fructu magis quam arbore spectantur, scilicet in magnitudine, pinguedine, probitate & colore. Et Bellonius de cult. notat, in vallibus insulae Corcyra in Gracia, Oleus esse semper virentes, quæ in Quercu altitudinem excrefant.*

I. Olea fativa, *ἡ ἀσία ἡντιο* &c.

Olea, Brunf. Trag. Tur. Cord. hist. Ang. Bellon. Gesl. hor. Lon. Dod. Ad. Lob. Rauwolf. Cæli. Cam. & Ind. occid. par. 9. l. 4. c. 32.

Olea fativa, Matth. Dod. gal. Cord. in Dioscorid. Lacun. Cast. Tabern. (cui & domestica) Lugd. Clus. hist. Ger.

Nodos qui in caudice sunt, Theoph. 1. hist. 13. *ῥῆγες* vocat: rustici in Hetruria (Cæsalpino auctore) ova olearum vocant, eò quod iata numerosa sobole germinant. Ad nos adferuntur Hispanicæ, Genuenses, Narbonenses sive Malsilienses & Comenies.

In Virginia tria baccarum genera inter se differentia habentur, quarum forma glandibus similis, à quibus bonum oleum elicitur, Thomas Hariot in def. Virgineæ, Ind. occid. p. 1. sed quid sunt?

1. Olivæ maximæ Hispanicæ.

Olivæ Sergianæ regis, phauliæ, Plin.

Olivæ magnæ & carnosæ, Clus. hist.

Olivæ superbæ nucis ferè magnitudine, Cæli.

2. Olivæ minores & Genuenses & ex Provincia.

Olivæ Lusitanicæ Narbonenses, Borticæ, Clus. hist. ex quibus plus olei exprimitur.

3. Olivæ oblongæ atrovirentes ad lacum Comensem natæ adferuntur, quæ carne dura nec succulenta oisi firmiter hærent.

4. Olivæ albæ.

Plin. l. 23. c. 3. olivarū albarū & nigrarū meminit. Oliva alba circa Hispan. & Ulysioponā, Clus. hist.

In Hetruria habentur:

1. Minores rotundiores, plurimū olei habètes, quæ Olivellæ vocantur, Cæli. quas Matth. secundo loco recenset, & eas prægrades arbores juglandi modo ferre, quas Olivatræ rura Senesia vocitèr.

2. Majusculæ & oblongæ oleū parcius sed dulcissimū reddètes, quæ nomine à radiis desumpto, Raggiariæ dicuntur, Cæli. hæ primæ sunt Matth. quas oleæ minores, pferunt, quibus in cibis utunt.

3. Majores & pulposiores ad condituras tantum quæstæ, quas Regias Cæsalp. vocat.

4. Sunt quædam, quarum caro ab osserecedit cum franguntur, virides, quæ conditæ gratissimæ sunt, quas Colimbades Cæsalpinus, censuit.

Colymbades quas *κορυμβάδες* Diosc. l. 1. c. 139. nominat, aliqui volunt esse olivas muria conditas, ab innatando sic dictas: quamvis Plinio l. 5. c. 3. (quem Cæsalp. imitatur) distinctum genus locisse videatur; quarum etiam l. 23. c. 3. meminit. Condiuntur autem plerumq; immaturæ per Hispaniam & Galliam Narbonensem: interdum etiam maturæ & nigra, præsertim in Lusitania.

Olivarum feraces arbores, sed insuavi odore & sapore pejore, in Brasilia, reperiri, Benzo l. 1. c. 18. scribit.

II. Olea sylvestris folio duro subtus incano. *ἡ γερνία ἢ ῥῆγες* &c. *αὐθιμονὴ ἡ ἀσία* Dioscoridi l. 1. c. 137. & c. 141. scribit Æthiopica olea lacrymam Scammonio similem, fulvam esse, &c. quod Gummi elemi esse Cæsalpinus suspicatur.

Olea sylvestris, Matth. Lac. Tab. Ger.

Olea syl. five oleaster, Ad. Lob. ico.

Oleaster vel syl. olea, Cast.

Oleaster, Lon. Cæli. Clus. in hisp. & hist.

Hanc aliqui cum aculeis, alii sine iis, pingunt: alii in descriptione aculeorum meminere, ut Matth. Dod. alii præterire: sane fructu est multo minore & à fativa cultura differt: hinc & fativa si negligatur, in sylvestrem abit: & ut Theoph. 1. hist. 3. ex nucleo oleæ, *ἡ γερνία* &c. nascitur.

III. Olea sylvestris folio molli incano.

Olea Bohemica, Matth.

Elæagnus, Matth. ep. Cam. ep.

Salix Amerina, Amato.

Chalef, Bellunenfi.

Ziziphus Cappadocica Plinii, Bellon. Dod. Lug.

Ziziphus alba, Gesl. hor. Clus. hisp. & hist.

Ziziphus alba Columellæ, Bellon. (cui & Oleaster perperam) Cam.

Oleastris species quibusdam, Gesl. hor.

Olea syl. Septentrionalium; sive Elæagnus Theophrasti. folio Vitis, Lob.

OLIV

Oliva Bohemica, Lugdun.

Seisefun, Rauwolf.

Alii Elaeagnum Theoph. alii Ziziphum Cappadocicum Plinii, alii ejusdem l. 6. c. 18. Jovis barbâ esse volunt.

Plinius lib. 21. capit. 9. de Coronis agens, duo

earum inquit genera, quando alia flore constant, alia folio: florem dixerim esse Genistas, namque & iis decerpitur luteus, item Rhododendron, item Zizipha quæ & Cappadocica vocatur, his odoratus, similisque olearum floribus.

## SALIX.

**SALIX**, ἰρία Græci, ἡ δὲ τὸ ἰρύαι, quod citò in altum excrescat, inter primas etiam germinans: & Latinis, quod celeritate crescat ut salire videatur, dicitur. ἰρία arbor est vulgo cognita. Diosc. l. 1. c. 136.

Genera: Theoph. 3. hist. 13. Salix multigena est: nam alia nigra dicta, quod cortice nigro, aut puniceo tegatur: alia candida, quod candido: virgas pulchriores & ad texendum commodiores nigra proferit: candida spissiores. Est tam nigra, quam candida genus quoddam parvum: hanc Arcades non ἰρίαι vocant, existimantque fructum fecundum eam parere. At Plinio l. 16. c. 37. Salicis plura genera: nam quadâ & in proceritatem magnam emittunt, jugis vinternis perticis præbent, pariuntque, baltheo corticis vincula: & alia virgas sequacis ad vincituras lenticia. Alia prætenues viminibus texendis spectabili subtilitate. Rursus alia firmiores corbibus, ac plurima agricolarum suppellectili: candidiores abiao cortice leves tractatu, mollioribus vasibus quam si e corio fiant, atque etiam supinarum in delicatis cathedrarum aptissima. Finditur Græca rubens Amerina, ut & candida, haud paulo flexilior, ideo solido ligans nexu. In Asia tria genera observant, nigram utiliorem viminibus: candidam, agricolarum usibus: tertiam qua tenuissima est Helicem vocant. Apud nos quoque multi totidem generibus nomina imponunt: vimineam vocant, eandem purpuream: alteram nitelinam à colore qua fit tenuior: tertiam Gallicam, qua tenuissima. Et l. 17. c. 20. perticulis & viminalis meminit: hæc Plinius. Quare veteres Salices distinguere colore primum. dein usu: colore, albo, nigro seu purpureo, sive pheniceo, sive rubente & vitellino, qui in cortice spectatur. Usu, quod alia fit perticulis, alia viminali: alia fissilis, alia ex qua vincula fiunt: alia ex qua virge fiunt, vel tenues & invalida, vel firmiores & crassiores, ad varia opera.

I. Salix vulgaris alba arborefcens.

Salix alba Theoph. & Plinio.

Salix ex qua perticæ fiunt, Matth.

Salix perticalis, Cord. in Diosc.

Salix 1. vel major, Dod.

Salicis quartinum genus, Lon.

Salix, Ad. Dioscoridis, Lob.

Salix alba perticalis, Lugd.

Ex hac pali ad vitium pedamenta, & stipites ad sepes firmandas fiunt.

II. Salix vulgaris nigricans folio non serrato.

Salicis primum genus, Trag. Fuch. Tur.

Salix Gallica, Cord. in Diosc.

Salix nigra seu punicea, Lon.

Salix nigra seu rubens, Thal.

Salix phœnicophloeos sive phœnicea, Lugd.

III. Salix vulgaris rubens.

Τὸ δὲ οἶον nomine (Salicem Amerinam Gaza vertit) Theoph. l. 6. c. 2. designasse aliqui volunt: verum hæc Salix fructus non habet: cum in Oesio fructus sit, vel niger, vel candidus.

Salix Amerina nigra & rubens, Plinio.

Salix colore rufescente, que Græca vocatur, Matth.

Salix tertium genus, Fuch. Tur. primum genus, Lon.

Salix viminalis, Amerina & Sabina Columellar, Dod. gal.

Salix minor, viminalis & Gallica, Dod.

Salix Amerina, Lugd.

Salix Sabina sive Amerina, Thal.

Ex hac vincula quibus in aqua maceratis vites & doliolum circuli vinciuntur: & alteri cortex magis rubet, alteri nigricat.

IV. Salix sativa lutea folio crenato.

Salix tertia, Trag. Cæf.

Salix vitellina, Dod. gal. Cord. in Diosc.

Salicis alterum genus, Fuch. Lon.

Salix angustifolia syl. Tab.

Salix aquatica, Ger.

V. Salix folio amygdalino utrinque virète aurito.

Salix μολακίφρα, id est, cortice nigro, Theoph. 3. hist. 13.

Salix purpurea, Plinio.

Salix, Matth. in fig. major, Ger.

Salix syl. latifolia, Tab.

Salix purpurea nigra viminalis, Lugd.

Hæc virgas tenues præbet, ad corbes, sportas, fascinas, & similia conficienda: huic peculiare, quod singulorum foliorum exortibus alæ dux adposcuntur.

VI. *Salix folio longissimo, angustis. utrinque albid.*

*Elæagnus* (Zenigole Patavinorum) Ang. Cast. *Elæagnus Dalechampii*, & *Salicis* 6. genus, Lugd.

*Ελάγιος*, & nomen, ex *ελαία* qui dicitur, ex olea & vitice compositum est: nam ut Theoph. 4. hist. 11. *Elæagnus* fruticosa planta est Agno similis, folio, figura eidē simili, molli, lanuginoso, ut Mali cydoniæ, flore albæ populi minore, fructu nullo.

VII. *Salix humilis angustifolia.*

*Salix humilis*, Dod. ico.

*Salix humilis repens angustifolia*, Lob. Lugd. an *Chamæitea*, Tab. & Ger.

IX. *Salix oblongo incano, acuto folio: quæ 2. loco in Prodomo describitur.*

IX. *Salix fragilis.*

*Salix* 2. candido cortice, Trag.

*Salix candida* vel Græca, Dod. gal.

*Salicis* tertium genus, & *Salix alba*, Lon.

Hæc ad ligamenta planè inutilis est: cōmuniter cortice albo, rarius rubro, de qua sub *Salice* 1. in Prodomo.

*Salicis* 4. genus, quam vulgo Vitricem vocitent, quod vitri modo frangatur, Cæsalp. proponit, sed folia lata subrotunda & hirsuta tribuit.

X. *Salix foliis glaucis & per ambitū hirsutis.*

XI. *Salix humilis capitulo squammoso.*

*Salix Helice* Theoph. 3. hist. 13. Lugd.

*Salix angustifolia*, Clus. pan. Pannonica, Eid. hist.

Sæpè foliis vesicæ subrubentes, & furculis, pilulæ quadam scabræ insident.

*Salix latifolia.*

I. *Salix latifolia rotunda.*

*Siler arbor*, Ang.

*Salix lato folio*, Gesl. hor.

*Chaleb Syrorū*, Gesl. quia flore est odoratis. Cam.

*Salix platyphyllos*, Ad alia, Thal.

*Salix latifolia*, Cam. Clus. hist.

*Salix platyphyllos* sive *leucophlecos* & *Elæagnus* quibuldam, Lugd.

*Salix caprea rotundifolia*, Tab. Ger.

De *Silire* Plinius l. 16. c. 18. hæc habet: non nisi in aquosis proveniunt *Salices*, alni, populi, *siler*, ligustra tessaris utilissima: & cap. 21. *Sileri* folia non decidere scribit, nulla alia nota addita: deque ejus viribus l. 24. c. 10. egit.

Hujus carbo citissimè ignem concepit, quare ex ejus cinere, sulphure & aphronitro pulvis tormentarius conficitur: hujus carbonibus pictores ad

delineanda opera utuntur.

II. *Salix folio ex rotunditate acuminato.*

*Salicis* quartum genus, Trag. Lon.

*Salix aquatica*, Lob. ico.

*Salix platyphyllos*, Thal.

*Salix caprea latifolia*, Tab. Ger.

III. *Salix latifolia minor.*

*Salicis platyphyllæ* species alia, Thal.

IV. *Salix subrotundo argenteo folio, quæ 3. in Prodomo.*

V. *Salix maritima ostrearum testis imascens.*  
*Salix marina*, Lugd.

*Salix pumila latifolia.*

I. *Salix humilis latifolia erecta: quæ 4. in Prodi.*

II. *Salix latifolia repens.*

*Salix pusilla humilis*, sive *Salicula repens*, Cam. ap.

*Salicis pumilæ* genus 2. Clus. pan. & hist.

*Salix pumila*, Tab. humilis, Ger.

*Salix pumila*, folio latiore, Dod. belg.

*Salix leucophlecos palmum alta*, Lugd.

III. *Salix alpina pumila rotundifolia repens, infernè subcinerea.*

*Salix pumila latifolia prior*, Clus. pan. & hist.

IV. *Salix pumila foliis utrinque candicans, quæ & lanuginosis.*

*Salix abortiva*, Lugd.

V. *Salix saxatilis minima, quæ 7. in Prodomo.*

*Salix pumila angustifolia.*

I. *Salix pumila linifolia incana.*

*Salix pumila angustifolia prior*, Clus. pan. & hist.

*Salix pumila folio angustiore*, Dod. belg.

II. *Salix pumila brevi angustior; folio incano.*  
an *Salix humilis repens*, Ad. Lob. ico.

*Salix pumila angustifolia altera*, Clus. pan. & hist.

Hæc variat: nam paulo latioribus foliis quæ in tabulosis Hollandiæ aggeribus Oceano objectis nascitur, Clusio monente.

III. *Salix alpina Pyrenaica: quæ 6. in Prodi.*

IV. *Salix alpina angustifolia repens, non incana, quæ 5. in Prodomo.*

*Salix exotica.*

I. *Salix Syriaca folio oleagineo argenteo.*

*Zarneh* vel *Zarnabum*, Rhafi c. 353. & *Avicennæ* c. 742

*Zurumbeth Serapioni*, c. 26.

*Elæagnus Theophrasti.*

*Sasiat Syrorum*, Rauwolf. & Lugd. ap.

*Calaf* seu *Ban*, Alpino.

Verùm *Rauwolf.* foliis angustioribus, at *Alpi-*

nus latoribus pingithac sub nomine arboris magnæ virtutis, ab insigni Pharmacopœo D. Jo. Pona Verona hoc anno accepimus.

Ex floribus incolas aquam cordialem elicere, Rauwolfius scribit: & quidem in Ægypto, quam Macahalef vocent, Alpino monente.

II. Salix Arabica foliis Attriplicis.

Garb Arabum, Avicennæ. 326. & 686.

Salix exotica, Garb incolis, Rauwolf.

Garab Maurorum, Lugd.ap.

Ex hac apud ipsos Aphronitru optimum fit, ad ignariu pulverem conficiendu, Rauwolf. monete.

### AGNUS CASTUS sive VITEX.

**VITEX**, Græcis ἄγνος, ἢ λύγος Dioscoridi l.c. 135. ἄγνος, id est Castus, quod ab iis in quibus estur, aut bibitur, aut substernitur, castitatem conservet, Gal. 6. simplicium auctore: quare matrona in Thesiphoriis Asbeniensium ἀγνόςου. id est, castitatem custodientes, folia hujus arboris sibi sternebant, Dioscoride & Plinio referentibus. Cui & λύγος (quasi vimen) propter invictam serè virgarum flexibilitatem: officinis, Agnus castus: cujus semen quibusdam à Piperis similitudine, Piper vocatur. Est Diosc. frutex in arbore assurgens: virgulta gerit fractu contumacia & longa: folia verò olivæ, sed teneriora atq. majora. Theoph. ἄγνος (Amerinam Gaza vertit) cultura arbor efficitur, cum frutex sit, i. hist. 5. verum super fructum ipsum florem insidentem emittit: virgas parvas sicut cornus: femina suo latere profert & fructuosior est, nodos tamen geminatos, tunc invicem congruos habet, i. hist. 21. Plin. l. 24. c. 9. non multum, inquit, à Salice virgulinum usu distat Vitex. foliorum quoque aspectu, nisi odore gratior esset.

Genera ejus duo: est qua album florem, cum aliquatenus purpureo mittat, altera purpureum profert, Diosc. ac Plinio l.c. major, in arbore Salicis modo assurgit: minor, ramosa, foliis candidioribus, lanuginosis: prima album florem mittit in purpureo, quæ & candida vocatur: nigra, quæ tantum purpureum.

I. Vitex foliis angustioribus cannabis modo dispositis.

Vitex, Trag. Dod. ut: Ang. Cord. in Diosc. Gesn.

hor. Lac. Tur. Lon. Cæs. Lug. Cam.

Vitex sive Salix Amerina, Matth.

Agnus sive Vitex, Bellon.

Agnus castus, Gesn. hor. Cast.

Elæagnon Theophrasti, Ad. Lob.

II. Vitex latiore folio.

Vitex latiore ferrato folio, Lob. Lugd.

III. Vitex trifolia minor.

Agni casti species multo minor cæteris, tribus tantum firmis foliis donata, Rauwolf. Sed quid?

### SPIRÆA.

**DE** Spiræa hac habet Theophrastus i. hist. 25. plura ex aliis fructum cacumine ferunt, quam ex arboribus, ut frumentorum quæ spicam pariunt, & fruticum ἑρπύων καὶ ἀκρίαια (aliqui ἑρπύων legunt) ὃ ἄγνος, ὃ ἄλλ' ἄγνια: erica, pirea, amerina, ut Gaza vertit, qui omittit ὃ ἄλλ' ἄγνια. id est, & alia quedam.

Frutex spicatus foliis salignis serratis.

| Spiræa Theophrasti forte, Clus. hist.

### LIGUSTRUM.

**LIGUSTRUM** Græcis λυγέρις Cyprus Diosc. l. c. 124. arbor est foliis circum virgulta oleæ similibus, sed latoribus, mollioribus & viridioribus: floribus candidis muscosis, odoratis: semine nigro, sambuci fructui simili: & Plinio l. 2. c. 24. Cyprus in Ægypto est arbor Ziziphi foliis, semine coriandri, flore candido odorato: & mox, quidā hanc esse dicunt arbore, quæ in Italia Ligustrum vocatur: & l. 24. c. 10. Ligustru eadem arbor est, quæ in Oriente Cyprus.

I. Ligustrum Germanicum.

Ligustru, Brunf. Matth. Lac. Fuch. Cord. in Diosc.

Bellon. Gesn. hort. Tur. Lob. Rauwolf. Cæs. Cast.

Lugd. Thal. Tab. Ger. Eystett.

Ligustrum vulgare, Trag.

Ligustrum majus, Lon.

Phyllirea, Dod. ut: Ang. Gesn. hort.

Halimus, Lac.

Ligustrum Dioscoridis, Ad.

Ligustrum Italicum, Alpino.

Sunt qui Cyprus Dioscoridis volunt, ut Tragus, Matth. Cord. in Diosc. Cæs. & alii: negant alii, ut Anguillara, qui Ligustrum Latinorum facit: alii Phylliream volunt, ut Dodon. & Anguil.

Flore est albo, Tragus & sublateo notavit, & Ligustri aliam speciem nominat: & Lonicerus majus & minus facit.

II. Ligustrum myrtifolium Italicum quod i. in Prodro mo: quod etiam nomine Myrti ligustri folio, accepimus.

III. *Ligustrū foliis laciniatis*, quod 2. in Pro-dromo, & *Ligustri nigri* nomine ex Italia primū, dein pro *Syringa laciniatis foliis* ex horto Nobil. Contareni habemus.

IV. *Ligustrum Ægyptiacum latifolium*.  
Cyprus Græcorum, Alcanna vel Henne Ara-bum, nunc Græcis Schenna, Rauwolf. & Lugd. append.  
Cyprus Plinii sive Alcanna, Belli ep. 4. ad Clus.  
Henne in Ægypto aliàs Alcanna, Bellonio.  
Alcanna Arabum, Clus. ad Bellon.  
Alkana, Ad.

Flore est pallidè subflavo.

V. *Ligustrum Ægyptiacum angustifolium*.  
*Ligustrum Ægyptium*, Elhannesea Tamaharen-di, vel Alcanna Avicennæ, Alpino.

Figura enim ab Alpino proposita diversā, à Rauwolfii figura, quod & Clusius in cur. post-rioribus monet: & Alpinus florem subcinereum Sambuci floribus minorem tribuit: quare an di-versā considerandum: rami solum baccis mi-nutis seminibus refertis onustum, sed sine foliis, ex Creta ab Honorio Belli habemus. In hist. Indor. par. 4. figura tab. 15. iuxta Mangostans proponitur.

## PHILLYREA.

*Phyllyrea* Diof. l. 1. c. 125. arbor est Cypri magnitudinem æquans, foliis oleaceis, sed latioribus & nigrioribus, fructu lentis nigro subulcis, & quasi racemato.

I. *Phillyrea latifolia levis*.  
*Phylerea* arbor Galloprovinciæ, verior Macaleb Serapionis. Ad. Lob. ico.  
*Phillyrea*, Cam. ep. \* notata.  
*Phillyrea*, Mahaleb Serapionis, Lugd.  
*Phillyrea* Dalechampii, Eid.  
Mahalepum Serapionis, Tab.

II. *Phillyrea latifolia spinosa*.  
*Phillyrea prima*, Clus. hisp. & hist.  
*Phillyrea prior* Clusii, Lugd.

III. *Phillyrea folio leviter serrato*.  
*Phillyrea* 2. Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.  
*Phyllirea serrata*, Ger.

IV. *Phillyrea folio Ligustri*.  
*Phillyrea*, Matth. Lac. Rauwolf. Lugd.  
*Phillyrea* Bellonii, Gei. hor.

Cyprus latiore folio, Dod.  
*Phillyrea major*, Ad. Narbonensis, Lob.  
*Phillyrea tertia*, Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.  
*Phillyrea media*, Cam. ep.  
*Phillyrea Penæ major*, } Lugd.  
*Alaternus major* Dalechampii  
*Ilaturum*, Cæf. & *Phillyrea*, Theoph.  
*Phyllirea latiore folio*, Ger.

V. *Phillyrea angustifolia prima*.  
Cyprus, Dod.  
*Phillyrea quarta*, Clus. hisp. & hist. Tab.  
*Phillyrea angustifolia*, Lob. Cam. ep. Ger.  
*Phillyrea minor*, Ad. Penæ, } Lugd.  
*Alaternus minor* Dalech.

VI. *Phillyrea angustifolia secunda*.  
*Phillyrea quinta*, Clus. hisp. & hist.

## SECTIO QUARTA.

*PHILLYCA; CELASTRUS; OENOPLIA; RHAMNUS;*  
*Lycium; Rubus; Chamærubus; Capparis; Rosa Sativa,*  
*sylvestris, & Hiericuntica.*

### PHILLYCA.

*Phillyca* Theophrasto l. hist. 15. ex sylvestribus perpetuò viret: 3. hist. 6. ineunte Vere germinat: 5. hist. 7. cauda & Celastri modo, semper fronde abundat. Plinio l. 16. c. 26. Alaternus dicitur, qui inter arbores fructum emittit ferentes hoc est, ne semen quidem, refert, cui folia inter Ilicem & Olivam.

I. *Phillyca elatior*.  
*Alaternus*, Ang. Portæ, Cam.  
*Phillyca* Theophr. Alaternus Plinii, Elæprinos Cretensium, Bellonio.  
*Alaternus* Plinii (& Spina cervina quorun-

dam) Lobel. icon. Gerar.  
*Alaternus prima*, Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.  
*Celastrus mas* Theophrasti, Cæf.  
*Bourgetpine* Monspelienfium, Ad. Lob. ob.  
*Apharca* Theophrasti, Lugd.

*Phillyra*

Phillyra mas Theophrasti, Cæf.

Alaternus Turneri, Taber. qui duas figuras adposuit.

A<sup>cap</sup> Theophrasto i. histor. 15. ex sylvestribus arboribus perpetuò viret: 3. histor. 6. fructum primum cum uva nigrescit & varia fit, maturant: alterum cum vitis floret: bis enim ambæ

fructum ferre videntur.

II. Phillyra humilior.

Alaternus alter, Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Alaternus alter humilior, lato folio, Lob.

Ilaturum folio ad Illicem accedente, Cæf.

Celastrus facmina Theophrasti, Lugd.

Alaternus humilior, Ger.

## CELASTRUS.

**K** Hæc Theophr. 1. hist. 6. cultum nullum patitur: 1. hist. 15. folia nunquam demittit: 3. hist. 6. & tardissime fructum perficit: 5. hist. 8. ad baculos idonea est.

Celastrus Theophrasti, Clus. in cur. post. hanc ex horto Leidenſi accepimus.

## OENOPLIA.

I. Oenoplia non spinosa.

Sudar Serapioni.

Oenoplia seu Napca Bellonii, Connarus Alexandinorum fortè apud Athenæum, Clus. hist.

Hanc una cum fructu & floribus, ex Creta ab

Hon. Belli accepimus.

II. Oenoplia spinosa.

Nabca, Paliurus Athenæi credita, Alpin.

Oenoplia spinosa, Honor. Belli, Clus. histor. & ep. 5.

## RHAMNUS.

**R** Hamnus p<sup>alm</sup> Dioſcoridi lib. 1. cap. 119. frutex est circa ſepes naſcens: virgas rectas & spinas aculeatas, ut Oxyacantha habens: folia verò parva, oblonga, ſubpinguia, mollia: est & altera candidior. De tertia, vide ſub Palmo. Et Theoph. 1. histor. 15. a<sup>cap</sup> frutex est perpetuò virens: 3. hist. 17. & alia candida, alia nigra, fructusq; diverſus. Umbræ verò aculei gerat: 3. hist. 18. peculiare racemum, quod per latera caulium ſepiunt: poſtremoq; caulis ramus omnium maximus propendet. Plinio l. 24. c. 14. inter genera Ruborum, Rhamnus appellatur a Græcis candidior & fruticosior: ut floret ramos ſpargens rectis aculeis, non ut cæteri aduncis, ſolus majoribus. Alterum genus est ſyl. nigrius & quadantenus rubens: fert veluti ſolliculos.

I. Rhamnus spinis oblongis, flore candicante.

Rhamnus candida, Theophrasti.

Rhamnus primus, Matthiol. Ang. Lac. Lon. Clus. hisp. & hist. Dod. K. u. w. olf. Lugd. Caſt.

Rhamnus candida, Cord. in Dioſc.

Rhamnus alter Dioſcoridis Monſpel. Ad. Lob. Lugd.

Rhamnus, Bellon. Cæſalp.

an Rhamnus circa Tripolim ipſis Hauſer, Arabibus.

Hauſegi ſive Rhamnus primus, Rauwolf.

II. Rhamnus alter foliis falſis flore purpureo.

an Rhamno altero ſimilis, Bellon.

Rhamni prioris altera ſpecies, Clus. hisp. & histor. Lob.

Rhamnus primus alter, Dod.

Rhamnus alter Cluſii, Lugd.

Rhamni ſpecies quæ Spina ſancta, Colum.

III. Rhamnus tertius flore herbaceo baccis

nigris.

Rhamnus niger Theophrasti.

an Rhamni genus baccis nigris in Græcia, Bellon.

Rhamnus tertius, Clus. hisp. & histor. Dod. Taber. Ger.

Rhamnus primæ ſpeciei tertius, Lob.

IV. Rhamnus Salicis folio anguſto fructu flavoſcente.

Rhamnus ſecundus, Matthiol. Dod. ut: Lac. Lon. Clus. hisp. & hist. Lugd. cum figura Matthioli & Dodonæi.

an Rhamni genus baccis rubentibus, Bellon.

Oleaſter Germanicus, Cord. in Dioſc. & hist.

Oleaſtri peculiare genus, Cord. obſ.

Rhamni ſpecies, Cam. ep. & hor.

Rhamnus primus Dioſcoridis, Ad. credius, Lob.

Rhamni alterum genus, Cæſ.

Hippophæ Dioſcoridis fortè, Colum.

V. Rhamnus folio ſubrotundo fructu compreſſo.

Rhamnus tertius Dioſcor. quem ſcribit nigrioribus, lucioribusque foliis & quadantenus rubentibus.

tibus: virgultis oblongis, quinque ferè cubitorum & spinosioribus quidem, at minus firmos, & rigidos aculeos habens: fructus verò latus, albus, tenuis, folliculi figura, fructu verticilli. Sunt qui Rhamni 3. Dioscoridis descriptionem ad Paliuri ejus historiam revocandam velint: de quo l.c. 12. sic: *ῥαμνὶς* frutex est vulgo notus, aculeatus, solidus, cujus semen pingue, & lini seminis æmulum reperitur. De quo Theophrastus hist. 5. frutex est: hist. 8. spinosus: 1. hist. 6. folia cum extremorum lateribus sinuata concidunt: 3. hist. 6. & post Occasum Vergiliarum fructum reddit: 3. histor. 17. habet quoque nonnullas differentias: omnes autem fructifera, &c. & 4. hist. 4. in Africa plurima est & fruticosior, folio nostrati (id est jujubis) simili, fructu diverso, fructum ferens latum instar folii, &c.

Spina Judaica, Crescentio.

Rhamnus tertius, Matth. Ang. Lac. Ges. hor. Lon. Cast. Cam. Colum.

Rhamni tertia species, Dod. gal.

Rhamnus niger, Cord. in Diosc.

Paliurum & Paliura Græcis vulgo, Bellon.

Paliurus frutex, Ges. ap.

Paliurus, Dod. Ad. Lob. Rauw. Lugd. Cast. Cam. Eystett.

Jujuba sylvestris & Spina Marruca, & Paliurus Africanus Theoph. Cæsalp.

VI. Rhamnus catharticus.

Rhamni alia species, Trag.

Spina infectoria, Matth. Bellon. Ad. Lob. Cast.

Spin merlo, Cast. ap. (Clus. hist. Tab.

Rhamnus solutivus, Dod. ut: Thal. Ger.

Cervispina, Cord. hist.

Spina cervina vulgo, Ges. hor.

Spina alba, Lonice.

Spina cervalis vulgo, Cæf.

Rhamnus catharticus, Lugd.

Communiter frutex est: aliquando arboream altitudinem adipiscitur.

VII. Rhamnus catharticus folio oleæ.

Hippophaes, Anguil.

an Hippophaestum quorundam, Lugd.

IIIX. Rhamnus catharticus minor.

Spina infectoria pumila prior, Clus. pan. & hist.

Rhamni solutivi minor species, Cam.

IX. Rhamnus foliis oblongis ferratis.

Rhamnus Bavaricus, Lugd.

## LYCIUM

**Λ**ύσιον, à Lycia in qua magnus hujus proventus fuit: & *πυξάνθη*, id est Buxus aculeatus à similitudine quadam cum Buxo dicitur. Est Dioscoridi l. c. 132. arbor spinosa, virgū trium cubitorum, aut etiam longioribus, circa quas folia sunt buxo similia, densa: fructum habet instar piperis nigrum amarum, densum, levem: corticem verò pallidum Lycio densato similem & radices numerosas, obliquas, lignosas: & mox: fertur & Lycium Indicum fieri ex fructu Lonchitide appellato: est in spinarum genere, virgas habens vellas tricubitales, aut etiam majores à fundo transversas & Rubo crassiores: ruptus cortex rubescit. folia verò olea similia. Et Plinius l. 12. c. 7. fert & spina piperis similitudinem, præcipua amaritudine, foliis parvis densisq., Cypri modo, ramis trium cubitorum, cortice pallido, radice lata. lignosaq., buxei coloris: & l. 24. c. 14. Modum consuecendi docet: addens spinam ex qua Lycium fiat, in Græcia pyxanthem chironium vocari.

I. Lycium buxi folio.

Lycium, Matth. Tab. Ger.

Lycii nomine ostenditur, quæ tamen verum non est, Ang.

Pyxantha, Dod. ut: Lon.

an Lycium sive Pyxantha Narbonensium, Ad.

Lycium alpinum, Lugd.

II. Lycium facie pruni. syl. sive Italicum.

Lycium Italicum, Matth. Lugd. Tab.

Spina infectoria pumila altera, Clus. pan. & histor. Pont.

Lycium Hispanicum, Ger.

III. Lycium Hispanicum folio oblongo.

Lycium Hispanicum, Lob. Lugd.

IV. Lycium Hispanicum folio buxi.

Lycium quorundam, Clus. hisp. & hist.

an Tamaio, Lycium verum, Frag.

V. Lycium latifolium.

Paliurus alter peregrinus, Ad. Lobelius in iconibus titulum habet, sed figura subiecta non convenit, quæ sub Rhamno 3. repetitur, & est Oxyacanthæ Dioscoridis.

VI. Lycium Gallicum.

Lycium Dalechampii, Lugd.

Grana luteo colore tingunt.

VII. Lycium Indicum foliis pruni.

Frutex spinosus peregrinus, Arabibus Hadhath, incolis Zaroa, Rauwolf.

Lycium



Lycium legicimum Rauwolfii, Cluf. hist.

Lycium in Libano proveniens, Belli ep. 1.

II X. Lycium Indicum alterum.

Ulez, Lycium Indicum creditum, Alpino.

I X. Lycium folijs ericæ.

Cate five Lycium, Garz. Acoft.

Lycium cujus succus Cate dicitur, Frag.

X. Lycio affinis Ægyptiaca.

Agialalid, Alpino.

XL Frutex exiguis foliolis confertus.

Tamazo, Cluf. hisp. & hist.

## RUBUS

**R**ubus *βάρ* & *Græcis*: notitia vulgaris est Dioſcoridi l. 4. c. 37. At Theoph. i. hist. 5. frutex est: 2. hist. 16. cujus folia cium extremo, tum lateribus sinuata cōcidunt & spinosa cuncta redduntur: 6. hist. 1. imò etiam caulis & rami: 1. cauf. 21. fructum racematim gerit, & non solum serò, sed etiam particulatim maturescit.

Genera: Theoph. 3. hist. 18. plura esse scribit: & trium meminit: quadam erecta quæ *βάρ* & : quadam deorsum pergens, quæ *αυλίστα* & : tertia *κωβόβατ* & dicitur. Et à Dioſcoride l. c. *βάρ* & : & cap. seq. *βάρ* & : *Idæa*: & l. c. 123. *κωβόβατ* & proponitur. Plinio l. 16. c. 37. Rubi mora serunt: & alio genere similitudinem rose, qui vocatur Cynosbates: tertium genus *Idæum* vocant Græci à loco. Sic l. 24. t. 13. duorum priorū meminit: & cap. seq. Cynosbati, rubi *Idæi*, & *Rhamnū* inter Rubi genera recensuit.

I. Rubus vulgaris, five Rubus fructu nigro.

*βάρ* & *Græcis*: Sentiis, Latinis dicitur: & fructus

mora rubi, *βαίνα* Galeno: quibusdam Vacciniæ:

officinis, mora bati.

Rubus, Dioſcoridi & Plinio.

Rubus excellā, Theophrasto.

Rubus, Bruinf. Matthiol. Fuch. Dodon. ut: Cord. in

Dioſc. Lac. Tur. Lon. Lob. Cæf. Caft. Lugd.

Rubus grandis & secundus, Trag.

Morus live Rubus, Ang.

Rubus vulgaris, Gef. hor. Thal.

Rubus Batis, Ad.

Rubus arvensis, Tab.

Rubus *Idæus*, Ger. ico.

II. Rubus repens fructu cæſio.

*Chamæbates* Theophrasto, humirubus *Gazzæ*.

Rubus humilis & primus, Trag.

Rubus minor, Dod. ut:

Rubus reptans, Ad.

Rubus humilis Belgicus, Cluf. pan. & hist.

Rubi alterum genus, Cæf. Lugd.

Fructu est communiter cæſio, modo cæruleo, modo nigro & minore.

III. Rubus *Idæus* spinosus.

*βάρ* & *Idæa* appellatur, quoniam copiosius in

Ida nascatur: est autem longè tenerior priore, exigu-

is spinis præditus: quanquam & sine spinis in-

veniat: hæc Dioſcorides l. 4. c. 38. Et Plinius lib.

16. c. 37. Tertium genus *Idæum* vocant Græci à

loco: tenuius quam cætera, minoribusque spinis

& minus aduncis.

Rubus *Idæus* Dioſcoridis & Plinii.

Rubus *Idæus*, Trag. Matth. Ang. Dod. ut: Bellon.

(qui in Ida monte invenire non potuit) Gef. hor.

Tur. Lon. Ad. Lob. Caft. Thal. Ger. def. & par. 3:

Ind. orient. & 2. par. Ind. occid.

Rubus *Idæus* major, Lac. def.

Rubus *Idæus* exilibus spinis, Cord. in Dioſc.

Rubus 3. montibus proprius, Cæf.

Rubus *Idæus* spinosus, Lugd.

Rubus *Idæus* vulgaris, Cluf. hist.

IV. Rubus *Idæus* lævis.

*Chamæbatus*, seu Rubus *Idæus* alter, Trag.

Rubus tertius, Cord. in Dioſc.

Rubi alia species, Gef. hor.

*Doctsbere* / id est, baccæ hircinæ, Lon.

Rubus hircinus, Tab.

Rubus *Idæus* non spinosus, Lugd.

Rubus *Idæus* *Placæ*, Cluf. hist. def.

Rubus, Ger. ico.

V. Rubus *Idæus* fructu albo.

Rubus *Idæus* leucocarpos, Cam.

Rubus *Idæus* fructu candido, Thal. Cluf. hist.

VI. Rubus exoticus.

Rubi facie senticosā planta, Ad. Lob. ico.

Arboris truncus spinosus, Lugd. def. at figura sub

titulo Nerei facie secundo loco habetur.

*Chamærubus spinis carens.*

I. *Chamærubus saxatilis.*

Rubus alpinus humilis, Gef. hor.

Rubus *Idæus*, Eid. Fracto.

Rubus saxatilis, five petreus, five alpinus, Cluf.

pan. & hist.

Rubus parvus saxatilis alpinus, Cam.

Rubus minimus, Thal.

Acini

Acini huic bini, terni, quaterni, ad summum quinque aiant.

II. Chamærubus foliis Ribes.

Chamæmorum Norvegica, Clus. hist.

Fructus rubens aut pallidus.

III. Chamærubus foliis Ribes Anglica.

Chamæmorus, Clus. span. & hist.

IV. Chamærubus foliis Vitis.

Chamæmorus altera Norvegica, Clus. hist.

## CAPPARIS.

**K**άππαρις Dioscoridi l. 2. c. 204. frutex est aculeatus per terram in orbem stratus, spinas aduncas ut Rubus habet, folia rotunda, malo cydonio similia: fructum ut Olea, quæ cum debescit album florem promit, quo delapsa quiddam glandis oblonga figura reperitur, quod apertum grana tanquam punica habet exigua, rubentia: radices lignosæ, magnæ ac numerosæ. Theophrasto 6. histor. 10. ramis aculeatis constat: 6. histor. 3. & non solum caule aculeato, sed etiam folio hispido: 1. histor. 6. & 3. histor. 13. quæ cultura deterior redditur, ut natura syl. dixerit: sic 3. caus. lib. 8. Gazæ vocem κάππαρις Inturim vertit, ut & 6. hist. 5. & 7. hist. 8. alibi verò Capparim reddidit. Plinio l. 13. c. 23. Capparis, quidam & Cynosbatum vocant: alii Ophioslaphylon: vide & l. 19. c. 8.

Genera: Dioscorides habet Africam, Marmaritam, Apulam, & quæ è rubro mari & Arabia defertur: quæ qualitatibus variant: idem & Plinius l. 13. c. 23. refert.

I. Capparis spinosa fructu minore, folio rotundo.

Capparis, Trag. Matth. Dod. gal. Anguil. Cord. in Dioscor. Gel. hor. Lac. Lon. Ad. Cast. Lugd. Rauwolf. (qui & sylvestrium meminit) secunda, Tabern.

Capparis spinosa, Bellon.

Capparis retuso folio, Lob.

Capparis Italica, Cæf.

Capparis rotundiore folio, Ger.

II. Capparis folio acuto.

Capparis, Dod. prima, Tab.

Capparis folio acuto, Lob. Lugd. Ger.

Capparis aliud genus, Cæf.

Plinio l. 19. c. 8. laudatiss. in Caria, proximum Phrygia. Verum Alexandria Ægypti Venetias præstantiss. adferri, Lugdun. scribit. De cultura Capparium Quiqueranus de laudibus Provinciae legendus.

III. Capparis non spinosa fructu majore.

Capparis non spinosa, Bellon.

In Arabia arborefcit & hyeme folia retinet.

Capparis Alexandriae majores esse, quàm alibi, quas Cappar appellant, Alpinus author est.

IV. Capparis arborefcens fructu Juglandis magnitudine.

Capparis Arabica fructu ovi magnitudine, semine piperis instar acri, Bellon.

Capparium arbor, Rauwolf. qui fructus magnitudinem non expreßit.

Capparis plurimum ab his quæ in arbores adolefcunt & quæ in Græcia proveniunt, differentes in Tauri montis saxorum fissuris, Bellonius notavit.

V. Capparis portulacæ folio.

Capparis leguminosa, Lob. Tab.

Capparis Fabago, Dod. Ger.

Capparis syl. live fabaginea, Cam. ep.

Morgiani, Syrorum: Andirian, Rhasis: Ardisfrigi.

Avicennæ, Rauwolf. & Lugd. ap.

Fabago Belgarum, Lugd.

Telephium Dioscoridis & Plinii, Colum.

Peplios Petri Quith pharmacopæi Lutetiani in cuius orto anno 1579. collegimus.

VI. Capparibus similes baccæ in Virginea.

Sacquenunener baccæ plantæ quæ in stagnatibus aquis reperitur, par. 1. Ind. occid.

## ROSA.

**R**osam vetustas ex sanguine Veneris: & Turcæ ex sudore Mahometis, ortam sibi persuadent, cuius nomine folia Rosarum humi jacere non patiuntur: hac Græci ρόδον dicunt, quasi ὀδὸν pro ὀσφὶ Etymologico: At Plutarcho 3. symp. qui ὀσφὺς παλὸν ἔσδωδὺς ἄσπινος, quod largum odorū effluviū emittat. Theophrasto 1. hist. 15. Rosa inter suffrutices est, & perpetuo cacumine vires: 1. histor. 21. flores bicolores sunt, quod in his alterum florem insidentem medium gerit: 1. histor. 22. verum flos ipse super fructum est: 6. histor. 2. rami aculeati sunt. Et Plinius lib. 21. cap. 4. Rosa nascitur spina verius quàm frutice, in Rubo quoque proveniens, illic etiam jucundi odoris, quàm in angustia.

angusti. Germinat omnium primo inclusa granoso cortice: quo mox intumescente & in virides alabastras fastigiate, paulatim rubescens dehiscit ac sese pandit, in calicis medio sui stantis complexu, luteos apices.

Differentia Theophrasti 6. his 6. permulta sunt soliorum multitudine, paucitate, asperitate, levitate, colore, odore: cum plurimis quina folia sunt, quibusdam duodena, vixenag., alii longe plura: sunt enim quas Centifolias vocant, sed folia interna parva admodum sunt: ita enim oriuntur, ut alia intus alia extra emicent, non tamen jucundi odori, odoratiores inter amplas quibus pars ima scabra: & 6. caus. 29. urbana rosa odoratiores est sylvestri. At Plinius genera nostri fecere celeberrima, Prænestinam & Campanam: addidit alii Milefiam, cui sit ardentissimus color, non excedentis duodena folia: proximam ei Trachiniam, minus rubentem: mox Alabandicam vilioris albicantibus foliis: vilissimam verò plurimum sed minimissimis Spineolam &c. & mox: inter has media quam Coroncolam vocant: omnes sine odore, præter Coroncolam, & in rubro natam: addit adhuc alias, que æquivoce potius Rosa appellata sunt: addit & ea que ex Theophrasto adscriptis. Sane Rosa variant floribus colore, qui varium est, albus, candidus, pallidus, carneus, rubens: sic differentia est in soliorum numero, magnitudine & odore: fruticis quoque aliqua differentia pro magnitudine & parvitate, asperitate & levitate. Sic in India occident. rosas omnia plena passim: & præter rosas ex Hispania importatas, species earum plurima alie nascuntur, quarum alie rubee, alie croceæ, nonnullæ ceruleæ, quedam candida visuntur: quas cristallum specie capitibus suis gestant: par. 9. ind. occid. l. 4. c. 27.

### Rosa sativa.

#### I. Rosa rubra.

Rosa Milefia, Plinii.

Rosa sativa rubra multiplex, Brunf.

Rosa domestica punicea, Marth.

Rosa hortensis rubra multiplex, Trag.

Rosa hortensis, Fuch.

Rosa, Tur. Lac. Lon. rubra, Cord. in Diof. Lugd.

Ad. Tab. Ger.

Rosa rubra urbana, Ges. hor.

Rosa sativa rubra, Ang. Cast.

Rosa sativa 3. quæ Provincialis Gallis, Dod.

Rosa Damascena, Lob.

Rosa rubens multifolia, Cæf.

Rosa intensè rubens, Cam.

Est simplex & multiplex, colore magis minusq; rubro: huc referre oportet

1. Rosam Milefiam fl. rubro pleno: vulgo Rosa fina.

2. Rosam Milefiam fl. simplici rubro, &

3. Rosam ex rubro nigricante flore pleno, &

4. Rosam rubicundam Saccharinam dictam, Græcula Plinii, Camer.

#### II. Rosa rubra pallidior.

Rosa sativa quarta quæ francha Gallis, Dod.

Rosa tholosericæ, Lob. ico.

Rosa rubicunda, Cam.

Rosa tertia, Cæf.

Rosa damascena rubra, Lugd.

Aliis Trachinia, Prænestina aliis, aliis Græcula Plinii: hæc priore minus rubet & flore simplici plerumque est, & foliis latissimis, cujus frutex spinis communiter caret.

#### III. Rosa saturatius rubens.

Rosa prima Prænestinæ similis, Clus. hist.

Rosa purpurea, sive in rubro nigricans, Cam.

Foliis est quadragenis amplioribus, saturatius rubentibus, ad nigredinem vergentibus & alabaistro crassiore.

#### IV. Rosa purpurea.

Rosa trachynia, Plinio.

Rosa hortensis ex purpura albicans, Trag. Ges. hort.

Rosa domestica carnis colorem referens, Marth.

Rosa incarnata, Ang. Cam.

Rosa sativa 2. sive incarnata, Dod.

Rosa rubra sive carnei coloris, Bellon.

Rosa pallida, Ad.

Rosa roseo colore, Cæf.

Rosa sativa purpurea, Cast.

Rosa minus rubens, Lugd.

Rosa provincialis major, Tab. Ger.

Rosa provincialis fl. incarnato pleno, Eyf.

Rosas purpureas sive rubreas, colore carni similes Pharmacopœis Zebedenas dici, Joannius in tractatu de pilulis Aloës scribit.

Quibusdam Alabandicæ similis, aliis Prænestina, aliis Campana Plinii.

#### V. Rosa verticolar.

Rosa prænestina verticolar, Clus. hist.

Variat: nam flos media ex parte candicantibus, altera purpurascens foliis, vel venis similis coloris aspersis constat. Vel folia quædam integra alba, quædam integra rubra, inter se commixta sunt.

#### VI. Rosa maxima multiplex.

Rosa centifolia Batavica rubra, Clus. hist. Eyf.

an Centifolia veterum, quam inodoram dicunt, eum hæc odora sit.

Variat: communiter flos ex albo rubet: habetur & alba, quæ

Rosa alba major Provincialis, } Clus. hist.

Rosa centifolia Batavica alba, }

Rosa provincialis flore albo, Eyst.

VII. Rosa multiplex media:

Rosa centifolia Batavica secunda, Clus. hist.

IX. Rosa major Prænestina, Clus. hist.

Rosa prænestina variegata, Eyst:

IX. Rosa alba vulgaris major:

Rosa Campana Plinii.

Rosa sativa alba, Brunf. vel 1. Dod.

Rosa hortensis candida, Trag. alba, Ges. hor.

Rosa domestica alba, Matth.

Rosa alba; Ang. Cam. Lugd. Tab. Ger.

Rosa candida, Ad.

Rosa quarta candida, Cæs.

Hæc quibusdam spineola, aliis Alabardica Plinii cenietur: foliorum numero flores variant: hinc

Rosa flore albo pleno & Rosa alba flore simplici, Eystert.

X. Rosa alba minor:

Rosa lacteola quæ centifolia Plinii videtur, Cam. Eystert.

XI. Rosa moschata simplici flore:

Rosa moschata & Damascena, Matth:

Nesrim (vel Nesrim) Serapionis; Ang:

Rosa sativa quinta, Dod.

Rosa muscata simplex; Ges. hort. flore simpl. Lob. Gerar.

Rosa muscatula, Cæs.

Rosa alba Damascena fl. simplici, Cast:

Rosa Damascena (quasi de Sceni apud Arabes) simplici flore, Cam. Eyst.

Rosa coroneola, quam Damascenam vocant, Lugd.

Rosa muscata alba, Tab.

Hæc minor est & major; quæ

Rosa muscata major, Lob. ico.

Hæc alba est, nonnunquam ex albo ad puniceum nonnihil vergit:

Rosæ moschata cum sylv. tum domesticæ, rubræ, albæ & virides, Bellon. lib. de cultur. munit.

XII. Rosa moschata flore pleno:

Rosa coroneola, Plinio:

Rosa muscata multiplex, Ges. hor. Ger.

Rosa muscata, Damascena, Alexandrinæ, Eid. append.

Rosa sativa quinta multiplex, Dod:

Rosa muscata, Ad. Lob. ico. alba multiplex, Tab.

Rosa muscatula multifolia, Cæs.

Rosa alba Damascena fl. pleno, Cast. Eyst.

Rosa coroneola altera, Lugd.

Rosa damascena five muscata pleno flore, Cam.

Aliis Prænestina Plinii.

XIII. Rosa moschata semper virens.

Rosa semper virens flore albo, Clus. hist. append. auct:

XIV. Rosa spinis carens flore majore:

Rosa sine spinis prima, Clus. pan. at secunda in histor.

Rosa sine spinis, Cam. Tab. Ger.

Colore est inter Prænestinæ & rubras media: sunt qui & albo observant.

XV. Rosa sine spinis flore minore.

Rosa sine spinis altera, Clus. pan. & hist.

Colore succem vini ferè refert:

XVI. Rosa subviridis:

Si in teneris Agrifolii arbusculas Rosæ inferantur, flores subvirides producuntur, Camerarius. Quamvis interdum anni constitutione frigidiore & humidiore, herbacei coloris rosæ, sine calyce proveniant, cujus causam Costæus de natur. stirp. explicat:

In hortis Italiæ, cæruleas reperiri, in historia Lugdunensi habetur ex Advers.

XVII. Rosam folio subrotundò & crispo, in horto Mortembelgardico ante plures annos, sed atque flore observavi, cujus ramulum exsiccatum asservo.

Rosa sylvestris:

Rosam sylvestrem Dioscorides lib. 1. cap. 123. *κυνόσατον* vocat, quam aliqui Oxyacantham appellant: frutex est (inquit) rubro longè major, arborescens: folia fert multò latiora quam Myrtus, aculeos verò circa virgas robustos: florem candidum, fructum oblongum, olivæ nucleo similem, quidam maturefcit, fulvus; intus verò lanugineus conspicitur. At Theophr. 3. hist. 8. Cynosbatos (cani rubus Gaza) fructum tibrutilum parit, malo punico similem: est inter fruticem & arborem. punicæ non ab similibus folio anterinæ. Plinio lib. 8. cap. 41. radix sylv. rosæ, quæ Cynorhodes appellatur: & lib. 25. cap. 2. Cynorhodo una medica

dicina erat, spongiolæ quæ in mediis spinis ejus nascitur.

I. Rosâ syl. vulgaris flore odorato incarnato.

Cynosbatus Dioscoridi, Lon. Ad.

Cynorrhodos Plinii: & Barbaro.

Sentis canis & Cynosbatus, Brunf.

Rosæ syl. primum genus, Trag.

Rosâ syl. Matth. Ang. Gef. hor. Dod. Tab. odora, Gerar.

Cynosbatus procerior & Cynorrhodos, Cord. in Diosc.

Cynorrhodos seu Rosâ canina, Thal.

Rosâ syl. vulgaris, Lugd. Cam. ep.

Rosâ canina odorata & syl. Lob.

Rosâ syl. altior, Cæf.

Rosâ canina, Cam.

Cynosbatus & Rubi tertium genus, Lugd.

Rosâ syl. odorata incarnato flore, Eyst.

Flores ex purpura dilute albicant.

Huic, ut & tertiæ, Spongiola adnascitur, quam Plinius in Cynosbato, pilulam Castaneæ similem:

in Cynorrhodo, spongiolam vocat.

Rosæ syl. spongia dicitur Cynorrhodon, Ang.

Spongiola syl. rosæ, Dod.

Spongia Bedeguaris, Ad.

Bedeguar officinis perperam.

II. Rosâ syl. flore majore & rubente.

Rosâ syl. flore rubro, Eyst. colore & majoribus foliis à priore differt.

III. Rosâ syl. flore pleno.

an Rosâ Alabandica, Plinii.

Rosâ syl. odorata flore multiplici, Lob. ico.

Rosâ canina duplicato flore, Cam.

IV. Rosâ syl. foliis odoratis.

Englanteria, Ruellio.

Rosâ syl. altera, Trag. Gef. hor.

Rubus canis, Englanterium, Tur.

Cynosbatus & Cynorrhodos altera, Cord. in

Cynosbatus, Lac. (Diosc.

Rosâ 10. Cynorrhodi vel caninæ rosæ odorata

species, Dod.

Rosæ syl. species altera, Lugd.

Rosâ englanteria, Ad. Tab. Eyst.

Rosâ canina, Ger.

Flos ex purpura saturata candicat.

V. Rosâ syl. odoratissimo rubro flore.

Rosæ syl. tertium genus, Trag.

an Cynosbatus quarta, Cord. in Diosc.

Rosâ syl. Gef. hor.

VI. Rosâ syl. odorata albo flore.

Rosâ syl. humilior, Cæf.

Rosâ quarta an Græcula Plinii, Clus. hist.

VII. Rosâ odore Cinamomi simplex.

Rosâ cinamomina & 7. vel syl. 2. Dod.

Rosæ de canelle, Lob. ico.

Rosâ cinamomea, Ad. Lugd. simplex, Cam.

an Cynorrhodos seu Rosâ sylvestris, Thal.

Pro Lychnide Plinii Gesnerus habet: & in Albio monte, majorem & minorem nasci tradit: illam feminam, hanc marem faciens.

VIII. Rosâ odore Cinamomi flore pleno.

Rosâ cinamomea pleno flore, Clus. pan. & histor. Eystett.

Rosâ cinamomea altera, Cam.

Spermoniam Plinii, sic enima, non Spineolam aut spinosam legendum, Barbarus vult: quamvis alii Sycibicum legendum putant, Camer.

Flos dilute purpurascit & in medio suave rutilat.

IX. Rosâ rubra præcox fl. simplici: exiguo odore & foliis laticioribus à prædicta discernenda, Eystett.

X. Rosâ minor rubello flore, quæ vulgo à mense Majo, Majalis dicitur.

Rosâ cinamomea altera, Cam.

Rosâ provincialis minor, Tab. Ger.

XI. Rosâ lutea simplex.

Rosâ lutea, Ang. Ad. Lob. Cæf. Cast. Lugd. Cam.

Tab. Ger. fl. simplici, Eyst.

Rosæ citrinæ, Gef. hor.

Rosâ syl. tertia, vel Rosâ octava, Dod.

Meminit Gesnerus Rosarum quæ moschum fragrant & luteæ sint: tales non vidimus, sed fruticis folia odorata observavimus.

XII. Rosâ lutea multiplex.

Rosâ flava plena, Clus. hist. & ap. 2. & cur. post.

Rosâ lutea maxima flore pleno, Eystett.

Hæc duplex, altera florem totum expandit: altera verò semiclausâ flore permanet.

XIII. Rosâ campestris spinosissima fl. albo odoro.

Rosâ cæpensis odora, & quinta, Clus. pan. & hist.

Cynorrhodon polyacanthos, Lugd.

Rosâ campestris odorata Clusii, Cam.

Rosâ Dunensis, vel species nona, Dod.

Rosâ præcox spinosa fl. albo, Eyst. (beat.

Flos albus, fructus maturus niger, cum aliorum ru-

XIV. Rosâ syl. pumila rubens.

Rosâ quarta, Clus. pan. at in hist. sexta & pumila.

PP 2 Fru-

Fructus maximus & pyri in modum turbinatus.

XV. Rosa syl. pomifera major: hæc sequente elatior, ramosior, paucissimis aculeis, foliis majoribus, pallide virentibus, & apud nos locis humidis in Ainetis provenit.

XVI. Rosa syl. pomifera minor.

Rosa syl. pomifera, Ad. Lob. Lugd.

Cynorrhodi species, Thal.

Rosa arvena, Tab.

Rosa pimpinella, Ger.

Hanc Lobelius spinis carentem, at Tabernæ montanus spinosam pingit: utramque habemus.

XVII. Rosa arvensis candida.

Rosa syl. quarta species, Trag.

XVIII. Rosa campestris repens alba.

Cynobatos five Cynorrhodos 3. Cord. in Dioscor.

XIX. Rosa campestris spinis carens biflora. Rosa Græca & Cynorrhodon lave, Lugd.

Flore est languide rubro, vere & autumno prodians, quæ duplex, alia odoris expers, alia foliis exiguis inavissimi odoris, in monte Pilati Lugdunensium.

Rosa Hierichuntica dicta.

Nominis huius authorem fuisse Monachum,

Bellonius refert, cum tamen circa Hiericho nunquam reperitur, sed in Arabia deserta, ad littora maris in sabulo: & Rauwolfius, in Syriæ testis & ruderibus, ejus sylvestrem speciem invenit: hanc à pluribus nunc annis in hortulo meo colo, cum facile & crescat & floreat: de qua Joh. Sturmius Lovaniensis professor, libellum superstitionibus plenum, scripsit.

I. Rosa Hierichuntea vulgo dicta.

Amomum, Cord. in Diosc. & hist.

Amomis Diosc. & Plinii, Czf.

Rosa Hierichuntea, Tur. Lon. Lob. Garz. Casta-perta & conclusa, Eyst.

Rosa de Hiericho & Rosa Mariæ monachis, Lugd.

Rosa Hierichonthina 1. & 2. Tab. major, Ger.

Duplicem fecit Cordus, alteram inspidam inodoram, quæ Amomis: alteram aromaticam odoratam, quæ Amomum sit. Sed de Amomo vide suo loco.

II. Rosa Hierichonthea sylvestris.

Rosa Hierichonthis syl. species, Rauw. Cam.

III. Rosa Hierichonthicæ exsiccatæ similis.

Blatterlos Holandis, fruticulus ad Scorbutum, Indis orient. par. 4. fig. 21.

## SECTIO QUINTA.

MYRICA five TAMARISCUS; ERICA; SABINA;  
CEDRUS BACCIFERA; CUPRESSUS; JUNIPERUS;  
Asparagus & Corruca.

### MYRICA five TAMARISCUS.

ΜΥΡΙΚΗ (GAZA modo Myricam, modo Tamariscum vertit) arbor nota est, fructum veluti florem ferens compage muscosum: in Aegypto & Syria quadam nascitur sativa, cætera sylvestri similis, fructum ferens Galla proximum &c. Sunt qui è caudice calices consciunt, quibus splenetici poculorum vice utuntur: Dioscor. lib. 1. cap. 116. Et Theophr. 1. hist. 16. Myrica folia carnosâ sunt ut Cupressi, & inter frutices numeratur: 5. hist. 6. in Tylo Arabia insula frunt Myrica lignum, non ut apud nos imbecillum esse: sed validum sicuti Iligneum, &c. Plinio LXXII. Myricen & Italia, quam alii Tamaricen vocant, Achaia autem Bryan sylvestrem infigne in ea, quod sativa tantum ferat Galla similem fructum: & lib. 24. c. 9. Myricen quam & Tamaricen vocat Lenæus, similem scopis Amerinæ dicit, &c. & l. 16. c. 24. Tamarici folia carnosâ sunt: & l. 16. c. 21. quæ non decidunt: & cap. 26. fructum nullum ferre, ut semen quidem scopis tantum nascens.

Genera duo sunt Dioscoridi, sativa & sylvestris: & Plinio l. 24. c. 9. sylvestris plane sterilis, altera virior: hæc fert in Aegypto Syriaq, etiam abundanter lignosum fructum, majorem galla, asperum gustu, quo Medici utuntur vice Galla. Et Cordo rectè monente, etiam in Germania duplex invenitur, alterum solidiore ligno, medulla exilis, foliis tenuibus, ad Rhenum: alterum ligno non adeo solido, medulla ampliore & foliis latiusculis ad Danubium. Et pro-cerior Tamarix, & burilior, quia diminutiva forma Tamariscus dicitur.

I. *Tamarix fruticosa folio crassiore* five Germanica.

*Tamariscus*, Brunf. Lon. *fœmina*, Cord. hist.

*Myrica*, Trag. Tur. Gesf. hor. Lac.

*Myrica* syl. live *Tamarix*, Matth. Cast.

*Myrica humilis*, Dod. gal.

*Tamarix* syl. *fœmina*, Fuch.

*Tamarix humilis*, Cord. in Diosc.

*Myrica*, Gesf. hor. panonica, Clusf. pan.

*Myrica* syl. altera, Clusf. hist.

*Myrica altera* in Germania, Cam.

*Tamarix*, Dod. Tab. Germanica, Lugd.

*Tamariscus* Germanica, Ad. Lob. Ger.

Ex hac ad Rhenum nata, doliola sextarium dimidium capacia, confecta Francofurtum deferuntur.

II. *Tamarix altera folio tenuiore* five Gallica.

*Tamariscus*, Ang. Narbonensis, Ad. Lob. Ger.

*Tamarisci* aliud genus, Rauw.

*Myrica* circa Montipelum, Gesf. hor.

*Tamarix* Narbonensis, Lugd.

*Tamarix* Gallica aut Hispanica, Clusf. pan.

*Myrica*, Cæf. syl. prima, Clusf. hist.

*Myrica* five *Tamariscus* Gallica, Cam.

*Tamarisci* syl. genus, Alpino.

Hæc in arbores quoque in Hispania excrefcit, ut hominis ulna vix amplecti possit.

III. *Tamarix Ægyptia arbor.*

*Myrica* ingentis magnitudinis in Alexandria, Bels.

*Tamarix* gallis onusta ad Nilum, Eid. (lon.

*Tamarix fativa* & procera in Ægypto, Cord. in Diosc.

*Tamariscus* Rauw. & 1. par. Ind. or. l. 2. c. 1.

*Tamariscus* Atle vocata, Alpino.

*Myrica domestica* in Ægypto, Cast.

*Myrica fativa* Diosc. cum gallis mihi non visa, Clusf. hisp. & hist.

Galla *myricæ*.

Chermatiel Arabibus, Bellon.

*Myricæ* Ægyptiacæ galla, Clusf. hisp. & hist.

Fructus nucû magnitudine, figuræ inter se diverfæ longi, breves, rotundi, lati, crassi, graciles, Alpino.

In Ægypto tam in humidis quàm siccis nascitur, ita ut utrobique sylvulæ reperiantur, Bellonius.

## ERICA.

**E**rica arbor est fruticosa similis Myricæ, at multo minor, Diosc. l. 1. c. 117. & l. 3. c. 174. Coris frutex est folio Eri- ca, sed minore, pinguiore & rubente. Erica cacumine fructum fert sicut Pyraea & Amerina, Theoph. 1. hist. 23. Ericam Græci vocant fruticem, non multum à Myricæ differentem, colore rosæmarini & penè folio, Plin. l. 24. c. 9. qui l. 11. c. 16. mellis sylvestris erica meminit.

*Erica folio Myricæ.*

I. *Erica vulgaris glabra.*

*Erica vulgaris*, Trag. Thal.

*Ericæ*, Fuch. Dod. gal.

*Erica prima*, Matth. Lac. Dod. Lugd.

*Erica*, Cord. in Diosc. Bellon. Lon. Cast. def. Tab.

*Erica*, Tur.

*Erica Myricæ folio*, Ad. Lob. Clusf. pan. & hist.

*Erica vulgaris* five *pumila*, Ger.

Flos communiter colore dilutioris purpuræ: & aliquando & autumnò & vere floret: aliquando etiam flore albo est, hinc

*Erica alba*, Tab.

*Erica pumila alba*, Ger.

*Erica fl. albo minor*, Eyf.

II. *Erica Myricæ folio hirsuta.*

*Ericæ Myricæ folio similis*, Clusf. hisp. & hist.

Selago Plinii quibusdam, l. 24. c. 11. similis herbæ huic Sabinæ est Selago appellata.

III. *Ericæ genus*, quod tota Græcia vulgo Phana dicitur, Bellon. sed quid?

*Erica folio Coridis.*

I. *Erica maxima alba.*

*Erica prima*, Clusf. hisp. Lugd. Tab.

*Erica coris folio prima*, Clusf. hist.

*Erica major floribus purpurantibus*, Lob. Ger. descr.

III. *Erica maxima purpurascens longioribus foliis.*

*Erica secunda*, Matth. Dod. gal. Cast. Lugd. Tab.

*Erica Coridis folio altera*, Clusf. hisp. & hist.

*Erica Juniperifolia densè fruticans* Narbon. Lob.

IV. *Erica frutescens peregrina.*

*Erica peregrina* Brancionis, Lob.

V. *Erica major florib. ex herbaceo purpureis.*

*Erica tertia*, Clusf. hisp. Lugd. Tab.

*Erica coris folio tertia*, Clusf. hist.

*Erica major florib. herbaceis purpuratibus*, Lob.

*Erica cruciata*, Ger.

Hujus altera species, cujus flosculi herbacei racematim & spicatum coherent.

VI. *Erica major scoparia foliis deciduis.*

PP 3

Erica quarta, Clus. hisp. Lug. Tab.  
 Erica scoparia flosculis herbaceis, Lob.  
 Erica quarta Monspeliensium, Lugd.  
 Erica coris folio quarta, Clus. hist.  
 Erica pyramidalis, Ger.  
 Selago Plinii, Piræa Theophrasti, Guilandino dicebatur.

Hæc biflora est, & ex hac scopæ apud Monspeliensium conficiuntur.

VII. Erica ex rubro nigricans scoparia.

Erica tertia, Dod. gal. Lugd.

Erica nona, Clus. hisp. Lugd.

Erica pumila atera Belgarum, Lob.

an Erica tertia, Dod.

Erica decimatertia, Clus. hist.

Ex hac scopæ ad vestes purgandas conficiuntur.

IX. Erica humilis cortice cinericeo arbuti flore.

Erica sexta, Clus. hisp. Lugd. Tab.

Erica pumila calyculato unedonis flore, Ad. Lob.

Erica coris folio sexta, Clus. hist.

Erica tenuifolia, Ger.

IX. Erica hirsuta Anglica.

Erica octava, Clus. hisp. Lugd. & Taber. sub septima pinxit.

Erica juniperifolia altera, Lob.

Erica coris folio duodecima, Clus. hist.

Scopa, Cæsalp.

Erica tenuifolia caliculata, Ger.

X. Erica ternis per intervalla ramulis.

Erica quinta, Clus. hisp. Lob. Lugd. Tab.

Erica coris folio quinta, Clus. hist.

Erica procumbens.

I. Erica procumbens ternis foliolis carnea.

Erica quarta, Clus. pan.

Erica coris folio nona, Clus. hist.

Huic sæpe capitula viridia è foliolis compacta, capitulorum Thymi modo adnascuntur.

II. Erica procumbens herbacea.

Erica quarta altera, Clus. hisp.

Erica tertia, Clus. pan.

Erica coris folio octava, Clus. hist.

III. Erica procumbens dilute purpurea.

Erica altera, Clus. pan.

Erica coris folio septima, Clus. hist.

Erica baccifera.

I. Erica erecta baccis candidis.

Acacalis Dioscoridis, Amato.

Erica septima, Clus. hisp. Lugd.

Erica baccifera, Lob. Cast. ico.

Erica coris folio decima, Clus. hist.

Erica baccifera tenuifolia, Tab. Ger.

Frutex Lusitanis Camarinnas dictus, Linscot. in diaz orient. par. 4. fig. 21. lit. C.

II. Erica baccifera procumbens nigra.

Erica baccifera, Matth. Cast.

Erica baccifera Matthioli, Lob. Lugd. Thal.

Erica prima, Clus. pan.

Erica coris folio undecima, Clus. hist.

an Coris, Cord. in Diosc.

## CAMPHORATA.

Campforata dicitur, quod herba digitis friata, odorem camphora nonnihil referat: quam aliqui Selaginem Plinii l. 24. c. 11. quam Sabine similem dicit: alii ejusdem l. 24. c. 15. Chamæpeucen, quam Larici foliis similem feribit: quidam Cneorum nigrum esse volunt.

I. Camphorata hirsuta.

Chamæpeuce, Ang.

Camphorata Monspeliensium, Ad. Lob. Camer. Tabern.

Selago Plinii five Camphorata, Lugd.

II. Camphorata glabra.

Chamæpeuce & Camphorata minor, Lugd.

III. Camphorata congener.

an Anthillis altera, Ang.

Anthillis atera Italicorum, Lob. Lugd.

Camphorata altera, Tab.

Anthillis lentifolia, Ger. ico.

## SABINA.

SABINA *βέδαρος*, nonnulli *βέδαρος* Dioscoridi l. 1. c. 104.

Genera duo Dioscoridi l. c. unum foliis simile Cupresso, at spinosius & graveolens, acre ac servens: curta vero est arbor, & in latum magis sesundens. Alterum genus est folio Myrica simili. Plinio l. 24. c. 11. herba Sabina huius appellata à Græcis, duum generum est: altera Tamarici similis folio, altera Cupresso: quam quidam Creticam Cupressum dixerunt: & l. 17. c. 13. Sabina herba propagine servitur & avulsione.



I. Sabina foliis Tamarisci Dioscoridis.  
Sabina, Brunf. Trag. Fuch. Dod. ut : Bellon. Gefn.  
Hort. Tur. Lob. Cæf. Portæ: vulgaris, Cam.  
Sabina sine baccis, five sterilis, Matth. Cæf.  
Sabina miti folio, Cord. in Diosc.  
Sabina altera, Ang.  
Sabina vulgarior, Ad.  
Sabina altera, Lon. mas, Tab.  
Sabina Tamarisci similis, Lugd.  
Sabina sterilis, Ger.

II. Sabina folio Cupressi.  
Sabina baccifera, Matth. Rauw. Cam. Ger.  
Sabina altera, Dod. ut:  
Sabina, Lac. prima, Ang. qui Thyam Theophrasti  
cenfer.  
Sabina major, Gef. ap.  
Genuina sabina baccifera atrorubra, Lob.

Sabina Cupressi similis, Cord. in Diosc. Lugd.

Sabina vera, Cæf.

Sabina fructifera, Cæf.

Cum in arborem excrefcit, quotannis baccas juniperinis similes producit,

Sabina femina minor, Tab.

III. Sabina foliis Cupressi altera.

Sabina baccata altera, Lob. Lugd.

Sabinæ alterius altera icon, Dod.

Sabina femina major, Tab.

Ramulorum exilitate & foliorum lenitate, tantum à priore differt.

Differt autem à Cedro, quod Sabinæ gravis odor sit, & Sabinæ extremi rami in acuta folia definant, & baccæ minores sunt & nigrescant: cum Cedrus Junipero odoratior sit, folio obtuso, & baccæ majores phœnicæ coloris sint.

## CEDRUS.

**CEDRUS** alia est confusa, alia baccifera: de baccifera sic Dioscorides l. 1. c. 105. dicitur & altera Cedrus parva, spinosa Juniperi modo, fructum ferens magnitudine myrri rotundum. Risp. Theophrasto l. hist. 15. perpetuo viret: l. hist. 16. folia habet rara extremitate pungente: 3. hist. 12. quidam binam affirmant, alteram *Λυκίας*, alteram *Ποντικής* (puniceam Gaza) alii simplicem dicunt, scilicet qui Idam incolunt. est Junipero non dissimilis, sed folio maxime distat: quippe Cedro densum, acutum; spinosumq., Junipero mollius: excelsior quoque Juniperis nasci videtur: alii nominibus non dividunt, sed ambas Cedros appellant: Cedrum cum additione *ἑξυκεδρον* nunciant, &c. Plinius l. 13. c. 5. Junipero similem habent: Phœnices & Cedrum minorem: duo ejus genera, Lycia & Phœnicia: differunt folio: nam quæ densa, acutum, spinosum habet, Oxycedrus vocatur, ramosa & nodis infesta. Altera odore præstat: fructum ferunt Myrri magnitudine, dulcem sapore.

Cedrus baccifera.

I. Cedrus folio cupressi major fructu flavescete.  
Juniperus major seu Cupressus sylv. Dioscoridis;  
in Codice Hermolai.

Cedrus Phœnicia, Plinii.

Cedrus Lycia, Matth. Gef. hor. Cæf.

Cedrus pumila foliis obtusis & Phœnicia, Bellon.

Cedrus minor, Cord. in Diosc. Portæ.

Oxycedrus Lycia, Dod. Ger.

Juniperus major, Clus. hisp. & hist.

Cedrus phœnicæ, Ad. media vel secunda, five

Oxycedrus folio cupressi, aut Sabina major Mōspel. Lob.

Thuiæ genus quartum, Lugd.

Cedrus phœnicæ secunda, Tab.

(cis.

II. Cedrus folio Cupressi media majorib. bac-

Cedrus Lycia, Bellon.

Cedrus minor alter, Diosc.

Cedrus phœnicæ altera, Plinii & Theophr. vel prima, Lob.

Thuia Mafiliensium, Lugd.

III. Cedrus folio cupressi minor.

Cedrus phœnicæ minor vel tertia, Lob.

Hæ tres sola magnitudine differunt: verum & duæ priores ratione ætatis variare cœsemus, ita ut Martiolus adulescent, at Lugdunensis historia adultam exprimere videatur. Sic & ratione ætatis in foliis differentia: primo enim prodeuntia, Juniperi vulgaris folia æmulantur, quæ paulo breviora & acuta: at adultæ, instar foliorum Cupressi rotundantur, ita ut rami inferiores foliis pungentibus & acutis, summi verò obtusis & rotundis vestiantur: hoc exprimit figura

Sabinæ baccifera, Adverf. & Lob. ico.

## THUYA & BRUIA.

**Thyon** five *Thia* Theophrasto 5. hist. 5. forma Cupressi similis, cum ramis tum foliis, caudice fructuq., vel potius seu Cupressus sylvestris: & l. hist. 15. ex sylvestribus perpetuo viret. Plinius l. 13. c. 16. Thya ex Theophrasto memi-

meminis, quam aliqui volunt eandem cum Cedro Atlantica ejusdem. Brutam sic descripsit Plinius l. 12. c. 17. petunt in Helimos arborem Brutam, Cupressio sive similem, ex albidis ramis, jucundis odoribus, accensam & cum miraculo historiæ Claudii Cæsaris predicatam, odorem etiam proximum Cedro. &c.

**Thuya Theophrasti.**

Arbor vitæ, Bellonio, Gef. hor. Dod. Clus. hisp. &

### hist. Cast. Tab. Ger. Eyst.

Arbor filici similis, Oviedo.

Cedrus Lycia, Loban & Ad.

*Thuyæ tertium genus, Lugd.*

Arbor paradisa Lutetian. Lugd.

Thuia five Thya vulgo, Cam.

Hæc è Canada Francisko I. Galliarum regi, Arboris vitæ nomine oblata, fortasse ab odoris vehementia vel ob immortalem ejus comam, sic dicta.

C U P R E S S U S.

**C**UPRESSUS καρυωτός Dioscoridi l. 1. c. 102. Σεντ τὴ κρύειν τὴς καρπὶ τὰς ἀκρῆμονας. Theophr. 1. hist. 8. procerum & longo caudice constat, tamen macilentum: 1. hist. 13. mas nodosior est femina: 1. hist. 14. simplici affurgit caudice ad longitudinem, sed non multum radicibus, neque ramis frequentibus patet: 1. hist. 15. viret perpetuo: 2. hist. 3. pietrunque ex femina matrem provenire affirmant: 1. cauf. 5. hujus fructus non id totum est, quod pila speciem gerit, sed quod coninnatitur præterea, exile & quasi lericum semini proximum, quod pilula sua dehiscent delabitur. At Plinio l. 16. c. 33. Cupressus natu morosa, fructu supervacua, baccis torva, folio amara: odore violento, ac ne umbra quidem gratiofa, materie tarta, us penè fruticosi generis, diti sacra, & ideo funebri signo ad domos posita: femina sterilis duo genera earum: meta in fastigium convoluta, qua & femina appellatur: ma spargit extra se ramos, depuraturq. & accipit vitem, &c.

I. Cupressus, Math. Ang. Dod. ut: Cord. in  
Dios. Ger. hor. Tur. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæs. Por-  
tæ, Lugd. Cam. Tab. Eyst.

Cyparissus, Cast.

Cupressus altera five sylvestris, Ger.

Hujus fructus five conos, nuces vel pilulas Cypressi, Officinæ Cypressi nomināt: aliquibus Galbulæ dicuntur.

II. Cupresso similis arbor in Syria: an Cedrus major Dioscoridis.

Thya forte Theophr. cujus fructus pilularum Compositi magnitudine in Oriente notissimi.

Abhel dicitur, Guilandino in problem.

*Cedrus major* Dioicæridis, *Thyia* Theophrast. & Abhel, Guiland. in papyro.

Tac arbor Cupresso limilis ex qua gummi Tara,  
Rauwolf.

Arbor cujus fructus Abhel Guilandino, Clus  
hispan.

Habhel fructus, Clus.hist.

J u N I P E R u S.

**A** *Ῥαδις & Ῥαδοῦ*: Ῥαδὸ τὸ τῶι ἀρώδι καὶ δυν, quod ejus odorem omnia reptilia aduersentur: vel Ῥαδις τὸ ἔχον τὰς ῥαδιδας καρπούδας: Latine Juniperus dicitur, quod juniores & novello fructus pariat, antiquis matrescentibus: solam serē arborum sētus suos in biennium prorogare ajunt: cujus baccæ *ῥαδιδα*, in officinis Grana Juniperi nominantur. Ejus verd lacryma Vernix dicitur.

Genera: Diofcoridi L. c. 13. *ἀνδρόδοξος* quaedam maior est, altera minor: unius fructus, nucis pontica magnitudine reperitur: altera vero *φάβαν* aequat, at rotundius est odoratus, dulcis in manducando ac subumaciat Arctebati dictum. Plinius vero L. 6. c. 25. nec *Juniperi* flores: quidam duo genera tradunt: alteram florere nec ferre: qua vero non ferreat ferre, protinus bacca subnascentibus qua biennio bareant: sed id falsum: L. 2. c. 8. *Juniperus Cedro* affinis: et ejus duo genera: altera major, altera minor: haec Plinius. Verum baccae in quibusdam grandes, in aliis exiguae: in bu dulces, in aliis proflus amarae: alii plane rotundius, quaedam oblonge et acuminatae.

I. *Juniperus vulgaris fruticosa.*

Juniperus, Brunf. Matth. Dod.ut: Lac.Tur. Lon.

Lob. Portæ, Ger. nostras, Cam.

*Juniperus vulgaris*, Trag. Clu & Hist.

*Juniperus minor*, Fuch. Cord. in Diosc. Lugd. syl.

*Juniperus humilis*, Gef. hor.

Juniperi altera species, Ang.

*Juniperus vulgarior*. Ad.

Juniperi primum genus, CæL

*Juniperus* & *Juniperus baccifera*. Tab.

Hic, describit etiam Juniperum majore Germanicam & fructum magnū verrucosum adpignit.

II. Juniperus vulgaris arbor.

Juniperus nata in Hispania, Plinio l. 16. c. 20.

Juniper-

Juniperus vulgaris celsior & arborefcens, Cluf. hisp. & hist.

Juniperus major fativa, Cast.

Juniperus urbana in arborem affurgens, Lugd.

Tales Thufcia alit, frequenter in agro Senenfi, ut Matthioli & Lugdunenfi monent : & in Hispania, ita ut ex eastrabes & ædium contignationes, multi fabricent, Clusio referente.

II. Juniperus minor montana folio latiore fructuq; longiore.

Juniperus minima, Gef. hor.

Juniperus alpina, Cluf. pan. & hist.

IV. Juniperus major baccâ cæreuleâ.

Juniperus maximus Illyricus cæreulea baccâ, Lob. an Juniperus alter, Cæf.

Juniperus major, Lugd.

Juniperus major Illyrica, Tab.

Juniperus maximus, Ger.

V. Juniperus major baccâ rufefcente.

Oxycedrus Theoph. & Galeni.

Cedrus phœnicea, Matth. Tab.

Oxycedrus, Dodon. gal. Bellon. cui & Juniperus,

ruber, Cluf. hispan. & hist. Lugdun.

Cedrus, Lac. Lon. minor & Cedrula, Gef. hor.

Cedrus magna five Juniperus peregrina, Cord. in Diofcorid.

Cedrus minor, vel phœnicea, Cast.

Oxycedrus phœnicea, Dod. Ger.

Juniperi prima species, five Diof. Juniperus, Ang.

Juniperus major Monspeliensium, Lob.

Oxyarceutis five Juniperus acuta, Ad.

an Juniperus montanus fructu flavo, Cæf.

Etalch Scalig. grandiori Juniperus, Lugd.

an Juniperus major Italica baccis rubris, Cam.

Aliis Cedrus Lycia Theophrasti.

VI. Junip. major fructu nucis magnitudine.

Juniperus major in Cupressi altitudinem affurgens, fructu dulci, Gallæ quodammodo simili eduli, nucleo olivæ nucleis simili, Bellon. quid?

VII. Arbor Americana oxyacanthæ similis.

Lignum exoticum, Cluf. ex. l. i. c. 6.

an atfinis arbori Etalch in Africa nascentis, cujus Joh. Leo in desc. Africæ meminit, dubitat Cluf.

Incolæ igne refinâ eliciunt, qua picis loco utunt.

## ASPARAGUS & CORRUDA.

**E**TSI Ἀσπαραγὸς & vel ἀσπαραγός Galenus 2. alim. omnes propemodum teneros caules & tenera germina, seu ex oleribus & herbis, seu ex frutricibus, seu ex fruticibus, arboribusq; vocit, attamen peculiari generi plantæ etiam tribuitur, quæ sic dicta, quod cauliculos hos, qui prima germinatione è terra prodeunt, præcipuas habeat.

Genera duo Diofcoridi l. i. cap. 152. petraea & fativa : & Galeno βασιλικὴν regium & ἁλιν palustre : sic enim Diofcorides, ὁ πῦρος πικρὸν & quem ὑακινθῶν ( id est murinam spinam ) vocant, vulgaris est nota : & paulo inferius : Asparagus altitudo, frutex est ramosus, folia habens multa, longa, sæniculo similia, radice rotunda, grandi, tuberculum habente. Et Theophrastus 6. hist. 1. ἀσπαραγός ( hanc solam vocem per geminam Asparagus corrudam Gaza vertit ) ex toto aculeata est, & nullum juxta aculeum folium gerit : & 6. hist. 3. juxta aculeos pusillum quiddam clava simile producit, ex quo stoculus tandem ipse erumpit : radice larga, alta, numerosa, eademq; tam crebra innititur, ut pars superna radicum tota connexa & continua reddatur, ex qua vel ipsorum caulium proventus scilicetatur, &c. Plinius l. 19. c. 8. omnium bortenfiū lautissima cura Asparagus &c. Est & aliud genus incultius asparagus, mitius corruda. passim etiam in montibus nascent, referit superioris Germaniæ campis non infaceto Tiberii Cæsaris dicto, herbam ibi quandam nasci similitam asparago &c. & paulo infra : indicavimus & Corrudam : hunc enim intelligo syl. asparagum, quem Græci orminium aut nyacanthon vocant : & l. 19. c. 4. sylvestres secerat natura corrudas. ut quisq; demeteret passim &c. altiles spectant ut asparagi : & l. 20. c. 10. Asparagi vires ubi recensuit, subjungit : syl. asparagum, aliqui Corrudam, aliqui Libycam vocant : Attici orminium hujus eff. caciior vis & candidiore major : & l. 21. c. 16. in totum spina est Asparagus.

Asparagus folio molli.

I. Asparagus fativa.

Asparagus, Brunt. Trag. Matth. Fuch. Dodon. gal. Cord. in Diof. & hist. Gef. hort. ( qui majoris & minoris meminit ) Tur. Lon.

Asparagus altitudo, Fuch. Tab. domestica, Bellon.

Asparagus Diof. idem cum fativo & hortensi, Ang.

Asparagus fativus, Lac. Cast. Lugd. Ger.

Asparagus hortensis, Dod. Ad. Cam.

Asparagus domesticus, Eyst. vulgaris, Lob.

Asparagi alterum genus, Cæf.

Hic cum in pratis Alsatia nobis vicinæ & in pratis ad Danubium sitis, & in Burgundia circa Vesuntium spontè proveniat, hunc Plinium intelligere

QQ

ligere censemus, cum in superioris Germaniæ campis provenire scribit, & hic dicitur

Asparagus mitior iponte nascent, Cl. hisp. & hist.

II. Asparagus sylvestris tenuissimo folio.

Asparagus sylvestris, Matth. Cast.

Asparagi tertium genus sativo simile, qui Paladium leporis, Cæf.

Sola transplantatione & cultura à sativo differt.

III. Asparagus maritimus crassiore folio.

Asparagus ~~maritimus~~ sive palustris, Galeno.

Asparagus palustris, Matth. Ang. Tab.

Asparagus marinus, Clut. hisp. & hist. Cam.

Asparagus maritimus Dioscoridis, Ad. Lob.

Asparagi alterum genus, Cæf.

Asparagus sylvestris, Ger.

*Asparagus Corrua dictum.*

Corruam nonnulli dicta volunt, teste Ruellio, quod ubi adolevit, facile corrui decidatvè: sic & Horminum, ~~unde rō dpmā~~, quod est ruo.

I. Asparagus foliis acutis.

Asparagus petra Dioscoridi & Galeno.

Corrua & syl. Asparagus, Plinio.

Asparag. petreus & corrua, Mat. Tab. in ico. Ger.

Corrua, Dod. gal. Cord. hist. Rauw. Bellon. Ad.

Lob. ico. Lugd. cui & Corrua Penz.

Asparagi prima species, Ang. Cæf.

Asparagus sylvestris, Gei. ap. Lac. Dod. Cam. ep.

sive Corrua, Bellonio.

Corrua prior, Clut. hisp. & hist. Tab.

II. Asparagus aculeatus alter, tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum.

Asparagus syl. alter, Dod. Ger.

Corrua altera, Clut. hisp. & hist. Lugd. Tab. at in ico. Corrua Hispanica.

Corrua Hispanica altera, quæ Lusitanica, Lob. at in ico. Corrua varietas.

Asparagi quartum genus, Cæf.

III. Asparagus aculeatus spinis horridus.

Polytricha, Bellonio.

Asparagus syl. tertius, Dod.

Corrua tertia, Clut. hisp. & hist. Lob. Lugdun. Tabern.

Corrua Hispanica altera, Tab. in ico.

Asparagus syl. spinosus, Ger.

Asparagi Theophrasti nomine cui spina pro folio, ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

IV. Asparago aculeato affinis triplici semper spina.

Echinopoda Cretica, Hon. Belli ap. 2. ad Clusium & Ponæ ital.

Chenopoda Plinii suspicatur Hon. Belli.

Sic autem Plinius l. ii. c. 8. ceras ex omnium arborum satorumq; floribus confingunt, excepta Rumice & Chenopode: plura non habet. Verum aliqui Echinopode legunt, quam quidam Tribulum, alii Echion, alii Spinæ genus interpretantur. Sic Dalechampsius apud Athenæum per Echinopoda, Cardui Chii genus intelligit.

## SECTIO SEXTA.

**CEDRUS CONIFERA; PEUCE seu PINUS; PINASTER;**

**LARIX; PITYS sive PICAEA; SUCCI sive HUMORES PLANTARUM; GUMMATA; Resina; Abies; Taxus; Draco arbor; Palma Dactylifera;**

*Palma squammosa fructu; Palma nucifera; Nucces exotica & Arbores admiranda.*

### CEDRUS CONIFERA.

**K** <sup>l. 1. c. 105.</sup> Dioscoridi l. i. c. 105. arbor magna est, ex qua Cedria dicta colligitur: fructum verò habet uti Cupressus, at grandiorum multò: At Serapio, minorem legit. Et Guilandinus cum de Papyro vult eum esse arborem, quam sub Cupresso altera proposuimus. Theophrastus 4. hist. 6. & 5. c. 158. Cedrum Syria gignit, eaq; ad extremum videntur: 5. hist. 5. ex Cedro simulacrum sculpere solens. Plinio l. 15. c. 5. Et majoris Cedri duo genera, quæ steret fructum non fert: frugifera non flores, & in ea antecedentem fructum occupat novus: semen ejus Cupresso simile: quidam Cedrelaten vocant: & l. 24. c. 5. Cedrus magna quam Cedrelaten vocant, dat piceum quæ Cedria vocatur.

Cedrus nucifera foliis laticis.

Cedrus major, Matth. Dod. gal.

Cedrus arbor conifera, Gei. hor.

Cedrus Hebraeor. non Græcorum, forte Cedrus

Syriæ Theophrasti, Ang.

Cedrus Dioicor & Sacrarum literarū idem, Ang.

Cedrus, Bellon. (cui & Libani & Syriæ & in Anan) Rauw. Cæf. Tab. Libani, Ger.

Cedrus

Cedrus Libani quæ neq; Dioscoridis neq; Græcorum Cedrus est, Guiland.  
Cedrus magna, Dod. Portæ.  
Cedrus Libani & Palæstinæ præcelsa, Ad. Lob.  
Cedrus phœnicia Matthioli, Lugd.  
Cedrus phœnicia nostra, Lugd.

Co ni non dependent, sed sursum spectant, ut resè B ellonius, Dodonæus & Dalechampius in histor. Lugdunensi, pingunt.

In regno Congiano tanta copia, tantæq; magnitudinis ut inde naves conficiant: par. 1. Ind. or. l. 2. c. 1. & in insula Tercera scaphæ, currus, rhedæ, & hujus generis alia opera extruunt: par. 3. Ind. or. cap. 6.

Sic in Andes nova Hispania, summa copia, ubi alia alba, alia rosea & fragrans: Joseph. Acoft. l. 4. c. 3. ubi de Cedro admiranda, verba facit. Provenit etiam in Virginea & Florida.

## DE PEUCE seu PINU.

**E**τς Πῆκον καὶ πίνον, à Gaza Pinus & Picea vertatur, ab aliis tamen contrario modo fit, & πῆκον Picea, forte ob nominis similitudinem redditur: nec mirum, cum ut Dioscorides l. 2. 86. habet, πίνον, vulgo nota arbor est, ejusdemq; generis est quæ πῆκον dicitur, siquidem hæc ab illa specie tantum differat: ita ut nam picea quam pini fructus, qui in conis reperitur πίνον dæ, eodem cap. 87. monente, appelletur.

Genera: πῆκον Theophrasto 3. hist. 10. alia urbana, alia sylvestris: sylvestris duplex est, alteram Idæam, alteram maritimam vocant: hanc rectior, celsior, materieq; crassior Idæa: folio teneriori, imbecillioriq; maritima, & cortice leviori, utiliq; ad coria, quod alteri minus: mox maritima rounda, breviorq; debiliens, & Idæa oblongior viridis: minorq; bifidus, nunquam sylvestrior, &c. Idæa ramosior crassiorq; & picem copiosius præbet, &c. Macedones genus quoddam πῆκον simile dicunt, & matrem brevioris, folioq; durioris: sæminam verò proceriorem, foliis pinguiorem, mollem, procliviorisq; Mari lignum circumcincta medulla durum & operi fabrilis versuale: sæmina tractu omnino facile atq; molliora, quod quidem omnium ferè marium sæminarumq; publica differentia est, ut calores materiam afferant, &c. (& Plinius l. 16. c. 10. lignum maribus durum, & in fabrilis opere contortum: sæmina molliora, publico discrimine in securibus) Igitur πῆκον genera, urbanum atq; sylvestre: sylvestris mas & sæmina, ac tertia sterilis. At Arcadia incolæ, nec sterilem nec urbanam πῆκον appellat, sed πίνον, &c. Plinio l. 6. in Europa sex genera cognatarum arborum feruntur (pinus, pinastr, picea, larix, abies, tæda, taxus) ex iis pinus atq; pinastr, folium habent capillamenti modo prætenue, longumq; & mucrone aculeatum &c. Pinastr nil aliud est, quam Pinus sylvestris a latitudine & a medio ramosa, sicuti pinus in vertice: copiosiorisq; pino dat resinam. Sic l. 15. c. 10. nucum pinearum genera quatuor recenset, 1. grandissimas, 2. Tarentinas, 3. Sapineas, 4. pityidas, 5. pinastris.

## I. Pinus fativa.

Pinus urbana folio perpetuo, Theophrasto.  
Pinus, Bruff. Trag. Dod. ut: Bellon. Cord. in Diof. Lac. Tur. Lon. Cæli. Cast. Portæ: arbor, Gefhor.  
Pinus domestica, Matth. Tab.  
Pinus fativa, Ang. Lugd. Ger.  
Pinus vulgarissima, Ad. Lob.  
Pinus Italica, Cam.

Nucem πῆκον: Theophrastus, aliis κόκκος καὶ κόκκος & κόκκος vocant: & in hoc genere marem nucem rotundior, fæminâ longiorem ferre vo-

## II. Pinus sylvestris.

(lunt.

Pinus syl. montana Theophrasti.  
Pinastr, Brunf. Trag. Tur. Gefhor. Lob. Cæfalp. Thal. Portæ.  
Pinus sylvestris, Matt. Cast. live Pinastr, Dod. ut.  
Picea φασγίον, Ang.  
Pinus sponte proveniens, Cord. in Diof.  
Pinus syl. fructifera, Lugd.  
Pinus syl. montana, Tab.

Pinus syl. mugo, Ger. ico.  
an Pinastr i. vel Austricus major, Cluf. hist. qui duplicem facitalbum & nigrum.

## III. Pinus syl. montana altera.

Pinus tubulus, Plinio l. 16. c. 10. eisdem, inquit, arbores (scilicet Pinum & Pinastrum) alio nomine esse per ora Italiz, quas Tubulos (strubulos Hermolaus legit) vocant, pleriq; arbitrantur, sed graciles succinctioresq; & enodes, liburnicarum ad usus, penè sine resina.

Pinus syl. Mugo, Marth. Ad. Lob. Tab.  
Pinus syl. altera, Dod. ut: sed edit. lac. tertia descriptione.

Picea altera sive sylvestris, Ang.  
Pinus tubulus, Lugd.  
Pinus montana minor, Ger.

## IV. Pinus syl. montana tertia.

Teda, Brunf. arbor, Lugd.  
Pinus syl. cembro, Matth. Ad. Tab.  
Pinus syl. tertia, Dod. gal.

QQ 2

Pinastr,

**Pinaſter**, Bellonio.

**Pinus ſyl.** altera ſpecies, Dod.

**Pinus ſylveſtris**, Ger.

Plin. l. 6. c. 10. ſextum genus eſt Teda propriè dicta, abundantior ſucco, quàm reliqua, parcior liquidiôrꝫ quàm Picea, flammis ac lumini ſacrorum etiã gratia

V. **Pinus maritima major**.

**Pinus maritima prima**, Math. Tab.

an **Pinus marina**, Ang.

**Pinus ſyl.** quinta, Dod. gal.

**Pinus maritima**, Lugd. major, Dod.

**Pinus maritima Theophrasti**, Lob.

**Pinus ſyl.** montana, Ger.

Huc refer ſequentem, modo eadem non ſit

**Pinus ſyl.** altera, Lob.

**Pinaſter 2. & Pinus marina Theophr.** Cluſ. hiſp.

**Pinaſter alter Hiſpanicus**, vel minor **Hiſpanicus**. Eid. hiſt.

**Fini maritimæ majoris ramulus**, Dod.

**Pinus ſylveſt.** five ſterilis, quia nuclei edules non ſunt, Lugd.

**Pinus montana Theophrasti**, Tab.

**Pinus maritima major**, Ger.

VI. **Pinus maritima altera**, Math. Tab. Lug.

**Pinus lœza Theophrasti**, Lob.

**Pinus ſyl.** quarta, Dod. gal.

**Pinus ſyl.** minor, Ger.

an **Pinaſter primus**, Cluſ. hiſp. & hiſt.

Hæc ab Auſtriaco majore, fortè tantum ratione ſoli diſtat, Cluſio monente.

VII. **Pinus maritima minor**.

an **Piceæ** genus alterum, Bellon.

**Pinus maritima minor**, Dod.

**Pinaſter tertius**, Cluſ. hiſp. Lob. Lugd.

**Pinaſter tertius Hiſpan.** vel pumilo alter, Cl. hiſt.

an **Pinaſtri** alterum genus parvum in maritimis, Caſalp.

IIIX. **Pinaſter conis erectis**.

**Pinaſter pumilio**, Cluſ. pan. Cam.

**Pinaſter quartus Auſtriacus**, Cluſ. hiſt.

IX. **Pinaſter latifolius** julis viſcentibus aut pallescentibus, Cluſ. pan.

**Pinaſter ſecundus Auſtriacus**, Eid. hiſt.

X. **Pinaſter tenuifolius** julo purpuraceo, Cluſ. pan.

**Pinaſter tertius Auſtriacus**, Eid. hiſt.

**Thæda**, Tab.

**Tæda** five **Pleudopinus**, Ger.

Hujus arboris ramos ſolent noſtrates Oenopolæ ante ædes ſuas proponere, ut Viennenses Abietis teneriores ramos, & aliarum regionum incolæ Hederam.

XI. **Pinus Indica** nucleo purgante.

**Pinei** nuclei Malucani, Acoſta, Monardi.

**Pinei** nuclei cathartici, Lugd.

**Pinea** purgativa, Caſt.

**Pinei** nuclei Indici, Fragoſo.

an **Pinioen** five **Nuces pineæ** ex Puna, Joſeph. Acoſt. l. 4. c. 29.

XII. **Pino ſimilis Orientalis**.

**Cibage**, Cam.

XIII. **Pineos** nucleos duros referens fructus. Fructus peregrinus 8. Cluſ. ex l. 2. c. 30. & in tab. 3. Lugd. Tab. Ger.

XIV. **Pineæ** nucis nucleo ſimile ſemen ſavo ſpadiceum Braſilianum.

Fructus miſcellaneus 9. Cluſ. ex l. 2. c. 15.

XV. Arbor ſpinofa fructu pineæ ſimili.

Cachi arbor ſpinofa, cujus fructus Ciccara, forma pineæ nucis, Scalig. Ludovico Romano, Nic. Coſtino, & ex his Lugd.

## L A R I X.

**Q**uæ Larix aut Larex, etiã Græci δελξ nuncupatur, an à Theophrasto deſcripta fuerit dubitatur: hæc vox in Gaza verſione reperitur: Gaza tamen Larix nihil aliud eſt, quàm πικρος Theophrasti, quæ plerumq; Piceam interpretatus eſt: aſtamen interdum πικροξ vocem, per Piceam & Laricem ſimul expreſſit, ut videre eſt 9. h. ubi legitur πικροξ, πικροξ, & πικροξ Gaza reddidit, terebintho, larici, piceæ, amygdalæ. Sic Plinius de Larice agens, ea quæ Theophrastus πικροξ tribuit, omnia illa Larici adſcribit: ſic l. 16. cap. 10. ſcribit: quinto generi ſitus idem, eadem facies, Larix vocatur, materies præſtantior, longè incorrupta, vix emori contentius: rubens præterea & odore acrior: pluſculum huic erumpit liquoris, melleo colore atq; lentore, nunquam diſcreſcit: & mox: Larix nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo igni vi conſumitur quàm lapides. Verum experientia Plinio contrariatur, & ipſius propria verba, dum inquit: in Macedonia Laricem maſculam urunt, ſumunt radices tantùm. Et l. 16. c. 21. ei perpetuam comam tribuit, cùm tamen in noſtra Larice contrarium conſtat. Quare Gaza larix, eſt πικρος Theophrasti: at Plinii Larix, eſt δελξ Theophrasti. An fortè hæc Larix

*stra Larix, fit Pinus urbana folio deciduo Theophrasti: siquidem scribat Pini urbani genus quoddam solum habere perpetuum: sylvestri autem omni id perpetuum esse: ex quibus colligere licet, urbani quoddam genus esse, cui folia decidunt, quod in sola Larice animadversum est.*

Larix, Brunf. Matth. Bellon. con. Dod. ut: Fuch. Gesl. hor. Lac. Tur. Lon. Ad. Lob. Cast. Clus. pan. & hist. Lugd. Portæ, Tab. Ger. Cam. Pini syl. genus cui hyeme folia decidunt, Cæf.

Ex hac colligitur resina laricea, de qua inter Resinas. Fungus etiam adnascitur qui Agaricum dicitur, quemadmodum Larici adpingunt, Lobel. Tab. Ger.

## DE PITY seu PICEA.

**P**l<sup>u</sup>rus à πικρα differre videtur, Theophr. 3. hist. 10. quod (scilicet Pinus) pinguior sit folio tenniori, magnitudine minor, erectaq, minus affurgit: praterea quod conum brevior em horridioremq, ferat, ac nucem magis resinofam. Ambabus folia capillata, sed Peuce materies candidior, similiorq, Abieti, atq, in totum minus spinosa. Et 3. hist. 6. quidam Pinum & Piceam florere existimant, quidam minime, sed Piceam xυθαρων, id est, nucamentum gignere, quod Grossi proportionem respondet. Plinius l. 16. c. 25. Pinum Piceamq, ullo flore ex hilarari negat: experientia tamen refragatur. Et ut l. 16. c. 10. Picea plurimam resinam fundit, interveniente candida gemma, tam similis thuris, ut mista, visu discerni non queat, &c.

Genera duo ex Plinio colligimus, sativam & sylvestrem, illam Sapium, hanc Piceam nominat. Nam Sapium inferiorem & enodem Abietis partem significat: sicut superiorem partem nodosam durior emq, Fusterna, Plinio l. 16. c. 39. scribente: verum etiam arborem significat: hac enim l. 16. c. 12. habet: inter hac genera proprium quidam secere Sapium (Sapium Turnebus legit) quoniam ex cognatione earum feritur: ejusq, arboris imas partes Teda vocant, cum sit illa arbor nil aliud quam Picea, feritate paulum mitigata satu: Sapium autem materies casarum e genere fiat. Sic Plinius ejus nucem Sapineam vocat: nam l. 15. c. 10. nucem Pinearum genera enumerans, tertium ait Sapinea, e Picea sativa, nucleorum cute verum quam putamine, adeo molli ut simul mandatur.

I. Picea major prima, sive Abies rubra.

Picea, Brunf. Matth. Ang. Cord. in Dioscor. Gefn. hor. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæfal. cui & Tæda Plinii, Cast. Lugd. Thal. Tab. Ger. Abies prima & rubra, Trag. Abies, Dod. Sapium, Bellonio, Lac.

Picea Plinii & Abies mascula Theophrasti, Clus. pan. & hist.

Hanc alii Abietem mare Theophrasti: alii Pi-

ceam φεισφόρος ejusd. l. caus. 9. quam Gaza pediculiferam, Scaliger pediculariam interpretatur. Sic di&a Plinio l. 16. c. 10. quod totis paniculis minoribus gracilioribusque, minimos ac nigros nucleos pediculis fimiles gignat: alii Tædam Plinii (de qua sub Pino quarta) faciunt.

II. Picea minor.

Picea pumila, Clus. pan.

Pinum tubulum sive tibulum Plinii, Dalechampi vocare videtur, Clus. hist.

## DE SUCCIS seu HUMORIBUS Plantarum.

**Q**uemadmodum multis animalibus pili & penna decidunt, & serpentes singulis annis exuvias deponunt: sic & plantis folia, flores & fructus decidunt, & ex earum aliquibus humor superfluum profluit, ut Vitibus lactyma: Ceraso, pruno gummi: picea, terebintho, lentisco, resina: aliis aliis liquor quantitate molestus. Nam ut in animalibus sanguis turget, sic in plantis humor seu succus, qui si vel sponte profluat, vel arte educatur, ad earum conservationem facit: nam & plantæ suis venas & nervos habet, per se nomine carentes, ut habet Theophrastus l. 1. hist. 3. que similitudine quadam nomina partium animalium sortiuntur. Sanguis autem plantarum, earum succus proprius est, ut in Ficubus lac, secundum Aristotelem l. de plantis: in Vite veluti humor: in quibusdam veluti oleum: in aliis pici liquida similis: in nonnullis, ut gummi. Et ut Theophr. l. c. humore plantarum deficiente, & ipse deficere incipiunt, eoq, exsiccato, tabescunt: quem humorem nonnulli simpliciter οὖρον succum in cunctis appellant, quidam absque nomine relinquunt: in quibusdam vero οὖρον succum, inq, aliis δάκρυον lactrymam vocant. Idem serè habet Theophrastus 6. caus. 17. & hic pro coctionis diversitate, diversam crassitiem & colorem nascitur. Hinc si bujus humoris consilientiam consideres (ex Theophr. 6. caus. 17.) alii callofiores lentioresq, sunt: alii aquosi, minusq, lenti: hinc alii densari possunt, alii nequeunt: nonnulli etiam quo densentur atque concrecant, aliquid miscent. Quare

succus plantarū, qui ῥαδικὲς proprie, is humor est, quo planta nutriuntur, quiq; non spontē, sed precedente expressione, aut alia preparatione elicitur: quiq; semper tenuior est, nisi calore exsiccatum, induretur. Liquor vero sive in crassior est, qui interdum sponte, interdum incisione delabatur, & velut lacryma profusum, unde communiter δάκρυον lacryma vocatur. Qui si oleaginosus & liquidus fuerit, ῥιζίνη dicitur: si terrestris, aqueus & in truncu arborum concretus, ῥόμμι gummi: quæ verò naturam mediam inter gummi & resinas possident, & partim terrestria & aquea, partim oleaginea & pinguis sunt, ῥόμμι ῥιζίνη gummi resina nominatur. Sed de succu inspissatu primum, dein de gummatis, sum de Resina, & tandem de Pice.

De succu inspissatu.

I. Ammoniacū, ἀμμωνιάκον Dioscoridi 1.3.c.98. est Ferulæ (δένδρ) liquor, & totus cum radice frutex Agasyllis appellatur: Galen.6.simpl. Ferulæ lacryma. Plinio 1.12.c.23. Hammoniacum lacryma, ab Hammonis oraculo nomen habet, juxta quod gignitur arbor, quam Metopion vocant, resinæ modo aut gummi.

Ammoniaci lacryma, Matth.

Hammoniacum seu gutta Hammoniaci, Cord. hist.

Ammoniacum, Cæf.

Ammoniacum officinis & Gummi ammoniacū.

Probat Dioscorides l.c. bene coloratum (exterius flavum, intus candidum) ligni & calculorū expers, thuris glebarum granorūve similitudine, syncerum ac densum, nulla sorde spurcatum, castorei odore, & gustu amarum: quod genus θραύσμα (thrauston Plinio, quasi dictis fragmentum) appellatur: alterū, quod terræ calculorūve particeps est, φύγμα (Phryma Plinio, i. e. mixtura) dicitur: & hoc ad medicamenta in aqua resolvitur.

II. Galbanum γαλβάν Diosc. 1.3.c.97. liquor est Ferulæ in Syria nascentis, quam nonnulli Metopion vocant: Gal.8.simpl. γαλβάν succus est plantæ ferulacæ: hoc secundum eundem 1. de Antidot. in Sagapenum convertitur. Plin. lib. 12. cap. 25. Galbanum dat & Syria in eodem Amanomonte, è ferula ejusdem nominis resinæ modo, quam Stagonitici appellant, de qua & lib. 24. cap. 5. At Theophr. 9. hist. 7. Chalbanum in Syria nascitur ex Pavo vocato.

Galbanum, Matth. Cord. hist. Cæf.

Probatissimum quod thuris effigiem præbet, colore maximè flavū (tale enim recens est) gummosum purum, pingue, minimè lignosum, odore gravi, nec valdè humidum, nec penitus aridum, & cum accenditur clarum, flammam nutriendi: hoc Dioscorides resinā & ammoniaco, Plinius verò Sagapeno, adulterari scribit.

III. Opoponax ὀποπόναξ Diosc. lib. 3. cap. 55. ex Panacis Heraclei radice concisa colligitur. Gal. 8. simpl. radicibus & caulibus: at Mesuzo. et ferulaceo panace: nonnullis ex Chironio. Opoponacis Plinius lib. 20. cap. 24. in Theriaca meminit.

Opoponax sive Opoponacum, Cord. hist. Lugd. Opoponax, Cæf.

Probat amarissimum, intus candidum ac subflavum, foris ad auri colorem inclinans, læve, pingue, Galbani instar lentescens, friabile, graveolens, & dum resolvitur propius ad lacteum liquorem accedens.

IV. Sagapenum: σαγαπένην Dioscoridi lib. 3. cap. 95. ferulacæ herbæ liquor, quæ in Media nascitur: Gal. 8. simpl. ex planta ferulæ (panacalis dicit Clusius) atsimili. Sanè ipsa planta Sagapenum dicitur, at liquor abusive hoc nomen obtinuit: rectius Sagapeni succus diceretur. Plin. 20. cap. 18. Sagapenum, Hammoniaci lacrymæ simile. Sagapenum othincinis Serapinum, Matth. Cord. hist.

Sagapenum, Cæf.

Probat quod sincerum, pellucidum, foris rufiss, intus cum frangitur flavis aut candidioribus guttis compactum, inter digitos lentescens, medio inter Silphium & Galbanum odore, acrisque gustu: & ut Ala fetida resolvitur.

V. Meconium, μεκόνιον Diosc. lib. 4. capite 65. succus est, ex papaveris nigri foliis & vâculis tuis expressus & exsiccatum, quem privativè Græci μεκόνιον vocant, sed liquore vinibus multo imbecillior est: propter aqueam & inordinatam substantiam. Eidem 1.6. c. 17. Μάκονος ita dicitur. Plinio lib. 23. cap. 1. Meconium: hactenus lib. 20. cap. 19. Mecon tithymali species fuit & lib. 27. cap. 12. meconion aphrodes, peplos est Meconium, Lugd.

VI. Opium, ὀπὸν ἢ μύκωνος Diosc. 1.4. c. 66. est liquor lacteus qui ex papaveris nigri scapo leviter inciso colligitur: ubi colligendi modū docet.

Opium



Opium, Matth. Cæs. Lugd.

Opium nigri papaveris liquor, Cord. hist.

Opium, Osum Mauritanis, Garz. Frag. vide Aco-  
stam.

Amfion sive Opium, Linscot. par. 4. Ind. or. c. 34.

Opium triplex est: album quod à Cairo adre-  
tur, quod forte Thebaicum: alterum nigrum &  
durum, ex Aden: tertium flavescens magis ac mol-  
lius ex Cambaja & Decan, Garz. Linc. l. c. at Fra-  
gulus, albicantis & nigri tantum meminit.

Ex Papavere nigro elicetur, Plin. l. 20. c. 18. &  
Avicenna: at apud Turcas, ex papavere albo, qui  
totos agros, ut nos tritico continent, cum apud  
eos & Persas in quotidiano usu sit, ad drachmæ  
unius pondus: ejus enim usu se animosiores fieri  
credunt, neque belli pericula reformidare, Bello-  
nio scribente: & ut Linscotus l. c. qui semel, sed  
sensim, assuevit, nisi indies iteret, brevi tabidus  
moricur: & si per dies quatuor aut quinque inter-  
mittat moritur. Paludanus in Linscot. scribit,  
Turcis privato nomine Maslac vocari, & ab ipsis  
indies pisi magnitudine devorari.

Probatum candidum, vel leoninorum pilorum  
modo flavescens, in massam veluti ex granulis di-  
versi coloris coactum, grave, densum, solidum, si-  
ne sordibus existens, amarum, gustu calidum, in-  
odore gravi & viroso, somnum inducens & ina-  
qua promptè liquecens, Bellonio & Paludano  
monentibus: & hoc in Asia minore in placen-  
tulas, unciarum quatuor, vel sēlibræ pondo, cogi-  
tur. Quis ergo nostrum adulteratum esse non  
animadvertit? Attamen ex eo quod adfertur, eli-  
gendum, purum, colore maximè rufum aut spa-  
diceum, cum frangitur, splendore quodam nitens  
& quod faciliè dissolvitur, sed non ceræ instar len-  
tescens.

VII. Ἀλοῦ. Aloë & de herba & ejus succo  
denotato dicitur: ex Aloë, Diosc. l. 3. c. 25. (ὁ πρῶτος)  
succus coactus ex India adfertur.

Genera duo (ἡ χολιδία) succi: alterum a-  
renosius, quod veluti fæx & crassamentum puris-  
simæ esse creditur: alterum (ἡ πρῶτη) ad jecoris  
imaginem vergit, Dioscor. l. c. Recentioribus il-  
lam Caballinam, quod equis & veterinariis me-  
dicandis dicata sit: hanc Hepaticam, quod Hepa-  
tis modo coacta sit, nominant: quam etiam non-  
nulli Succotrinam, quasi succo citrina, quod ejus  
pulvis citrinus sit. Vel potius Socotrina (ut  
Linsc. par. 2. Ind. or. 6. & par. 4. c. 38.) à solo natali

Socotra insula, quæ aliis omnibus præstat, solida  
atque compacta. Sunt tamen qui has differentias  
faciant, succotrinam, subcitrinam & optimam:  
alteram Hepaticam, nigriorem synceram tamen:  
tertiam Caballinam, lividam, arenosam.

Aloë, Matth. Cord. hist. Lugdun. Aloë ex India,  
Cæs. l. p.

Eligenda pinguis, nitida, calculorū expers, sub-  
flava, hyeme friabilis, æstate molliuscula, hepatis  
modo coacta, faciliè humescens, eximieq; amara:  
nigra contrā, fractuq; contumax, improbanda: la-  
vanda quin etiam & quod arenosum subsistit ab-  
jiciendum, pinguisimum & quod leve est reci-  
piendum: hæc Diosc. l. c. Apulam & Hispanicam  
succo faciendo inutilem Cordus scribit: at quo-  
modo tam Hepatica, quàm Socotera dicta, ex no-  
stra Aloë elici possit, eleganter Doctis. Fabius Co-  
lumna in sua plant. *αλοῦ* ostendit.

#### IX. Succus Aloë facie.

Iraituch & Aiawe succus primus ex America,  
Muscæ foliis involutus, Clus. ex l. 4. c. 7.

IX. Scammonium *σκαμμωνία*. Scammonææ  
plantæ succus, qui ex radice lactei succi plena in-  
ciat & exsiccata reservatur: cujus modum Dio-  
scorides l. 4. c. 171. docuit.

Scammonium, Plin. l. 26. c. 8. vocat: quem tantum  
utui esse, Theophrastus 9. hist. 12. scribit.

Scammoniam Matth. Cord. hist. Cæs. Lugd.

Scammonæa officinis ad Arabum imitationem  
hic succus dicitur, qui densatus in massas cogitur,  
& exticcatus succus, aut lividus, aut cinericens, aut  
sulvus redditur.

Differentiæ hujus ratione loci apud Diosc. &  
Plinium: ille, cum qui ex Mysia regione Asia de-  
portatur, cōmendat: natione autem Syriacum &  
Judaicum deterrimum haberi, ervi farina & Ti-  
thymalo adulteratum. At Plinio laudatur Colo-  
phonium, Mylium, Priennense: adulterinum ve-  
rò fieri ervi farina & Tithymali marini succo, in  
Judæa ferè, quod deprehendatur gustu, cum Ti-  
thymalus linguam excalefaciat, &c. Quod verò  
Scammonium nostrum, notas à Dioscoride tri-  
butas non habeat, causā putatur, quod hoc tempo-  
re veterem parandi modum non obierint, ac nō  
ex radice inciat, ut Dioscorides docuit, sed prius  
dissecta, vel expressa, aut è stipitibus & foliis  
contulis paretur: alioqui tanta Scammonii copia  
quotannis vix afferri posset, vel etiam lacte Ti-  
thymali adulteratum.

Opti-

Optimum est quod ex Antiochia deferitur, dein Armenum, Europæum omnino prævum est. Probat quod pellucidum, læve, rarum, spongæ instar foraminosum, colore cum frangitur fulvum, taurini glutinis modo translucens: nec vehementer linguam excalescens (quod admisti Tithymalli argumentum est) & cum linguæ affricatur, in candidissimum liquorem lacti similem se superficie resolvens: cito liquefscens, friabile, non valde ponderosum, nec tetri odoris. At glebæ ingentes nigræ & graves, aut adulteratæ sunt, aut succus est ex tota planta expressus.

Hujus vehementia corrigitur à quibusdā Aloë addita; sed rectius, si Malo cydonio excavato indatur, pasta circumdetur, & in clibano coquatur, dein contundatur, ut veteres fecere: aut ut alii, in succo Cydonio coquatur: melius verò si semina fœniculi, anisi, dauci adderentur. Sic correctum Diacrydium, quasi lacrymula dicitur, in officinis Diagredium, quod nimis recens, vehemens: antiquum imbecillum, quare tormina excitans: binum optimum est.

X. Elaterium, *ἑλατήριον* Dioscoridi l. 4. c. 155. & Theophrasto 9. hist. 10. dicitur (Gaza agitatorium vertit, fortè quia motu turbatorio corpus exagitat) Elaterium Plinio l. 20. c. 1.

Hoc Dioscorides ex succo fructus, addito extrahendi modo, Theophrastus ex semine (fructum intelligens) liquato: Plinius ex succo è semine expresso fieri scribit. Hoc à bimatu ad decennium colore candido utile, Dioscoridi: Ægineta, quod anno antiquius non est, & quod virefcit probat. Theophrasto, omnium medicamentorum diuturnissimum, & optimum quod vetustissimum: hinc Plinius ex Theophrasto 9. hist. 14. ducentis annis servatum meminit. Hoc Hippocrates usus fuit, nunc verò ob ejus vehementiam, non facile usurpatur.

Elaterium quod leve & candidum & igne instar pinguedinis accenditur, Bellon.

Elaterium, Math. Bellon. Cæf. Lugd.

Plinius l. 20. c. 1. meminit Cucumeris syl. in Arabia nati, heliotropio simili, semine nujis juglandis, quod semine & Elaterio contra serpentes efficacissimum sit: hoc necdum novimus.

XI. Euphorbium, *ἐφωρίον* succus est acerrimus, arboris ferulæ speciem gerentis, Diosc. l. 3. cap. 96. qui & colligendi modum docet, ut supra l. 10. scæ. 6. ostendimus: At Dodonæo non arbor,

sed herba potius est, cujus foliis incisus liquor acerrimus, facileq; concrefscens effluit: verum atre arborefcere videtur.

Euphorbium Plinio.

Euphorbium, Math. Cæf. Lugd. euphorbiæ nominatæ plantæ liquor, Cord. hist.

Genera duo sunt: unum Sarcocollæ modo pellucidum, flavû, pisi magnitudine in guttas & quales densatum, modicè cavernosum: alterum inutriculis quibus excipitur, in massam densatur, candicans, aut vitri colore: adulteratur Sarcocollæ, aut gummi & tithymali liquoris admixtione. Eligendum est purû, translucens, candidû aut flavum & acre, quod levi linguæ contactu os accennum diu detinet: quare etiam non sine molestia tunditur, nisi naribus diligenter obturatis & munitis.

XII. Succus liquiritiæ: ex radicibus succus exprimitur, & in pastillos codèfatur ex Cappadocia, Hispania, etiâ Bambergæ ubi frequè se est adferitur.

XIII. Succus Acaciæ: ex Acacia in Ægypto (*ἰγγύρισμα*) succus exprimitur, qui in umbra licatus, ex maturo quidem fructu niger, ex immatura subfulvus redditur: aliqui tamen è foliis una cum ipso fructu exprimunt. Eligendus modicè fulvus & odoratus: hæc Dioscorides l. 1. c. 133. Acacia legitima, Math. Lugd.

XIV. Acacia Germanica: ex prunis sylvestribus coctis succus exprimitur, inolat & efficcatur, & tessulatim divisus, Acaciæ veræ loco asservatur.

Succus è syl. prunis, Acaciæ succedaneum, Math. Acacia Germanica, Dod.

De Manna.

I. Manna.

*μαννὰν* & *αἰθήματα*, Galeno.

Melleus humor in Robore, Theophrasto.

Mel ex aëre, cui cœlestis natura, Plinio.

Men, Siracost & Terniabin, Arabibus.

Thereniabin & Trungibin, Serapioni & Avicennæ.

Manna purgatoria, Math.

Drosomeli, Cord. hist.

Manna & mel rosicidum, Cæf.

Manna, Persis Xercast, sive Xerkeit, id est Lacatiboreum, Linscot. p. 4. Ind. or. 29.

Est autem Manna sive Mel aëreum vapor terræ succolus & optimus, æstatis calore elevatus & in aëre in dulcem liquorem excoctus, noctis frigore coactus, & roris modo supra arborû & fruticum folia decedens.

II. Man

## II. Manna liquida.

Cedrii mel Hippocrati, Ros Libani Græcis, Bell.

Terniabin Arabibus & Turcis, Eid.

Manna mellis instar liquida, Linscot.

an Manna Germanica liquida flava, cui Syrupus foliis infidens, liquidum permanens, dum ab apipus auferatur, Cord. hist.

Hæc in monte Sinai colligitur, & instar mellis in fidilibus Cairum venalis defertur.

## III. Manna officinarum.

Manna nostra laricea, Rauwolf.

Manna durior & concreta, quæ Mannæ nomine Cairi in officinis reperitur.

Hæc cōmuniter Calabrica nominatur, quia in Calabria circa Canis ortum ex Fraxino & Orno, ab incolis in usum medicum colligitur: quæ duplex in officinis.

Granata, quod minoribus granulis constat, Masticina, quæ majoribus & mastichi guttis propæ æqualibus.

Vel Manna foliorum, quæ minutioribus micis constat, quia ex foliis colligatur: & Manna corporis, quia ex ramis arboris habetur, Cæf.

Eligenda candida, recēs, anno nō vetustior: ruffa enim & fusca, inveterata est: adulteratur saccharo penidio, herbarū foliis circumvoluto: & quæ Senne folia granis suis amplectitur, factitia est.

In Apēnino quoq; aliquādo in canicularibus promiscuē in plurib. arboribus, sed præcipuē in Quercu & Salice colligitur, nunc concreta similis Calabriensi, nunc liquidior melli similis, Cæf. alp.

## IV. Manna Persiana granis Coriandri.

Transchibil, mannæ species, quæ ex spinoso frutice, quem Arabes Agul & Alhagi vocant, colligitur, forte Manna Israelitarum, Rauwolf.

Mannæ genus aliud, Tiriam Jabyu, seu Trumgibyn dictum, quod ex floribus aliis quoq; & foliis legitur, magnitudine seminis cannabini, colore rubro: ejus in Ormo & Persia, non verò India, usus est, Linsc. par. 4. Ind. or.

Ex Syria longè candidior Italica adfertur duplex: Mastichina, quæ translucida Mastiche similis: Bōbycina, minime translucida, candore Gossipii, Matth. Cæf.

## V. Mannæ Calabrinæ similis Persica.

Mannæ tertium genus, ejus fragmenta foliis adhuc coherentia advehuntur, Linscot.

## VI. Manna Armeniaca.

Manna frustis pugni magnitudine, fusci coloris,

fortè Manna Alhagiezi Avicennæ, Rauwolf.

## Succi exotici.

## I. Succus laxativus ex flavo rufescens.

Succus undecimus qui Ghitta iamau dicitur, Clus. ex. l. 4. c. 8.

Gutta Gamandra: gummi gotta: gutta gemau: gummi Peruanum aliis: aliis succus Gambici, vel Crambici.

Cattagamma, vel genu, Burgraf. in Achille.

Hic ex Sinarum regione adfertur: & aliqui Euphorbii succum ceniēt, sed arbor tanta non est: aliis Rhamni solutivi: aliis Cataputiz succus: aliis ex Scāmonio & Tithymallo compositus, nō nulli compositum ex Chelidoniz majoris succo, Scammonia & Croco suspicantur: alii ex succo corticis mediani Frangulæ. Quid si fortè succus è floribus Ricini Indici expressus, & exsiccat, ejus in Hydropicorum serosis humoribus ducendis insignis usus.

an Gummi ad podagrā ex novi orbis continente, quo isthic podagrici se purgant, Monardi, Lugd.

## II. Succus splendens Anethi odore.

Usuc & Gyp succ<sup>o</sup> 2. ex America, Clus. ex. l. 4. c. 7.

III. Succus Aspalatho similis Anethi odore. Succus primus concretus à Gareto, Clus. ex. lib. 4. cap. 8.

IV. Succus colore albo, flavo & rufo mixtis Anethi odore.

Succus quintus à Gareto, Clus. l. c.

## V. Succus cinereus fœniculi odore.

Succus nonus, Clus. l. c.

VI. Succus aspalatho similis ater micis albis aspersis odore.

Succus tertius à Gareto, Clus. l. c.

## VII. Succus aspalatho similis inodorus.

Succus ater à Gareto, Clus. l. c.

## IX. Succus atrorubescens inodorus.

Succus decimus, an Bixa Oviedi, Clus. l. c.

IX. Succus flavus albis granis cōmixtis, gravi odore.

Succus quartus à Gareto, Clus. l. c.

## X. Succus visco similis colore vario.

Succus circa bacillum concretus, Clus. l. c.

## XI. Succus mastichinæ resinæ non absimilis.

Succus 6. à Gareto, Clus. l. c.

## XII. Succus Succino non absimilis.

Succus septimus Anime similis, Clus. l. c.

## XIII. Succus Sanguini draconis affinis.

Succus duodecimus, Clus. l. c.

RR

XIV. Suc-

XIV. Succus camphoræ redolens ex radice  
Canellæ vulneratæ, Garz.

Canellæ liquor è viridi cortice præstetur radi-  
cum inciso, Acostæ.

## DE GUMMI.

**G**ummi (*ῥαῦμα* Græci) lacryma est, in truncis arborum ipsum producentium coagulata & concreta, Galeno 7. simplic. cuius substantia magis aquea est, ut Resina oleaginosa: quare Gummi aqueis facile, oleaginis difficiliter miscetur: contra Resina, quæ etiam flammam facile concipit, cum Gummi in igne crepiter, et scilicet stillando procedat, ubi tamen aerem contigerit, coagulatur & aque simile est, ut Aristotelis 2. de plantis, verbi gratia: quare id pruni ardentibus injectum, fragorem edit. Verum, ut idem Aristot. quædam quomodo comita & lapide coagulatur, alia molliscula: quædam pellucida, aurco colore flavescens, alia obscura, pallidiora. Nunc ad specialia.

I. Gummi Arabicum: à Serapione sic dictum, quia ab Arabia regione Ægypto contermina importabatur.

*Ῥάμμα ὁ ἀπὸ τῆς Ἀραβίας*, Diosc. l. 1. c. 133.

Commi ex spina Ægyptiaca, Theoph. 4. hist. 3.

Gummi ex Ægypti spina, Plinio l. 13. c. 11.

Gummi Acanthinum, Celsus, l. 5. c. 1.

Gummi Thebaicum, Galeno, nonnullis Babylonum, quod Gummi est à Græcis simpliciter sic dictum, Matth.

Gummi Acaciæ, diversum ab Arabico vulgaris usus.

Gummi Arabicum & Acaciæ gummi, Bellon.

Gummi quod Arabicum cognominatur, Cord. hist.

Gummi Arabicum, Lugd.

Probat. r. Dioscoridis vermiculatum, vitri modum pellucidum, ligni expers: proximum est candidum: at resinosum ac sordidum inutile est.

II. Gummi tragacanthum: quod ex radice plantæ spinosæ ejusdem nominis vulneratæ effluit, Dioscor. lib. 3. cap. 13. qui *δρακον* vocat, quamvis Theoph. 9. hist. 8. sponte profluere asserat.

*Τραγάκη* Galen. 8. simpl.

Tragacantha lacryma, Matth. Lugd.

Dragacanthum officinarum.

Gummi Tragacanthæ, Bellonio.

Tragacanthum, Cord. hist.

Probat Dioscorides pellucens, læve, gracile, purum ac subdulce: Vel eligito candidissimum, purum, æqualiter translucens, & cuius minima portio, maximam aquæ copiam coagulet: & hoc non nisi pilis & pistillo calidis lævigatur.

### III. Sarcocolla.

*Σαρκοκollή* (*δρακον*) lacryma arboris in Perside nascentis thuri tenui similis, subfulva, gustu amariuscula, quod *ῥάμμα* admixtione adulteratur, Diosc. l. 3. c. 99. Sic Galeno 8. simplic. lacryma arboris Persicæ. Plinio l. 13. c. 10. fit & ex Sarcocolla, ita vocatur arbor, gummi utilissimum, simile

pollini thuris, & ideo cædidum quam rustum melius: & l. 24. c. 14. sunt qui Sarcocollam sping lacrymam putant, pollini thuris similem, cum quædam acrimonia dulcem.

Sarcocolla, Matth. Lac. Cord. in Diosc. & hist. Cel.

### IV. Gummi Hederæ.

*Κρόκος δακρυον*, Dioscor. l. 2. c. 210. Galen. 7. simplic.

Lacryma hederæ, Plinio l. 24. c. 10.

E' majore Hederæ trunco vulnerato, & interdum sponte lacryma quædam, & gummeus succus exit, ex flavo rubescens, odore gravis, sapore acer.

### V. Cancamum.

*Κάλαμπος*, lacryma est Arabicæ arboris (folia Myrti habentis, Amato) myrrham quadammodo referens, virosi gustus, quæ tanquam thymiamate, id est suffimento utuntur, Dioscor. lib. 1. cap. 2. Et ut Plin. l. 12. c. 20. ex confinio Casis, cinamomum & Cancamum ac Tarum invehitur. Verum illud Anime, hoc Agallochum syl. Dalechampsius in Plinium, credit.

Cancamum Dioscoridis, Laccam dicunt Serapio, Ægineta, Matthiolus: at Brassavolas, Garzias, Clusius, res diversas faciunt: aliqui non modo diversum, sed & incognitum putant: quidam Cancamum Dioscoridis, Benjui esse volunt. Anijmum, Amato.

Anime (quod ex Æthiopia Arabiæ finibus Lusitaniam advehitur) Monard. Frag. & p. 9. Ind. occid. l. 4. c. 29.

Anime vulgo, quasi Aminea Myrrha, Cæl.

Anime triplex habetur: 1. fulvescit & pellucidum est: 2. nigricat & taurino glutini sive Colophonis fere simile, vel Myrrhæ, quam & Minzam, à terra ubi præcipue nascitur, Dioscorides appellat.

Aminea Serapioni, unde Lusitanis corrupte pro Aminea vel Aminea, Anijmum & Hermolao

Myrrhæ

Myrrha Aminea: 3. pallidum & retorridum, Clus. & Lugd.

Sic alia ex Hispania nova sive America, quæ Monardi Orientalis: alia candidior orientali, de qua Garzias & Cancamum Græcorum esse vult: licet aliqui Succini speciem suspicentur.

#### VI. Lacca officinarum.

Lac legitimum nomen, sic dicitur, quod hoc medicamentum, cum ejus usus est, in Lac sive mellis crassiciem dissolvatur: & ubi præstantissimum nascitur Trec nominatur.

Myrrha similis Avicenna.

Chermes Arabum quorundam.

Formicarum alatarum stercus, Amato.

Formicæ enim hanc Laccam elaborant, materiam ex arbore exsurgentes (unde plerumque formicarum alæ permixtæ conspiciuntur) & hos ramulos arbore avulsos in umbra siccant, Garzia monente. Fortè relictius dixerimus, lacrymarum & reliquorum Gummi modo, sponte exudasse & concrevisse. Verum & in arbore Benisera reperitur. Cancamum, officinarum Lacca, Matth. Cord. in Diosc. & hist.

Lacca Arabum & officinarum, an Cancamum Dioscoridis, Lob.

Lacca, Garz. Acosta, Frag. Clus. Lugd. (qui Cancamum esse negat) Tab.

Gummi Lacca, legitimum est Cancamum, Cæs. Lacca à Malaijs Cajulacca dicta, ex qua ceram Hispaniam conficiunt, Linscot. par. 4. Ind. or. c. 24. & fig. 18.

Duplex habetur: ea quæ cum bacillis, vix enim sine iis adfertur, quam Laccam Sumetri vocant, quia ex Sumetra insula, id est Taprobana habetur: ut eam quæ in glebis sine sulculis affertur, Laccam Comberti nominant: & altera fascitia, qua insectores utuntur, quæ & suas differentias habet.

#### VII. Sanguis draconis officinarum.

Κινναβάρη, Diosc. l. 5. c. 109.

Cinnabari seu sanguis draconis, Cord. hist.

Sanguis draconis, Matth. Cadamusto, Theveto, Monardi, Cæs.

Sanguis draconis verum est Cinnabarum Diosc. Cæs. Cæs.

Est arboris exoticæ lacryma, nam statim anni tempore arbores ferro sauciuntur, quæ anno sequenti gummi emittunt, quod coctum & decoctum hoc gummi efficit: in Africa, in parva quadam

insula Atlantici Oceani propè Mederam: nunc laudatissima ex Carthagine Peruana adfertur. Arborem hanc primus Clusius, arboris Draconis nomine exhibuit. At Acosta, in India arbor Ber, sive Malus Indica dicta, æstate alatis formicis perpetuè onusta conspicitur, quæ in ejus ramis Laccam elaborant.

Cinnabarim Dioscoridis, Solinus & alii censent, (at Clusius subdubitat) fortè quia Diosc. l. c. scribit, Cinnabarim altè & abundè coloratam esse, & eam ob causam quoddam *αἷμα λεγόμενον* appellasse.

Duplex habetur, nativum & quoddam factitium, panibus coactum, ex rubrica & pice colophoniam, quo potissimum veterinarii utuntur, Cæs. Frag.

#### IX. Asa foetida.

Asam aliqui duplicem faciunt, aliam dulcem sive odoratam, aliam foetidam: hanc Altit Arabum: illam Belzoinum officinarum esse, & utrumque è Laferpitio profluere volunt. Hic de Asa foetida, quæ gummi est Laferis sive Laferpitii plantæ ferulaceæ, quæ *σάπυς* Dioscoridi l. 3. c. 94. dicitur, ex cujus radice atque caulibus incisis (*σάπυς*) liquor hic colligitur.

Altit, Avicennæ: Anjuden, Indis.

Asa, officinis, sed relictius Asa, quasi Lesar, fortè voce ex Lafer corrupta.

Asa foetida, laferpitii species, Cord. histor. Lugd.

Succus Lybicus, interdu Medicus & Syriacus, alias Cyrenaicus, à loco natali vocatur.

Duplex Theophr. 6. hist. 3. alter ex caule, quem *καυλίαν* Scaparium: alter ex radice, quem *ρίζαν*, radiceum vocabant: & Plinio lib. 19. cap. 3. duo sunt nomina, Rhizias, atque Caulias vilior illo: & lib. 22. cap. 23. Silphium venit primo è Cyrenis: nunc ex Syria importatur, deterior Parthico, sed Medico melior, extincto omni Cyrenaico, &c. In officinis sæpe duplex: una pura & translucens: altera impura & turbida, cui Sagapenum (quo adulterari Diosc. scribit) cujus odorem refert, permiscetur, unde Germani Diaboli stercus nominant: utraque tamen gravis odoris est. Cuius si usus esse debeat ad medicamenta liquida, aqua aut aceto, aut vino injectum supra prunas resolvenda, & quod in fundo manet rejiciendum: vel per colum cui adhærebit, transmittendum.

## IX. Gummi ex Molle sceniculi odore.

Gummi album ex cortice arboris Molle, Lugd.  
an Succus octavus, Clus. ex l. 4.

X. Gummi caryophyllorum, similis facultatis  
cum resina Terebinthina, Garz. Frag.

Gummi ex auro rufescens, inter Caryophylla in-  
terdum reperitur, Clus. in Garz.

XI. Camphora officinarum.

Capur & Catur Arabum, Garz.

Camphora ex genere bituminis, Cels.

Caphura, Matth. Castor. (qui arborem adpingit)  
Lugd.

Camphora, vulgo Alcanfor, Frag.

Est gummi-resina pellucida, candida, ex rimis  
arboris peregrinae, juglandi nuci simili, foliis sali-  
gnae similibus, Garzia: Dioicoridi & Graecis ve-  
teribus incognita: è recentioribus Aëtio & Sethi  
cognita.

Insula Borneo, arboribus camphoriferis refertis-  
sima est, nec preciosior in Oriente camphura ha-  
betur, Linc. op. par. 2. Ind. or. c. 24.

Differentiae duae: 1. Caphura de Burneo, quae ra-  
rè adfertur, & omnium nobilissima: (par. 9. Ind.  
occid. additam) altera ex Sina in Europam adfer-  
tur, Garz. Acofta, in panes orbiculares coacta: Et  
Arabes genera quatuor constituunt, in caput, pe-  
dus, crura & pedes dividentes, Garzia & Frago-  
so monentibus: hicque alteram dicunt Chyneam, à  
Chyna unde advehi solet: vel Chnichen, Linc.  
par. 4. Ind. or. c. 36. Sic alia rudis est, alia elaborata:

rudis est ignem non experta: elaborata, quae folis  
aut ignis calore excocta atque purgata, album co-  
lorem contrahit, Matth.

Eligenda instar crystalli spléndens, sincera, odora.

XII. Chonidetros gummi quoddam Succino  
crudo permixtile, quod Caphura quae ex Burneo  
adfertur, saepe permiscetur, Lugd.

Gummi Chamderros vocatum, Garz. Frag.

XIII. Gummi Juniperi.

Gummi Juniperinum, Plinio l. 13. c. 11.

Sandarax Serapionum, Cord. hist. resina majoris ju-  
niperi arida, dura, flava, Mastichi similis.

Vernix Latinis & Vernilago, ab anni tempore,  
quali Veris ros.

Gummi juniperi, Sandaracha & siccas Verni.  
Matth. Juniperi lacryma, Vernix, Lugd.

Gummi est resinolum ex Junipero; sed ne qui  
vocum affinitate deceptus, Sandaracham Graeco-  
rum, quae metallicum est, & Auripigmento co-  
gnatum, & exitiolum venenum, substituat.

Ab hoc differt Vernix liquidus, qui ex prædicto  
colys sincero & oleo ex semine lini expressit.  
quo ad picturas & tabulata illustranda utuntur.  
Sandaracha verò Aristotelis (*ouda-jun*) 9. lib.  
40. & Plinii l. 11. c. 7. est apud dum operantibus  
bus, qui saepe invenitur in favori inanissimis  
positus, amari saporis vel ceruginosi mellis genus.

XIV. Gummi Ceraforum, Matth.

XV. Gummi Ulmi, vide in noxis nodis in  
Matth.

## DE RESINIS.

**R**esina primum lacryma seu liquor est pinguis ac oleaginosus, ex arbore sepius sponte, interdum et vulnera-  
fluens: qui sponte defluit autis in & ex resina dicitur. Est autem ratione consistens duplex: bi-  
quida quae Graecis *oxye*, h. e. humida seu fluxilis, ut Terebinthina: altera durior & sicciore, quam *oxye*, h. e.  
pictam seu tosam nominant, ut Colophonia recentiorum.

## Resina humida.

I. Terebinthina vera.

Terpinthina, Dioscoridi.

Gluten Albotin, Avicennae.

Terebinthina vera ex Cypro adfertur, Lugd.

Terebinthina resina, Matth. Cord. hist.

Est liquor pinguis ex Terebinthi trunco & ra-  
mis defluens, quae omnes resinas antecellit, Dio-  
scoridis l. 1. c. 91. testimonio: quae pro ratione loci  
magis commendatur, ut prima sit Chia, dein Ly-  
bica tum Pontica tandem Cypria, Syriaca, Judai-  
ca, Arabica. Haec liquida deflillat, dein paulatim  
arefcit & saepe cum Thure adfertur, & in templis

cum eo suffimigatur, & inepte Incensum ipsum  
verò Thus, Olibanum appellant.

Probatum alba, pellucida & vitreo colore & in  
extruleum vergente odorata & acris.

Et ut Diosc. l. 1. c. 91. & 92. resinas omnes antecel-  
lit Terebinthina, proxima hinc lentissima: dein  
pineae & abiegnae: post haec picea & Arabica.  
Verum Terebinthina Veneta, ex novella Abietibus  
colligitur.

II. Resina laricea.

*Adexa* & *prunax* ex Dioscoridi.

Resina larigna, Matth. Cord. hist.

Terebinthina officinarum Germaniae.

Haec

Hæc ut Galenus 2. compos. med. secundum genera, 4. scribit, pro prima sæpe venditur (etiam nunc, non solum illius locum, sed etiam cognomen tum sibi vendicat, Matth. & Lugd. quoq; monumentibus) quæ illa humidior & acrior est.

Optima quæ purissima, odoratissima, aliquantum translucida, & quæ ab intincto digito contumaciter & æqualiter diffiuit.

III. Resina lentiscina sive Mastiche: & Matth. Gluten Romanum Arabibus. (Lugd.

Masticha sive Mastiche, hodie Mastix, Cord. hist.

*ῥητινὴ λευκή* Dioscor. l. 1. c. 90. (resina lentiscina Plinio) cui & *μαστίνη*: ex lentisco effluit, & inter Gummi-resinas proponenda videtur. Et cap. 92.

Terebinthinæ proportionem respondere scribit.

Galenus verò 3. comp. med. l. gen. 6. Terebinthinæ præfert. Idem 2. ad Glauc. Ægyptiæ masti-

cis meminit: nunc solos lentiscos in Chia, non autem in Gallia nec Italia (vel saltem exigua) li-

cet similes sint, mastichen proferre, Bellonius asserit.

Mastice etiam in Brasiliæ dumetis nascitur, L-

erio, Ind. occid. par. 3. c. 12.

Probatior candida, splendens, odorata, & friabi-

lis: quæ in Chio nata: deterior virescens & nigra bitumini similis Ægyptiæ, aut Pontica. Hæc thur-

æ & resina mista adulteratur.

Duplex est: propriè & impropriè dicta: propriè

quæ ex lentisco effluit: quæ vel alba, vel viridis

Diosc. vel ut Galenus, alia alba quæ Chia: alia

nigra, Ægyptiæ: habetur & Cretensis, quæ flava:

est & amara. Impropriè dicta est ea quæ ex spino-

sa planta emanat, Theoph. 6. hist. 4. vel ut Plinius,

ex humili spina quæ Chamæleon est Dioscori-

dis: hæc est Acanthice mastice Theoph. Gaza

spinalem vertit.

IV. Thus sive Olibanum officinarum.

*λίβανος* Diosc. l. 1. cap. 81. sic dictum quibusdam,

quod è monte Libano deferatur: vel potius à *λί-*

*βαν* stillo: Thus verò, à *θύω* sacrificio.

Thus, Matth. Cord. hist. Cæf. Lugd.

Lovan Arabibus } Garziæ & Linc. par. 4. Ind.

Conder Avicennæ } or. cap. 28.

Liquor est arboris Thuriferæ, quæ in Arabia thu-

rifiera cognominata, provenit Diosc.

Primas tenet masculinum *σπυρίον*, natura rotun-

dum, candidum: at Indicum subsulvum, & arte

rotundum factum, quod *ῥητις* aut *ῥητις* II. *δ-*

*στέλιος ὀρεινός* orobium, quod in Amelo nascitur,

quod *καριόκων* vocant, minus est & fulvius. III. *ἀ-*

*μαρμύριον* cognominatum, quod candidum & dum

mollitur, mastiches more digitos cedit, Diosc. l. c.

Ex his colligitur veteres aliud Arabicum, aliud In-

dicum fecisse, cum tamen in India non nasci Gar-

ziæ affirmet.

Et nunc plures species habentur, etiam Cordo in

sua historia monente, colore & magnitudine gra-

norum tantum differentes: 1. est Indicum dictum,

quod maximis & inæqualibus glebis constat, livi-

dum nigricansq; candicantibus aut flavis macu-

lis varium. 2. mammosum, oblongis grumis mā-

marum forma compositum. 3. malculum, parvis,

rotundis, candicantibus aut flavis grumis, interdū

singulis, interdum geminis velut testiculis con-

stans. 4. Orobæum, minimis grumulis, ervo æ-

qualibus, odore masculo simile.

At hujus pollen & farina ex crebra in faccis con-

cusione, Manna dicitur: nonnunquam & cortex

adhærens adfertur.

At Theveto aliud candicans, nitidum, quod æ-

stare: aliud rubescens & vilis, quod vere colligitur:

Est ut Garziæ, Frag. & Lugd. quæ ex monta-

nis fluit, laudatissima Melax, nobis mascula dici-

tur: quæ ex iis quæ in planis, nigrum improbum,

& cum aliarum arborum resinis permixtum, quæ

naves, ut nos pice oblinunt.

V. Resina Cupressi.

*Κυπαρισσίνη* πετρίνη, est cupresso etiam resina liquida

fluit, Diosc. l. c. 92. Matth. Lugd.

VI. Resina Cedri sive Cedria.

*κεδρία* Diosc. l. c. 105.

Cedrus dat picem quæ Cedria vocat. Plin. l. 24. c. 5.

Cedria sive Resina ex Cedro, Matth. Lugd.

VII. Myrrha.

*Σμύρνα* Diosc. Theoph. Gal. 8. simpl.

Bola Indis, Garziæ & Linc. or. p. 4. Ind. or. c. 28.

Myrrha, Matth. Cord. in Diosc. qui in hist. quinque

dicet genera, & sextum adulterinum.

Myrrha, Theveto, Garz. Frag. Cæf. Lugd.

Myrrha & Opocalpsum, lacryma est ex unius

arboris truncato manans, Guil. the.

Myrrha suo furculo spinoso hærens, Ad. Lugd.

Lacryma est (sive gummeus succus concretus)

arboris nascentis in Arabia, Ægyptiæ spinæ si-

milis, quæ incisa in substratas lacrymas destillat, pars

verò circa caudicem concrevit, Diosc. l. c. 77. quæ

& Theoph. 9. hist. 4. habet & scribit, Arborem es-

se minorem Thuris arbore & fruticosiorem, cau-

dice duro, contorto, cortice lævi: aliis, Thuris folium laurinum & læve: Myrrhæ aculeatum non læve, Ulmeo simile, crispum extremo spina horridulum, lignei modo, &c. Alii, terebintho: Diodorus, lentisco æquat.

Myrrhæ arborem ipinosam, foliis Acaciæ, se vidisse testatur Bellonius.

Differentiæ: alia *πυρρα*, id est, campestris, quæ expressâ *σαλὴ* excipitur: Nam Staße (quæ quibuldam Styra liquida) ut habetur apud Dioscor. l. i. c. 73. pinguitudo est recentis myrrhæ cum aqua pauca contusæ & organo expressæ, & ex qua unguentum factum.

Staßen nominatur: & Cord. hist. Staße liquor ex Myrrhâ. Aliis tamen Staße stillatitius ros est, qui ante corticem ferro solutum, sponte & sine plaga, sed veluti cutis poris hiantibus, quasi saliva quædam exudat. Alia *σαλὴ*: primas tenet *πυρρα*, *πυρρα*, a loco natali denominata, quæ subviridis, pellicula ac mordax: 2. tenuis, bdellii modo lætescens: 3. *χρυσά*, nigra, & retorrída: 4. demum *πυρρα* dicta, quæ aspectu gummi refert. Improbatur etiam quæ *ἀμύρρα* nominatur: adulteratur gummi, Diosc. l. c. Hanc esse Anijmum nigram Lusitanorum, Amatus vult. Ex Arabia & regione Alexim, quæ Æthiopia est, adfertur, Garzia auctore. Myrrha animinea. Dioscoridi.

Anime occidentale, Hermolao, Lugd.

Anijmum nigrum Lusitanorum, Amato.

Adversariorum auctores fulvam, albescentem & viridem se vidisse testantur.

Eligenda friabilis, levis, undiquaque concolor, quæ contracta intrinsecus lineas candidas intercurrentes habet, unguis speciem præ se ferentes ac læves, quæ minutis glebis, amara, odorata, & acris: at ponderosa & quæ piceæ coloris, inutilis est.

Myrrhæ Bœoticæ etiam Diosc. l. i. c. 78. & Galeus meminere, quæ ex arbore quadam in Bœotia nascente, è radice incisa stillat.

IX. Styra (sive Storax officinarum) quia striatim ex arbore extillat.

*Στυράξ* lacryma est arboris malo cotoneo similis, Diosc. l. i. c. 79. & Plin. l. 12. c. 25. sive succus est gummeus resinosisq; Syriacæ cuiusdam arboris cœcretus, nullus enim liquidus & fluxilis est, nam lacryma quæ extillat, mox in glebam densam, pinguem & resinosa, aliquot granis albicantē, luvissimè fragrantem, concrevit.

Seplasiæ, Arabes secutæ, in liquidum & sicum distinguunt: liquidus est Myrrha Staße: sicus Storax calamita officinarum.

Styraz, Matth. Cord. hist. Lugd.

De hac Plinius l. i. c. 25. lacrymæ ex austro jucundiores, intus similitudo harūdinis, succo pingnans: huc circa canis ortum advolant pennati vermiculi erodentes: ob id in scobe sordescit.

Dicitur calamita, quod in calamis è Pamphiliæ ferebatur: nam & cætera odorata olim arundinibus recondebantur, ne expirarent & vires amitterent, quod & de Didamno Cretico Theophr. 9. hist. 16. scriptum reliquit. Dioscoridi est *σαλὴ*, *πυρρα*, *πυρρα*, *πυρρα*: addit: inveniri & lacrymam gummi similem, translucidam, myrrhæ similem, quæ per pauca. Et Plin. l. 12. c. 17. ex Syria (& albi: ex Cypro, Sydona, & Pfydia) revchom Styracem, acris odore, ejus vi foris abigentes suorum fastidium.

Præteritur flavus ac pinguis (ruffus & pinguis lentus: deterior fursurolus, & cano situ obdudus) resinosis, albicantibus grumis, qui dum mollior melleam humiditatem & odore perferantem, ex se remittit.

Adulteratur arboris scobe, quæ vermiculorum erosione facta fuerit, & hunc Styracem ideo *σαλὴ* quasi vermiculatum cognominant, quod imperiti tanquam syncerum admittunt, Dioscor. At Plinio, cedri resinâ, vel gummi, alias melle, aut amygdalis amaris adulteratur.

Ex Styrace assato fuligo quoq; colligitur: & in Syria unguentum Styacinum conficitur, Diosc.

Styraz liquidus: & Cord. hist. Lugd.

Alii ex Styra calamita, laricea resina, oleo & vino simul coctis conficiunt, & quod post menses aliquot tenuissimum & liquidum, Oleum Styacinum vocant ex decoctione quorundam fusculem in aqua fit: licet aliqui Styracem liquidam peculiari arbore à Styra discrepante, manare velint: & sic Styraçis liquidæ duæ species erunt. At Cæsalpino, qui ad nos adfertur, lariceæ resinæ est consistentiæ, cineraceus, odore altero vehementiore.

Storax rubra officinarum, est cortex de quo inter arbores.

IX. LIQUIDAMBAR, Monard Mexican. hist. Cæf. Lugd. & par. 9. Ind. occid. l. 4. c. 29. resina est liquida quæ ex India occidentali afferitur: nam incisa arbore vastæ magnitudinis, quam Amerindos vocant, foliis hederæ, cortice crasso, cinereo



nereo, quo inciso aut excavato effluit, ut ex Monardi & hist. Mexiocanae auctore, Lugdunensis refert: ex hac recenti, oleum odoratius per se stil-  
lare ajunt: exprimi quoq; ut majorem quantita-  
tem habeant, sed minus perfectum, quo chirothe-  
cas inficiunt: & cum Styracis odore sit ad Styracis  
genera referri posse, Cæsalpinus monet.

#### X. BDELLIUM.

*Bdellium* nonnullis *jud. de. 207*, alii bolchum appel-  
lant, lacryma est arboris Sarracenicae, Dioscor. l. i.  
c. 80. & Plinio l. 12. c. 9. vicina est Baëtriana in qua  
Bdellium nominatis. arbor nigra est, magnitudi-  
ne oleæ, folio roboris, fructu caprifici, naturaq;  
Aliis, ex arbore valde simili ei quæ Myrrham  
profert.

Duplex est: alterum quod probatur amarum,  
translucidum, taurino glutini simile, intus pingue  
& facile mollescens, lignorum & sordium experts.  
Alterum sordidum ac nigrum, grandioribus gle-  
bis in ossa convolutum, quod ex India adfertur,  
quod Adrobalon nuncupatur & omnium pessim-  
um est.

Defertur & jam à Petra, siccum, resinosum, sub-  
lividum, Diosc. qui Sarracenicum, quod è Saraca  
felicit Arabiæ civitate devehitur, laudat; Galenus  
verò, Scythicum; Plinius, Baëtrianum. Laudatur  
etiam quod in Media nascitur, Parthicum nomi-  
natum. Adulteratur gummi admixto Diosc. Sunt  
qui Anime, legitimum Bdellium esse putent, Cl.  
in Garz. monente.

Bdellium, Matth. Lac. Cord. hist. (qui sex species  
facit) Cæf. Frag. Lugd.

Bdellii fructum Cortusi, Clusius ad notas in Garz.  
pingit: Lugd. vide inter Palmas.

#### XI. Belzoinum officinarum.

Benzoinum, Laserpitium non est, Matth.

Benzoum, benzoi & Asiæ dulcis, Cord. hist.

Ben Judæum, Ruellio: forte nomen vicinari-  
te lapsus, Ben joy id est filium de joa, ubi pluri-  
mum nascitur nominare debuit, Garzias.

Benivi, quod neq; Græcis, neq; Arabibus, neque  
Judæis cognitum, Garz.

Belzoe vel Belzoin, vel Belzuinum vulgo, Lugd.

Belzoi vulgo, lacryma ex Oriente, Cæf. qui Myr-  
rham suspicatur.

Benevinum, Linscot, par. 4. Ind. or. c. 27.

Est Beni visera arbor vasta, foliis citri aliquan-  
tum minoribus, parte averfa candicantibus, ex cu-  
jus ramis vulneratis gummi effluit, Garz. Cujus

plura genera, præfertur Amygdaloides (hanc  
Myrrham Troglodyticam Dioscoridis, Amatus  
ceniet) quod unguis seu maculas candidas amy-  
gdalarum instar admittas habet, & in Seylan pro-  
venit: aliud genus nigrius in Samatia & Joa,  
quod vilius: 3. quoq; nigrum est, è novellis ar-  
boribus profuens, quod priore odoratius, & ab  
odore grato Benivi de Bonias, quasi de florib-  
us, vocant, Garz. Linscot, par. 4. Ind. or. c. 27.  
Quare aliud album, aliud nigrum est, Eidem  
par. 2. Ind. or. c. 22. commisceri tamen solent, ut  
unâ commodius vendantur.

XII. Copal, Monardi, Cæf. Lugd. & par. 9.  
Ind. occid. l. 4. c. 29.

Copal aut Pancopal, Frag.

Resina candida, diacitro valde transparenti haud  
dissimilis, odorata, quæ ex Hispania nova ad-  
fertur.

Genera duo facit Gomara in hist. Mexiocana:  
alterum rugosum, molle, thurisimile Xolochco-  
palli vocatum: alteri præstantius Copal cahuiel,  
quod pleriq; Myrrham existimarunt, Clus. notis  
in Monard. Lugd.

Copal & Suchi copal, altera Styracis & thuris ge-  
nera: par. 9. Ind. occid.

XIII. Resina abiegna Indica, Monard. Lu-  
gdunens.

Ex arboribus spuris, quæ neque pinus, neq;  
cupressi dici possunt, in quorum cacumine vesicu-  
læ, quibus contractis, liquor guttatim stillat,  
quo ut Balsamo utuntur: ex novi Orbis continen-  
te adfertur.

XIV. Resina è Pinu & Picea liquida quoq;  
manat, quæ ex Gallia & Hetruria convehitur:  
dein è Colophone asportabatur, hinc *καλοφονία*  
appellata, Diosc. l. i. c. 92. Sic etiam aliquando ex  
Populo profluit.

XV. Resina Carthaginensis, quæ à Carthagi-  
ne novi orbis provincia mittitur, purissima, odo-  
rata, Terebinthinâ Venetâ multo præstantior, Mo-  
nard. Lugd.

XVI. Resina Ambræ facie, Clus. ex. l. 4.  
cap. 6.

XVII. Tacamahaca, resina genus ex nova  
Hispania, odore gravi Galbanæ; Monard. Frag.  
Lugdun. & par. 9. Ind. occid. l. 4. c. 29. vide supra  
in Populo.

XIX. Caranna, Monardi, Frag. & par. 9.  
Ind. occident. l. 4. c. 29.

Caranna,

Caragna, Lugd.

Resina pinguis oleaginosa ex cōtinētis parte interiore, colore & odore; sed graviore Tacamahaca.

Duplex est: nam præter illā, alia purior ex Carthagine crystalli modo limpida adfertur, quæ Caranna purior, Monard. Lugd.

XIX. Gummi Elemi officinarum.

Improprie Gummi dicitur, cūm Resina sit, ut quæ flammam facile concipiat, & oleaginosus diluatur: Dioscoride monente, Scāmonio utrunq; simile est, sed magis flavescens, aut potius subrufa, minutis stillicidiis mammosa, nec linguam vellicans.

Resina Elemi, aliquibus Gummi elemi, Cedri lacryma videtur, Cord. hist.

Gummi elemi officinarum, seu Oleæ Æthiopice lacryma, quæ in glebas concreta adfertur, quæ gustu iners, nec palatum ferit, Lugd.

Gummi elemi Æthiopice oleæ lacryma non est, Matth.

Similem ferè lacrymam, sed pauciorē, Oleæ & oleastri fundunt.

*Resina sicca.*

I. Colophonia officinarum.

Pix est quæ præ cæteris *φύσιν* & aliquando *αγνουςιν* quali confusa, nominatur, quod ex mul-

tis simul congestis in massam iuduerit, quæ igne liquata & repurgata durior & siccior evadit. Hæc duplex est, alia veterum, Dioscor. l. i. c. 92.

*καρφηρία*, quod ex Colophone olim advehebatur, & resina erat liquida, quam Cordus ejusdem arboris censet, à qua Elemnia resina profluit, Cedrus videlicet. Altera verò est recentiorum.

Colophonia Hispanica & Græca, Matth. Lugd. Colophonia pix arida, quibuldam Pix Græca, Cord. hist.

II. Resina sicca, Græcis *ξυγι* dicta, quæ ab ignis ope cito concrescit, *quæ quæ mivivon*, quasi germinatio picæ, Galeno nuncupatur: hæc resina est confusa ex Abietina, Strobilina, & Pityina. Nam ut Diosc. l. c. ex siccis resinis alia est strobilina, alia Abiegna, alia Pineæ & Piceæ.

III. Strobilina *στροβιλίνη* Diosc. l. c. Gal. quam alii ex Pinu, alii ex Picea, alii ex Pineis nucibus, quas Strobilos vocant, profluere dicunt.

IV. Abietina *ιαννίνη* Diosc. à quibusdam malè Colophonia dicta, quæ diu liquida permanet. Lapides quoq; resinacei in India occid. circa portum Tierra de Brea, tanta copia habentur, ut omnes totius mundi naves istis implere possis: hæc admodum bona pro navibus, nec ardore Solis liquefcit, par. 8. Ind. occid.

## DE PICE.

**P**ix liquor est pinguis & resinofus, ex accensa tæda profluens. Tæda autem, etsi de arbore quog, dicitur, *βύττα* men pini arboris morbus intelligitur, ubi ea per senectutem nimiam pinguedine veluti strangulata est, quæ Tæda accensa, Pix *μαζα* effluit: hæc collatione purgata crassescit, siccior duriorq; reddita, *ξυγι* *μαζα* sicca pix, & *μαζα* *μαζα* Diosc. l. c. quasi iterata & secundo cocta pix dicitur: & Matth. Lugd.

Ex tæda, picem nigram & Cedriam confici, Belonius scribit.

Zopissa verò & Apochyma, nominatur pix à navibus maritimis derasa, Diosc. l. c.

Pix navalis, ab illa secundum aliquos distinguitur, eam significantes, quæ picandis navibus apta, & non ab iis abrasa est.

Differt autè Pix à Resina, quod hæc sponte effluerit, illa verò ignis beneficio educa, & est veluti

Resina cocta: & ea quæ primo extillat, Pix liquida officinis, Pisselæon Dioscoridi, Cedria Plinio dicitur.

Pix five Bitumen, resinæ in Siruan non procul à Moluccis, quod ex Samatra advehitur, qua picandis navibus utuntur, aliqui falsò Anime esse credunt, Garz. cap. de Lacca.

Sic Americani, ex arbore Oxyacanthæ simili, igne resinam eliciunt, qua picis loco utuntur.

## A B I E S.

**A**bies, Græcis *ιανν* Theophrasto l. i. hist. 7. procera est & longo caudice, cui cortex tunicis multiplex: l. i. hist. 9. una tantum radice eaq; nervosa constat: l. i. hist. 16. folia habet rara, eadem multisida & quasi serrata: l. i. hist. 16. flor. 6. flos Cocci colore & c. Plin. l. 16. 10. Abies è cunctis amplissima est, materies præcipua trabibus, nec Abies forma alia quam Picea.

Genoa

*Genera Theoph. 3. hist. 10. est quedam mas, quedam femina: mari folia acutiora, magis pungentia ac magis flexa, quare aspectu crispior tota arbor videtur. Materia candidior in femina, mollior operiq; faciliior & toto caudice procerior est: mari magis varia, latior, durior, medulla plenior & aspectu minus pulchra: conus maris paucos nucleos habet in priore tantum parte: femina conos nullos omnino, ut Macedones dixerunt. Plinio l.c. femina prolixior, materie mollior utiiorq; arbor rotundior, folio pinnata, densa ut imbres non transmittat, atque bilatior in totum: & l. 16. c. 24. folia inflecta pectinum modo, pungentia. Verum Theoph. 4. hist. 7. marinam habet, qua supra lapides patellarum molo adhaeret, &c. Sic in insula Virginia Abietes magnae & praeterea ad malos navium reperiuntur.*

I. Abies conis sursum spectantibus sive mas.

Abies, Dod. gal. Lac.

Abies legitima vel mas, Bellon. com.

Abies altera, Dod.

Abietes Pilati, du Choul, Lugd.

II. Abies alba sive femina.

Abies, Brunf. Trag. Matth. Cord. in Diosc. Gefn. hort. Ad. Lob. Thal. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Abies femina, Ang.

Picea, Dod. ut:

Abies Plinii & femina Theophrasti, Clus. pan. & hist.

In hac Viscum, quod Stelin Plinius l. 16. c. 44. ex Theoph. 2. cont. 23. appellat, albis baccis praeditum, Clusius obviavit.

Inter cortices abietum novellarum, quae tuberculis scatent, liquor praestantissimus, sed paucus, continetur, ita ut unumquodque tuberculum saepe aliquot duntaxat guttas contineat, qui Italici lacryma dicitur: forte apud Galenum 3. comp. medic. secundum genera, liquida Piceae resina, quam Terebinthinæ loco insitiores vendebant: & haec Abiegna lacryma sive resina liquida, in quibusdam Italici locis, Oleum Abiegnum nominatur: officinae Terebinthinam Venetam vocant. Verum ex gemmis quoque, more Populi, lacrymam fundit. Sic ex Abiete, veluti ex Pinu ac Picea resina etiam sicca & candida colligitur, quae thus ementitur, ac pro eo à vulgo usurpatur.

## T A X U S.

**T**A X U S etiam si resinam non fundat, inter resiniferas tamen, propter similitudinem quam cum foliis habet, relata est, quae in Theophrasto: quia & Nicandro: Dioscoridi l. 4. c. 80. οὐλαξ, quibusdam ὀριμαλον, Romanis τίζε arbor est similis Abieti & foliis & magnitudine. At Theoph. 3. hist. 6. perpetuo viret ex sylvestribus: 3. hist. 10. unius generis est, proceræ, autem facilius, similisq; Abieti, sed non tam alta & alii magis sinuata: folio quoque Abieti similis, sed pinguiore & molliore: quae in Arcadia crescit, ligno nigro aut puniceo constat: quae autem in Ida, flavo & Cedro simili, quare aliqui emptores decipiunt, pro Cedro vendentes &c. in Macedonia fructum abunde profert rotundum, sabâ paulo majorem, rubrum, tactu mollem, &c. si ab aliquibus hominibus manditur, suavis est & innoxius. At Matthioli apud Tridentinos perniciosum scribit: contra Pena, ejus baccas à pueris in Anglia innoxie estrari, refert. Plinio l. 16. c. 10. Similis his (scilicet Abieti & Picea) etiamnum aspectu est Taxus, minus vivens graciliusq; & tristis ac dira, nullo succo, ex omnibus sola baccifera: mas noxio fructu: lethale, quippe baccis in Hispania praeterea venenum inest, &c. Sunt qui & Taxica hinc appellata dicant venena, quae nunc Toxica dicimus, quibus sagittae tinguntur.

Taxus, Matth. Ang. Dod. ut: Gef. hor. Lac. Tur. Lon. Ad. Lob. Cz. Lugd. Cam. Thal. Portz.

Milax arbor, Cord. in Diosc. Smilax arbor, Cast.

## D R A C O A R B O R.

I. Draco arbor, Clus. hisp. & hist. Lob. Cast. Lugd. Arbor Gadenus Posidonii forte apud Strabonem. Draco, Tab. Arbuscula Dragonalis, Frag.

Fructum ferre Cerasi magnitudine, Cadamustus, Thevetus & Clusius, & ex hoc, alii scribunt: & Dragonal nomine fructum missum, Clusius

in notis ad Monardem refert. Verum Monardes scribit, si à fructu, pellis qua integritur auferatur, Dracunculi effigiem apparere (ut apud Monardem, Lugd. pingitur) à quo fructus procul dubio arbor denominata sit: Vide Fragulum. Hujus lacryma Sanguis draconis dicitur.

II. Pragrande folium, Ad. Lob. ico. an Algez similis grande folium, Cz.

Folium arboris Draconis ex Indiis delatum, Lugdun.

Folium palmæ filamentis & textura, Tab.

III. Draconi arbori affinis Americana.

Tacori in Kayua & Wiapack nascentia folia, Clus. ex. l. 2. c. 21.

Incolæ ex foliis maceratis & in tenuia staminia deductis, funes conficiunt.

## P A L M A.

**A**rbor quæ ὄνις Græci, Latinitus Palma dicitur, fructus verò δακτύλος ὀνίχας, Græci: Latinitus Palma & Dactyli: Arabibus, Tamar: at ut Dioscorides l. 1. c. 148. ὀνίχας in Aegypto gignitur: (at in tota India non reperiri, Guiland. de pap. scribit) ex ea verò fructus in medio Autumni vigore colligitur, Arabia Myrobalano similis ac πῖμα dicitur, viridis colore, & ferens mali cydonii odorem: si verò integre maturuerit, ὀνίχας δακτύλος fiet. Et in fine seq. cap. postquam de Palmis Thebaicis egit, Aegyptiacos nucleos, ἐκ τῆς ῥοσσεύου ὀνίχας, id est ex humilibus decerpi scribit. Idem cap. 150. involucrium fructus palmarum adhuc florentiam, etiam Palmam ὀνίχας ἁπλοῦς (Palmitem Plinius) nominat: & fructus qui sub ea continentur, similiter elaten, quæ à nonnullis Plegon appellatur. Sic quod in trunci superna parte includitur, ἔχειον Theophrasto, Galeno (cui etiam xapod vert. 2. aliment.) & alii Græci dicitur: at Dioscor. ἔχειον τοῦ ὀνίχου, medulla trunci improprie dicitur. Sane Palma vitalis vis in vertice, ea contra pondus resurgit, & in ea uterque sexus maxime elucet, in cuius quoque foliis scriptitatur, ut Guiland. de pap. exposuit. Plinius l. 13. & medullam & cerebrum vocavit: Serapio verò Cessionem.

Ex Theophrasto seqq. sufficiant (quæ pleraque & Plinius l. c.) Palma cortice scabro constat, i. hist. 8. medullam omnino nullam habere videtur, i. hist. 9. quæ ad longitudinem tantum apta augeri, i. hist. 14. folia arundinacea habet, i. hist. 6. semina protinus post regnem ambientia subeunt, ut uncis & amygdala, sed cavitatem nullam habent: sed tota plena atque perfusa sunt: tamen humor quoque quidam, colorq. inest, i. hist. 18. mas floret, semina minime, sed protinus fructum promit, i. hist. 22. & quodammodo cacumine gignit, i. hist. 23. Verum 4. hist. 7. Palmam pelagiam scribit esse candidæ admodum brevi, virgus sæpe rectis, quæ subitus exeunt, &c. foliis spinarum acaniticarum, erectis tamen, nec circumflexi &c.

Genera: Theophrasto 2. hist. 8. alia fructifera, alia steriles: illarum alia matres, alia semina: sic in fructu differentia: alii nucleum habent, alii eo carent: quidam durum, nonnulli mollem: sic colore, alii candidi, alii nigri, alii flavi sunt: magnitudine, quidam rotundi, veluti mala; alii parvi, cicurum magnitudine. Et Plinio l. 13. 4. palma genera undequingenta sunt: at clarissime omnium quas Regias appellare: quia Regibus tantum Persidis servabantur, Babylone nata: plura videantur ibidem: at quas in Caryotarium genere Nicolaos, in honorem Nicolæ Peripatetici Philosophi, ab Augusto ita nominatas Athenæus voluit, barum & Aegineta meminit.

### I. Palma major.

Palma, Trag. Matth. Dodon. ut: Ang. Lac. Tur. Cord. in Diosc. Gef. hor. Ad. Lob. Cat. Cast. Acoftæ, Lugd. Cam.

Palma sive Dachel, Alpino.

Palma major, Bellon. (quæ in Aegypto celsissima) Tab.

Palma Tamara, in insula S. Thomæ, Roëlsio in epad Clus.

Palma dactylifera, Lincor. 4. par. Ind. oriental. figur. 14.

Pingunt arborem, dein fructum cum floribus & Spatha.

Spatha, Ang.

Dactyli cum palma elate, Matth.

Palma elate, Cord. in Diosc. Lugd. Tab.

Palmarum fructus, & flores & elate, Dod.

Caryotæ, Carotidæ, fructus palmæ dactyli, Cast.

Palmarum fructus sive dactyli, Lob.

Fructus dactyli in Italia, Caryotæ verò Dioscoridi & Plinio, Cast.

Palmarum excelsum sylvam, in Arabiæ deserto Rauwolfius transiit, & tres species Dactylorum observavit: 1. quales ad nos adferuntur: 2. penitus rubros: 3. flavos, primis minores sed lapidiores, qui à Serapione Hayron nominantur.

Palma cerebrum sive medullâ, ἔχειον Græci vocant, quæ vescebantur, ut etiamnum in Alexandria: quidem cruda, einaræ etenim saporem refert: solent Aegyptii rustici palmas abortivas requirere, quarum cacuminibus excisis, candidam medullam eximunt & venalem proponunt. Varia palmarem genera sunt, spinosum in Creta, differens à Cephaloni sive pumila Palma, Bellon.

### II. Palma minor.

Xapop

*Chamarops*, Theoph. 2. hist. 8.

*Chamarops*, Plinio l. 12. c. 4.

*Palma humilis*, Matth. Cæf.

*Cefigioni*, Angul.

*Palma minor*, Gef. hor. Tab.

*Chamariphes*, Dod. Ad. Lugd.

*Palmites*, Lob. Garz.

*Palma Chamarops*, Plinii, Lugd.

III. *Palma humilis exotica*.

*Chamarippe peregrina* : & ejus fortè foliū, Cluf. ex l. 4. c. 12. & 13.

I V. *Palma* fylv. in Cambaya fimilis, Garz.

V. *Palma Americana* fructu racemoso.

*Palma Yuri* dicta, Leriō in par. 3. Ind. occid.

*Palmarum* in America quatuor aut quinque genera reperiuntur: inter quæ frequentiffima ea, quæ *Ceraua*, alia quoque quam *Yri* vocant: hæc fructu est rotundo ad efigiem raceni, tanti ponderis, ut ægrè una manu subleuetur, sed nucleus tantum *Cerafi* crassitudine edulis, &c. Leriū.

VI. *Palma manicam Hippocraticam* referēs.

*Palma facciferā*, Cluf. ex l. 1. c. 2.

Ex insula maris Atlantici *facciferā* dicta, quia forma illi colo sive sacco, quale vinum aromatizantes percolare solent: in quibus nuces orbiculares durissimæ continebantur.

VII. *Palma Americana spinosa*.

*Hairi* Theveti, Lugd.

*Ayri Brasiliensis*, Leriō in desc. Brasil. sive Amer. par. 3.

*Ebenum* esse multi existimant: quia lignum ferri modo in aqua fidit, ex quo Barbari enses & sagittas, quæ ferreas loricas penetrare possunt, conficiunt: fructu est rotundo, pilæ lusoria magnitudine (cui nucleus ut nix albus, minimè tamen edulis inest, Leriō) simili facie, nomine *Kayama* Oviedus describit.

IX. *Palma vinifera* Theveti, ex qua incisâ succus effluit, qui vasīs terreis excipitur, & in quotidianam potionem, quam *Mignol* appellant, in promontorio Æthiopum (nunc promontorium Viride nominatur) reponitur: quæ suavisimi gustus, quamvis ejusdem arboris fructus, qui parvi sunt *dadyli*, acerbi sunt nec facillè edi possint. Sic ex palma *Cichorin* similis succus elicatur, Lugdun.

an *Palma* cum gradibus foliis, ut unum viro contra pluvias tegendo satis sit, quæ perterebrata & turbulo immisso vinum copiosum, gustu Hispanico

simile profundit, quod Vinum *Palmitem* Hollandi vocant: par. 3. Ind. or. fig. 2.

IX. *Palma vinifera* fructu ex arboris truncō spinoso.

*Palmitas* cujus fructus pineæ nuci similes, Lincf. par. 3. Ind. or. c. 10. & par. 4. fig. 16. & par. 5. fig. 2. num. 7.

*Palmites* arbores vinum exstillantes non secus ac arbores *Cocos*, par. 4. Ind. or.

*Palmites* arbores ramis & frondibus carètes, fructu ex stipite *Ananas* non dissimili, grana plurima instar *punicæ* alienius continente, par. 6. Ind. orient. c. 38.

X. *Arbor* fructu nuci pineæ specie.

*Melenken* Theveti in *Necumere* maris Indici insula, Lugd.

Huc referri possunt

*Palma* alia, quarum fructus *Cola* dicitur, nuci pineæ majori similis, pulpa quadruplici, intus colore rubicundo castaneæ forma continens: *Pigafet. des. regni Congiani* l. 2. c. 1.

X I. *Palma humilis* longis latisque foliis.

*Palma*, quam in Cypro crescere Theoph. 2. hist. 8. scribit, quibusdam: quod *Guiland.* in The. refutat, quia hujus fructus sapidus non sit, cum *Mulæ* longè suavisissimus sit.

*Palma* Plinio l. 12. c. 6. major alia pomō & suavitate præcellentior, quo sapientes Indorum vivunt: folium alas avium imitatur, longitudine trium cubitorum, latitudine duum &c. arbori nomen *Palma*, pomō *Ariena*.

*Musā*, *Maum* & *Amusā*, *Serapioni*, *Avicen.* Indis, *Quelli*, & *Guinensibus* *Bananas*.

*Musā*, Matth. Dod. gal. Bellon. Guil. Ad. Rauw. ol. Cæsalp. Cast. Frag. Tab. Lug. Garz. cui & *Ficus Martabanis*.

*Palma* species pumila quæ *Musas* fert, Gef. hor.

*Musā* *Serapionis*, Lob.

*Musā* sive *Ficus Indica*, *Acosta*, Lugd. ap.

*Poma* *paradyfi*, Lud. Romano, hujus enim arboris fructum *Adamum* comedisse volunt.

*Platanus*, *Oviedo*.

*Dudaïm* in Bibliis: *Phyximilon* *Aeschlylo*: *Margaita* Grecis & Latinis: *Mnz* & *Gemez*, Mauritanis: *Ficus Pharaonis*. *Kafi*: *Melapolanda*, Indis orient. at Indis occid. *Platanus*: *Abella*, insulæ *D. Thomæ* iniquinis dicitur, teste *Guiland.* in The. Mauz, Alpino.

*Mauze* Theveti, Lugd.

Huc referri debet,  
Paquouere Americanorum, Theveti.  
Musā pacouere, Lugd. qui figuram Theveti à prio-  
re diversam exhibet.

Huius foliis gummi Elenani, aliquando & Sac-  
chari panes involvuntur.

XII. Musā affinis in regno Catay.

Photel, nonnullis Ficus Pharonis, Thevet. Lugd.

XIII. Musā affinis altera.

Banam. fructus in regno Congiano, forma & gu-  
stu Musā Ægyptiacā: par. 1. Ind. Or. l. 2. c. 1.

XIV. Palmam referens arbor farinifera.

Zagu, Ferd. Lopez.

Sagu, Pigafetta, & ad Cluscur. post.

Arbor vasta in regno Fansur, Polo Veneto.

Albor farinifera, Clus. ex l. 1. c. 3. & 16. Lugd. &  
Claudio Dureto.

In Ternate insula Aequatori proxima provenit,  
cujus summum fastigium in caput orbiculatum  
instar Brassicæ capitatæ extuberat, in cuius me-  
dicullio farina, ex qua panes fiunt: sicut etiam a-  
pud Amboënses, & panes & alia cum lacte fercu-  
la conficiuntur.

Arborem quandam in insula Ternate detrunc-  
cant, findunt, ligna fissa tamdiu condunt, dum fari-  
na decidat, quam Sagge nominant, ex qua panes  
candidos quadrilateros conficiunt: par. 5. Ind. Or.  
At parte 8. panis Sagu Moluensis, ex radicibus  
arborum confectus dicitur: quare Leriis in de-  
script. Brasiliz, putat farinam non ex ligno attrito,  
sed ex radicibus Aypi & Maniot confici.

XV. Arbor exotica fructu daſtylis simili.

Arbor tinctoria, Theveti, Lugd.

In regno Senegæ, arbor ex cuius nucleis oleum  
expressum: cum aqua mixtum, pocula & pileos  
croceo colore tingunt.

XVI. Genus fructus palmulis simile, sed ut  
piper linguam exurens, Linscot. par. 3. Ind. Or. 10.

XVII. Arbor foliis amplissimis fructu cucu-  
meris forma.

Bonannas par. 7. Ind. orient. fig. 4. & par. 5. c. 7.

Bannana: par. 6. Ind. Or. & par. 8.

Folia tantæ magnitudinis ut virum aliquem co-  
operire possint.

Huc referri potest

I. Ficus Indica fructu racemoso folio oblo-  
an Uva quam ex benedicta terra Moyſi attu-  
lerunt?

Platanus, Oviedo: & par. 4. Amer. c. 28.

Platanus Indica: par. 9. Ind. occident. l. 4. c. 21.

Darach, Moris ipsa arbor dicitur: Avicenna, Se-  
rapio, Rhafis meminere, Palud. notis in Linscot.  
Ficus Indica, Linscot. 4. par. Ind. Or. 11. & fig. 11.

Pacouaire frutex, (ad Musam Matthioli accedere  
cenſet) Leriis 3. par. Ind. occident. 12.

Platanus sive Bonannas, par. 9. Ind. occident.

At fructus dicitur

Bavanas, Patan, Prian, Quelli Indis, pacona  
Brasilianis, Linscot. l. c.

Paco, Leriis l. c.

Pacona, par. 3. Amer. ep. 1. de Brasil.

Poma Paradyſi, Brocardo ter. sanct. def.

Davanas fructus, par. 2. Ind. Or. 4.

Vannanas seu Ficus Indica, in Sumatra, par. 4. Ind.  
orient. c. 4.

Arbor Vannanas: par. 8. Ind. occident.

Genera plura: 1. ceteris crassius, Figos Dora,  
Fici aulici Lusitanis dicuntur: 2. minus Seneryn  
dictum: 3. Cadolyn: 4. ficus nobilissimus Chyn-  
capolyn nuncupantur, Linscot. l. c.

Folia huius, quæ ulnam longa, tres Spithamas la-  
ta (lapathii aquatici sex pedes longa, duos lata, Le-  
rio) in variam supellectilem Indis in Goa cedunt,  
quibus & Turcæ papyri loco utuntur. Surculus  
sæpè 200. ficubus prægnans est, uvarum modo in  
se compressis: acini ex quibus dependent, sæpè in  
tantam molem grandescunt, ut à binis bajulis traſ-  
versa pertica vix gestari queant: Toto anno fru-  
ctifera est, & Indis commeatum quotidianum  
largitur: Linscot.

Ex foliis in insula Capul, suppanem conficiunt,  
quo corporis partem inferiorem & pudenda te-  
gunt: par. 9. Ind. occident.

Aliz Platanis adhuc in India reperiuntur, exiles  
& candidi, quas in Hispaniola Dominicos vocat:  
alibi etiam crassiores, & rubentes proveniunt: Jo-  
seph. Acosta l. 4. c. 21.

II. Ficus Indica fructu racemoso altera.

an Ficus Indica circa Aefinum amnem nascens,  
Theoph. 1. hist. 12. 4. hist. 5. & 2. caus. 14.

an Fructus arboris Gaguey, Oviedo.

Arbor peregrina fructum similem ficui gerens,  
Clus. ex. l. c. 11.

Huc referre oportet

Fructum exoticum tertium, Clus. l. 2. c. 9.

Palma nucem ferens.

I. Palma Indica coccifera angulosa.

Jantial Indij id est, nux Indica, Avicenna.

Nux

Nux Indica, Matth. Ad. Lob. Cæf. Cast. Lugd.

Nux Indica grandis, Cord. hist.

Palma in India nascens, Theoph. Arnano, Straboni, Guil.

Coccus Indica, Lac. Frag.

Palma Indica Garzia, quæ & Elephantis, Lug. ap.

Nux Indica 1. & 2. Tab.

Palma nuces Indicas Cocos dictas ferens, Pigafetta in def. regni Congiani, sive par. 1. Ind. orient. l. 2. cap. 1.

Palma Indica sive Cocos, par. 9. Ind. occident. lib. 4. cap. 26.

Palma sive nucifera arbor Indica, quæ Arabibus Maro, Indis Tenggamaran & Lanhæ: at nux, Arabibus Narel, Indis Tenga, Lusitanis Coquo, Linsc. par. 4. Ind. or. c. 12. & fig. 11.

Palma Indica Cocco vocant ut & fructum: par. 9. Ind. occid. additam.

Cocos sive nux Indica: par. 8. Ind. occid.

Coques nuces, ex cuius corticibus, corbes parant: par. 9. Ind. occid. additam.

Palma Coccochne, palma indica nucem Indicam ferens, quas Linscottus rotundas pingit, cum ex Guinea triangulares advehantur, nisi fortè succo plenæ rotundiores sint, Roëlsius in ep. ad Clus. ubi Linscottii figura à Clusio reprehenditur.

Fructus Lusitanis Cocco & Coquen dicitur, ob tria foraminum vestigia, quibus Cercopitheci caput repræsentant: & nucleus inclusus siccatus, Copra nominat, qui fructus & victu & amictu Indis suppeditat, & omni tempore nuces fert, Linsc.

In Caryotarium genere, quas Plinius Nicholaos appellat, aut quod Pateton vocat, esse volunt.

Liquorem colligunt ex nuce, quem Suram nominant: & Ambonenses Vinum de palma: & quomodo vinu ex his fiat, ostenditur ad Clus. cur. post. Ex hoc spiritum eliciunt, qui incolis Arack aliis Fula, sive Mype, id est Vinu sublimatū dicitur: sed & alio modo distillata Sura, Uraca fit. In summa ex Palma, fructus, oleu, lac, mel & aceru colligunt: ex cortice ligneo pocula, ex paleaceis nucū integumentis, fumes ad naves, folio deniq; quoq; usus existit.

Genera Cocos seu Palmæ Indicæ quatuor sunt: 1. nucum jam dictarum, ex quibus Indi universi omnem suum victum quærent: 2. Lusitanis Arraqueo: quæ Areccam fert: 3. dactylitæ, Tamar: 4. Lantor dicti, ex quo Indi papyrum suum quærent: 4. par. Ind. or. c. 3.

II. Palma coccifera figura ovali.

Coccus de Maldiva, Garz. Acoftæ, Frag. Clus. ad Garz.

an Nucum genus peculiare contra venena, in insula Melandyna, Linsc. par. 2. Ind. or. c. 15.

Fructus argento includuntur, ut & priores: aliquando prægrandes admodum, interdum exigui in littus ejecti reperiuntur.

III. Palma Javanensis longissimæ folio.

Lantor, è Coquos seu Nucum Indicarum classe, folia viri longitudine præferens, par. 4. Ind. or. c. 3. & 6. fig. 15.

Fructum fert pusillum Cerasi magnitudine, qui nucleus carnosus dictum continet: hanc Palmam aliqui primæ foeminam existimant.

IV. Palma coccifera ex Guinea.

Avellanæ Indicæ species, Matth. Lugd.

Avellana Indica, Lob. Tab.

(Garz.)

Fructus 1. cum Cocco affinitatem habens, Clus. ad Palma Ady. Roëlsio in epist. ad Clus. qui an sit Palmæ Caryotides Diosc. & Galeni, dubitat.

Fructus Abariga incolis, Caryoces & Carcosso Lusitanis, Citrii mali magnitudine, ex cuius pulpa oleum expriment, id edulius miscens: ex germinibus succum colligunt, quo ut Vino inebriantur.

V. Palma coccifera Brasiliæ.

Sabucage pomo est amboque pugnis ampliore, forma calycis, in quo nuclei amygdalini similes, etiam sapore. Lero 3. par. Ind. occid. c. 12.

VI. Avellana angulosa villis obsita si modo à priori diversa sit.

Fructus peregrinus 3. cum priore magnam similitudinem habens, Clus. ex l. 2. c. 29. Lugd. Tab. Ger. huius nucleus pro

Fructu peregrino 5. proponitur à Clus. Lugd. Tab.

VII. Palma coccifera minor.

(Ger.)

Palmitas quarum aliquas femellas dicunt, quæ vinum nullum proferunt, sed fructibus abundant, quorum nucleus juglâdis magnitudine, cuius cortice aperto, tres in eo nuces, avellanis similes: par. 6. Ind. or. c. 12.

IX. Palma cujus fructus Cucu.

Kunzeo inquit Theoph. 4. hist. 2. similis Palmæ, similitudinem in caule & foliis repræsentans: quæ cum aliquantulum increverit bifida fit, iterumque horum utrumque pari modo dividitur: virgas breves nec multas proferit: fructum fert magnitudine qua manum impleat, rotundum & oblongum, colore flavicante, succo dulcem & gratissimum, non congestum ut Palmæ, sed per singula

gula discretum, nucleo magno vehementerque duro, &c.

Cuci Plinio l. 13. c. 9. qui eadem ferè quæ Theoph. habet.

Cuciophera, Matth. Cam. ep. Lugd. ap. Tab. Ger.

Cuciophoron, Ang.

an Nux Indica minor, Cuci Theophrasti, Cord. hist.

Bdelij fructus Cortusi, Clus. hist. Lugd.

Persea, hunc fructum adpinxit, Lugd. un.

Cuci fructus, suo pulvino nudatus, Clus. hist.

Cuci fructus, Linicor. par. 4. Ind. or. fig. 18.

IX. Nuci Indicæ majori affinis fructus Brasiliensis.

Fructus exoticus quintus binis foraminibus parte anteriore, Clus. ex. l. 2. c. 16.

X. Nucula Indica ex Guinea.

Nucula Indica, Ad. Lob. ico.

Nux altera, Clus. ex. l. 2. c. 26.

Nucula Indica secunda, ad Clus. cur. post.

Ex foliis liquor exprimitur, aut ea in aqua decoquantur, eoque pro potu utuntur: at ex fructu panem suavem conficiunt.

XI. Palma cujus fructus fetilis Fausel dicitur.

Fausel Serapionis: Fissel & Fufel, Avicennæ.

Avellana Indica, Matth. qui una tabella triplices fructus pingit, ut & Lugd. hic tamen & nucem ex Clusio adposuit.

Fausel, id est Avellana Indica, Cord. hist. Frag.

Fausel sive Areca, Garz.

Areca sive Fausel, Clus. in Garz. Lugd.

Avellana Indica cujus fructus Areca, Acoftæ.

Areca palmæ species, Scalig. Vattomanno, cui fructus Cöfcol, & Lugd. Romano Chofola, Lugd.

Areca, Cast. Tab. Ger. hi duo & arhorem & fructum, tam hujus quam sequentis, una tabella proponunt.

Fausel cum suo involucrio & eodem exutis, Ad. Lob.

Nuci Indicæ affinis fructus, Areca, Cæf.

Palma Indicæ altera species, quæ Lusitanis Arequiero, quæ fructum Arecca seu Fausel parit, Linicor. 4. par. Ind. or. c. 5. & fig. 11.

Arecca & Arrequa, Supary, Arabibus Fausel fructus dicitur, Linic. 4. par. Ind. or. c. 16.

Genera tria: 1. latere uno presior, altero latior & major: 2. minus, nigricantius, durius, Checanyn dictum: 3. à cuius masticatione homo ac vino inebriatur, Linic. l. c.

XII. Palma cujus fructus oblongus Fausel similis.

Avellana Indicæ genus oblongum, Clus. in Garz. Lob.

Nux oblonga quæ Fausel cum suo involucrio magnitudine æquat, Lugd. cui Avellana Indica 4. ordine in tabula.

XIII. Palma fructu nuce juglande minore & rotundiore.

Alia species Coquillo dicitur, in Chile fructu suaviore, par. 9. Ind. occid. l. 4. c. 26.

XIV. Fructus exoticus Fausel affinis.

Fructus exoticus 2. à Clusio, Clus. ex. l. 2. c. 23.

XV. Fructus Javanensis quadrangulus cortice reticulato spadiceo.

Peregrinus fructus *παραγινος* prægrandis, alterius Palmæ fructus fortè, Clus. ex. l. 2. c. 5.

Hunc cum pluribus aliis à D. Hoofft Guillemi, Amstelredamo accepit.

XVI. Nuci de Coulcul quæ gemini pugni magnitudine sit, quæ parvis granis eiui aptis, atq; Avellana instar dulcibus plena sit, meminit Bellenius obi. l. 1. cap. ult.

XVII. Conroq, fructus Brasiliensis, ex quo oleum exprimitur curandis vulneribus præstantissimum: Leriis, vel 3. par. Ind. occid. 10.

*Palma squamoso fructu.*

I. Palma conifera ex Guinea squamis ad pediculum conversis.

Palma pinus sive conifera, Ad. Lob. ico.

Palmapius sylvestris, Lugd.

Peregrinus fructus squamosus, Clus. in auctar. ad exot.

Fruticis aut arboris exoticæ ramus cum fructibus squamosis, Clus. cur. post.

Includitur nucleus durus, venosus, qualis interdum pro insigni aliquo lapide obruditur.

II. Palma conifera squamis sursum conversis. Fructus peregrinus abiegna nuci similis, Clus. ex. l. 2. c. 3. (rens)

III. Palma conifera squamis à prioribus diff. Palmapius sive conifera Penæ, Lugd.

Palmapius, Cast. ap.

Palma conifera, Tab.

IV. Fructus squamosus orbicularis major juglandis magnitudine.

Fructus peregrinus squamosus tertius, Clus. ex. lib. 2. c. 3.

V. Fructus squamosus orbicularis minor, avellana magnitudine.

Fructus peregrinus squamosus secundus, & fructus



*Aus Canne de Bengala creditur, Clus. ex. l. 2. c. 3.*

VI. Fructus squammosus orbicularis sulcis rectis, obliquis & transversis.

Guayana fructus elegantissimus, Clus. ex. l. 2. c. 4.

Guanavanus, par. 9. Ind. occid. c. 28.

Varia fructu cordis effigie viriditatem orbiculari croci coloris.

VII. Fructus squammosus pyriformis.

Fructus aspero cortice ex Baly insula, Clus. ex. lib. 2. cap. 4.

IX. Palma fructu aculeato ex arboris trunco prodeunte.

Jaca, Garz. Acoft. Frag. Lugd.

Jaca minor, Cast.

Jaceros in Calecut, Ludov. Romano.

Jaca & Jaqua, Linc. 4. par. Ind. or. c. 6. & fig. 16.

Fructus melonis magnitudine: quoddam genus adeo auge<sup>t</sup>, ut ab uno homine ægrè attolli queat: Duplex est, alter & præstantior Barca: alter Papa aut Giralol appellatur.

IX. Arbor fructu Ananas ex caudice emergente, nucleis turgente.

Arbor sine foliis seu ramis, in insula minore S. Mariæ par. 4. Ind. or. c. 6.

X. Arbor Indica fructu racemoso erinaceo. Erinaceus Lusitanorum, Linc. par. 4. Ind. orient. fig. 16.

Fructus in Baly insula pomi ferè magnitudine, aspera & spinosa cute tectus.

XI. Fructus cortice squammoso.

Fructus ex Bally pyri magnitudine, cortice instar piscis squamarum aspero, nucleo uno vel altero, Linc. par. 3. Ind. or. c. 39. & par. 4. c. 6.

*Nuces exotica.*

I. Nucula saponaria non edules.

Arbores, quæ à precariis sphaerulis & à saponi cognomen acceperunt, foliis filicis, Oviedo hist. Ind. Lugd.

Sphaerula saponaria Oviedi, Monardi.

Fructus exotici 16. Clus. ex. l. 2. c. 16.

In Hispaniola fructu integro cum aqua pro saponi utuntur: ex osiculis sunt corollæ ebenis similes.

II. Nux vomica in Officinis.

Nuces vomicae Seplasis, quas Methellas genuinas crediderunt, Matth.

Nux vomica communis, nec vomica est, nec metella, Ang.

Nux vomica, Cord. hist. (eui & canina) Cast. Lug. Tabern.

Nux metella, Lac. vulgò & Fungus orientalis, Cels.

Nux metella vera, Vomica officinarum, Lon.

Vomica officin. falso Metella, Guil.

Tithymali myrsinitis fructus, Fuch. comp.

Nux vomica, fortè Cutichula, Rauwolf.

Homini noxiam dicit Matth. innoxia Milichius & Renodæus: potiones somniferas ex his se parasse, Brasavolus scribit.

III. Nux metel officinarum oculata.

Nux metel communis, Vomica non est, sed potius Metel verum, Ang.

Nux vomica, Lac. vera, Metella officinarum, Lon.

Nux methel five methela, Lugd.

Hippiomanes Cratevæ quibuidam, Eid.

Fructus peregrinus sextus, Clus. ex. l. 2. c. 30. & in altera tabula, Lugd. Tab. & Ger.

Nutum genus gallis tum forma tum magnitudine simile, Ind. or. par. 4. c. 8.

IV. Cocculæ officinarum.

Baccæ cotula Elephantinae Germanis pharmacop. Matth. epist.

Solani furiosi fructus, Cord. in Diosc.

Cuculi fructus Solani furiosi in Ægypto, Eid. hist.

Coco de levanti, quidam fructum Tithymali parali esse putant, Lac:

Grana orientis, Cornaro.

Nux vomica fortè, q̄ officinis Galla oriétalis, Cels.

Cuculus Indicus, Cast.

Cocculæ oriétales. Doam Sames in Halepo, Rauwolf. (wolf.

Cocci orientales, Tab. Ger.

Baccæ orientales & piscatoria, Condronchio.

Hæ saepe racematim pediculis hærentes, hederæ corymborum modo ex Alexandria adferuntur.

Pro pediculis nullū præstantius remediū inventū, Cōdrōchus speculārī de his baccis tractatū scribit.

Quidam Solani manici, quidam Tithymalli, quidam Clematidis fructum opinantur.

V. ANACARDIUM: fructus hic veteribus Græcis incognitus censetur, quem recentiores Græci

anacardis, à cordis cum primis ressecati, tum similitudine, tum colore nominarunt. Baladar Arabibus, ut Serapioni.

Anacardium, Matthiol. Lac. Cord. hist. Lon. Cast. Garz. Acofta, Frag. Lugd. Tab. Ger.

Anacardium, Arabibus Balado, Lusitanis Faba Malaccana, ex qua viridi Achar conficiunt, id est, sale & aceto maceratū congiunt, Linc. par. 4.

Ind. or. c. 29.

Anacard-

Anacardus sive Anacardium : Persea forte Plinii Cxf.

Variatur nam quod in Malavar oblongiore porrecto collo est, eo quod in Sunda prodit.

VI. Anacardii alia species.

Acajon, Theveti, Lug. Lerio 3. par. Ind. occid. c. 12.

Cajous Acoftæ, Clufad Garz. Lugd. Ger.

Cajos, Lincot. par. 4. Ind. orient. 9. & fig. 13.

Caftanæ quæ ex Indiis adferuntur: Rondil. cap. de memoria deperdita.

Anacardii aliud genus, quod Cajous, Frag. Tab.

Fructus peregrinus 7. Cluf. ex. l. 2. c. 30. & in tab. altera, Lugd. Tab. Ger. nux est Cajous immatura.

Fructu ovi anserini forma, cuius extremo nux leporini renis figura (cujus nucleus suavissimus) adnascitur: ex fructu Canibales potionis genus conficiunt.

*Arbores venenata.*

I. Arbor fructu orbiculari venenato.

Penoabfou Theveti, Lugd.

Arbor in America portulacæ foliis, & in fructu quolibet nuces senæ amygdalis similes, in singulis singuli nuclei, ad vulnera sananda, ut & oleum ex iis expressum, utile.

II. Arbor fructu pilæ magnitudine.

Arbor venenata 1. Theveti, Lugd.

Hujus succo Canibales sagittas imbutunt.

III. Arbor succo venenato, radice esculenta.

Arbor venenata alia, ex qua scarificata succus mortifer emanat, radice tamen esculenta, ex qua farinam, qua vescuntur, faciunt, Thev. Lugd.

IV. Arbor fructu venenato, radice venenorum antidoto.

Arbor Baxama, cujus & umbra & fructus suffocant: cum tamen radix in aliis regionibus, venenorum antidotus sit, ut & fructus qui Rabaxit vocatur, Theveto, Lugd.

V. Arbor brasiliæ folio excelssima Americana.

Uhebebasou fructu pedis longitudine, quo apum examina nutriuntur, Theveto, Lugd.

#### HERBÆ & ARBORES admirandæ.

I. Planta sanguineos sudores excitans, in epist. ad Monard.

II. Herba mortem aut vitam in morbis prænuncians, Monard. Lugd.

III. Baharas in Judæa radix colore flammæ assimilis, circa vesperam veluti jubare fulgurans: quæ accedentem & evellere cupientem tam diu

refugit, nec prius fugam sistit, quam urina muliebri, aut mæstruo sanguine conferta fuerit, Joseph. de bello Judaico.

cum Aglaophotide sive Cynospasto terrestri Æliani: marmaritime Democriti: Cynocephalia & Oslitide Apionismoly, Homeri: & pæonia non Dioscoridis, sed Galeni, nisi fallor, convenit. Guiland. pap.

Baaras aut Babras Josephi, ex loco natali, Cast.

IV. Frutex Tartaricus.

Agnus Scythica, Boramietz, Sigisf. Baroniab Herberstein in hist. Moscovica, Scalig. Lugd.

Borametz Tartarica, Claud. Dureto, qui eum pingit.

Ex semine Melonis magnitudine crescit figura agni, quem omnibus partibus repræsentat & pro carnibus pilos gerit singulari cornu specie, & radix ad umbilicum surrigitur.

V. Arbor venereos stimulos domans in epist. ad Monard.

VI. Arbor foliis ambulantibus, Pigafetta.

Arbor in insula Cimbabon, Costæo, Guiland. pap.

Arbor mira cujus frondes repunt, Scalig.

Arbor foliis virentibus & ambulantibus, Dureto, qui eam pingit.

In insula Cimbabon, arbor foliis Mori multum similibus, parte utraq; binos pedes breves & acutos habens, quæ ubi tanguntur, diffugiunt.

VII. Arbor Malvarensis foliis tactu se contrahentibus.

Arbor in provincia Pudefetan in Asia, Nicolao Conti, Poggio Florentino, Cardano.

Arbor pudica, Scalig. Dureto, qui arborē pingit.

Arbor verecunda in Pudefetaniam, Costæo.

Planta in Peru nascens, cujus folia contactu siccat, Francisco Lopetz: quam tamen Acuan verum aliqui putant, Clusio monente.

Herba pudica, Lugd.

an Arbor circa Memphim, Theoph. 4. hist. 3. nascitur peculiaris quædam arbor circa Memphim, non foliis, vel ramis, vel tota forma peculiare quid sortita, sed eventus: facies enim ejus spinosa, folia filicibus (pennis Plinius) non assimile: sed cum ramulos quicquam contigerit, folia veluti arefcentia & languescientia contrahi ajunt, deinde paulo post ad vitam redire. Idem fere Plinius l. 13. c. 10. Huic arbori affinis herba, quam l. 10. c. 12. sub Herba viva proposuimus.

II. Arbor aquam fundens.

Arbor perennes aquas è foliis exudans, Benzoin in insul.

in insul. Canar. descr. vel Ind. occid. par. 6. ubi & figura habetur.

Arbor mediocris magnitudinis in insula Ferro, cui similis intoto orbe non invenitur, Linscot. par. 3. Ind. or. c. 5.

Arbor in Ferro insula, quæ incolis Garoë: Hispani Sancta: veteribus historicis Til vocatur, par. 8. Ind. orient.

Vide & Cardanum 6. variet. rer. 22.

Ombrien sive Pluvialem Plinii & Solini, hanc insulam suspicantur. Plin. l. 6. c. 32. in insula Ombrien vocata, arbores similes Ferulæ, ex quibus aqua exprimitur: ex nigris amara, ex candidioribus potui jucunda. Verum Benzo & Linscottus, arbori folia Juglandis, quanquam paulo majora & perpetuo viridia tribuant, quæ fructum habet in cortice glandis instar pendentem, cum nucleo suavissimo & valde aromatici gustus, par. 8. Ind. oriental.

In tota insula nulla aqua reperitur, præter eam quæ ex illa arbore manat, quam perpetua ac densa nebula, ubi solis æstus non flagrat, circumdat.

IX. Arbores quibus ædiculæ superstruuntur. Ceibas sive Cerbas arbor maxima in Ind. occident. quam homines quatuordecim simul complecti nequeunt, Oviedo, Cardano, Francisco de Bello foresto.

Cerbas arbor in Nicaragua, quæ quindecim complecti non possunt. Tantæ crassitie, ut Indi ædiculas supra construant, Petrus Martyr: pingit Claudius Durretus: vide & par. 6. Ind. occid. 61.

Ceyba arbor, Lerio del. Bras. c. 12.

Ceyuas arbor grâdis in India. ex quibus Indi suas Canoas fingunt & excavant, 9. par. Ind. occident. l. 4. c. 30.

Ligno est fungoso ut Suberis: fructu lana referto & semine bombacis.

Quomodo Indi in arboribus domicilia habeant, duabus figuris exprimitur, in parte 6. Americ. & istorum ædificiorum meminit etiam Petrus de Cieca par. 1. Chronica Peruanæ cap. 12. & 27. & 29. quæ valde capacia esse scribit, ut plures etiam integras familias capere possint.

X. Arbor in summo cacumine solum frondes minimas parturiens, ex cuius trunco integro, Canoas suas exstruunt, Linscot. par. 1. Ind. or. fig. 21.

XI. Licondo, arbor tantæ magnitudinis, ut sex viri brachiis expansis vix possint circumdare, & tantæ magnitudinis, ut 200. viros cum armis &

remis capere possint, ex cuius trunco excavato scaphas conficiunt in regno Congiano, part. 1. Ind. orient. c. 4.

XII. Rattiak arbor, ex qua in Virginea lintres fabricant, 1. par. Ind. orient.

XIII. & XIV. Yga, Yuuera, arbores in Brasilia quas integras decorticant, cortice illico, ex quo scapham parant, quarum singulæ triginta armatos vehunt: nam cortex pollicaris crassitudinis, quatuor pedes latus, quadraginta longus: par. 3. Ind. Occid. l. 3. c. 25.

Sic ex arboris Yuire vocatæ cortice tilia permixti, funes conficiunt: Lerus del. Bras. c. 14.

Lintres singuli, ex cortice arborum detracto constat, quos Ygat nominant, tantæ amplitudinis, ut singuli quinquaginta homines capiant: idem capit. 13.

XV. Gelsomoro arboris ab incolis dictæ cortex, in quibusdam Indiæ locis pecunia est: Pigaseta in desc. regni Congiani lib. 1. c. 4.

XVI. Pindo herbæ caules aut Palmarum rami, ad januas ædium: Lerus del. Bras. c. 13.

#### Arbores anatifera.

I. Arbor ex cuius ligni putredine vermes, & ex his Anates viventes & volantes generantur, Claud. Durretus arborem pingit.

Hector Boëtius in descrip. Scotiæ in insulis Hebridibus, Klaki avem nominant, in quibus vim procreandi potius, quam arboribus inesse, &c. quæ citantur à Cardano lib. 6. de Var. rerum, dubitatione prorsus digna dicens. Polydorus Virgilius pro fabula habet.

Olaus Magnus scribit, è lignis putridis fungos primum enasci, ex his aves maritimas, quæ piscibus vivant. Idem confirmat Cornelius Scribonius in epist. hist. de generibus Septentrion. Alexander ab Alexandro de diebus gentilibus: Antonius Torquemada in suo Hexamero: Joh. Baptista Porta in phytognom. Abraham Ortelius in suo theatro. Sic Syl. Giraldo in hist. Hiberniæ, Bernacæ dicuntur, quæ anatis palustribus similes, sed minores.

Bernacles, Ad. & Lob.

Britanniæ conchæ anatifera, Lob. belg.

Anatifera concha, Lon.

Ex furculis arborum conchæ anatifera, Lugd.

Conchæ anatifera ex arbore dependentes & truncis adhaerentes, Aldroand. de avibus, & libr. de testaceis.

Conchæ vulgo anatifæræ, non sunt fructus terrestres. neque ex iis anates oriuntur, sed Balani marinaræ species. Colum.

In navigat. testia Hollandorum per Norvegiam in Chinam an. 1596. sive in par. 3. Ind. orient. hæc habentur: hoc loco Anserum rubentium ova magno numero collegimus: cujus generis anseres quotannis magna copia in Hollandia ad Wiringam capiuntur: qui quo loco sua ova excluderent, hæcenus nemini adhuc compertum fuit, cum multi eisdem in Scotia arboribus nasci, frustra contenderint.

II. Arbor ex cujus fructibus in aquam delapsis anates prodeunt, Claud. Dureto, qui ejus figuram proponit.

Arborem in Scotia apud Orcades insulas reperiri audio, cujus fructus avem Anatum formam habens, producant, Æneas Sylvius in descript. Europæ.

Arbores in Scotia quarum fructus foliis involutus, si in aquam decidat, in avem transmutatur, quam avem arboream vocant, Sebast. Munsterus in Cosmograph. Saxo Grammaticus etiam meminit.

Arborum quarundam fructus similes cono pini, si in mare decidat, in aves transeunt, quibus etiam in Quadragesima uti licet, Joh. Boterus in sua relat. de his etiam Pierius Valerianus in suis Hieroglyphicis, & Andreas Thevetus, in sua cosmographia.

Fructus ostræcis non dissimilis arboribus nascens, in tanta copia, ut folium vix cerni liceat: par. 8. Ind. occident. descript. navig. i. ipsius Drake.

In Guajana, Ostrea in arboribus, & novis terra crescent, quod in India Occidentali & alijs locis frequentissimum est: quam arborem Thevetus in sua Gallia Antartica c. 26. describit, ad eam imagine peregrini cujusdam fructicis: describitur etiam a Plinio l. 13. c. 25. par. 8. Ind. occident. in hist. Raleigh.

III. Arbor cujus folia si decidant super terram, in aves volantes, si verò in aquam, in pisces mutantur, Claudio Dureto, qui figuram fingit.

*Cornu plantabile:*

CORONIDIS loco de Cornu plantabile quædam ex Hugonis Lintschotani historia Indica, quæ par. 4. Ind. orient. habetur, qui cap. 17. hæc refert, in Goa insula, ad hujus nominis civitatem, juxta murorum terminos, locus quidam discretus est, quo omnis generis pecudes mactare solent, in quo animalium cælorum cornua passim objecta jacet, non solum ceu nullius apud Indos usus, sed præcipue hanc ob causam longius obijciuntur, quod Indis haud exigua cõtumelia sit, si ei cornu ostendatur, ædibusve obijciatur: ita ut cornu ostendenti, à magistratu pœna constituta sit. Hæc cornua, si illo loco aliquandiu jacuerint, radices in terram defigunt, medulla ejus in plurima quasi filamenta dissecta & protuberante, & hoc modo in solum se immittente: radix brasiliæ similis: sicut plures meis manibus evulsi, duas trèves spithamas elongatas, id quod nullo uspiam terrarum angulo similiter fieri compertum est. Hujus causam veram & immotam qui scrutaretur & assequeretur, nemo quod sciam, uspiam comparuit: nam & terra, in omni illo confinio, valde saxosa & lapidosa est, &c.

SOLI DEO GLORIA.



CON

## CONCLUSIO.

**C**UM ad hujus Operis, in quo DEI Opt. Max. admirandam sapientiam, clementiam ac bonitatem, in tot millibus PLANTARUM creandis, velut digito solum demonstrare volumus, finem pervenerimus, Tibi DEUS, qui solus immortalis es, tibi inquam, TRINUNI & UNI TRINO Hygie & Panacee Parenti, sit honor & gloria in secula, quòd pro ineffabili tua misericordia, inexplicabili clementia, inexhausta bonitate (ut qui solus ipsa Bonitas & Sapientia es) mihi misero peccatori tua gratia adfuissti, tuoq; auxilio, ut ea quæ nunc supra quadraginta annos, in Plantarum historia adeò admiranda, suspicienda, vaga, Oceanoq; imperscrutabili simili, in qua potentiam tuam, sapientiam & bonitatem declarasti, partim variis & laboriosis peregrinationibus, partim diligenti Botanographorum lectione, partim optimorum virorum communicatione, observavi, & observata Veterum & Recentiorum lectione comprobari cognovi, in hunc Indicem conferre potuerim. Tibi æterne DEUS, quòd me vitæ & beneficiis, toto vitæ meæ tempore adeò clementer affeceris, mihiq; tuâ curâ spiritum servas, sit laus in secula. Insuper de voto pectore & supplex rogo, ut porrò & mentem & intellectum meum illumines, manum meam regas, ut ea quæ solum nomine in hoc opere attingi, & quorum historiam in THEATRO BOTANICO, (cujus Operis hic solum Index est) fideliter tradere & absolvere possim, quòd ea ad altissimi tui Nominis gloriam, ad humani generis utilitatem vergant, cum sine Tuo auxilio à nobis nihil, at Tua ope omnia præstari possint. Largire quæso tuum S. Spiritum, ut miracula tua in Arborum & Herbarum creatione, explicare queam. Tuo enim jussu, ut cum Sancto tuo Propheta loquar, terra, tertio Creationis die STIRPES creavit, Herbas frugiferas, & Arbores fructiferas, quæ suo quæque in genere fructum ederent, & in quibus suum semen inesset in terris: tradidisti sexta die homini omnes Herbas, quæ sunt in omni terræ solo frugifera, omnesq; arboreo sætu præditas Arbores semen parientes, quibus ad alimoniam uteretur. Sic bestiis terrestribus omnibus, aërisq; volucris, & quæcunque vitali spiritu animata in terris moventur, his omnem Herbarum viriditatem ad pastum dedisti. Quare ô S. TRINITAS meo instituto clementer adesse digneris, quo opus, à multis annis inchoatum, ad felicem finem perducere queam: siquidem

Nullus sit felix conatus, & utilis inquam,  
Consilium si non detq; juvetq; DEUS.

F I N I S.

T T X H K A I' Π' O' N O.

T T 2

# APPENDIX.

## AD LECTOREM.

**C**um huius PINACIS pars ad Brasicam usque cusa jam foret, & aliquot mensibus ejus ulterior editio, ob operantium defectum, à Typographo intermissa foret, & interim Thlaspi aliquot species ex Austria à D. Bursero accepissem, ea quæ de ejus speciebus scripseram examinans, observavi, ab amanuensi (ob meam absentiam) aliquot scbedas transpositas, & non eo quo fieri debebat ordine descriptas esse: idcirco duos libros priores, cum parte tertii diligenter relegi, & non solum quæ hinc inde transposita erant, in sua loca reposui: sed insuper quædam alibi authorum nomina, addidi: quædam etiam emendavi: & sequentia descripta, diligentius perlegi. Addidi quintiam nonnullarum hactenus non descriptarum brevis historiam. Quod si & his & reliquis posthac aliqua, ex novis prædeuntibus Scripioribus addi poterunt: vel insuper aliquid mutandum esse vel lectione, vel à bonis & ingenius Viris, plantarum transmissione admonitus (cujus nomine officiosè rogamus) animadvertero, peculiari id appendix monebo; Adhuc γὰρ αἱ σφραγίδες σφραγίσαι, quare benignum & candidum Lectorem rogamus, ut omnia hæc benignè interpretetur.

Pagina 1. lin. 24. Graminis primi b. post lineam 30. adde Gramen caninum quartum, Tab.

pag. 2. b. post lin. 20. adde, Gramen equinum, sive Hippagrostis Gesneri cum hac plurimum convenit: Gramen albicās lanuginosum molle, Cam.

pag. 3. lin. 8. Gramen minimum, Lugd. lin. 18. deletur. 1. 30. ico. Lugd.

p. 4. post lin. 10. VI. Gramen spicatum foliis & spicis hirsutis molliibus. b. lin. 5. Theoph. Caula vulpina Plinii.

p. 6. 17. alterum, Lobico. b. 1. 7. pratensis, Trag. dele Lugd.

p. 7. b. 1. 31. aculeatum Germanicum vel

p. 9. 1. 24. spurium, Ad. b. 1. 43. Festuca nemoralis quarta

p. 10. b. 1. 3. & 22. pan. & hist.

p. 12. 1. 16. Holothænos, Cord. in Dios. Gesn.

1. 24. Lugd. def. 1. 32. vulgaris. b. lin. 32. Lugd. cui etiam Calamagrostis leucanthemos. 1. 33. hist. & Ger. 1. 36. paludosus, Ad. & Lob.

p. 15. 1. 7. Lac. Ad. Cæf. b. 1. 11. icon. & Ger. 1. 23. marina, Dod. def.

p. 16. 1. 28. fontalis, Ad.

p. 17. b. 1. 9. Syringa & Arundo scriptoria, Ad. 1. 5. fæctæ, Ad.

p. 18. 1. 24. Mambu b. lin. 14. Saccharum, Meficalamus, Cord. hist. Mel arundinis quibusdani Saccharum, **Lor.**

p. 19. b. lin. 8. Cam. (cui & Xiphium Indicum Italorum) Cæf. 1. 10. quorundam, quod inter Cannam & Acorum ambigæ naturæ sit, quare &

Calamagrostis 1. 18. Lugd. cum duplici figura. 1. 19. Florida & Harundo liliflora, Tab.

P. 20. 1. 5. videtur: vel potius *πικρὸν* à *πικρὸν*, quod locum palustrem notat. 1. 13. Lon. Ad. Lob.

Pag. 21. 1. 6. Cord. in Dioscorid. (cui & Triticum semestris) Dodon. 1. 9. mutica, Ad. & Lob.

1. 11. Cæf. II. Triticum siligineum, Triticum candidum, Græcorum & Galeni, *Σιλιγίνη* & *πύριον* Hippocr. aut ejus interpreti Tragus, sive Olyra. Siligo Varroni, Columellæ & Plinio, cui & Sandalum. Triticum genus candidissimum, Cæf.

1. 13. vocavit. III. Triticum æstivum.

Trimestre triticum Græcis: *τρίμηρον* Theophr. & Dioscor. Setanum, Galen. Siliginis & Triticum 3. species, Columel. Triticum trimestre, Portæ.

Triticum aliud quod Vernellum vocant, Cæf. 1. 13. aculeatum & Triticum lucidum Gallobelgarum, Lob.

b. 1. 13. typhinum, sive Tiphæ cerealis multiplex 1. 19. cerealis, Ruell. Dod. gal. Triticum Romanum, Tragi, Eid. 1. 21. dele Lob. 1. 22. Triticum typhinum, Tabaristis

p. 22. 1. 18. Amylæum. Olyra Diosc. 1. 37. Lob.

(cui & Hordeum polystichon autumnale, Ad.

par. alt.) Dod.

p. 23. 1. 1. ico. & Ad. part. alt. 1. 16. Brunf. Ruell.

p. 25. b. 1. 36. Indicum, perperam Turcicum, Matth. Lon. Cæf. 1. 44. Turcicum, Ang. Dodon.

1. 46. Lugdun. Portæ.

p. 27. b. 1. 36. Diosc. Irio cerealis sive Erysimum, Ruell. Erysimum cereale, Gesn. cat. Portæ. 1. 41.

Dodon.

Dodonæo. Fagopyrum, Ad. (an Erysimum Theophr.) Lob.obi. (& Lampfana vera quorundam) Franco.

Pag.28.b. l.36.minor,Ad.& Lob. l.37. Lugd. Gerar.

p.29. l.2. dele Ger. l.13. Salonenfis, Ad.Lob. l.32. Tab. Ger. Phalangium cauliculis simplicibus, Czfi. Liliaphodelus albo flore quibusdam. b.l.5. Lob. Aphodelus acorifolius palustris luteus, Ad. Asphodelus Belgicus palustris luteus, Lob.ad.part.alt. l.27.& 28.dele.

p.31.l.29. Ger.Franco, Eyflett. b.l.25. Lob. Lugdun.dei.Cam.Tab.Ger.& Chalcedonica.

p.32. l.23. latifolia decima, Cluf.l.31. Ger. Iris sylanguitfolia major, Tab.

p.34.l.12. Eidem & Eyflett.l.18.luteo, vel Chamaeiris minor *αγλαδωρ*. l.27. Gef.Dod.Ad.l.37. Cam.Caft.Tab.

p.36.l.4. Ang.Zaduarie five Zadura herba, Ad. Zedoaria, Braf. Lon. Lugd.

p.37. l.7. Diofcor. Inula Comagenia, Eid.hift. Costus officin. Ad. Costus amarus Pharmacop. Cam.ep. Marth. l.10. amarus Costæo, Lon. l.22. Tab.Cyperum Indicum Brafav.& Costæus fufpicantur. b.l.15.fumitur,quam Agyrtæ corrupto nomine cum Italis Costones quasi Costum amarum vocant. At Cæfalpino, Ferula cujusdam radix est.

pag.40. l.28. hift. Iris bulbosa angustifolia odorata, Eyft. b.l.13.referatur, Iris bulbosa violaceo colore mixto, Eyft. V.I. Iris bulbosa angustifolia alba. Iris bulbosa alba, Lob. ad.part.alt. Iris l.26.Tab.Cam.l.27.Lob.Ger.Eyft.

p.41.l.21. major. Xiphion. Spatha seu Gladiolus fegetalis, Ruel. b. l.26. Tab. Gladiolus flore pallido, Ger.

p.42. l.9. Plinii fortè aliis, Pericarpus bulbosus, Ejusd. l.29.comofus Diof. Ad.major. l.42. huc referatur, Hyacinthus comofus flore albo obsoleto, Cluf.pan.

p.43.l.1.uva ramofa.l.39. Cluf.hisp.& pan.Ger. Turcanum.

p.44.b.l.24.pingit: & huc referendus Hyacinthus fl.purpureo albo Eyft. l.33.ico & Cluf. hift. flore niveo, Eyflett. flore albicante & flor. albo, Swer. l.43. qui Hyacinthus orientalis niveus, Cluf.hift.

p.45.l.7.caeruleo & alter violaceo colore, Eyft. l.4r. Ayur.

pag.46. lin.7. liliflorus, Ad. stellaris lin.16.

Fuchf. floribus candidis, Dodon.

Pag.48. b.l.35.hift.Narcissus mediorubeus communis, Swer. lute.Eyft. Narcissus mediocroceus purpureus, Ad.

p.49.l.5.deleatur. l.40. Indicus fl. rubro, vulgo Jacobæus Robi. b.l.39. Lob.& Lugd.

p.50.l.34.Swer.Narcissus latifolius flore prorsus albo secundus, Cluf.hift. l.36.dele præcox. b.l.8.Taber. Narcissus latifolius flore prorsus flavo, Cluf.hift.icon. l.22.Tab.Narcissus Pitæus, Ger. l.41. Africanus major.

p.51. l.1. pone luteus Africanus, Ad. b.l.10. Lob. Ger. l.36. Tab.Ger.

p.52. l.14. V.Narcissus. l.25. falsus, five Pseudonarcissus. l.28. Narcissus seu Pseudonarcissus oblonga tuba rotunda non fimbriata. l.31. Narc. seu Pseudonarcissus. b.l.23.Theoph. Ad.& Lob. l.31. adfervo: reperitur & magis præcox flore aureo, qui Pseudonarcissus vulgaris præcox, Cluf. hisp. Pseudonarcissus præcox, Eyft.

p.53. linea 9.deleatur.

p.54. l.1. ico. Narcissus juncifolius multiplici complexu constans, Czfi. b.l.34.Tab.Pancratium marinum, Ad. lin.pen.dele & Swert.

p.55. b.lin.38.& 39. Leucoium bulbosum.

p.56. l.18. & Leuconarcissolirion five tertium bulbosum Leucoion, Lob. b.l.7. hisp. Lugd. & Cam. l.11. dele.

p.57.l.13. hift.rota lutea, Ger.l.29.Caft. præcox rubra, Chut.hisp.pan.& hift.

p.60.l.7.hift.Serotina lutea latifolia, Cam.

p.61. l.5. Eyft. Huc referenda, Tulipa serotina lutea latifolia diclonos, Cam. & ejusd.cristata papaveris modo, five *αγλαδωρ*.

p.62. l.6. secunda & media secunda versicolor, Cluf.

p.63. b.l.18. Bononiensis, Ger. quæ l.30. Bry. an Tulipa Cretica Caccini, Cluf.cur.post. l.40.pan. & hift.Cam.& Ger.tit.trans.

p.64.b. l.23. genus, flavo flore, Cluf.

p.67. lin.37. Crocifolium & Bulbifolium, Ad. Costæo, Lob.Ephemerum venenosum, Amato. l.40.Tab.Germanicum, Ger. b.l.8.Lob.Crocus vernus minor, Ger.

p.68. l.4. Angicum, Ad.& Lob. l.6.Tab.& Ger. lin.3. Colchicum montanum Hispanicum. l.15.Tab.& montanum, Eid. & Ger.l.22. Tab.Ger. Cluf. b.l.36. Pannon. Ger.

pag.69. l.19. Cam.Colchicum Vere prodians,

Eid. Matth. l. 29. Lob. Ad. Tab. Ger. lult. Eyst. Italicum, Cam. b. lin. 5. Narcissus in Apenino Marcel.

pag. 70. l. 13. Cast. vulgo, Cæf. l. 38. Ornithogalum magnum. b. lin. 3. Cam. Ger. l. 4. Galeni, Ad. Lob. l. 16. Lugd. spicatum, Cam.

p. 72. l. 4. Portæ, Cæpis a finis Maligia, Cæf. l. 16. hor. Ang. Lon. l. 19. capitatum Plinio, Hermol. Ruel. (cui Gethyllidas Græcorum) Dod. gal. Cast. vulgare l. 21. Cæf. Lugd. Portæ. b. l. 16. Dod. Ad. l. 17. Tab. Ger. l. 30. Tab. Franco: Porrum Indum, Cam. Scorodoprasum, Ger. l. 39. hor. Cæf. Port. Lugd.

pag. 73. l. 10. hor. Lac. Lugd. Lon. l. 17. Pancratium, Ang. (& Scilla vulgaris) Guil. Cluf. lin. 38. Lob. domesticum, Matth. Cast. l. 40. hor. Ad. b. l. 8. Scilla mascula Plinio: femina, Myrepf. Scilla, Marcel. Hermol. Manard. Ruel. Guil.

p. 74. b. lin. 8. Cast. Allium latifolium maculosum sive serpentium, Ad. l. 29. Dod. Allium syl. vulgare seu caninum, Thal. tenuifolium, Franco.

pag. 75. b. l. 42. Dod. Lon. Myle, Gelsecat. Moly Dioscoridis putatum, Ad.

p. 76. l. 24. Tab. Ger. Eyst.

p. 77. l. 12. aureum, Ger. majus l. 19. cruentum puniceum flore b. l. 4. Tab. Liliium cruentum latifolium, Ger. l. 31. hor. syl. Thal.

p. 78. l. 44. album variis maculis.

p. 79. l. pen. du Bry. Corona imperialis procerior rubra, sed alia rubicunda, Swer.

p. 80. l. 9. pan. & hist. Liliium non bulbosum, sive arundineum flore subcroceo, & alterum luteo, Cam. b. lult. Lac. Cynosorchis, Ad.

p. 81. l. 13. quarta, Tab. dele Lob. b. l. 22. dele.

p. 82. l. 28. hist. ab hac solâ radice, triplici bulbo constante differt ea, quæ Triorchis Serapias mas, Fuch. Lugd. Triorchis mas minor, Fuch. in ico. Tur. Tab. Triorchis mas, Lon. Orchis Serapias mas, Dod. gal. b. l. 28. Lob. Tragorchis minor & verior, Lugd.

p. 83. l. 11. Tab. Saryrium trifolium, Eid. l. 13. du Bry. minor & Testiculus leucanthemos, Eyst. li. 22. dele Tab. l. 45. Lac. Testiculus figura & colore apem referens, Cæf.

pag. 84. lin. 14. ico. Orchis ornithophora alba, Lugdun.

p. 86. l. 30. Gem. & Ger. l. 36. palustris latifolia, (Ger.

pag. 88. l. 4. dele.

p. 92. l. 9. verba, ut quidam censent. b. l. 4. tota

linea ponenda est post lineam 26. lult. Rapunculus syl. umbellatus.

P. 93. l. 7. Dod. Campanula hortensis persicifolia lactiniola flore volubilis, Ad. l. 40. Belli. Petra marula, Rapunculus Creticus, Imperato. b. l. 12. carulea agrestis, l. 15. minor, Ad. (Cluf. hist. solo nomine) sive minor rotundifolia linea 18. tota ponatur post 35. l. 41. deletur.

p. 94. l. 6. Lob. (& Trachelium majus Anglici Septentrionale candidum, Eid.) l. 18. Dod. cui & Rapum syl. Diosc. Lugd.

p. 95. l. 6. referunt, & rectè, cuius Dioscorides l. 2. c. 142. inter olera sine descriptione meminit: & Plin. l. 20. c. 9. inter syl. Brasicas & Lapfana est, pedalis altitudinis, hirsutis foliis, napi similibus, nisi candidior esset flore. l. 10. Lob. & Thal. l. 12. Fuch.

Corn. Cord. Tur. sive Erythimum, Dod. gal. Cam. ep. l. 13. dele. l. 17. legatur Rapa syl. altera, Cæf. l. 12. articulata, sive Lamplana veterum. l. 37. Lob. Ger. def. b. l. 37. lege Napum syl. Cæf.

p. 96. l. 29. magnus, Ad. & Lob. b. l. 33. purpureus, Ad. Lob.

pag. 97. l. 2. dele Ang. l. 8. rusticanus, Ad. Lob. l. 24. Lob. lege Lac. l. 25. officin. Ad. Lob. l. 33. folio major. l. 35. Cast. Cæf. cui Lepidium syl. fortè Columellæ. b. l. 7. Lugd. an Raphanus syl. Cord. in Diosc. l. 9. aquaticus Rapiſtri folio: dele alter. l. 10. Ger. an Raphanus syl. Cæf. lin. 34. dele Cæf. & lineam sequentem. l. 37. Cardamantica, Ad. Lob. lineæ ultimæ subjunge: III. Iberis nasturtii folio minor. Iberidis pustillæ seu Nasturtii syl. nomine ex Thuringia D. Fürerus misit.

pag. 98. l. 6. Ruellio, Hermol. Scalig. Dod. gal. Ad. Lob. l. 8. hor. Draco herba acetaria, Cord. ob. l. 14. 10. Gallorum, Ruellio. l. 17. Cast. Lugd. Cam. Ger. Parmica folio Taraconis, vel Sternutatoria, Ad. Lob. Parmica vulgaris, sive pratensis, Cluf. hist. l. 26. Brunf. Hermol. Ruel. Corn. Matth. l. 34. Lac. Ad. Lob. l. 39. obtinent: & hæc est Eruca fide Rucula marina major & Sinapiſtævum, Trag. Erucula major, Cord. I. Erucula latifolia semine nigro. Eruca genilis (fortè Erythimon) Manardo, Portæ. Erucæ major five Hispanica, Ad. Eruca altera fruticosa, Cæf. III. Eruca latifolia. lult. Matth. Ad. Lob. Dod. Lugd. (cuius Erysimum verum etiam videtur) Cast. b. l. 15. Cæf. qui flores albos tribuit. l. 31. dele & adde VI. Eruca palustris & Nasturtii folio siliqua oblonga. Eruca



P.99. l.1. gal. Ad. Carpentorū herba, Ruel. l.26. Cxi. Portæ. l.29. folio, Ad. Lob. II. Sinapi hortense semine albo. Sinapi sativum album, Trag. Sinapi alterum sativum, Ad. & Lob. Sinapi album, Cam. & Eystett. III. Sinapi apii folio. Sinapis lin.30. dele. l.33. dele alterum. l.34. dele album Eystett. l.38. folio, Ad. b. l.2. Ang. Ad. post lineam 15. pone X I V. Erucæ folia napi radice. Pycnocomon Anguit. quid? l.26. minus Irionis veri folio, aut burfæ pastoris, Ad. Sinapi syl. minus. l.27. & 28. dele.

pag.100. l.1. dele lutea. l.4. dele. l.6. Ger. Refeda tenuifolia, Tab. dele major, Thal. Tab. lin.7. Lugd. Rhededa Plinii, Eyst. recta, Cam. Erucago vulgaris. Col. l.11. dele Eyst. l.12. Cam. Refeda major, Thal. Refeda lutea, Lugd. l.14. dele. li.31. Luteola, Ad. Lob. b. lin.2.3. & 4. deleantur. l.7. hist. (quam duplicem facit)

pag.101. l.26. Eid. Ruel. l.14. hor. Erysimum alterum Italicum, Ad. Lob. l.32. mitis, Ad. Lob. maculosa, Lob. icon. b. lin.2. Colum. an Irio altera, Cxi. l.26. Brunf. Ruel. cui & major l.30. Ang. Perficaria hydropiper sive aquatile piper urens, Ad. lin.35. descript. Perficaria major, Lobel. ob. Thal. l.38. Perficaria pumila, Tab.

pag.102. lin.26. ico. & Ad. l.29. defeatur: adde Piper Indicum medium, Eystett. lin.44. Eystett. Piper 10. Regio. lin.46. quod Piper 12. Regio. b. lin.23. rugosa, quod Piper 8. Regio. lin.26. Eystett. Piper 6. Regio. l.30. Eystett. Piper 7. Regio. lin.33. Eyst. an Piper ex Indiis Melopeponis forma Monardi. l.44. erectum majus pyramidale, vel secundum Regio. lin. ult. quod Piper erectum minus pyramidale, vel 3. Regio.

pag.103. l.2. quod Piper oblongum exiguum erectum pyramidale, vel quartum Regio. lin.4. quod Piper undecimum, Regio. l.10. quod Piper rotundum majus surrectum vel primum Regio. b. lin.7. Tab. Huc referendum, Piper oblongum erectum minimum, Regio. Piper Indicum surrectis corniculis parvulis, Cam. b. l.36. ver. Cam.

pag.104. lin.1. crispum: hujus semen etiam Piper Nasturtii Mauritanii nomine, Lugduno atavorum accepimus. l.12. Lac. tertium, Donn. lin.13. Matthiol. Tabern. & Lugdun. lin.28. rodr. Silymbrii aquatici alterius nomine, Mat-

thiol. Lugdun. & Tabern. Si flores species, exprimere videntur. Nasturtii filiquosi sylvatici seu montani majoris Thalii nomine, D. Fürerus, Nasturtii pratensis congeneris, D. Jungermannus Lipsiæ misit. lin.32. Diofcoridis, Ad. & Lobel. b. lin.4. gall. Cardaminum Sion, Ruell. lin.8. Tabern. mont. & Portæ. lin.15. erucæ folium, Ad. & Lobel. lin.37. Colum. II. Nasturtium montanum luteum foliis sativi. Nasturtium montanum minus, Thal. quid? III. Nasturtium

pag.105. lin.8. Lugdun. Cardamine pusilla saxatilis montana *si non dicit*. Colum. Hoc lin.11. Vernum, quo nomine Monspelio accepimus. lin.12. & 13. pertinet ad præcedens. lin.15. hortensis: hoc Cardamidii montani verni nomine, D. Fürerus misit. lin.38. deleatur & ponatur, Thlaspi & Thlaspidium vulgare & Burfa pastoris prima, Trag. Thlaspi quod vulgo Nasturtium tectorum, Ruel. Thlaspi latifolium, Fuch. Thlaspi cardamoides, sive Nasturtiarium, Cord. Thlaspi minus latifolium, Lon. b. lin.3. pastoris 2. & 4. l.17. dele Gesn. hort. l.40. lege Thlaspi arvense Acetose folio.

pag.106. lin.3. & 4. deleantur. lin.8. dele, minus latifolium, Lonicer. l.9. deleatur. lin.11. folio, Ad. & Lobel. l.40. deleatur. b. lin.8. folio, Ad. & Lob. l.10. deleatur. lin.25. Lugdun. & Nasturtium sylvestr. Dalechampii, Eidem. lin.28. folio majus. l.30. ico. Cam. Tab. Gerar. II. Thlaspi montanum glasti folio minus. l. penult. dele capitulis rotundis. lult. Thal. qui tamen diversum describit

pag.107. lin.20. attulit. IX. Thlaspi saxatile Polygalæ foliis: cauliculis est pedalis, foliis polygalæ forma, sed longe minoribus: flosculis exiguis, albidis, thecis rotundis infractis, semine minutissimo: in saxosis circa Monspelium. lin.37. Græcum, Ad. & Lob. lin.38. Tabern. Alyssum minimum, Clus. pan. & histor. lin. ult. deleatur. b. lin.7. subjunge Thlaspi Syriacum vel Græcum alterum anguloso bifori pericarpio lentifolio, Adversaria proponunt: sed quid?

pag.108. lin.30. Lac. Lonic. Corn. (cui Medica Diofcorid.) Cord. l.36. media. Burfa pastoris sexta, Trag. minor, Gesn. lin.38. Thal. qui & alterius foliis integris meminit. b. l.31. deleatur. l.32. alfinefolia, Ad. Lob.

pag.

pag. 109. l. 2. deletur. l. 21. Myagrum Diofcoridis, Ruel. Ang. l. 24. Myagron. Dod. (& Erysimon cereale) Thall. 35. Camer. Drabe, Matth. l. 40. Prod. Drabæ ferventis vernæ nomine, Bononia Do&. Agerius attulit. b. l. 2. foliis, Paronychia altera myagri folio, Gelsneri. Cam. l. 18. Eyst. Bricourres nomine semen missum fuit. Pseudoiatisdem Alpinus nominabat. l. 26. descripta. Thlaspi nomine Norinbergâ: Lepidii, Monipelio: Myagri Montembelgardo habemus.

p. 110. l. 9. Lac. Ad. Lob. b. l. 17. Batava, Ad. & Lob. l. 18. sinuato. Cochlearia Anglica Attriplis folio, Ad. lin. 19. Britannica, Ad. Lob. Dod. Lugd. & Ger.

## NUNC ALIQUOT PLANTARUM DESCRIPTIONES ADPO-

*nere lubet: quare ad pag. 75. post Allium Pyrenaicum ponatur*

**ALLIUM** sive Moly Virginianum: foliis est gramineis angustis, palmaribus, nervosis, acuminatis, per margines nonnihil asperis, & cauliculos superantibus: cauliculis semipalmaribus, umbella ceu in Moly luteo infidet, quam flores plures purpureoærulei oblongis pediculis donati, iisque trifolii insident: at umbellæ folia bina oblonga, ut in Allii sive Moly montani speciebus, sed latiora, subsiiciuntur. Hoc Phalangii Virginiani nomine Lutetia ex horto Jo. Robini, D. Georgius Spörlinus Basileensis, Medicinæ candidatus, in hoc studio versatissimus, unâ cum aliis multis, Anno 1622. misit.

*Ad pag. 138. lin. 21.*

**BOTRYS** ambrosioides Mexiocana: radice est oblonga, fusca, capillaribus fibris cincta, intus candida: caule pedali, etiam altiore, sed cubitum non superante, eoque subrubente quandoque, rotundo, striato, pilis levissimis & rariissimis aspersis: foliis pallide virentibus, Atriplicis sylvestris vulgaris forma similibus, oblongis, sinuatis, pediculis oblongis donatis & absque ordine caulem ambientibus: ad singulorum exortum, ramuli unciales, ut in Atriplice emergunt, pluribus velut capitulis alternatim dispositis, onusti, quibus singulis foliolum exiguum subsiicitur, quibusque apertis sticuli exigui, luteoli, ut in Botry conspiciuntur, hisque semen minutum copiosumque succedit. Planta annua est, ex semine deciduo sese pro-

pagans. Et licet tota planta primo intuitu Atriplicem referat, ita ut Atriplex Mexiocana dici possit: attamen propter odorem gravem quidem, sed non ingratum & saporem aromaticum ad Cuminum accedentem: & propter florum & seminum copiam, ad Botrym referre maluimus: hocque primum nomine Parote Mexiocanum in horto Cl. Doctoris Plateri anno 1619. crevit.

*Ad pag. 141. lin. 34.*

**MILLEFOLIUM** aquaticum cornutum minus: hoc priore longè minus, quod pro radice fibellæ capillares tenuissimas habet: ex qua cauliculi palmares, pilo tenuiores quos foliola plura, etiam quovis pilo tenuiora & brevissima orbiculatim ambiunt, quæ simul juncta lentis magnitudinem non æquant: ex quorum medio pedicelli tenuissimi prodeunt: flores necdum observavimus. Hoc in fundo paludis Michelfeldensium D. Spörlinus, anno 1621. reperit.

*Ad pag. 184. inter Aconitum & Doronicum.*

**DORONICUM** Americanum laciniato folio. folia habet atrovirentia nonnihil hirsuta & aspera, in quinque lacinias divisa, quarum quælibet uncias quinque vel sex longa, duas lata, in acumine desinit & per margines profundius incisa est: rotunda tamè media in summitate trifida: caulis est rotundus, striatus, lævis, circa cujus summitatem folia ex rotunditate acuminata, non quidem laciniata, sed per margines profundius incisa: caulis summo flos magnus luteus Doronici forma, foliis luteis oblongis discum ambientibus, quare ad Doronicum retulimus: licet Aconiti Americani nomine Lutetia D. Spörlinus miserit, (ex horto Vespasiani Robini Botanici Lutetiani seduli, à quo multa nos expectamus) & ad viri altitudinem assurgere scripsit.

*Ad pag. 242. lin. 28.*

**LYSIMACHIA** lutea corniculata: planta est ramosa ad viri altitudinem assurgens, forma ad Lysimachiam latifoliam purpuream sili quodam accedens: hæc ex radice oblonga alba, digitalem crassitudinem superante, paucis fibris capillata, caulis exurgit initio rotundus, at supra medium, ob plurimos ramos angulosos, subcinerus, lævis, statim à radice in breviores, mox majores ramos, his in alios latè expansos, brachiatus, qui rotundi, paucissimis pilis donati, hinc inde maculis parvis rubentibus variegati, ex quibus tanquam ex poris pilus prodit.

prodit. Folia statim ad radicem plura, oblonga, palmum superantia, latitudine unciam vix excedentia, quæ crassa, pallide virentia, lævia, in acutum desinentia: quorum inferiora quandoque lacinata, reliqua verò obscure sinuata, per quorum medium costa alba, ut in *Lysimachia Chamænerion dicta*, excurret: ex alarum sinibus pediculus articulatus & rotundus prodit, cuius pars supra articulum triuncialis fistulosa, cui flos magnus, flavus, quadrifolius, extra folia effertur: qui cum primo florere incipit, quadrangulus est, quo aperto, verum Sole tantum lucente, in ejus medio stilus conspicitur, qui viridis ad articulum usque descendit, & apicibus quatuor sulphurei coloris, crucis in modum dispositis, donatus est, quem stamina octo circumstant, quorum quatuor singulis foliis adposita, alia quatuor ipsis interjecta sunt: hisque singulis capitulum oblongum albicans insidet: ipsi verò flori, calycis in modum, folia quatuor oblonga, angusta, pallida subjunguntur. Flos odoratus est, nonnihil ad Keiri, vel potius *Liliasphodeli* lutei odorem accedens, ultra diem non persistens, cum is qui sub vesperam aperitur, ad sequentis diei vesperam flaccescat, unde *Ephemum* dici meretur. Flore, cum pedicello ad articulum delapso, altera pediculi pars sesquiuncialis, sensim ad uncias binas, etiam ternas oblongatur & in siliquam sive corniculum abit, & propter semen copiosum, nigrum, parvumque quod continet intumescit: quod ubi maturuit, ipsa cornicula quæ utrinque ad caulis latera numerosa sunt, in quatuor partes dividuntur. Hujus semen, *Lysimachia Virginiana* nomine anno 1619. Patavio accepimus, quod Vere satum, tota æstate & hyeme sine caule remansit: at sequenti anno, circa Veris finem calefcere, & Junio florere cepit: nunc verò ex deciduo semine (annua enim planta est) autumnò delabente, singulis annis in hortulo meo copiose & usque in autumnì finem floret. *Matthioli* *Ephemum* esse suspicatus sum, sed cum nulla, nisi *Dioscoridis*, notas adposuerit, nil pronunciare licet.

Ad pagin. 258.

*LIYTHOSPERMIUM* angustifolium umbellatū: cauliculo est palmo minore, rotundo, quem folia strictissima, oblonga, nonnunquam utrinque bina, ambiunt, in cuius summitate flores quasi in umbella dispositi, cæreuli, parvi, oblongi, cavi, per ora in quinque crenas divisi. Hoc ex horto Pata-

vino, ante plures annos D. Heyl, nunc Dantisci medicus, attulit.

Ad pagin. 268.

*VIRGA aurea Mexicana*: ex una radice caules plures, nonnihil tamen reclinati, assurgunt: circa quos folia palmaria, sesquiunciam lata, crassiuscula, splendentia, in summitate tamen multo breviora: ex foliorum alis ramuli prodeunt, quibus flores saturatè lutei, sursum spectantes & unam tantum caulis partem occupantes, insident. Lutetia in horto Robini D. Spörlinus collegit.

Ad pagin. 299.

*VITIS Virginiana*: foliis est *Vitalba* nonnihil similibus, sed multo latioribus, rotundioribus & tenuioribus, viticulis suis altè scandens, & suis claviculatis arboribus comprehendens, cuius fructus corymbis hederaceis similes esse dicunt. Lutetia in horto Robini D. Spörlinus legit.

*VITIS* *Canadensis* nomine, ex eodem horto misit alterius fruticosæ plantæ folia, tria in uno pediculo, instar foliorum *Trifolii* disposita, pediculo longo glabro, foliis lætis, crassis: quod si pediculis aculei additi foret, arboris *Coral*, quam *Clusius* in Append. historiz suæ rar. plantarum descripsit, pronunciamus.

Ad pag. 414. post lin. 37.

*II. RHUS Virginiana*: arbuscula est *Rhoë* vulgari major, foliis multo majoribus, acutioribus, mollioribus & viridioribus, quorum quælibet pinna, uncias quinque & sex longa sunt, & sequetis quod ex *Tupinambault* habemus, longiora, latiora, profundius crenata & viridiora: folia verò superiora *Jasmini albi* foliis similia sunt: rami ex stipite pullulantes, tenella cervorum cornua, ex cranio modo erumpentia, referunt: similiter enim hirsuti sunt, eundem colorem, eandem figuram habent: spicam, *Rhoë* vulgari multo majorem habet. Ex eodem loco habemus.

Ad pagin. 444. b.

*PRUNO* *Sylvestri* affinis *Canadensis*: frutex est sesquicubitalis, caule lignoso, rotundo, atro-rubente cortice vestito, in ramulos brachiato: folia habet *Rutæ Hypericoidi* similia: flores, *Pruni sylvestris* floribus similes, sed multo minores, copiosos, candidos, pediculis oblongis uncialibus & capilli modo tenuibus, caliculis virentibus sustentati, insidentes; in quorum medio, filamenta plura exigua & tenuissima: flos nullo fructu

V V

succedente, Lutetia in horto Robini decidit: qui Hypericum frutescens nominat, & à Canada alatum asserit.

*Ad pagin. 432.*

**RICINUS** Americanus folio Staphisagriz: huius ramum habemus cubitalem ferè, lignosum, crassum, rufescentem & circa foliorum exortum hirsutum, quem folia pallide virentia, pediculis oblongis & hirsutis asperis donata, ambiunt: folia inferiora, ad foliorum Ficus formam nonnihil accedunt & in lacinias quinque divisa sunt: superiora verò, quæ Staphidis agriæ foliis similliora, in ternas lacinias secta sunt: omnia verò per circumterentiâ crenis acutis exasperantur & nonnihil pubescunt, ita ut tactu mollia sint: caulis summitas in ramulos aliquot villosos dividitur,

quibus flores quinquefolii, ex intensâ purpura rubentes (ut figura pictor expressit) insident. Plura non licet, cum solum ramum siccum, cum figura coloribus illustrata, Ricini Americi foliis Ficus nomine anno 1621. Verona ab insigni Pharmacopœo & Botanico, D. Johanne Pona, unâ cum aliis elegantissimis acceperimus: & quotidie, ex Illustr. & Magnifico Dn. Nicolai Contareni Senatoris Veneti, instructissimo viridario, multa pulchra & exotica, ipsius opera, accipimus pluraque quotidie ab ejusdem filio Francisco Pona, Philosopho & Medico apud Veronenses clarissimo expectamus, & non solum plantas & semina: verum etiam Naturæ *paradiſi* Parentis sui, duplici Indice ab ipso complexum, veluti nuper ad nos perſcripſit.

#### APPENDICIS FINIS.

### LAUS COGNITIONIS SIMPLICIUM.

#### ORIBASII XV. COLLECTAN. CAP. I.

*Simplicium medicamentorum & facultatum quæ in eis insunt, cognitio ita necessaria est, ut sine ea nemo rite medicari queat: ita enim magna nobis suppetit copia, & nos in quacunque temporis opportunitate medicamenta facile conſperimus. Valet enim eadem notitia ad composita remedia conſcienda: præterea verò ad eorum vires universales inveniendas, pertinet, & quod artis est apud omnes pateſcit.*

#### ARTIUS TETRAB. II. SECT. IV. CAP. LI.

*Omnium simplicium pharmacorum vires nosse oportet eum qui aliquod compositum est facturus: qui enim eas noverit, etiam eis, quæ ab aliis composita sunt, recte utetur; maxime cum indefinitè descripta fuerint.*

#### FERNELIUS IN SUA MEDENDI METHODO.

*Simplicium cognitio, collectio, selectus, expurgatio; conservatio, præparatio, correctio & miscendi industria seorsim ad Pharmacopœos referuntur, ac pertinent: quorum tamen & Medicum imprimis gnarum, peritumq; esse oportet, siquidem apud artis ministros auctoritatem, dignitatemq; suam retinere ac tueri velit, quos docere hæc ipsa debet.*

ΜΟΝΗ  
ΤΩ ΤΡΙΜΕΤΙΣΤΩ  
Θ Ε Ω  
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ  
ΕΙΣ ΑΙΩΝΑ.

# I N D E X.

Notandum ubi (a) habetur columnam primam, ubi (b) columnam secundam:  
ubi (a, b) utramque: ubi neque (a) nec (b) semper primam  
paginæ columnam denotare.



|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BARIGA</b> 109 b                                                                                                                             | <b>Acanus</b> Lugd. 180                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Gefneri</b> 88 b                                                                          | <b>caria</b> Dod. 317. villosa. ib.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Abavo</b> 414                                                                                                                                | <b>Acarna</b> ejusque species 179                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ægopodium</b> Tab. 156                                                                    | <b>Alchimech</b> Alpini 391 b                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Abelicea</b> Po- 103 b                                                                                                                       | <b>Accipitina</b> Cæf. 103 b                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Æquum</b> Gazæ 435                                                                        | <b>Alchimilla</b> 110. <b>montana</b> 152                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Abella</b> 507 b                                                                                                                             | <b>Acer</b> ejusque species 430                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Æra</b> Græcorum 9                                                                        | <b>Alcyonium</b> ejusque species 368. rubrum 467 b                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Abelmoluch</b> 432 b                                                                                                                         | <b>Acetabulum</b> Fuch. 287                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Æreomeli</b> 495 b                                                                        | <b>Alectorolophos</b> D. lechâ-<br>pii 110. <b>Ang.</b> 163 b. Plin-<br>ii 238                                                                                                                                                                              |
| <b>Abelmulch</b> Ponæ 317 b                                                                                                                     | <b>Acetofella</b> Lon. 114 b                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ærichinomene</b> 359 b. Plin-<br>ii 307 b                                                 | <b>Alexander</b> Turn. 154 b                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Abdelavi</b> Alpini 311 b                                                                                                                    | <b>Achanaca</b> Thev. 111 b                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Æthiopis</b> ejusque species 241                                                          | <b>Alfalfat</b> Avic. 330                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aberas</b> 384 b                                                                                                                             | <b>Achaovan</b> Alpi. 131 b. 134 b                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Ag. Cretensium</b> 381 b                                                                  | <b>Alga</b> Triag. 141 b. secunda<br>191 b                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Abbel</b> 488 b                                                                                                                              | <b>Achilica</b> Matth. 122. Dod. 140. <b>montana</b> Lob. 114                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Agallochum</b> 391. fgl. 498<br>b. quibuldam 102                                          | <b>Alga angustifolia</b> 364 b.<br><b>bombycina</b> 363 b. inty-<br>bacea Lugdun. 364.<br><b>latifolia</b> 364. <b>mariti-<br/>na</b> Lob. ibid. b. minima<br>Cæf. ibid. tinctoria 169                                                                      |
| <b>Abies</b> 504. <b>Dodon.</b> 493.<br><b>marina</b> 365. <b>malcula</b><br><b>Theoph.</b> 492                                                 | <b>Achilleos</b> Cæfalp. 278 b                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Agaricus arboreus</b> 375.<br><b>xatilis</b> 375 b                                        | <b>Algodon</b> 430                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Abrotanoides</b> faxea Cluf. 365 b                                                                                                           | <b>Achilides</b> 439 b                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Agaluga</b> 439 b                                                                         | <b>Alhagi</b> Rauwolf. 394 b.<br><b>manna</b> 497                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Abrotanum</b> ejusque species 156. <b>formina</b> ejusque species 156 b. <b>formina</b> ,<br><b>Fuch.</b> 138 b                              | <b>Acinaria</b> marina 366. <b>pa-<br/>lustris</b> 471 b                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Agavatus</b> Ponæ 389 b                                                                   | <b>Alypius</b> Actii Ang. 462 b                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Abrus</b> Alpini 343                                                                                                                         | <b>Acinos</b> ejusque species 224                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ageratum</b> ejusque species 221. Dod. gal. 264. <b>feru-<br/>laccum</b> 134              | <b>Alypum</b> Matth. 483. <b>mon-<br/>tis</b> Ceti ibid.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Abfithium</b> ejusque species 138. <b>arborescens</b> 136.<br><b>dulce</b> 159. <b>marinum</b> 137.<br><b>montanum</b> ejusque species 139 b | <b>Aconitum</b> ejusque species 183. <b>batrachoides</b> 182.<br><b>canidum</b> Lugd. 182.<br><b>lycoctonum</b> 182 b. <b>par-<br/>dalianches</b> ejusque species 184. <b>pardalianches</b><br><b>Fuch.</b> 167. <b>racemofum</b><br><b>185</b> b. <b>salutiferum</b> Tab. 167. <b>Gefn.</b> 154 | <b>Agiahalid</b> Alpini 479                                                                  | <b>Alisma</b> Cord. 87. <b>Lugd.</b><br><b>185.</b> <b>Cordi</b> 190. <b>Trag.</b><br>226. <b>Guil.</b> 252 b. 267.<br><b>Diof.</b> <b>Column.</b> 242. <b>Cæ-<br/>falp.</b> 244 b. <b>alterum</b> Plin-<br>ii 241. 243. <b>pratorem</b><br><b>Col.</b> 241 |
| <b>Abfith.</b> <b>Scitiphium</b> ejusque species ibid. <b>Scitiphium</b><br><b>Trag.</b> 105 b                                                  | <b>Aconitum</b> Americanum 520 b                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Agiahoris</b> Corufi 354 b                                                                | <b>Alisma botryodes</b> 186 b. 187<br><b>folioglaph</b> 188 b. <b>fyl-<br/>varum</b> Col. 241 b                                                                                                                                                             |
| <b>Abfus</b> Alpini 312 b                                                                                                                       | <b>Aconitii</b> <b>lycoctoni</b> genus<br><b>Lugd.</b> 322                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Agnir</b> Fragof. 113 b                                                                   | <b>Alyffon</b> Matth. 107. <b>Dodo.</b><br><b>201</b> b. <b>Fracat.</b> 238. <b>Col-<br/>um.</b> 230. <b>Dioic.</b> <b>monta-<br/>num</b> 249. <b>Galenii</b> Cæf.<br>230. <b>Galenii</b> Clufii 232.<br><b>Germanicum</b> <b>echioides</b><br>257 b        |
| <b>Abutilon</b> Avicena. 316 b.<br><b>Ponæ.</b> 317 b                                                                                           | <b>Acorus</b> ejusque species 34                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Agnus</b> castus ejusque species 475. <b>Scythica</b> 512 b                               | <b>Alyffos</b> Gef. 334                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Acacalis</b> Cam. 402 b.<br><b>Diof.</b> <b>Amat.</b> 486 b                                                                                  | <b>Acorus</b> Theoph. Ang. 274                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Agria</b> Anguil. 425 b                                                                   | <b>Alyffon</b> avicæ album, <b>Ta-<br/>bern.</b> 232 b. <b>major</b> Tab.<br>233 b. <b>Plinii</b> 333 b. <b>Cæf.</b><br><b>335</b> b. <b>trigonum</b> Lugd.<br>463 b                                                                                        |
| <b>Acacia</b> ejusque species 392.<br><b>altera</b> Ang. 394                                                                                    | <b>Adæza</b> Plin. 183 b                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Agriomela</b> 452                                                                         | <b>Alkacengi</b> 165                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Acacia Germanica</b> 495 b                                                                                                                   | <b>Acqua</b> potus 24 b. <b>Acuan</b><br><b>verum</b> 512 b                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Agriopastinaca</b> Belli 113                                                              | <b>Allagacy</b> 286                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indica</b> 403 b. <b>major</b><br><b>Cæf.</b> 402 b. <b>vera</b> Matth.<br>ibid.                                                             | <b>Aculeata</b> Lonic. 178 b                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Agnostari</b> Belli 21 b                                                                  | <b>Alleluia</b> Lon. 389 b                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Acacia succus</b> 496 b                                                                                                                      | <b>Aculeola</b> Gazæ 385 b                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Ahovay</b> Theteti 434 b                                                                  | <b>Alliaria</b> 110                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Acacia</b> 512                                                                                                                               | <b>Aculæa</b> molchata Cæf. 319                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Aypi</b> 91                                                                               | <b>Allioporrum</b> 74                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Acantha</b> Hipp. 392                                                                                                                        | <b>Acuta</b> spina Cæf. 454 b                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ayr</b> Hyacinthus 95                                                                     | <b>Allium</b> ejusque species 73.<br><b>anguinum</b> 74 b. <b>bicor-<br/>VV 2</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>Acanthaluce</b> Diof. 381 b                                                                                                                  | <b>Acutella</b> Cord. 389                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ayri</b> Palma 107                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Acathifolia</b> peregrina Cæf. 336 b                                                                                                         | <b>Adiantum</b> ejusque species 355. <b>album</b> Cæf. ib. <b>Lob.</b><br><b>358</b> b. <b>Tab.</b> 356 b. <b>aureo</b><br><b>Tab.</b> 356. <b>furcatum</b> Thal. 358                                                                                                                            | <b>Atawe</b> 495 b                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Acanthioides</b> Col. 379                                                                                                                    | <b>Adiantum</b> <b>nigrum</b> , Cæf. 356 b. <b>Lob.</b> 355 b. <b>Tab.</b> 355                                                                                                                                                                                                                   | <b>Aies</b> Cluf. 91 b                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Acanthium</b> ejusque species 382. <b>montanum</b> Lugd. 382 b                                                                               | <b>Adonis</b> ejusque species 178                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Auga</b> Matth. 249. <b>lutea</b><br><b>Cluf.</b> 250                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Acanthus</b> ejusque species 383. <b>Germanica</b> Trag. 378 b. <b>fyl.</b> Lugd. 376. 377. <b>vulgaris</b> 377                              | <b>Adoreu</b> Lugd. 21. <b>Dod.</b> 122                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Aizoon</b> arborefcens 282 b.<br><b>dasyphyllum</b> 283 b. <b>tele-<br/>phium</b> 109     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                 | <b>Adrachla</b> Cretenf. 460                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Aizoo</b> perfimilis Lob. 184                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                 | <b>Ægilops</b> Plinii, Trag. 21. <b>Gef</b> 9 b. <b>Matth.</b> Lob. 10                                                                                                                                                                                                                           | <b>Alabastrites</b> Lob. 322                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                 | <b>Ægilops</b> arbor 420 b                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Alaternus</b> Lugd. 476 b                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                 | <b>Ægypton</b> Cratævæ 389                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Albahaca</b> Coflæ 226 b                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                 | <b>Ægolethron</b> Plinii 189 b                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Album</b> olus Dodo. 165 b                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Alcali</b> Gef. 289                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Alcanna</b> Arabum 476                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Alcea</b> ejusque species 316. <b>Sy-<br/>riaca</b> 317. <b>Venera</b> , ib. <b>velu-</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |

- ne 74 b. caninum exiguum Tragi 43. can. L. Trag. 74 b. fluviatile, i. bid.
- Allium montanum ejusq; species 74 b. moschat. 75 b. saxatile, ibid. sylvestre 74 b. sphaerico capite 74. ulpicum Plin. 74. ursinum ibid.
- Allium five Moly Virginianum 520.
- Alnus ejusque species 428. baccifera. ibid. b.
- Aloe ejusque species 286. b. succus. 425.
- Alepecuros graminea 328. b. Theoph. Ang. 4 b. montana Lugd. 235 b.
- ~~Xirentia~~ Lon. 236.
- Alpina Gazae 429 b.
- Alfineanthemos Thal. 191 b.
- Alfine ejusque species 250. alpina Schwenck. 191 b. ejusque species. 251.
- Alfine Cæfalp. 122 b. corniculata 204 b. hederulæ 231 b. lutea 252. minima Tab. 108 b. nodosa. 251.
- Alfine hirsuta ejusque species 251 b. myosotis Lob. 254.
- Alfine palustris ejusq; species 251. petraea Tab. 285. purpurea Lugd. 205 b. tridactylites alpina 284 b. verna. 210 b.
- Alfines facie Colum. 122 b.
- Althæa ejusque species 315.
- Altitia Avicen. herba 156. succus 429 b.
- Alubias de Indias 340.
- Alum. Gallicum Scribon. 259.
- Aman 238.
- Amaracus ejusque species 224. Galeni 133.
- Amara dulcis 107.
- Amaranthus ejusque species 120. luteus 264.
- Amarella Cæf. 215.
- Ambate 417 b.
- Ambela 405.
- Ambo & Amba 440 b.
- Ambra dulcis Cluf. 224.
- Ambrosia ejusque species 138.
- Ambrosia Cord. 132. Lon. 136. alt. Matth. ibid. Taber. 137 b. montana Lugdun. 191 b. Nicandri Anguil. 76.
- Ambulon 459 b.
- Amedanus 428.
- Amelanchier Lob. 452 b.
- Anellus Lob. 267. montanus Col. 264 b. Virgilii Thal. 276 b. palustris Col. 267.
- Amygdalus ejusq; species 441.
- Amygdaloperficus 440 b.
- Aminæa 428 b.
- Amibaris Avic. 454.
- Amni ejusque species 159. parvum 154 b. quorundam Lugd. 386 b.
- Amniodes 159. Amnioselinum. ibid.
- Ammoniacum. 494.
- Amomis Clusii 413 b. Dio. Cæfalp. 484 b.
- Amomum Cord. 138. 484 b. b. Lob. 166. Germanicum. 154.
- Amomum Ang. 412 b. officin. Lob. 412. Clusii 413 b. Bonæ 423. quorundam Clusii 411 b.
- Amomū falsum Gef. 455 b.
- Amotes. 91.
- Ampeloprasum 72 b. 75. prolierum. 73.
- Amufa. 507 b.
- Anabasis Dodō. 15 b.
- Anacampteros Gefner. 287.
- Anacardium. 511 b.
- Anacok Clusii. 341.
- Anandromalache Gale. ni. 315.
- Anagallis ejusque species 252.
- Anagyris ejusque species 391.
- Ananas Lugd. 384 b.
- Anapallus 418.
- Anblatur Dodō. 11.
- Anchusa ejusq; species 255. Dod. 256. Cord. 257. degener 258. syl. Thal. 254.
- Andrian Rhafis. 480 b.
- Andrachnes Theoph. 460.
- Androsace ejusque species 367.
- Androsace Ang. 219 b. altera Matth. 251. Bellonii 15 b.
- Androsæmum Lon. 279. ejusque species 280.
- Andryala Lugd. 124.
- Anemone ejusque species 173. agrestis Trag. 178 b. alpina 177 b. corniculata 172 b. latifolia 173. limonia Gef. 49. lutea 177 b. 178. minor Lugd. 172. nemorosa 177. 178.
- Anemone pleno ejusque species 176. syl. ejusque species 176 b. 177.
- Anemone tenuifolia ejusque species 174. Cordi 178 b. Matthioli 175 b.
- Anethum 147. Col. 113 b. syl. Lacu. 148.
- Angarathi. 240 b.
- Angelica ejusq; species 155.
- Angelina arbor 440 b.
- Anguria flos 133 b.
- Anguria ejusq; species 312.
- Anil herba. 113. 342 b. 352.
- Anime 498 b. Occident. 502.
- Anisum ejusq; species 159.
- Anisomarathri Col. 152 b.
- Annona. 439 b.
- Anon Ovidi. 434.
- Anomis ejusq; species 388.
- Anonymos Garzæ 359.
- Fraxelo 408 b. Clusii 213 b. altera Cluf. 469 b. flore coluteæ Cluf. 471 b.
- Anonyma radice denrata Col. 234 b.
- Anseina Trag. 321 b.
- Antephorobium 387.
- Anthedon Theoph. 455 b.
- Anthemis 153. cranthemos Lug. 142 b. Dalech. 178. Thicph. 454 b.
- Anthemon 204 b. phylloides Theoph. ibid.
- Anthiera. 330 b.
- Anthyllis ejusque species 282. prima Diof. Cæf. 288 b. altera Cluf. 249 b. altera Cæf. 267 b. altera Lugd. 289. montana Lugd. 213 b. falsa Cam. 289.
- Anthyllis altera Dod. 347. Lob. 486 b. claviculata Lugd. 351. leguminosa Lob. 332 b.
- Anthyllodes Thal. 289. minor. 282 b.
- Anthora 184. Avicennæ 36.
- Anthriscus Lugd. 152 b.
- Antiphates Lob. 366. Ponnæ 366 b.
- Antirrhinum ejusque species 211. Diof. Cæf. 250. Tragi. 100.
- Antonii herba Gef. 245 b.
- Antophylli 411 b.
- Aparapo 184 b.
- Apargia Dalech. 127 b.
- Aparine ejusq; species 334. major Plin. 257 b.
- Aparine 334. lavis Thal. 335 b.
- Apate Dalech. 130 b.
- Aphaca ejusq; species 344.
- Lob. 145.
- Aphace Theoph. Lob. 126 b.
- Diof. Dod. 345. Plin. 126 b.
- Apharaca Theoph. 476 b.
- Aphyllantes prima Lugd. 92 b. Lob. 209 b. Ang. 262. Dod. 377.
- Aphroscorodon Gef. 74.
- Apiastrum Cord. 184.
- Lob. 228.
- Apios Fuch. 344. Tur. 162.
- ejus species. 395.
- Apium ejusque species 155. cicutarium 161. montanum Gef. 150 b. sylvaticum Thal. 150 b. sylv. Dalech. 152 b.
- Apocyma. 504.
- Apocynum ejusque species 302. Amati 311. latifol. Cluf. 294 b. Diof. 301. Syriacum Cluf. int.
- Apollinaris. 109.
- Aque ligna in lapide vertentes 427 b.
- Aquifolia vulgo 427 b.
- Aquifolium Plinii ibid.
- Aquilegia ejusque specio 144. minor Lugd. 740.
- Aquila Brava 298.
- Arabis Dod. 106 b. Mart. 109.
- Araboutan. 37.
- Aracinappil. 457.
- Arachida Cæf. 810.
- Arachyda Belli 345. lum. 344.
- Arachidna 908. Theoph. Cluf. 167.
- Aracle potus. 247.
- Arachus ejusq; species 247. Fuch. 338 b. latifolius Dod. 351.
- Aracus Cæf. 345 b. Dod. 344. Matth. 342. Tab. 345.
- Aralda Gef. 241 b.
- Arantia marina 309 b.
- Aratoucon fructus 400 b.
- Arbor aquam fundens 92 b.
- Arbores admiranda 325. pediculus fuliginosus 93. anatifera 513 b. filiquis ferentes 404. venenosa 512.
- Arbor Brasilia 391. cristifolia 465 b. contrarium facult. 457 b. contra fluxum 408 b. Cochinnile. 451 b.
- Arboris cortex ad theumaticos 427 b.
- Arbor paradyza 427 b. peregri. ex Guineæ 427 b.



- 461 b. Laurocerasi fol.  
ibid.  
Arbor piperis 455 b. pudica 512 b. rupiurans curans  
458 b. sancta 416 b. sine foliis  
411  
Aibor tinctoria 408.  
trifl. 469. vitæ 488. vitis  
401 b  
Arbor de rayz. 458. cryphi-  
pelas curans 399 b. ery-  
nifera 503. foliis ambu-  
lantibus 512 b. finium  
regundorum 419 b. fer-  
tida 428 b  
Aibor Goa 458. Indica  
Straboni 458. Iudæ  
Bellon. 402. Magella-  
nica 461 b. Nepal 458  
Arbutus ejusque species 460  
Archangelica Cæf. 93. Ta-  
berti 555 b. Cluf. 556 b.  
Lob. 231  
Atrium Cord. 198  
Atrifoliosodon Gef. 74  
Atrifolius Pon. 240 b  
Atrifrigi Avic. 480 b  
Atea, Linfcoet. 286  
Atea 510  
Arepas panis 25 b  
Aigemone ejusque species  
172. Trag. 171 b. Tab. 178  
Aigemone altera Fuch.  
321 b  
Aigemonia Plinii 133. 321  
a. b  
Argentaria petraza Gef. 126  
Argentilla Thal. 164 b  
Argentilla Lob. 321. Tab.  
248 b  
Aria Theoph. 452  
Ariena pomum 507 b  
Arisarum Matth. 195. ejus-  
que species 196  
Aristolochia ejusque species  
307. rotunda vulg. Trag.  
143 b. rot. vulg. similis  
Trag. 178 b  
Armeria ejusque species 208  
b. fyl. 210  
Armoraia Tab. 95 b  
Brunf. 96 b. Plinii Lac.  
97  
Armoraia Lob. 205 b  
Atrabium 35  
Aromata 407  
Atraguro 507-510  
Athemisia ejusque species  
137. marina 139. mo-  
reolones 132. polyco-  
nós 131. tenuifolia Fuch.  
135. secunda Cluf. 136.  
Turcica 138  
Athanica 308  
Arthetica Pandect. 260  
Arthetica Thal. 333  
Arthetica Cam. 241  
Atrif vulgo 274 b  
Atrifchochi 383  
Atrifchochi sub terra 277 b  
Atruro Costuli 350  
Arum ejusque species 195.  
Ægyptiacum 196. pa-  
lustr. Gef. 195 b  
Arundinacea pinnata Lob.  
387 b  
Arundo ejusque species 17.  
Indica Guiland. 17 b.  
ejus species 18. litho-  
spermos Gef. 258. mini-  
ma Lugd. 56. sacchari-  
fera 18 b. versicolor i-  
bid. volubilis 19  
Afa 156. foetida 499 b  
Agrimia Matth. 197 b. Lob.  
136 b  
Afarum 197. muri Lugd.  
259 b  
Afcalonitis Cæf. 72 b  
Afcabra magnum Mef. 290  
Afclepias ejusque species  
303  
Afcyrum Cord. 279. ejus  
species 280  
Afcolimbro Bellon. 384  
Afcopo arbor 409 b  
Afcouzenas Lob. 155  
Afpalathus ejusque species  
392 & 394  
Afpargus ejusque species  
489  
Afperrula ejusque species  
334. muralis Col. 334 b  
Afperrugo Plinii 334. Dod.  
237 b  
Afpodelus ejusque species  
28. foemina Fuch. 77 b  
Galenii 70 b. liliaceus  
Tab. 80  
Afpplenium Matth. 354 b.  
fyl. Trag. 359  
Afa five Tamarindi 403 b  
Alter Articus ejusque spe-  
cies 266. luteus alter,  
Lugd. 266. cernuus, ib.  
cæruleus Cluf. 267. co-  
nyzoides Lob. 266 b.  
Peruanus 277 b. purpur.  
Fuch. 267. non atticus,  
Trag. 167  
Alterius Rhafis 415 b  
Aftenas 251  
Afttragaloides Dod. 352.  
heibar. Lob. 349 b  
Afttragalus ejusque species  
351. Lugd. 344 b. Colum.  
351. Monteff. 349  
Afttrantia 156. nigra 132  
Athanafia 136  
Atragene Theoph. 300  
Attaçtylis ejusque species  
378. Matth. 379 b. Cy-  
pria Lugd. 379 b. marina  
384. fyl. Trag. 379  
Attriplex ejusque species 119.  
fyl. 118. 119. maritima  
120  
Avati 25  
Avellana ejusque species  
417. Indica 509 b. Me-  
xiocana 442. purgans  
418 b  
Avena ejusque species 23.  
Græca 10. nigra ibid.  
sterilis ibid.  
Avicularia 215  
Avornus 428 b  
Aurantia malus 436  
Aurea mala 167 b  
Aurelia Gazæ 264  
Aureum malum 436  
Auricula Judæ 372. lepo-  
ris Cæf. 287 b. Gef. 278 b  
Auricula muris ejusque spe-  
cies 262. muris Dod.  
Trag. 254. Camer. 323 b.  
Col. 263 b. Cæf. 246 b.  
249. major Trag. 129  
Auricula urfi ejusque species  
242  
Azubus 460 b  
Axi 102  
Azarolus 454  
Azavar 286  
Azedaræth 415  
B  
Bacca orientale 511 b.  
ex Virginea 472  
Baccharis Alpini 266.  
Dioscor. 238. Monfpel.  
265. Rauwolf. 264  
Bacheku 91 b  
Bagolæ Cæf. 412 b. 470  
Bagolarus Guil. 447  
Baharas 512  
Balador 511 b  
Balanus myrepfica 402  
Balaustia 438 b  
Ballore 230. crispa 231  
Balfamum ejusque species  
400. alpinum 468  
Balfami fructus 407. 418 b  
Balfamina agrellis Trag.  
228  
Balfamina ejusque species  
306. altera Col. 307 b.  
minor 221  
Balfamita, Brunf. 226. of-  
ficinar. Eyt. 228  
Bambus 18  
Bamia 317 b  
Banam 508  
Bangue 320  
Baobab Alpini 434  
Baptifcula 273  
Baracocca 442  
Barba capræ ejusque species  
163. capri Cæf. 183 b.  
hirci 274. fylvana Cæf.  
194  
Barba caprina minor Gef.  
336  
Barba Jovis 390. Cæf. 397  
Barbarea 98 b. minor 101  
b. muralis 101 b  
Bardana 198  
Baryococcalon 168  
Bafilicum ejusque species  
225. fyl. 204. aquati-  
cum 129 b  
Baran 434  
Baratas 91  
Barthleſchia 167 b  
Baticula 288. Batis 288  
Batie Indi 311 b  
Batrachion Apuleii Dod.  
179. Cluf. 180  
Bavanus 508 b  
Baucia 515 b  
Baxama 512  
Bdellium 503. ejus fructus  
510  
Beccabunga 252 b  
Bedegur 483  
Bedengian 167 b  
Been album Gef. Dod. 205  
Been rubrum quibuldara  
165. officin. Guil. 192.  
quibuldara 205 b  
Behen albū & rubrum A-  
rabum 235. Anguil. 151 b  
Beidelſar Alpini 116  
Bella donna 166  
Bellan Lugd. 388 b  
Bellevidere 212  
Bellis ejusque species 261.  
cærulea 262. lutea ejus-  
que species 162 b. lutea  
Dalech. 205 b. Plinii  
176 b  
Belmulcus Ægypt. Ponæ  
317 b  
Belzoinum 503  
Benedicti Trag. 321 b  
Ben Judeum 503. magnū  
Monard. 418. parvum  
Mon. 402 b  
Ber 433 b. Acoftæ 499 b  
Berberis ejusque species 454  
Bererinus fructus 461  
Bernacles 513 b  
Berula Tab. 252 b  
Beſhafe Avic. 408 b  
Beta ejusque species 117.  
fyl. Cord. 191. Plinii 192  
Berella 410  
Betonica ejusque species  
235. altit. 206. aquati-  
ca 235 b. 236. foetida  
236 b. fyl. Fuch. 209 b.  
VV 2

# I N D E X.

- 210 fyl. Pauli **Quadramio** 231 b  
**Betonica** Pauli **Dod.** 246 b  
 Cam. 247  
 Betule 410  
 Betula 427  
 Betulus 427 b.  
 Bezugo 300  
 Bezardica radix 14  
 Bibimella, Cætalp. 191  
 Bides, Cæf. 321  
 Bisfolium 87. **Lonic.** 304 b  
 Bifia radix 239 b  
 Bifermas Cam. 238  
 Bislingua 305  
 Bismalva 315  
 Biflora ejusq; species 192  
 Bixa Ovied. 419 b  
 Blattaria ejusque species 240  
 Blatterlos Holand. 484 b  
 Blitum ejusq; species 118.  
 Indiciu 120. **Pernanum** 121  
 Bolbonach 203  
 Boleri quercus 422 b  
 Bolanbac 433 b  
 Bombax 410. humilis 263  
 Bon vel Ban 428 b  
 Alpini 474 b  
 Bonannas 308  
 Bonduch Ponæ 309 b  
 Boniama 384 b  
 Bonifacia 305  
 Bonus hentricus 115 b  
 Bona Dod. 338. fyl. 388 b  
 Boramez 312 b  
 Bioræ 446 b  
 Borda 289  
 Borrage 256. minor fyl. Colum. 257 b. minima Lugd. 259 b  
 Botryorubrum 191 b  
 Botrys ejusq; species 138  
 Botrys ambrosioides Mexiocana 520  
 Bourgepine 476 b  
 Brabyla 443  
 Branca ursina 157. Italica 383. aculeata 383 b  
 Brasilium arbor 393  
 Braccia ejusq; species 110. fyl. ejusq; species 112. marina 295. spinola 111 b  
 Braccia Murciana 359 b  
 pratensis Lon. 376  
 Bresma 412 b  
 Brindones 434 b  
 Bryon Plinii 422 b. ladicæ fol. is Lob. 364  
 Bryonia ejusque species 297  
 Britannica Plinii 191  
 Ang. 242 b. Cam. 217. Gein. 110. Gelferi Lob. 255 b. quorundam 235 b  
 Briza 242 b  
 Bromos 9 b. 10 a  
 Brunella ejusq; species 260  
 Italica 234 b  
 Bruthaer 434 b  
 Brufcus 470  
 Bubonium Hipp. 159. luteum Tab. 266 b  
 Buccinum Dod. 142 b  
 Bucanion Cordo 212  
 Buens nochos fructus 295  
 Buglossum sativum ejusq; species 256. fyl. **Lonic.** 234. fyl. ejusque species 255 b. echinoides 128 b. rubrum Lon. 255  
 Bugula Dod. 260  
 Bulapathum Fracast. 192  
 Bulbus æstivus 47. coronarius 43. crinitus 48 b. ciuctus Hipp. 76 b. elculentus 42. 43. leucanthemus 70. follequi 70  
 Bulbus eriophorus ejusque species 47. lanatus Cæf. 48  
 Bulbus fyl. Cæf. 43. fyl. bifolius Gelf. 45 b. Gelf. 52 b. Fuch. 71. unifoli? Cluf. 56 b. Lug. 183. vomitori? Matth. 43. Lon. 45 b. 46  
 Bulbine Plinii 42. 43  
 Bulbocattannum ejusq; species 162. coniophyllon Cam. 161 b  
 Bulbocodion Theoph. 32 b  
 Buna 428 b  
 Bunapalla 408  
 Buncho Avic. 432 b  
 Bunias 95. adulterin 99  
 Bunium 162. Dalech. 150 b  
 Bupththalmum ejusq; species 134. Fuchii 135 b. ellebori species Dod. 186. Lon. 261  
 Bupleurum ejusq; species 278. Nicandri 157. Plinii 159. Hippoc. 164. a. b. angustifolium alpinu 277 b  
 Burfa pastoris ejusque species 108. minor 105 b  
 Burfa marina Cæf. 368 b  
 Bufelinon Plinii 132  
 Butomus Ang. 194 b. Cæf. 12 b. Cluf. 34 b. Dod. 15 a  
 Buxus 471  
 C.  
 Acalia ejusque species 108. Diofcor. quorundam 277. **Lonic.** 304  
 Cæzio Guil. 442 b  
 Cacavate 442 b  
 Cachi arbor 492 b  
 Cachos Indorum Lugd. 168  
 Cachrys marinum Cam. 288 b  
 Cachrys verior Lob. 158  
 408  
 Cacubulum Plinii Ang. 166  
 Cadegri Indi 410  
 Cajahaba 438 b  
 Caiova brassica 111 b  
 Caious 512  
 Cairini 492 b  
 Cakile Serap. Lob. 99 b  
 Calaf Alpini 474 b  
 Calamagrostis Tri. 4. 12 b. Lugd. 12 a  
 Calamintha ejusq; species 228. aquatica Tab. ibid. montana Trag. 225.  
 ocimoides Tab. 227. ter. tia Fuch. 266  
 Calampart 393  
 Calamus aromatic 54. Indicus 18 b. Peruvianus spin. 387 b  
 Calathiana verna Lugd. 188  
 Calceolus Mariæ Lob. 187 b  
 Calceatrepola Cæf. 387  
 Calcifraga Lob. 288  
 Calendula ejusque species 275. alpina Ger. 185  
 Calchimathia Ang. 222  
 Calla Plinii Dalech. 195. 196 b.  
 Callyonimus Gelf. 304  
 Callicrithæ Plin. Col. 362  
 Caltha ejusque species 275. alpina Gein. Taber. 185.  
 Africana 132 b. palustris Cluf. 276 b  
 Camaiinnas 486 b  
 Camaronu Rhafis 293 b  
 Camelina Dod. 109  
 Camiri fructus 406 b  
 Camolanga Cluf. 311 b  
 Camotes Cluf. 91  
 Cæctus Theoph. 383 b  
 Campanula ejusq; species 93. arvensis Dod. 215. alba fyl. 294. autumnalis Dod. 188 b. cærulea 295. Indica 295 b. lactescens Cluf. 93. lutea linnifolia Lob. 214  
 Campanula hirsuta ejusq; species 94. fyl. Triagi 243. 244  
 Camphora 500  
 Camphorata Lob. 486.  
 Cæfal. 221. quorundam 238 b  
 Canacorus 19 b  
 Canada 297 b  
 Canaria Plinii 1. Plinii Ang. 1  
 Cancannum 498 b. Græcorum 499  
 Canella ejusque species 16  
 Canior 16  
 Canna Ang. 17. Indica ib. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. mellea ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 311. sagitivoma 19 b  
 Canna fistula 401  
 Cannabis ejusque species 320. fyl. Lob. 232 b. Angul. 316  
 Cannabina aquatica Lob. 320  
 Cantabrica Plinii Ang. 93 b. Turn. 207. Cæf. 295 b. fyl. Turn. 209 b  
 Caovaporus 428 b  
 Capillus Veneris verus 355. Tragi 356  
 Capnos 143. Plinii 178 b  
 Capotes fructus 428 b  
 Capparis ejusque species 430. Alpini 266  
 Capparis fabago 480 b  
 Caprago Cætalp. 312  
 Caprificus 457 b  
 Caprifolium ejusq; species 302. ter. Dod. 431 b  
 Capriola Leonie. 1  
 Capsici ejusq; species 102. rotundum Lugd. 167 b  
 Caput caicis vel vituli 211  
 gallinac. Lob. 350. monachi 126 b. Gelf. 347  
 Caputium, Cord. 111  
 Carambolas 437 b  
 Carandas 450 b  
 Caranna 505 b  
 Carcapuli 487  
 Cardamine 104. alpina 104 b. 105  
 Cardemomum ejusq; species 413. Arabum 102. Lacu. 146  
 Cardesradix 918  
 Cardi 418. fyl. ibid. b.  
 Cardica 230. melica 229 b  
 Cardiopermon Tab. 348  
 Cardones Cæf. 583 b  
 Cardopatum Gelf. 380  
 Cardus ejusque species 376  
 Carduus acaulis Lob. 380 b. aculeatus Marth. 383 b. æreophyl. Lugd. 382 b. Arabicus 385. avenarius 377 b. aven. Lon. 380  
 Carduus 376



# I N D E X.

- Lon. **385** b  
 Carduus benedict. **378** b.  
 bulbosus Lob. **377**  
 Carduus chondrilloid.  
 Lugd. **385** b. chrysanth.  
 Dod. **384**.  
 Carduus eriocephal. Dod.  
**382** b. exorici **384**  
 Carduus ferox Lugd. **379**  
 b. fullonum ejusq; spe-  
 cies **385**  
 Carduus hortens. **381** In-  
 dicus **438**. lacteus **381**.  
 lanceolatus Tab. **385** b  
 Carduus Mariæ **381**. Mo-  
 nardis **387** b. monstro-  
 fus **379** b. muricatus  
 Cluf. **387**  
 Carduus mollis ejusq; spe-  
 cies **377** b. pitahaia  
 Lugd. **374**. pratensis **376**  
 Carduus sanctus **378** b.  
 fyl. Cæf. **382**. fyl. Dod.  
**385**. foliolaris **387** b  
 Carduus sphærocephalus  
 ejusque species **381**. spi-  
 nosus. ejusque species  
**385**. stellatus ejusq; spe-  
 cies **387**. stellatus Lob.  
 272  
 Carduus tomentos. **382**.  
 vulgaris Marth. **379**  
 Carduncellus **386**. Cæf. **331**  
 Carex 11b. Lon. 6b. **15**.  
 alter Lon. **12** b. Lugd. 6  
 Caryophyllata ejusq; spe-  
 cies **321**. Veronensium  
 243 b  
 Caryophyllus ejusque spe-  
 cies **207**. barbatus ejus-  
 que species **208** b. 209.  
 carthusian. **208** b. 209.  
 cæruleus ibid. b.  
 Caryophyll. hortensis sim-  
 plex ejusq; species **208**.  
 arborescens ibid. b. vir-  
 gineus Tab. ibid. b.  
 montanus Lob. 211. pu-  
 milio Cluf. **206** b  
 Caryoph. holostius ejusq;  
 species **210** b  
 Caryoph. Indicus ejusque  
 species **332**. Saxatilis e-  
 jusque species 211. sim-  
 plex laciniatus ejusque  
 species **209** b  
 Caryophyll. fyl. ejusq; spe-  
 cies ibid. prolifer ibid.  
 Caryophyll. aromatic. **410**.  
 Plinii Imper. **412** b  
 rorata **306**. 309.  
 rufina humilis Col. **380**.  
 syl. **379**  
 nabadium **146**  
 obe **402**  
 Carolus sanctus **298** b  
 Caros alpinum Gef. **148** b  
 Caiota Matth. **351** b  
 Carpesium æf. **410**. Cæf.  
 164. Cordi **412** b.  
 Lonic. **412**  
 Carpinus Lugd. **431** b  
 Marth. **427**. nigra ibid.  
 Theoph. Trago **428**  
 Carpopallium **400**  
 Carthamum offic. **378**. fyl.  
 Cæf. **379**  
 Carvi ejusq; species **318**  
 Carvifolia ibid.  
 Cassia Marth. Tab. **463**. La-  
 tin. Ang. 217. Latin.  
 Guil. **396** b  
 Cassia alba Dalech. 216. ni-  
 gra Dalech. 217. poëti-  
 cal Lob. **212** b  
 Cassiavi radix **91** b  
 Cassia **408** b. **409** b. fistu-  
 la **403**. nigra Dod. ibid.  
 lignea Cæf. **212** b  
 Cassida Col. **231** b  
 Cassina **270** b  
 Cassutha Fuch. **219** b  
 Cassia Gaze **313**  
 Cassanea ejusque species  
**428**. equina **419**. purga-  
 trix **419** b. Indica **412**  
 Cæstrangula **235** b  
 Catantæ am. **287** b.  
 Cæf. 306 b. 307. Imper.  
 190. Lugd. **131** b. **344**  
 Ruw. 189 b. Tab. **100**  
 Cataputia major **432**. mi-  
 nor **293**  
 Cate Acostæ **479**  
 Cateconier **286**  
 Cattagaua. **497** b  
 Cattaila Dod. **228** b  
 Cauleales ejusque species  
**152**. Bellon. **161**  
 Caucasus **75**  
 Caucon Ang. **15**  
 Cauda equina **16**. muris  
**100** b. vulpis Lob. **4** b.  
 vulpina Bellon. **328**  
 Caulis capitulatus Trag.  
 311  
 Caulorapa ibid.  
 Cautiorfructus **407**  
 Caxumba **37** b  
 Cazabis panis **91**  
 Cæzars Garz **14** b  
 Ceanothus Theoph. Lugd.  
**377**. Spina Theoph. **455**  
 Cedria **501** b  
 Cedrum mel Hipp. **487**  
 Cedrus **393** b. bacciteria  
**487**. Lycia Marth. **488**.  
**489** b. phœnicia Lob.  
**487**. Marth. **489**  
 Cedrus conifera **490**. Li-  
 bani **491**  
 Cedrula Gef. **489** b  
 Cefalioni **307**  
 Ceibas **313**  
 Celape **298**  
 Celastus **476** b. **477**  
 Celosia Tragi **121** b  
 Cemos Plinii **264**  
 Centaurium aquaticum  
 Gef. **279** b  
 Centaurium majus **117**.  
 muror. Gef. 279. northu  
 Lugd. 270. pratense  
 Gef. **271**  
 Centaurium minus ejusq;  
 species 278. min. visco-  
 sum **204** b  
 Centauroides Thal. **235**  
 Centella **300** b  
 Centeria Theophr. Cæfal.  
**286** b  
 Centimorbia Gef. **309** b  
 Centinervia **189**  
 Centonia Gef. **136** b  
 Centrum galli. **238**  
 Cæromyrini Theoph. **470**  
 Centumgrana **282** b  
 Centunodia Brunf. **281**  
 Centunculus Cæf. 250. 251  
 Americanus 263. Plinii  
 Ang. **295**  
 Cera ejusq; species **71**. a-  
 kalonia 72. festilis ibid.  
 Ceraea, Dod. 252 b. Marth.  
 288. Panceii **287** b  
 Cera Hispanica **429**  
 Cerasus ejusq; species **449**  
 racemosa **450** b  
 Ceratia Plinii Col. **328** b  
 Ceratonia **402**  
 Cæris Theoph. 429 b. si-  
 liquata Theoph. **402** b  
 Ceretolium magnum **160**  
 Cæritia æf. **235**  
 Cærus spinosus **458** b  
 Cerinthe ejusq; species 258  
 Cæronia Theoph. **402**  
 Cære\* ejusq; species **420** b  
 Cerrofulago **424**  
 Cervaria Gef. **248**  
 Cerviboleetus Marth. **376**  
 Cervicaria **24**  
 Cervipina **478** b  
 Ceterach Cæf. 354. 359 b  
 Cevadilla Monar. **23** b  
 Chaa in Iaponia **147** b  
 Chærophyl. ejusq; spe-  
 cies **152**  
 Chaia Alpini **311** b  
 Chalcei Plinii Lugd. **165** b  
 Chalcios Cluf. **388** b.  
 Lugd. **381**  
 Chaleb Gef. **474**  
 Chalier Bellon **473** b  
 Chamaetia Oryza **24** b  
 Chamæaste **456** b  
 Chamæbalan\* Tab. **344** b  
 Chambeat\* **326**. Theoph.  
**479**  
 Chamæcalamus **17** b  
 Chamæcerasus 450 b. al-  
 pigena Lob. **431**. petrea  
 Gef. ibid.  
 Chamæcypris Tab. **360** b  
 Chamæcistus ejusque spe-  
 cies **445**  
 Chamæcitinus Gef. **304**  
 Chamæclema Cordi **306**  
 Chamæcissus Fuch. ibid.  
 spicata Plinii **260**  
 Chamæcypris Plinii  
 Trag. **136** b. Dalecham-  
 pii **177**. agrestis **138**. Plin-  
 ii quorundam **212** b  
 Chamaedaphne Ad. **462** b  
 Brunf. 301. Diof. 304.  
 Col. **305** b. Marth. **462**  
 Chamædrys ejusq; species  
**248**. allurgens **247**. laci-  
 niata **138** b. scutellata re-  
 pens **249**  
 Chamædrops Lugd. **248**  
 Chamæcicus **457** b  
 Chamæclix Lob. **358**  
 Chamægellianum **398**  
 Chamægenista ejusq; spe-  
 cies **395**  
 Chamæziris ejusq; species  
**33**  
 Chamæzira **474**  
 Chamaelæa Trago **462**.  
 vera Marth. ibid.  
 Chamaelæagnus **414** b  
 Chamaeleon ejusq; species  
**379**. Monfpe. Lob. **381**.  
 niger Fuch. 381. Tab.  
 390 b. Septentrio. Col.  
**380** b. verus Lugd. ib. b  
 Chamaeleon non aculeat.  
 272 b  
 Chamæleuce Ang. **276** b  
 Cordi **395** b  
 Chamælinum **214** b  
 Chamæmelum ejusq; spe-  
 cies **135**. Chriftanth. Fuch.  
 134 b. eranthem. Fuch.  
 132 b. Dod. 178 b. mini-  
 mum Dalech. **134** b  
 Chamæmefpil\* Cordi **452**  
 Chamæmefrile Lugd. **215**  
 Chamæmoly Col. **73**  
 Chamæmorus **419** b. **480**  
 Chamænerion **245** b  
 Chamæorchis Lob. **84** b  
 alpina **81** b  
 Chamæpericlymen. **302** b  
 Chamæpuce Ang. **415**  
 Cordi **467** b. Gef. **360** b.  
 Lugd. **486**  
 Cha-

- Chamæpitys ejusq; species  
 249. Brunf. 248. Ber-  
 tholio 271. altera Dod.  
 138 b. altera Diof. Lob.  
 284. fruticosa Cretica  
 Belli 271. vermiculata  
 282 b  
 Chamæpyxos 471  
 Chamæplatanus 456 b  
 Chamæriphe 507  
 Chamærhododendros 468  
 a, b  
 Chamærops Plinii, Lugd.  
 247 b. 507  
 Chamærubus 479 b  
 Chamæschenos 12 b  
 Chamæfyce Dalechampii  
 282. herbarium 193  
 Chamæfyce arbor 457 b  
 Chamæpartii Trag. 391 b  
 Chamæ 410 b  
 Champe 470  
 chappowr 314 b  
 charamaïs 491  
 charantia Dod. 306  
 charunfel 410  
 chate Alpini 310 b  
 chaubeporus 428 b  
 chelape 298  
 chelidonium majus 144.  
 capitis 143, 144. minus  
 309. palustre Cordi  
 276 b  
 chenopoda Belli 394 b.  
 Plinii 490 b  
 chenopodium Tab. 119 b  
 chermæfel 483 b  
 chermes Arabum 159 b.  
 499. officin. 425  
 chichaporus 25 b  
 chicocapores 435 b  
 chymeni 100 b  
 china ejusq; species 295.  
 spuria Lob. 34 b  
 chironia Cæf. 466  
 chiuef 457 b  
 chlorosticton Gef. 358 b  
 chocolate potus 442 b  
 chondrilla ejusq; species  
 130. bulbosa, ibid. cæ-  
 rulea 130 b. foetida, ib.  
 Græca, ibid. viscosa 139  
 chondrilla altera Diofcor.  
 Lob. 126 b. Galeni Ang.  
 ibid.  
 chondrilla-tragopogonan-  
 themos Thal. 274  
 chonidretos gummi 500 b  
 chrysea Lugd. 307 b  
 chrysanthemū ejusq; spe-  
 cies 134. Lob. 275. la-  
 tifolium Dod. 185. lit-  
 toreum Lob. 288 b. ma-  
 rinum Lob. 131. Peru-  
 anum Dod. 276 b. sege-  
 tum Lob. 262 b. sim-  
 plex Fuch. 179  
 chrysanthemis Ad. 466 b  
 chrysis Plinii 364 b  
 chrysippe Plinii 235  
 chrysobalanos Gal. 407  
 chryfcome Diofcor. 98.  
 Diof. Columnæ 213.  
 Germanica Lob. 263 b  
 chryfologonum Penæ 324  
 chryfolachanum Dod. 115  
 b. Plinii Rucl. 124 b.  
 peregrinum 264  
 chryfolenium Taberna-  
 mont. 309 b  
 christophoriana 183 b  
 chulem Gazizæ 2 b  
 chunno panis 167  
 cyanus ejusq; species 273.  
 274. Plinii colum. 131.  
 angustifolius 271. fruti-  
 colus Ponæ 412 b. Syl.  
 minus 269 b. spinosus  
 273 b  
 cynaoides Tab. 274 b. flos  
 Dod. 272  
 cibago 491 b  
 ciccaria fructus 492 b  
 cicier ejusq; species 347.  
 arietinum Trag. 342.  
 astragaloides Ponæ 351.  
 erivum Lugd. 343.  
 orobæum, Lob. 346  
 cicera Lugd. 344  
 ciccebia 123. Cordi 124  
 cicercula Cæf. 344 b. Æ-  
 gyptiaca Cluf. 344 b  
 cichorium ejusq; species  
 125. bulbosum Dalech.  
 130. constantinopolit.  
 Marth. 126 b. dulce Col-  
 umn. 124 b. globulare  
 Imper. 192. spinosum  
 126. strumosum Myco-  
 ni 130. verrucatum  
 Marth. 130  
 cichoriū syl. luteum ejusq;  
 species 126  
 cici 432  
 cicla 117  
 cyclamen ejusq; species  
 108. uno folio Dalech.  
 304 b  
 cyclaminus altera Diofcor.  
 167. Ghini 250 b. alte-  
 ra Lob. 305 b. cistanthe-  
 mos Diof. 297  
 cicuta ejusq; species 160.  
 maxima, Eyster. 154 b  
 cicutaria ejusq; species 161.  
 odorata 160  
 cidromela 435  
 cyle Oviedo 430 b  
 cymbalaria 306  
 cuminagero 146 b  
 cymium bulbosum Plinii  
 Col. 162. equinum Trag.  
 158 b  
 cynagrostis 1  
 cinamomum ejusq; spe-  
 cies 408. veterum 409 b  
 cynanthemus Lob. 135 b  
 cinara ejusq; species 383  
 cinnabarium 499  
 cineraria 131  
 cynocephalus Plinii Lugd.  
 211  
 cynocephalea Guil. 512 b  
 cynocrambe Cæf. 119 a, b.  
 Loniceri 392 b. Marth.  
 122. legitima; ibid. b  
 cynoglossum ejusq; spe-  
 cies 257. Marth. 255.  
 Tragi 257  
 cynoglossum montanum  
 ejusq; species 258  
 cynog. minor Brunf. 254 b.  
 quorundam 139 a, b  
 cynomorion Plinii 87  
 cynops Theoph. Gef. 191 b  
 cynorrhodos Plinii 483.  
 polyacanthos Lug. 483 b  
 cynosbatus Diof. Ad. 483.  
 Theoph. Trag. 454 b  
 cynosorchis ejusq; species  
 80. dracontias 80. mi-  
 litaris ejusq; species 81.  
 macrocaules 85 b. palu-  
 stis 86  
 cynospathos terrestris 512 b  
 cyperella cordi 2 b  
 cyperus ejusq; species 13.  
 Babylonicus corn. 35 b.  
 esculentus 14 b. grami-  
 nea 6 b. Indicus 16. 37.  
 longus & rotundus 14  
 cypote Cluf. 496  
 cyprus Diofcor. Trag. 475 b.  
 Græcorum 476. Do-  
 don. 476 b  
 circea Diofcor. Cæf. 102.  
 Lutetiana Lob. 186 b.  
 Montpellier. Lob. 167. Tra-  
 gi 121  
 cistium Italicum Fuch. 256  
 cistium ejusq; species 377.  
 luteum Lob. 379  
 cistis ejusq; species 464  
 cistis ledon ejusq; spe-  
 cies 467. Silefiacus 468  
 cytinus 437  
 cythius ejusq; species 389.  
 Colum. Cam. 332. Tra-  
 gi 328 b  
 citrargo Cæf. 229  
 citrangula 431 a, b  
 citreolus Cæf. 310  
 citrullus 312  
 citrus 435  
 clavi filiginis 21 b  
 clematis daphnoides ejus-  
 que species 301. Æg-  
 yptia Plin. 302 b. cæcula  
 398. minima 143 b  
 clematidis ejusq; species  
 300  
 cleome Ostarvii Ang. 101  
 clymenon Diof. Columnæ  
 275 b. Columnæ 217 b.  
 Italorum Lob. 280 b  
 clymenon foetima Gef.  
 236. mas Gef. 235. mi-  
 nus Lugd. 236 b. Marth.  
 344. quorundam Lob.  
 300 b  
 clinopodium Cæf. 218 b.  
 ejusq; species 224. al-  
 pinum Ponæ 247 b  
 cneoron album Lugd. 461  
 b. Theoph. 462 b  
 cneoron Cæf. 463 b. Galeni  
 Ang. 462 b. Marth. 201  
 b. 463. Theoph. 217. 46  
 cnicus ejusq; species 51  
 coagulum terre Plinii 503  
 coca 469  
 coccolmea Theoph. 441  
 coccognidium 459 b. Bo-  
 lo. 463. Cord. 463  
 coccum infectarium 45  
 coccusbaphica 425. 160  
 ca 509  
 coecus radicum 139 b  
 cacinilla Frag. 199 b  
 cochlearia ejusq; species  
 110. Gussani. 252  
 cochlucho Acof. 90  
 cocconileia arbor 415. ga-  
 na 454  
 cocculæ officin. 416  
 cocufchau radix 985  
 codiaminum Gef. 523  
 codomalo Bello. 452  
 colfol fructus 508  
 coggyria 45  
 cohne Thevet. 451 b  
 coix Myconi 2. Theoph.  
 258  
 cola 507 b  
 colchicum ejusq; species  
 67. Alexandri Lob. 69.  
 Illyricum Ang. Lob. 61.  
 luteum 69 b. aëthanum  
 68. variegatum, ibid.  
 verum 69  
 coles Camer. 393 b  
 coles phaeolus 498  
 colytea Theoph. 454  
 Lugd. 391. tertia Theo-  
 phrast. 402 b  
 collum gruis German. 31  
 colocasia 195 b. 196  
 coloclemy Belli 379 b  
 colocynthis ejusq; species  
 35  
 Coli-

# I N D E X.

- Colophonia 104  
Colubrina Trag. 102  
Columbaris Barba. 269  
Columbina Cæf. 144  
Colus Jovis Lob. 238 b  
Colus rufica Cord. 379  
Colutea ejusq. fpecies 396  
Coma aurea 264  
Comacum Theoph. 407  
Comandaoufou 339  
Comaron Apuleii 326  
Combretrum Plinii 7 b  
Conchæ anatifera 513 b  
Conder Avicena. 501  
Condurdū Plinii 165, 204 b  
Condui 345 b  
Conferva Plinii Lob. 364  
b. marin. Lob. 368 b  
trichodes Lugd. 364 b  
Conyza ejusq. fpecies 265  
alpina Gef. 131 b. mon-  
tana Lugd. 265 b. palu-  
ftris 265 b. Eyft. 321.  
marina Lugd. 110  
Conyzoides cærulea Gef. 265 b  
Conarus Cluf. 477. The-  
ophr. 460  
Confiligo Ruel. 185. Ve-  
geii 186 b  
Cofiloda aurea Cord. 465  
b. rubra Tab. 326  
Confolida ejusque fpecies 259.  
aurea Tab. 268.  
Sarracena Eyft. ibid.  
Confolida media ejusque  
fpecies 260. minor Ad.  
261 b. paluftris Tab.  
266 b  
Confolida regalis ejusque  
fpecies 142  
Convolvulus ejusque fpecies 294.  
argenteus 295  
b. marinus Imperati 295  
Cōvolvulus pēnatus Col.  
398 b. reftus Ponz 463 b  
Copal 503 b  
Copau 417 b  
Copey 19  
Cocquillo 510 b  
Coral arbor Cluf. 402 b  
Corallina ejusque fpecies 366. Lob. 363. alt. Tab.  
664. Britan. Lugd. 368  
b. montana Tab. 361  
Corallina Egin. 252  
coralloides Cordi 322.  
Lobel. 366 b  
corallum ejusque fpecies 366  
coralli herba 184 b  
cōrchorus Dalech. 129.  
Lobel. 317. Plinii 252.  
Gef. 156  
Corcopal rufus 435 b  
coriandrum ejusq. fpecies 158  
corydalis Cam. 143  
corylus ejusq. fpecies 417  
coris ejusque fpecies 280.  
Diof. Guil. 466 b  
cornu cervinum Lob. 190.  
plantabile 514 b  
cornus ejusq. fpecies 447.  
femina Cæf. 451  
corona imperialis ejusque  
fpecies 79. regia quo-  
rundam 168. Fragof.  
276 b. Solis Tab. 276 b  
coroneola Cæf. 395 b  
coronilla Lob. 349  
coronopus ejusque fpecies 190.  
Gef. 379 b. Matth.  
109 b. cæruleus Gef. 131.  
Leon. 8  
coronopus ex Cod. Cæf.  
332 b  
cor Indum Lob. 343. D.  
Thomæ 338 b  
corrigiola Cord. 281  
cortex ad alvi profluvia  
408 b. criophorus Cluf.  
409 b. W'interan. 461 b.  
xylocaf. facie Lob. 408  
cortufa Matth. 243 b  
corrida ejusq. fpecies 490  
coru Acoft. 437  
cofmoſandalos Poëtarum  
Dod. 77  
cofta Camer. 129  
coftus ejusque fpecies 36.  
Maub. 156. Arabicus 36.  
amarus, dulcis 37. niger  
Eyft. 183 b  
coftus minor Gef. 221.  
hortorum Lob. 226 b  
cota Cæf. 136  
cotyledon ejusque fpecies 285.  
altera Cluf. 283.  
Diof. 287. aquatica  
Lob. 180. fyl. Trag. 304.  
tertia Dalech. 243 b  
cotinus 415  
cotis lignea 421 b  
cotonafter 432  
cotonea malus 424  
cottonaria Lob. 263  
cotula ejusque fpecies 135  
b. lutea Dod. 134 b.  
marina Lob. ibid.  
coucouchias 402  
coucoult Matth. 401  
couroq Lerio 510 b  
cracca ejusque fpecies 345.  
major Tab. 345  
crasfula major Cæf. 287 a.  
b. minor Dod. 283. fer-  
rata Thal. 285  
crategus Theoph. 425 b.  
Trag. 435. Lob. 430.  
Lugd. 454  
Cratægonon Lac. 101.  
Ang. 101 b. Dod. 210 b.  
Lob. 234 a, b  
crater Jovis Frag. 276 b  
craurophyllon Thal. 206  
crepanella Cam. 97 b  
crepis Dalech. 124 b  
creffione Cæf. 154 b  
creta marina Lon. 288  
crias Apuleii 243 b  
crispina uva 455  
crispinus 454 b  
crifta Cæf. 234. alpina  
Cæf. 163 b. galli Lob.  
ibid.  
crithmum ejusque fpecies 288.  
agrefte Trag. 186 b  
crocodilion Ad. 181. Cæf.  
186. Lugd. 380. 381 b.  
Tab. 380 b  
crocus ejusque fpecies 64.  
autumnalis 65. Indicus  
Acoft. 37  
crocus anguftif. ejusq. fpecies 67.  
luteus ejusque  
fpecies 66 b  
croce 412 b  
croton Nicandri Ang. 15  
cruciata Cord. 335. mura-  
lis Col. 314 b. gentiana  
fpecies 188  
crucialis Cæfalp. 257 b.  
marit. 334  
croci galli Brunf. 179  
cubebe 412  
cuci Plinii 510  
cuciphora 509 b  
cucophicos Cretenf. 338 b  
cucubalus Plinii Ad. 250 b  
cucullata Lugd. 243 b  
cucumis ejusq. fpecies 310.  
afininus 314. Galeni 310.  
marinus 311  
cucumis puniceus Cordi  
306  
cucumer marinus Aldro-  
an. 369 b  
cucurbita ejusq. fpec. 312.  
lacinata 312. Somphos  
Plinii 316. fylveft. 313  
culcas 196  
culices minores Lob. 83  
cuminum ejusque fpecies 146.  
pratense 158. fti-  
vum alt. Cæf. 151 b. fyl.  
Gefneri 142. fyl. alt.  
Matth. 142. Fuch. 145.  
Matth. Lob. 172. filiquo-  
fum ibid.  
cuneno Melitenf. 218  
cunila Cæf. 218  
Cunilago Plinii 266  
Cunus marinus Bellon.  
369  
Cupreffus herba Cord. 136  
b. arbor 438  
Curcas Balfamum 401 b.  
Ricini fpecies Cluf. 432 b  
Curcuma 37  
Cuscuta 219 b  
Cuffus altera Serap. Trag.  
295  
Cutarapama 184 b  
Cufchula Rauw. 511 b  
D  
Daburi 419 b  
Dachel 506  
Daftyli 506 b. Trapezunt.  
405 b  
Daftyliobotanon cærul.  
Thal. 250. alt. Thal. 285  
Dactylon Col. 284  
Damafonum Lugd. 185.  
Coid. 186 b. Dod. 187.  
Diof. 267. Diof. Col.  
242. Diof. Cæf. 244 b.  
ſtellatum Lugd. 190  
Dante radix Acoft. 293 b  
Daphne Alexandrin. Fuch.  
304 b  
Daphnoides 301. Fuch.  
462  
Daracht 508 b  
Darfeni Avicena. 408 b  
Datura Lugd. 168  
Davanas 508 b  
Daucoides majus Cord.  
152. minus Cord. 153  
Daucus ejusq. fpecies 150.  
officin. 151. acantocar-  
pos Col. 152 b. Creticus  
Lob. 148. alter Fuch. 157.  
alter Plinii Col. 153 b.  
ſelinoides Cord. 160.  
ſeparios Gef. 152 b  
Delphinium Cluf. 142.  
buccinum Diofcor. Lob.  
245 b  
Dende Serap. 432 b  
Dendrobryon Col. 361 b  
Dens canis 87. canis gram-  
men 1  
Dens leonis ejusque fpecies 126.  
Lonic. 316  
Dentali Cluf. 87 b  
Dentaria ejusq. fpecies 322  
Dentaria (Orobanchæ fpec-  
ies) major Matth. 88.  
minor Cluf. 83 b  
Dentellaria Rondel. 97 b.  
Gef. 265. Lugd. 322  
Dentilaria alia Gef. 101  
Denticulata Lugd. 178 b  
Deſiderium Gazæ 301  
Diaboli ſtercus Germ. 499  
Diapensia Matth. 319  
Dicamnus ejusque fpecies 222  
Digitalis ejusq. fpecies 243  
X X

# I N D E X.

|                                                                            |                                                                               |                                                                                          |     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Diofanthos Theoph. Ang.<br>209 b                                           | 384                                                                           | Epithymum                                                                                | 219 | men 210 b. nobilis 217. |
| Diospyros Gef. 452. Théophrast. 447. Lugd. 448                             | Echinophora Col. 152                                                          | Equisetum ejusque species                                                                | 15  | quarta Tr. 244          |
| Dipeadi 42 b. 43                                                           | Echinopoda Belli<br>Gef. 381. Cretica Ponæ<br>490 b                           | Eranthemum Dod. 178                                                                      |     |                         |
| Dipficus ejusq; species 385                                                | Echioides Col. 254 b                                                          | Eraway 432 b                                                                             |     |                         |
| Dodecatheon Plinii Ang.<br>241. Gef. Cam. 243 b                            | Echium ejusq; species 254.                                                    | Erigen- 444                                                                              |     |                         |
| Dolichus Bellon. 340.                                                      | Fuchii, Lob. 256. mini-<br>mum Col. 254                                       | Erica ejusque species 485.                                                               |     |                         |
| Dod. 319                                                                   | Echium scorpoides & ejus<br>species ibid.                                     | Alexandr. 463 b. bac-<br>ciferia Lugd. 471 b.                                            |     |                         |
| Donax 17                                                                   | Egano Ang. 391                                                                | Lob. 486 b. chrysan-<br>them. Lugd. 466 b. ma-<br>ritima Cluf. 365 b                     |     |                         |
| Tendergetin Brunf. 209                                                     | Eghelo Dod. 391 b                                                             | Ericoides Thal. 234                                                                      |     |                         |
| Dora Rauwolf. 26 b                                                         | Elæagnus Matth. 472 b.                                                        | Erigeron ejusque species                                                                 |     |                         |
| Dorella Cæf. 109                                                           | 472 b. Dod. 474 b. Lob.<br>472 b. Bellon. 414 b                               | 131. Dodo. 265                                                                           |     |                         |
| Dorycnium Dioscor. Pon.<br>272 b. Cordi 343. Im-<br>per. 463 b. Lobel. 329 | Elaprinus Bellon. 476                                                         | Esinacea Cluf. 394 b                                                                     |     |                         |
| Dorycnio congener Cluf.<br>312. similis Ang. 312 b                         | Elaphobolus nigrû Lo-<br>nic. 150. Diosc. 155. Gef.<br>278. album Lonic. 157. | Erynaceus Lusitan. 511                                                                   |     |                         |
| Doriones 424                                                               | Matth. 155 b                                                                  | Eryngium ejusque species                                                                 |     |                         |
| Doronicum ejusq; species                                                   | Elaterium 314. 496                                                            | 386. Vegetii Cam. 384                                                                    |     |                         |
| 184. Americum 520 b                                                        | Elæthe ejusq; species 252.                                                    | Erinus ejusque species 225.                                                              |     |                         |
| Doronicum Arabum Ponæ<br>35 b                                              | Brunf. 306. Cæf. 215 b.                                                       | Matth. 129 b. Nicandri<br>Col. 92                                                        |     |                         |
| Doronicum Dod. 276                                                         | Cordi 295. Dod. 250.                                                          | Eryfinum ejusque species                                                                 |     |                         |
| Draba ejusque species 109.                                                 | Tragi 257 b. tercia Tab.<br>345 b                                             | 100. Cam. 95. verum,<br>Lugd. 98 b. Aldoandi<br>309. cereale 27. Thie-<br>oph. Lob. 27 b |     |                         |
| Dod. 106 b. minima<br>Colum. 108 b                                         | Elëmi 504                                                                     | Erichthales Lugd. 377                                                                    |     |                         |
| Draco herba Dod. 98.                                                       | Eleofelinum Lob. 154                                                          | Erythrodanum marinum                                                                     |     |                         |
| arbor Cluf. 505                                                            | Elephas Col. 248 b                                                            | Lugd. 324                                                                                |     |                         |
| Dracunculus ejusque species                                                | Elhanne Alp. 476 b                                                            | Ermellinus Cæf. 447 b                                                                    |     |                         |
| 194. hortensis A-<br>rthol. 98. major Brunf.<br>192                        | Elkarie 428 b                                                                 | Ervanga Gazæ 294 b                                                                       |     |                         |
| Dracunculus majus 194 b                                                    | Elleborine 183                                                                | Erucae Col. 100                                                                          |     |                         |
| Dragonale fructus 505                                                      | Emerus Cæf. 397                                                               | Eruca ejusque species 98.                                                                |     |                         |
| Dragone Cæf. 98                                                            | Empetron Ang. 463 b.                                                          | 99 b. cinerea 151. mu-<br>ralis Lug. 109 b. bastur-<br>tio cognata 105 b                 |     |                         |
| Drakena radix Cluf. 14                                                     | phacoides Lugd. 463.                                                          | Eruca cærulea 99. mari-<br>ma 99. peregrina 201 b.                                       |     |                         |
| Drymopogon Tab. 104                                                        | Endivia major 112 b.                                                          | fyl. Gef. 98                                                                             |     |                         |
| Dryophanum Plinii Ruel.<br>414                                             | eius species 125                                                              | Ervilium Cæf. 344. Lugd.<br>342. fyl. Dod. 343                                           |     |                         |
| Dryopteris Matth. 318                                                      | Endiviola Ad. ibid.                                                           | Eryum Tab. 346. album                                                                    |     |                         |
| Drypis Lob. 388. Lugdun.<br>385 b                                          | Enger 113 b                                                                   | Fuch. 343. candidum<br>Trag. 344 b. fyl. Fuch.<br>344                                    |     |                         |
| Drosera Cord. 320                                                          | Englanteria Ruel. 483                                                         | Efkchara coralloid. Cluf.<br>366 b                                                       |     |                         |
| Drosomeli 496 b                                                            | Enneady namis Gef. 309                                                        | Efculus Plinii 420                                                                       |     |                         |
| Dudaim 507 b                                                               | Enneaphyllum Lob. 354.                                                        | Efula ejusque species 291.                                                               |     |                         |
| Dulcichinum Dod. 14 b                                                      | 185                                                                           | b. 292 Indica 116. rara<br>Lob. 291. minor Lugd.<br>291. rotunda 292                     |     |                         |
| Dulcamara Dod. 167                                                         | Enula 276                                                                     | Etalch Scalg. 489 b                                                                      |     |                         |
| Dulcisamarâ Tiag. ibid.                                                    | Enzanda Pigafett. 418                                                         | Evonymus ejusque species                                                                 |     |                         |
| Dulcis radix Trag. 352 b                                                   | Ephedra Plinii 152 b                                                          | 428. Theoph. 468 b                                                                       |     |                         |
| Dulcisida Gazæ 323                                                         | Ephemerum Diosc. Lob.<br>243. Matth. & Lob. 244.                              | Eupatorium ejusq; species                                                                |     |                         |
| Dulbaha Arabum 312                                                         | 243. Matth. & Lob. 244.                                                       | 320. 321 b. cannabinum<br>Lob. 121. Melius Matth.<br>221. Met. Cordi Ichol.<br>270       |     |                         |
| Duracina 440                                                               | quorundam 304 b                                                               | Euphorbium 387. succus<br>496. arbor 418 b                                               |     |                         |
| Duricon 424                                                                | Ephemericum non lethale<br>Fuch. 304                                          | Euphrasia ejusque species                                                                |     |                         |
| Duryaoca ibid.                                                             | Epilobium Gef. 245 a. b                                                       | 233. cærulea 254. gra-                                                                   |     |                         |
| Duron ibid.                                                                | E. majorana Tab. 224 b                                                        |                                                                                          |     |                         |
| Duroa Linc. 168                                                            | Epimedium Col. 355. Do-<br>don. 276 b. Plinii 70 b.                           |                                                                                          |     |                         |
| E                                                                          | Lob. 323                                                                      |                                                                                          |     |                         |
| EBanos Acoft. 393 b                                                        | Erimelis Galeni<br>Lugd. 432                                                  |                                                                                          |     |                         |
| EBenus 418. 507. ejus<br>species 391. Cretica<br>390                       | Epipactis Camer. 186 b.                                                       |                                                                                          |     |                         |
| Ebulus 456 b                                                               | Eyflert. 187                                                                  |                                                                                          |     |                         |
| Echinomelocactos Lobel.                                                    | Epipetron Gef. 369 b                                                          |                                                                                          |     |                         |
|                                                                            | Epithymum 218 b                                                               |                                                                                          |     |                         |



- Cam. 300 b. repens ib.  
 Fleors 37 b  
 Floribundio 470 b  
 Flos Africanus ejusq; species 122. ambarualis  
 Dod. 125. coccineus Lug. 203 b. Conflantinopol.  
 203. cuculi Dod. 104.  
 Trag. 205. Tab. 210  
 frument. 273  
 Flos hepaticus Tab. 309 b.  
 Hierosolym. 203. Me-  
 xio-canum 133 b. noſtis  
 Gef. 295. pallionalis 301  
 b. Perſicus Cluſ. 41 b.  
 regius Dod. 142  
 Flos languineus Monardi  
 306 b. Scarleti Lon. 209.  
 Solis Dod. 466  
 Flos Solis ejusque species  
 276 b. Farneſianus 277 b  
 Floſtindorus Fuch. 393 b.  
 Trag. 265. ſtigmatiſ. Ey-  
 ſlet. 209  
 Focot Guebit 430  
 Focniculum ejusq; species  
 147. aquaticum 141 b. er-  
 raticum Lon. 138 b. ma-  
 ritimum Lob. 288. mon-  
 tanum Trag. 148. porci-  
 nu Lob. 149 b. ſyl. Trag.  
 161 b. tortuoſum Lug. ib.  
 Fœnũ burguſiacũ Lob. 336  
 Fœnum greccum ejusq; ſpe-  
 cies 348. ſyl. Trag. 333  
 Folium Indi 410. prægran-  
 de Lob. 395 b. palmæ  
 filamenta 396  
 Fontilapathum Lob. 192 b  
 Foibefina Gef. 121  
 Formentone Cæſ. 27 b  
 Fragaria ejusq; species 126.  
 quarta Trag. ibid.  
 Fragula Cord. ibid.  
 Frangula Matth. 428 b.  
 Lugd. 431  
 Fraſſinella Cæſ. 303  
 Fraxinella Dod. 222 b  
 Fraxinus ejusque species  
 416. bubula 415 b  
 Fraxinea arbor Trag. 415  
 Friſoles 346 b  
 Frizoles Guateli 340 b  
 Frutillaria ejusq; species 64  
 Frometone alterũ Cæſ. 295  
 Frondipora 367 b  
 Fruſcus chologogus Mon.  
 1. ugd. 419 b. exotici 405.  
 ſub terra Lugd. 376  
 Furmentum amyſcum 22.  
 barbarum Ruel. 22 b. fa-  
 tum Lon. 9. Indicum  
 24. loculare Ruel. 21.  
 Sarracenicũ 27 b. ſyl. 10  
 Frutex coronarius Cluſ.
- 198 b. ſpinofus peregrin-  
 us Rauwolf. 478 b  
 Frutilla 471 b  
 Fucus capillaceus 354.  
 cupreſſinus 363 b  
 Fucus folliculaceus ejusq;  
 ſpecies 365. fungularis  
 364. ferulaceus Lob. 365.  
 linza 364  
 Fucus marinus Dod. 364.  
 365. foliis abrotani 365.  
 marin. baccifer. 365 b.  
 vermicularis 366. zo-  
 ſter 364 b  
 Fulle 470 b  
 Fumaria ejusq; species 143  
 Fumaria bulbola ejusque  
 ſpecies 143 b. bulb. mi-  
 nima Tab. 178 b  
 Fungus ejusq; species 369.  
 Amanita Gal. 372. auri-  
 cular. Cæſ. 368. boletus  
 Cæſ. 371 b  
 Fungus capreol. Tab. 370 b  
 cervinus, Matth. 376. cly-  
 perfor. Lob. 373 b. cono-  
 cielle, Portæ 371 b. co-  
 ralloides, Cluſ. 375. digi-  
 telli Trag. 372. elculen-  
 tus 370. 371  
 Fungus galericulat. Lob.  
 373 b. gallinac Cæſ. 371.  
 galucci Portæ 370. ignia-  
 rius Trag. 372 b. lacinia  
 372. laticus 371 b. le-  
 porinus Cluſ. 371  
 Fungus marinus Ald. 369  
 b. Dod. 374 b. minimus  
 Cæſ. 367 b. muſcarius  
 373. maximus 372. or-  
 bicularis, Dod. 374 b.  
 orientalis 311 b  
 Fungi noxii ejusq; species  
 372  
 Fungus petrus 373 b. pezi-  
 cæ Col. 370. 372 b. Cæſ.  
 375. piperiti, Portæ 371  
 b. praeſoli, Cæſ. 372 b.  
 prunuli, Cæſ. 371 b. quer-  
 cinus, Col. ibid.  
 Fungus ramoſus, ib. faxeus  
 Cluſ. 375 b. in faxis 372.  
 ſpongioſus, Lugd. 370.  
 ſuillus, Cæſ. 371. turini,  
 Cæſ. 370  
 Fuſanus 428  
 Fuſti 411 b
- G  
 G Agel German. 414 b  
 Gagey 308 b  
 Gaiderothymum 296 b  
 Galanga ejusq; species 35  
 Galbanum 494  
 Galbula fruſtus Cuprelli  
 488
- Galedragoti Xenocratis  
 Ang. 385  
 Galega ejusq; species 332.  
 montana Lug. 351 b. ſyl.  
 Dod. 343 b  
 Galeopſis Lob. 239. Dod.  
 235. lutea Lugd. 238 b  
 Galerita Trag. 197  
 Galla 420. myricæ 483 b.  
 terebinthi 400 b  
 Galli crux Apul. 8  
 Gallitricus 238  
 Gallium ejusq; species 335.  
 terrium Tragi 314 b. te-  
 traphyllon Colum. 333 b  
 Galum radix 193 b  
 Ganti radix 37 b  
 Garb ſive Garab Arabum  
 475 b  
 Gayoſ. hyllon Plinii 411 b  
 Garioſiſta Cæſ. 321 b  
 Gaſarte fruſtus 406 b  
 Gaſolinum 119 b  
 Gato camber 497 b  
 Gehuph arbor 440 b  
 Geiduar Lugd. 16 b  
 Gelapo 298 b  
 Gelbench Ang. 279  
 Gelleminum ejusq; species  
 397. rubrum Cæſ. 168 b  
 Gellamoro 413 b  
 Gemex 507 b  
 Genipaz 414  
 Geniſta ejusq; species 395.  
 Arabica Bello 395 b. hu-  
 milis, Dod. 397. illenſis,  
 Lug. 396 b. rorũda, Cæſ.  
 394 b. rubra Cæſ. 212 b  
 Geniſta ſpinola ejusq; ſpe-  
 cies 394  
 Geniſta ſpartii ejusq; ſpe-  
 cies ibid.  
 Geniſtella aculeata, L. ob.  
 395. montana, L. ob. 396  
 Genſibum Brumf. 108 b  
 Gëtiana ejusq; species 187.  
 concava 206. paluſtris  
 188 b. pratensis 188  
 Gentianella ejusq; species  
 187 b  
 Geraniũ ejusq; species 317.  
 banachoides, ib. colum-  
 binũ 318 b. moſcatũ 319.  
 nodofum Cluſ. 318 b. ro-  
 bertianum 319 b. ſaxatili  
 Cam. 318 b. ſangui-  
 neũ 318. tuberoſum 318 b  
 Geraniũ folio malvæ ejus-  
 que species 318 b. primũ  
 quorundam Lugd. 377  
 Geratũ palma 103  
 Gerontopogon Gef. 274  
 Gethyllis Gef. 72 b  
 Geum alpinum 243 b. Gef-  
 neri 322. Plinii 321. ri-
- vale Gef. 322  
 Ghrita jamaa 497 b  
 Gicherum Cæſ. 791  
 Gigantea 277 b  
 Gigarum Cæſ. 195  
 Gymnacticon hordeũ Ca-  
 mer. 22 b  
 Ginge Cam. 341 b  
 Gingidiũ ejusq; species 151  
 Gyphophyton Thal. 211  
 Gyp ſuccus 497 b  
 Gynſoloryz 24 b. fruſt. 312  
 Girth 145  
 Girthag Trag. 204 b  
 Gladiol<sup>9</sup> ejusq; species 44.  
 aculeatus Trag. 32 b. cæ-  
 ruleus major Trag. 32 b.  
 ſteridus 30. luteus Lug.  
 34 b. paluſtris Cord. 12 b.  
 Tab. 15. Cæſ. 202 b  
 Gladiolus Indicus 19 b  
 Glans virginea 421. un-  
 guentaria 402  
 Glãdes terreſt. Cluſ. 344 b  
 Glaſtivia Cretenſ. 201 b.  
 Belli, Ponæ 291  
 Glaſtum ejusq; species 115.  
 Ang. 204 b. ſyl. Cæſ. 97 b  
 Glaucium 167 b. Dioſc. 172  
 Glaux, Ang. 132. Cluſ. 347.  
 Gef. 350. vulgaris, Lob.  
 353. maritima 215  
 Glyſidia Plinii 121  
 Glyzyrrhiza ejusq; species  
 352. ſpinola, Lag. 386  
 Glyzyrrhiza alſtragaloides  
 128  
 Globularia Monſp. 262  
 Gluten Albotin Avic. 500  
 Gnaphallum ejusque ſpe-  
 cies 263. Dioſc. Tragi  
 4 b. Dioſc. Ponæ 222.  
 marinum Dalech. 265  
 Gaoconaz 401 b  
 Goan arbor 441  
 Gomphrena Lugd. 121 b  
 Gor fruſtus 419 b  
 Goſſypium ejusque species  
 420. muſcus 363 b  
 Gotine album 199 b. ru-  
 brunũ 191 b  
 Grain 25  
 Gramen & ejus species 1.  
 aculeatum 7 b. 1 a. alo-  
 peuroides 4 b. amouret-  
 tes 2 a b. anthoxantho  
 3 b. aquaticum panicul.  
 4. aureum, ibid. arvenſe  
 panic. 1. acundinacum  
 6 b. 7 avenacum 10 b  
 Gram. buſonum 73. bulbo-  
 ſum 23. caninum 1. ce-  
 narium 7 b. caryophyl-  
 laxæ foliis 1 b. 4. cy-  
 peroides 6 a. 7 a b.

# I N D E X.

- cristatum 3b. crucis 7b  
 Gram. dactylon 7b. 8a.  
 distachyphoron 9a.  
 dulce 1b. echinatum  
 7b. equinum 3  
 Gra. fescula 9b. filicea 2b  
 Gra. geniculatum 8b. glu-  
 mofum 10b  
 Gra. holosticum 7a. hor-  
 deaceum 9a. hirsutum 7a  
 Gra. juncea 5b. 6a. 7. leu-  
 canthemum 7b. leperi-  
 num 2. loliaceum 2. 3. 7. 9.  
 Gra. manna 8. maritimum  
 6. 10b. milifacum 8b.  
 montanum 3  
 Gra. nemorosum 7. 10b.  
 nodosum 2  
 Gra. panicum 4. 8. pani-  
 culatum 2b. panicula  
 crispata 1. pennatum 1.  
 phalaroides 4. 9b. pra-  
 tensa 2b  
 Gra. fegetum 3. sylvaticum  
 7. sorghinum 8b.  
 sparteum 1. spicatum 3  
 b. 5b. spica lerizae 9.  
 spica gemina 9. fecatum  
 9. tritici 8b. stritium 7  
 Gra. tomentosum 4b. 7.  
 typhoides 9. tremulum  
 2. trigloch 6a. 7. xer-  
 ampelinum 7  
 Gramen 2. Plinii Ang. 282  
 b. 3. Plinii Ang. 283b.  
 leucanthemum Dod. 210  
 b. floridum Cam. ibid.  
 maritimum Clus. 211  
 Gramen Parnassii ejusque  
 species 309. Lugd. 199b.  
 Matth. 304  
 Granadillos lignum 393b  
 Granadilla Mon. 301b  
 Granum alzelin 14b  
 Granum Aneken 412b.  
 ben 402. kernesium  
 469b. regium Mef. 432.  
 tinctorium 425. viride  
 410b  
 Grana paradyfi 413  
 Gratia Dei Ang. 279 Czf.  
 246b. Dod. 46b. Gal-  
 lorum Gef. 278. Germa-  
 norum Trag. 319b  
 Griatiola ejusque species  
 279. caerulea 246b. mi-  
 nori Gel. 218b  
 Grolli tricum 457  
 Grollulana ejusque species  
 455  
 Guacatane Monard. 221b  
 Guadarella Czf. 100  
 Guayaba 437b  
 Guajabara 19  
 Guajacum Patavinum 447  
 Guajanos 441b  
 Guayavas 437b  
 Guaina Oviedi 404  
 Guanabanus Oviedi 434.  
 Scalig. ibid.  
 Guanas 417b  
 Guanavano 439b  
 Guanavanus 511  
 Gummi ejusque species  
 498. Diolcor. ibid.  
 elemi 472. 504. ex  
 Molle 500. ad poda-  
 gram 497b  
 Gurta Gamandra 497b  
 H  
 Habaziz Portae 14b  
 Habbures Cam. 190b  
 Habafcon radix 92b  
 Hahilcoulcou Serap. 432b  
 Habzeli Serap. 412  
 Hachal Indi. Clusii 68b  
 Hemorrhoidalis Aldr. 281  
 b. Cast. 110. herba,  
 Brunf. 309  
 Haernia Serapion. 412b  
 Haiaa 91b  
 Haiiri Theveti 507  
 Halicacabum 166. peie-  
 grinum Fuch. 343  
 Halinus ejusque species  
 120  
 Halinus Lacun. 475. Tragi  
 411b  
 Haliphleas 420b  
 Hamamelis Athenaei 452  
 Harecomen Bellon. 26b  
 Harumae 447b  
 Hastula regia Trag. 28.  
 29  
 Hatle radix 91  
 Haur Arabum 429  
 Haufegi 477  
 Hebulben 401b  
 Hederalis 303  
 Hedera ejusque species 306  
 Cilicia 296. rigens Plin-  
 nii Czf. 425b  
 Hedera terrestris ejusque  
 species 306  
 Hederula Trag. 305b. pa-  
 lustris Tab. 362  
 Hedera lacryma 498b  
 Hedyphis 126  
 Hedyphium ejusque species  
 348. clypeatum Lob.  
 350. minus Tab. 349b.  
 minimum Lugd. 348  
 Helbane 414b  
 Helenium ejusque species  
 276. comagenium 37.  
 Theoph. 224  
 Helianthemum ejusque spe-  
 cies 466. ejus spec. Lu-  
 gdun. 465b  
 Helichrysum ejusque f. e-  
 cies 264. Italicum Matth.  
 141. syl. Trag. 263  
 Heliochrysum Trag. 213  
 Heliotropium ejusque spe-  
 cies 255. erectum Ger.  
 254  
 Helleboraster Lob. 185  
 Helleborine ejusque species  
 186b. Dalechamp. 188  
 Helleborus albus ejusque  
 species 186b  
 Helleborus niger ejusque  
 species 185. ferulaceus  
 Adverf. 186  
 Helxine Matth. 121. cif-  
 lampelos 294. 295. syl.  
 Thal. 168b. stans  
 Guiland. 295b  
 Hemeris 420  
 Hemerocallis Diof. 72b.  
 78. Chalcedon. 316.  
 Valentina Clusii 54b  
 Hemionitis ejusque species  
 333  
 Hende-trau. Trag. 285. ca-  
 ruleo fl. Trag. 250  
 Henne Arabum 476  
 Henophyllum Gefn. 304  
 Hepatica Tab. 362  
 Hepatica aurea Tab. 330  
 b. alba Cordi 309. pa-  
 lustris 309b. stellata  
 Tab. 334b. trifolia Lob.  
 330b  
 Hepatoriū aquaticum Dod.  
 321  
 Heptaphyllum Fuch. 326  
 Heracantha Tab. 379  
 Heraclea Tragi 231b  
 Herba alba Plinii Lugd.  
 8b. amoris Czf. Lugd.  
 359b. 287b. articula-  
 ris Tab. 206. cava Im-  
 per. 364. Malavaria  
 437. mimosa 360.  
 molle ibid.  
 Herba S. Alberti Czf. 101  
 b. Antonii 92b. S. Bar-  
 barae Fuch. 98b  
 Herba de Balcitera 186b.  
 benedicta Brunf. 321.  
 de Bengala 320b  
 Herba cancri major Lon.  
 253. minor Cord. 282.  
 cervi Gef. 248. clytix  
 Cam. 253b. costa Czf.  
 156b. S. Crucis 169  
 Herba doria Lob. 268. ful-  
 lonum Brunf. 188. gar-  
 taria Matth. 228. Gerar-  
 di Dod. 155b. Kunigun-  
 dis 320  
 Herba S. Jacobi 131. Joa-  
 nis infantis Monard. 114  
 b. judaica Gef. 332. Dod.  
 246b. Julia Ang. 221  
 Herba S. Mariz Czf. 326b.  
 Molucana 321. mimosa  
 Lugd. 360. molle Acost.  
 360  
 Herba mortem praedicans  
 312. radioli Apul. 359.  
 Sentiola Linsc. 359. vi-  
 va, Clus. ibid.  
 Herba Papagalli Dod. 121  
 b. paralyticus 241. paris  
 Matth. 167. perforata  
 Trag. 279. pudica Lugd.  
 312b  
 Herba rena Czf. 156b. re-  
 nu moribus curans, Mon.  
 153b. ad nupuras 282b  
 Herba facra Dalefch. 231b.  
 Ang. 269b. Sardoia Dod.  
 177. Guil 180. Simconis  
 316. Stephani Tab. 168b.  
 stella Dod. 190b. studio-  
 forum Tab. 212  
 Herba tridentata Cord. 191  
 b. trinitatis Fuch. 199b.  
 tunica 207b. turca  
 Lob. 282. turca monta-  
 Czf. 281b  
 Herba veti Trag. 177. Mof-  
 pel. 230b. Ungaria Lon.  
 317. vulneraria ad fumē  
 Trag. 266b. 278  
 Herba Wiapassa 326b  
 Herba admiranda 91  
 Hermodactylus Mefuzi,  
 Gef. 87b. Tragi 308b.  
 vulgo 67. verus 40b  
 Herniaria Dod. 282  
 Hesperis ejusque species 267  
 Hetich Americanorum 99  
 Hyacinthoaphodelus 70b  
 Hyacinthus ejusque species  
 41. Arabicus 45. autumnalis  
 46b. 47. botrioides  
 42b. 43. Campan. flore  
 44b. Colchici folio 47  
 b. comofus 42  
 Hyac. flo. oblongo 43b. 44.  
 obfolito 44. Indicus 47.  
 latifolius 46b  
 Hyacinth. nō fcriptus ejus-  
 que species 434  
 Hyac. Orientalis ejusque  
 species 44b. flore pleno  
 45b. ferotinus 45. Or-  
 nithogaloidea Cof. 70b  
 Hyac. Peruanus 47b. depe-  
 dre nostro 69b. poctarii  
 Lob. 83. 90. Trag. 40.  
 Trag. 77b. racemosus 42b  
 Hyc. stellaris species 45b.  
 Tripolitanus 46. Vangi-  
 lii 31. aya ramofa 42b  
 Hibernus Fuch. 104  
 Hydrolapathum Lob. 110b  
 Hydro-

- Hydropiper ejusq; species  
101. lanceolatum Lugd.  
180 b. rubrū Fuch. 193 b.  
Lugdun. 311
- Hieracium ejusque species  
126. arboref. 127. aspe-  
rum 126. echinoides  
Tab. 128 b
- Hieracium chondrilla folio  
ejusq; species 127 b.  
Creticum 127. dentis  
leonis fol. 126. foetidū  
ibid. b
- Hieracium fruticosum e-  
jusque species 129 b. in-  
tybaceum 128. majus  
126 b
- Hier. montanum ejusque  
species 128. glabriū 129.  
pratense ibid. b
- Hier. Sabaudum ibid. b.  
siliqua falcato 128
- Hierobotane mas Lugd.  
249. Brunf. 269. forma  
Brunf. 100. Lugdun.  
249
- Higuero Oviedo 434 b
- Holcylamus ejusq; species  
169. peregr. Dod. 107 b.  
Peruvianus Cord. 168.  
Dod. 169
- Hofifris Plinii 271 b.  
Tab. 127 b
- Hypecoon ejusque species  
172. Matth. 317. forte  
Lugd. 337 b
- Hypericum ejusque species  
279
- Hypericū frutescens 321 b
- Hypocheir Dalech. 125 b.  
Tab. 127 b
- Hypocistis 465
- Hypodrys 422 b
- Hippoglossum Valentinū  
Cluf. 463
- Hippomanes 511 b
- Hippomelis Palladii 454
- Hippophæ 293. Diofcor.  
Col. 477 b. Anguilar.  
478 b
- Hippophæstum 189. Col.  
387. Lugd. 478 b
- Hippia Lob. 250 b
- Hippion Gef. 188
- Hippoglossum Lugd. 303  
b. Matth. 304 b
- Hippolapathū Matth. 114  
b. Lob. 115 b
- Hippomanes Cratæv.  
Ang. 168
- Hippomarathrum Cam.  
147 a. Belli b. Franco  
158 b. Tab. 162 b
- Hippofelinum Theophr.  
154 a. Dod. Fuch. Lob. b.
- Lugd. 158 b
- Hippuris Lob. 15. Saxea  
Cluf. 365 b
- Hirculus 166. Frifcus  
466
- Huudinaria Tab. 309 b
- Hirundinaria Trag. 303
- Hyslopī folia 218 b
- Hyslopoides Cam. 218 b  
Gef. 465 b
- Hyslopus ejusque species  
217. campetris 466.  
Diof. 223 b. Hebraeorū  
217. montana Lon. 466.  
nemorum Lugd. 234 b  
vulgaris Col. 279 b
- Hivourahe 444
- Hobos Linsc. 417 b
- Hobos Eteobrech Lon. 209
- Hoyrii Theveti 384 b
- Holcus Plinii Ang. 9
- Holoconitis Hipp. 14 b
- Holochænos Lugd. 11 b.  
12
- Holofoetum ejusque species  
190. Matth. 7. alterum  
Lob. 388 b. caryophyl-  
leum Tab. 210 b
- Holothuria Arist. 369
- Hordeum ejusque species  
22. alterum 22 b. cau-  
sticum 23 b. Galaticum  
24. glabrum 22 b. ma-  
rinum 9. nudum 22 b.  
spuriū 9
- Hominum ejusq; species  
238
- Hovos fructus 446
- Hoxocoquomaclit Cam.  
352
- I
- Iaca Garz. 511. major  
Caft. 434
- Iacea ejusque species 271.  
alba Lugd. 273. aculca-  
ta Tab. 377. Babylonica  
272. incana Lob. 272  
b. laciniata 271 b. capi-  
tefpino 272. major  
tricolor Caft. 199 b. ni-  
gra Lob. 271 b. olea fo-  
lis 272 b. Tab. 273 b
- Iaceros 511
- Iacobæa ejusq; species 131
- Iaiama 384 b
- Ialapium 278
- Ialave fructus 407 b
- Iambolones 460 b
- Iambos 441
- Iangomas 444 b
- Iapatri 407
- Iaine montana Lugd. 284
- Iaininum ejusque species  
397. rubrum Caft. 168 b
- Iavapos fructus 407 b
- Iberis ejusque species 97
- Idæa ficus Lugd. 451. radix  
Diof. 470 b
- Igname 90. 91
- Ilatrum Caft. 476 b
- Illex ejusque species 420
- Illecebra major Lob. 283
- Impatiens herba Dod. 307
- Imperatoria ejusque spe-  
cies 156
- Impia Plinii 263
- Incentaria Cam. 136.  
Caft. 266
- Incenfum 500 b
- Indiamos fructus 407
- Indicum officin. 113
- Indorum ferrumatrix  
458 b
- Inguinaria Plinii 335 b
- Inhame Cluf. 90 b
- Iniamos Linsc. ibid. b
- Intybus ejusq; species 126.  
aphylla Th. 129 b. platyphyllos Thal.  
124 b. fyl. Trag. 133
- Inturus Gazæ 480
- Iolo Suchel 133 b
- Iondraba alifoides Col.  
107 b
- Ionthlapi Col. 107
- Iovis barba Plinii 473
- Iovis flos Theoph. 203 b
- Iphyon Theoph. Ang. 28 b
- Iratuch 495 b
- Iriou Fuch. 95 Matth.  
Lob. 101
- Iris ejusque species 30. alba  
31. Africana ibid.  
Afratica ibid. b. agria  
Theoph. 30. biflora 32
- Iris angustifolia ejusque  
species 32 b. prunum re-  
dulens 33
- Iris chalcidonica 31. Da-  
matena & Dalmatica  
31 b. Florentina 31. Il-  
lyrica 3132. latifolia 30.  
Lufitanica 31 b. 32. lu-  
tea 32 b. 34 b. Maurita-  
nica 39 b. maritima  
32 b. 33
- Iris pratensis 30 b. Pharaon-  
is 31 b. Sulfana 31. Tri-  
politana 32 b
- Iris bulbosa latifolia ejusq;  
species 38. angustifolia  
38 b. cærulea 40. lutea  
39. verticillor 39 b
- Iris tuberosa Lob. 40 b
- Istares ejusq; species 113. fyl.  
Lob. 204 b
- Iſcæmon Lob. 8
- Iſchas alter Cluf. 292 b
- Iſophyllon Cord. 278
- Iſopyrum Diof. Col. 144.
- Matth. 145 b. Caft. 343 b.  
Gefn. 327
- Iva molchata Tab. 138 b
- Monfpeliensium 249.
- Rhætorum 132 b
- Iucca Benzoni 91
- Iuglans 417
- Iujubæ ejusq; species 446.  
fyl. Caft. 478 b
- Juliola Scalig. 330 b
- Juncaria Tab. 334
- Juncellus Ad. 12 b
- Juncus avellana Ama. 14 b.  
odor. aquat. Dod. 163
- Juncus & ejus species 11.  
acutus 11 b. asper Dod.  
20 b. bombycinus 12 b.  
capitulis equiseti ibid.  
capitulo lanuginoso ibid.  
clavatus ib. cyperoides  
ibid. floridus ibid.
- Juncus lævis 12. lychnan-  
themus 7. 12. marinus  
gramineus 4 b. mariti-  
mus 6 b. melancranis  
12 b. odoratus 11. ro-  
tundus ibid.
- Juncus petrosus, Ang. 366
- Juni pappaywa 434
- Juniperus ejusque species  
488. major Diof. 487
- Juniperi gummi 500 b
- Jufaf Avicen. 108 b
- Junfa 346 b
- Juwrb Cluf. 399
- Ixonæ Theoph. 380
- Ixocaulos Thal. 205 b. al-  
tera Thal. 210 b
- Ixopas Cordi 130
- K
- Kaawy potus 25
- Kaate arbor 410 b
- Kaye Baka 464 b
- Kaifchu openauk 91 b
- Kali ejusque species 289.  
tertium Alpini 191 b
- Keiri 202 b
- Kerfina 242 b
- Kermia 316 b
- Kikaion S. Jonæ 432
- Kimifin 402 b
- Klapmuffen 365 b
- Knawel Traji 281
- L
- Lablai Alpini 341
- Labrum veneris ejusq;  
species 385
- Labrufa 299
- Laburnum 391
- Lacaria Theoph. 451 b
- Lacca 499
- Lacarbonum 496 b. lunæ  
Gef. 373 b
- Lachryma Christi 218.







# I N D E X.

- Trag. 214 b. rubra Lugd. 245 b  
 Lingua avis 496. passeris ibid. passerina Trag. 259 b  
 Lingua cervina 353. cervina ramosa Colum. 354 b  
 Lingua Plinii 180 b. major Lugd. 266 b. serpentina, Cæf. 354  
 Lingula vulnerar. Cord. 354  
 Linocarpus Thal. 214 b  
 Linolyris Lob. 213  
 Linosyrtum Theoph. 5  
 Linum ejusque species 21  
 marium Imper. 364 b.  
 pratense 4 b  
 Liquidambar 502 b  
 Liquiritia succus 496 b  
 Lirium mas 39. alterum Theoph. 69 b  
 Lysimachia ejusque species 244. Leonice. 395 b. galeculata Eysf. 236 b.  
 Lob. 246 b. lutea 245. corniculata 520 b. filiquosa 245. spicata 246. Virginica 245. 520 b  
 Lithobryon Col. 361  
 Lithontribon Lugd. 283  
 Lithophyton marinū Gef. 366  
 Lithoreoleucolon Colum. 201 b  
 Lithospermum ejusque species 258. angustifolium umbellatum 521. fruticosum 255 b  
 Lithothlaspi Col. 107  
 Lithoxyla 421  
 Loborū species Clusf. 404  
 Lobus crassus Clusf. 318 b.  
 echinodis Clusf. 399 b  
 Ioca 21  
 Locos fructus 414 b  
 Locusta Gef. 165 b  
 Lolade 196  
 Lolium 9. marium 9 b.  
 rubrum ibid. Fuchsi 204 b  
 Lonchitis ejusque species 359. Cæfalp. 63 b. major Cast. 48 b. prior Dalech. 187 b  
 Loropissos Ponze 332 b  
 Lotus ejusque species 331.  
 Ægyptia 195. 196. asperior Lob. 332 b. campestris Trag. 328. cneaphyllos Lugd. 339. horrorum Lob. 331 b. latifolia Lugd. 333 b  
 Lotus Lybica Lugd. 332 b  
 Lotus pratensis filiq. Clusf. 332 b. purpur. Lugd. 328. pentaphyllos Gef. 332. quadrifolia Tab. 327 b. filiquola Cam. 332 b  
 Lotus faciva Fuch. 331 b. syl. Matth. ibid. syl. minor Lugd. 328. tetragonobolus Cam. 332 b. urbana Matth. 333  
 Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homei Guil. 446. alt. Theophr. Lugd. 450 b. veterum Cord. 393  
 Louan Arabum 501  
 Luciola Gef. 354. Fracast. 310. Cæfalp. 7 b  
 Lucum 25  
 Lucumas fructus 407  
 Lunaria ejusque species 314.  
 Ang. 323. arthrica 242. aspera Gef. 201 b. burissa Ang. 287 b. radiata Lob. 339  
 Lunaria Græca ejusque species 203. Græca tertia Cæf. 203 b. quarta Cæf. 107 b  
 Lunaria major Gefn. 318. minor Cast. 349. lutea Lugd. 107 b  
 Luparia Tragi 183  
 Lupi crepitus Col. 374 b  
 Lupinus ejusque species 347. Africanus 348 b. Creticus ibid. syl. Cæf. 312 b. syl. rusticus Cæfalp. 350  
 Lupulus ejusque species 298. syl. Thal. 328  
 Lutea herba Plinii 395 b. Vitruvii 100  
 Luteola ejusque species ibid.  
 Lutum herba ibid.  
 M  
 Macahalea jua 475  
 Macaley Lob. 451 b  
 album Rauw. 403 b  
 Macatro 154 b  
 Macoquer 311 b  
 Macer veterum 408  
 Macis 497 b  
 Macouna 341 b  
 Madian 497  
 Madrepora Imper. 367  
 M. m. Trag. 422  
 Magai 448 b  
 Magi Arantia Cam. 156 b  
 Magnas 410 b  
 Mangumnanck 421  
 Mahalep Matth. 451. Serapion. Tab. 476  
 maiele Cord. 242 b  
 majorana ejusque species 224. major Taber. 223 b  
 mays 25. 26  
 mala Æthiopica 167 b. infana Fuch. ibid. Petruviana Eysf. ibid.  
 malabathrum 470  
 malacocissos Lugd. 306.  
 Damocratis Ang. 294.  
 Gef. 297. major Lugd. 276 b. minor Fuch. 309 b  
 malicorium 437  
 malinathalla 14 b  
 malope Plinii 315  
 malva ejusque species 314. altera Cæf. 316. Theoph. 316 b. Veneta Lonic. 317  
 malva arborea 315 b  
 crispa 315. rosea ibid.  
 malva viscus Ang. 315 b  
 malus ejusque species 433.  
 Arantia ejusque species 436. Assyria 437 b  
 Malus Armenica ejusque species 442  
 Malus citria ejusque species 435. cydonia ejusque species 434  
 Malus granata 438. marina Aldro. 369 b. Indica Acosta 433 b  
 Malus limonia ejusque species 436  
 Malus persica ejusque species 479. punica 437. Petruviana 168  
 Malum Hespericum 436. infanum marin. 369 b  
 māmara 431 b  
 mambi fructus 376  
 mambu Lugd. 18  
 mameleabor 417 b  
 mandocchade 91  
 mandoccharpie 91 b  
 mandepore ibid.  
 mandiocca 90 b  
 mandragora ejusque species 169. Theoph. Dod. 166. Cæfalp. 108 b  
 manducus 91 b  
 manga 440 b  
 mangier blanco 439 b  
 mangie Oviedi 438  
 mangestans 461 b. 472 b  
 manguey mexican 286 b  
 mangummenauk 421  
 maniel 91  
 manigette 25  
 manuot 90 b  
 manna 496 b. Germanica 497  
 liquida  
 manas marina Gefn. 369 b  
 marabilles del Peru 168 b  
 maraka 461 b  
 margarita Ægyptia 14 b  
 marificus 12  
 marmaritis 512 b  
 marmelos 435 b  
 marrubium ejusque species 229. agreffe Trag. 236. humile 231 b  
 marragon Chymifit. 77.  
 Constantinopolit. 76.  
 Imperiale 78 b. Pomonium 79  
 maruherba Död. 258  
 marum ejusque species 224. Dod. 223 b  
 maslac 495  
 massa 403 b  
 mastiche 501  
 mastie Gallorum 224  
 masuria Belli 329 b  
 mater violanum Lugdun. 109 b  
 Mates 404 b. Indorum 329 b  
 matos 441 b  
 matficaria ejusque species 133  
 maurifylvia Col. 238  
 maurifylvia Trag. 334  
 maurocapnos 452  
 mauroganga 312  
 mauronia 97 b  
 mauz 507 b  
 mazza de Congo 27  
 mechinum 35  
 mecoacham ejusque species 297 b  
 meconium 424 b  
 medetium Cord. 164  
 medica ejusque species 329.  
 Arabica Cam. 329 b.  
 Dioscor. 330. flava Clusf. 1 b  
 luna Lugd. ibid.  
 marina Lob. 329 b  
 medum Dioscor. Rauw. 94  
 mehenbethene 418 b  
 melampyrum ejusque species 234  
 melandryon Plinii 163. genium Clusf. 204 b.  
 quorundam Clusf. 205  
 melangula 438 b  
 melanthium ejusque species 135  
 melanzana 167 b  
 melcagris 64  
 melenken 507 b  
 Mc-

- Mel frugum Dioclis 27.  
 Gazza 331 b  
 Melica 26 b  
 Melilotus ejusque species  
 ibid. coronata Lob. 332.  
 Diof. 227. exigua Trag.  
 328. Italica Cam. 331.  
 Fuch. ibid. vulgaris  
 Cxf. 332  
 Melilot. quarta Trag. 332.  
 quinta Trag. 249 b. le-  
 prima Tiag. 332. ma-  
 jor tertia Trag. 330  
 Melilotus major pinguis  
 Lugd. 389 b  
 Melinum Cxf. 338 b. alte-  
 rum Cxf. 248  
 Melissa ejusq; species 229.  
 fyl. 230  
 Melissophyllum 229. Fuch.  
 231 b  
 Mellegera 413  
 Melocactus 384  
 Melochia Alpini 317 b  
 Melo corcopali 435 b  
 Melongena 167 b  
 Melo ejusq; species 310  
 Melopepo ejusque species  
 312. Lon. 310. Galeni  
 Cxf. ibid.  
 Melothron 297. Theoph.  
 167  
 Melopinus 168  
 Melt 20  
 Mel roscidum 496 b  
 Menianthes palust. Lugd.  
 327  
 Mentha fativa ejusque spe-  
 cies 226. aquatica 227  
 b. cataria Lob. 228 b.  
 corymbifera Cord. 226  
 b. corymbifera minor,  
 Cord. 221. lutea 266.  
 Sarracenia Lugd. 98 b  
 Mentha fyl. ejusque species  
 227  
 Mentastrium 227 b. Brunf.  
 229 b  
 Mentula marina Rond. 369  
 Mercutialis ejusq; species  
 121. montana 122. fyl.  
 secund. Trag. 306 b  
 Metercum German. 462  
 Mespilus ejusque species  
 433. anthedon 432 b.  
 Aronia 432 b. fyl. 434 b  
 Melle Avicen. 413 b  
 Metagucfunaux 439 b  
 Metallum Italorum 432  
 Meum ejusque species 148.  
 aquaticum Gef. 141 b  
 Myacathos Theoph. Lugd.  
 387  
 Myagrum ejusque species  
 109. Tabern. 204 b. alt.  
 minus Lugd. 334  
 Mignolporio 307  
 Milax arbor 305. five Acy-  
 laba Bellon. 423 b  
 Miliaris herba 8 b  
 Milie Abrayn 22 b. 23  
 Milium ejusque species 26  
 Æthiopicum 26 b. agre-  
 ste 27. alterum Theoph.  
 28. capreum 307. In-  
 dicum 24; 25 b. 26  
 Milium fyl. Tab. 234 b. fo-  
 lis 238  
 Militaris Galeni 129 b  
 Milicofolium ejusq; species  
 140. aquaticum 141. no-  
 bile 132  
 Millefolium aquat. cornu-  
 tum majus 141. minus  
 520 b  
 Millegrena 281 b  
 Millemorbia 235 b  
 Millepora Imper. 367  
 Millo 26  
 Milzarella 231  
 Mimulus Plinii 163 b  
 Myofotis Lob. 254. a. b.  
 parva 108 b  
 Myofuros 190 b  
 Mippi 433 b  
 Mira sole Italis 432  
 Myrica ejusq; species 484.  
 marina Cluf. 365 b  
 Myriophyllum aquaticum  
 141. pelagiū Cluf. 363 b  
 Myrobalanus ejusque spe-  
 cies 445. folio Heliotrop-  
 pii Plin. 419. Tioglodis-  
 ti Plin. 402  
 Myrtha 501 b. Aminea  
 499  
 Myrrhis ejusq; species 160.  
 cicutaria 161. lappa  
 Lugd. 152 b  
 Myrrhida Plinii Lob. 319  
 Myrtacantha 470 b  
 Myrtidanium 469 b  
 Myrtillus ejusque species  
 470  
 Myrtocistus 468  
 Myrtomelis Gef. 432 b  
 Myrrus ejusq; species 468.  
 Brabantica 414 b. Indi-  
 ca 469 b. ligustii folio  
 473 b. nemoralis 414 b.  
 fyl. 470 b. tenuifolia  
 Thal. 471 b  
 Myrti coccus 469 b. excre-  
 mentum ibid.  
 Mithridatiū cratevæ Cxf.  
 87  
 Mjuros Aëti Ang. 206 b  
 Myxus 446. alba 416  
 Mochus Cxfal. 344. Dod.  
 316  
 mogori 470  
 moly ejusque species 75.  
 alterum Plinii 29 b.  
 montanum 75. molcha-  
 tum 75 b  
 moly Homeri Guil. 312 b  
 molybdena Plinii Ang. 97.  
 b. Dalech. 386 b. Plinii  
 fortè 192  
 molyza Hipp. 74  
 molle Cluf. 399  
 mollugo ejusque species  
 334  
 mollusca nux 417  
 molochia Serapion. 252  
 molon Plinii 163 b  
 moluca 229 b  
 momordica 306  
 monococon frument. 21 b  
 monophyllum 304  
 monorchis Gef. 84  
 mora bati 479. terrestria  
 326  
 moracia nuxes 417  
 morgani 480 b  
 moringa 399  
 morochen 25 b  
 morsus gallinæ 250. 251.  
 diaboli 269. ranæ 193 b  
 morsus ejusq; species 439  
 moschata Cordi 178 b  
 caulea 221 b  
 mumeiz Arabum 499 b  
 mungo 413 b. similis 412 b  
 mufa 507 b  
 muscari 43  
 muscipula 205 b. 206  
 muscus arboreus 361. coral-  
 linus, Tab. 361. scenju-  
 lacus 361 b  
 muscus maritim. ejusque  
 species 363. 364  
 muscus pulmonarius 361 b.  
 pyxioides 361. quernus  
 Col. 361 b. ramifus 361  
 a. b. scoparius, Lob. 361  
 muscus saxatilis ejusq; spe-  
 cies 362. stellaris roscus  
 361  
 muscus terrestris ejusque  
 species 360. capillaris  
 Dod. 356 b. clavatus  
 360 b. corniculatus 358  
 b. denticulatus 360.  
 filicinus ibid. floridus  
 206 b. in parietibus Cef.  
 saxatilis fyl. Trag. 356  
 musco similis ad pilces ca-  
 piendos 360 b  
 mutellina Gef. 148 b  
 muz 507 b  
 N  
 N Abca Alpini 477 b  
 Nachani 99 b  
 Nanas Theveti 314  
 Napeca Belli 477  
 Napellus ejusque species  
 183 b. Moyus 184  
 Napobrassica 311 b  
 Napus ejusque species 95  
 Narcissifolium 96 b  
 Narcissifolium 96 b  
 Narcissus ejusque species  
 48. Africanus 49 b. ph.  
 albus 49 b. aquaticus 5.  
 d. Argiæ st. autumnalis  
 51. 59 b  
 Nar. calice oblongo 51.  
 calice magno & parvo  
 51 b. magno & oblongo  
 52. candidus 46. care-  
 leus 45 49. Confertus  
 nopol. 63 b  
 Narcif. Diof. 49. Boreph-  
 no 33 b. Indicus 49. luteo-  
 folius 51. latissimus  
 49 b. luteus totus 90 b  
 Narcif. maritimus 54 b  
 Mariu\* 55. medio luteo  
 50. orientalis 49 b  
 Narcif. Persicus 69 b. por-  
 raceo latifolio 41. 20.  
 gulfifolio 51. quintus  
 Matth. 70 b  
 Nardus 33. agrestis 164.  
 celtica 165. celtica alba  
 185. Italica 216  
 montana 165. fl. 197  
 Narthecia Theoph. 141 b  
 Nascaphrum 437  
 Nastos 170  
 Nasturtium ejusque species  
 103. aquaticum 104.  
 Babylonium Lob. 109.  
 hybernium Thal. 90.  
 hortense 103. Indicum  
 306. maritimum Lugd.  
 99 b. montanum 104 b  
 Nasturt. palustre Gef. 92  
 pratense Gef. 104. hircu-  
 stre Thal. 105 b  
 Nasturtiolum Gef. 105  
 Natrix Plinii Ang. 221 b  
 Lob. 229 b  
 Negundo 412 b  
 Nenuphar 361  
 Neoria Dod. 369  
 Nepa Theoph. Lob. 394  
 Nepeta agrestis Cord. 212.  
 Trag. 229 b. aqua-  
 tica Trag. 227. frutes-  
 cens Cord. 228. minor  
 Cam. 228 b. montana  
 Cord. 229. vulgaris  
 Trag. 228 b  
 Nepetella Esf. 228 b  
 Nerion ejusq; species 444  
 alpinum Gef. 408 b  
 Nicotiana ejusque species  
 169  
 Nilu

- Nidius avis **86 b**  
 Nigella ejusq; species **145**  
     Brunf. **204 b**  
 Nigellastrum Dod. **ibid.**  
 Nil Avicennæ Frago. **113**  
     Arabum Gef. **295**  
 Nimbo **416 b**  
 Nymphaea ejusque species **192**  
 Noccus herba **14**  
 Nodularia **366 b**  
 Noli me tangere Gef. **307**  
     Nozilicha Lob. **67**  
     Nuchani **23 b**  
     Nuchri **458**  
 Nummularia ejusq; species **309**, fvl. Gef. **252**  
 Nux juglans ejusq; species **417**, barbara Plinii **418 b**  
 Nux moschata ejusq; species **407**, Bâdenfis **ibid.**  
 Indica Matth. **507**, de Coulcou **510 b**  
 Nux infana **444**, merella Matth. **568**, officin. **511 b**, purgatrix **418 b**, vesicaria **401 b**, vomica officin. **511**  
 Nuces exoticæ **ibid.**  
 Nucula terrestris **162**  
 Nucula Indica **410**  
 Nuciperfica **440 b**  
 O  
 Occhio xochil **48 b**  
 Ochrus fvl. Lob. **343**  
 Ocymastrum Fuch. **225**, Matth. **204**, alterum Trag. **235**, verrucarium Gef. **168 b**  
 Ocymastrum Valentinum Cluf. **230**, Valerianthos Lob. **165**  
 Ocymoides alpinum Gef. **206 b**, fruticosum Cam. **205**, lychnitis Col. **206 b**, minus seu albi Lob. **205**, mulcosus Ponç **206 b**, noctiflorum Camer. **205**, peregnum Gef. **205**, polygoni folio Lob. **206 b**, repens Cam. **ibid.**  
 Ocimum ejusque species **225**, fvl. **ibid.**  
 Ocimum cereale **27 b**  
 Ocosole **102 b**  
 Ocularia **233 b**  
 Oculis bovis Brunf. **261**  
 Oculis Christi Lugd. **266**  
 Odontis Cam. **205 b**  
 Odontitis Gef. **210**, Tab. **234**, lutea Lugd. **277 b**  
 Oenanthe ejusque species **162**, fructus **299 b**  
 Oenoplia **477**  
 Oenothera Plinii **245 b**  
 Ocum Theoph. **473**  
 Ocum Plinii **90 b**  
 Ogegha **444**  
 Okceponauk **91**  
 Okindiger **340**  
 Olea ejusque species **471**, Æthiopica Cordi **392**, Bohemica **472 b**  
 Oleander **464**, fvl. Avic. **461**  
 Oleaster **472 b**, Germanicus **477 b**  
 Oleum abiegnum **101 b**, styracinum **102 b**  
 Olibanum **500 b**, **101**  
 Olyra Ad. **22**, Cord. **23**  
 Olënichium Cord. **133 b**  
 Olufatrum Cæf. **154 b**  
 Olus Hispanicum Trag. **114 b**  
 Olus Judaicū Avic. Rauw. **317**  
 Omphalocarpus Plinii **334**  
 Onagra Cæf. **245 a, b**  
 Onobolus Hipp. Ang. **285**  
 Onobrychis arvensis ejusq; species **215**, leguminosa ejusq; species **350**, Fracast. **352**  
 Onogryos Nicædri Gef. **382**  
 Ononis ejusq; species **189**  
 Onopordon Dod. **382 b**, Ger. **385 b**, Lugd. **382 b**  
 Onopryos tertia Lugd. **382 b**, Dodon. **385**  
 Onopteris Tab. **355 b**  
 Onosma Matth. **255**  
 Ophioglossum ejusq; species **354**  
 Ophioscorodon **74**  
 Ophris ejusque species **87**  
 Ophiolima **233 b**  
 Opinaurk **91**  
 Opium **494 b**  
 Opopanax **494 b**  
 Opul<sup>9</sup> Columel. Dod. **447 b**, campef. **431 b**, montana Lugd. **431**, Ruellii **456 b**  
 Opuntia **458**, marina Cortusi **364 a**, Osteocollos **458 b**  
 Ostrea in arboribus **514 b**  
 Orbitochyro Belli **310**  
 Orechis ejusq; species **81**, abortiva Cluf. **86 b**, andrachnitis **83, 84**, angustifolia Fuch. **82**, antropophora Col. **82 b**, bifolia **82**, Cam. **81**, trifolia **ibid.**  
 Orechis fetida ejusque species **82 b**, fucum referens **81**, latifolia **80**, lutea **83, 84**, mellitris Lob. **83 b**, montana **86 b**  
 Orchis morio ejusque species **81 b**, muscam referens **81**, minor odorata **86 b**, odorata **84**, ornithophora Lob. **81**, **84**  
 Orchis palmata ejusq; species **85**, repens **84 b**, rotunda Lugd. **81 b**  
 Orchis Scirpatis ejusque species **82**, sphegodes **83**, stratumantica **81**  
 Ordilion Ang. **161**  
 Oregioella Cluf. **406**  
 Orefellinum Tab. **150**, Ang. **152**, Fuch. **153**, Dod. **150**, Tab. **ibid.**  
 Origanum ejusque species **223**, tertium Dios. Quad. **231 b**, verticillatū Thal. **225**  
 Oryza **24**, Germanica **22 b**, fvl. **2**  
 Ornoglossum **416**  
 Ornus **415 b**, Bellon **416 b**, Pandect. **419 b**, Tragi **427**  
 Orobanchæ ejusq; species **87**, Gef. **86 b**, Ruellii **295**, Theoph. **294 b**, legumen Lugd. **345 b**  
 Ornithogalum ejusq; species **69**, Arabicum **70**, luteum ejusq; species **71**, spicatum **70**  
 Ornithopodium ejusque species **350**, alt. Dod. **449 b**  
 Orobis ejusq; species **346**, Americanus **344 b**  
 Orobis fvl. ejusque species **351**, fvl. Trag. **345**  
 Orontium Dod. **212**  
 Orvala Dod. **238**  
 Orzada Monard. **213 b**  
 Osamener **421**  
 Ostryis Dod. **212**, Lob. **212 b**, Austriaca Cluf. **213**, minor Tab. **ibid.**  
 Osleonis Cæf. **211, 212**  
 Osmunda Lob. **358**, Trag. **345**  
 Osmundula Lon. **358**  
 Ossar Belli **116**  
 Ossea Lon. **447 b**  
 Osteocollon Lugd. **15 b**, Cam. **209 b**  
 Ostericiū montanū Trag. **186**, fvl. Trag. **155 b**  
 Ostrucium Lon. **116**  
 Ostrya Cord. **427**, Theoph. **198**, Theoph. Lob. **415**  
 Ostfrys Theoph. **427**  
 Othonna Lob. **132 b**  
 Orites Tab. **206**  
 Ovaria **472**  
 Ovaria Gef. **226 b**  
 Ouludia Lugd. **57**  
 Ourari **184 b**  
 Oxyagrostis **7**  
 Oxalis ejusq; species **114**  
 Oxya Bellon **419**  
 Oxyacantha **454**  
 Oxyacanthus Galeni **454 b**  
 Oxyarceutis **489 b**  
 Oxycedrus Lob. **487**, Theoph. **489**  
 Oxycoccon Cordi **471 b**  
 Oxylapathum **115**, aquat. **191**  
 Oxymisline Ang. **470 b**  
 Oxyphezenicum **423 b**  
 Oxyis Plinii **370**  
 Oxyfchenos **10 b**  
 Oxytriphylon Lob. **332 b**, **330 b**  
 P  
 Pacayes **417 b**  
 Pacil Indis **427 b**  
 Paco **308 b**, **ibid.**  
 Pacoaze **ibid.**  
 Padus Lugd. **451**  
 Peronia Galeni **512 b**  
 Pagatower **25**  
 Payco Lugd. **189**  
 Pala Ariena Plinii **438 b**, Bellon. **458**, Plinii **397 b**  
 Palatum leporis Cæf. **490**  
 Palea de Mecha **11**  
 Palurus Africana Theoph. **478 b**, Gef. **454**, Ruel. **453 b**  
 Palurus Athenæi **472 b**, Bell. **474**, Lacun. **425 b**  
 Palla Garzæ **407**  
 Palma Christi Gallorum **432**  
 Palma Christi ejusque species **85**, palustris **86**  
 Palma aut Palus sanctus **448 b**  
 Palma ejusq; species **106**, caryotis Dios. **509 b**, cichorin **107**, cyprina Theoph. **107 b**  
 Palma coccifera ejusq; species **108 b**, Indica **109**, facifera Cluf. **107**  
 Palma squammosa fructus ejusq; species **110 b**, vinnifera Thvetto **107**  
 Palmapius **510 b**  
 Palmæ sanctæ similis **448 b**  
 Palmaria Tab. **285 b**



# I N D E X.

- Palmeta humilia* Scalig. **19**  
*Palmisolum giganteum* Imper. **304 b**  
*Palmatus* **107 b**. *femellæ* **509 b**  
*Palmula marina* Imp. **362**  
*Palmule Thebaice* **403 b**  
*Palo d'Águla* Lincf. **394**.  
*del cebra* **301**  
*Palo arbor* **439 b**  
*Paludapium* Tab. **154**  
*Palus Indiz* **448**  
*Panax ejusque species* **106**.  
*chironii* Theoph. Ang. **276**. Cam. **156 b**. Matth. **463**. Tab. **266**. Lugd. **156**.  
**278**. Lon. *ibid.* b. *chironium minus* Cam. **466 b**  
*Panax collinum* Tab. **156 b**  
*Panax Heracleum* Matth. **156 b**. Ang. **319 b**.  
*Cæf.* **156**  
*Panax peregrinū* Dod. *ib.*  
*Pharmacum* Plinii **268**.  
*recentiorū olulatri* Lob. **156**. Syracum *ibid.* *tenuifolium* Theoph. **278**  
*Pancratii* Gef. **42**. **43**. Dod. *ib.* **54 b**. Diof. *Cluf.* **72**.  
*Cæf.* **72**. *Indicum* **33**  
*Pancaleolus* Cæf. **162 b**  
*Panicatiella* Cæf. **8 b**  
*Panicum ejusque species* **27**.  
*Æthiopicum* *ibid.* b. *Indicum* **26**. **27**. *peregrinū* **25**.  
*fyl.* **8 a, b**  
*Panicūculi* **330 b**. *porcinus* **308**. *Indori* **90 b**.  
**91**  
*Pannachio Persiano* **80**  
*Pannus* *libro* **19 b**  
*Papaie fructus* **457 b**  
*Papas Indorum* **167**  
*Papaver ejusque species* **170**  
**171**. *erraticum* *ibid.* b.  
*Heraclei* Coli: **273 b**. *spinofum* **171 b**. *spumeum* Lob. **205**. Cæf. **273 b**.  
*Diof. quorundam* **279**.  
*Gef.* **291 b**  
*Paperas* **19**  
*Papyrum ejusque species* **16**.  
*Papillaris* Cam. **123**  
*Papulles Cretica* **343 b**  
*Paquouere* **308**  
*Pavacoccolus Guiland.* **168**  
*Paralytica* **241 b**. **242**  
*Parapara* **184 b**. *Cluf.* **341 b**  
*Paravas* **123 b**  
*Parietaria* **121**. *Monfep.* **230 b**. *fyl.* **234**  
*Paronychia* Ang. Tab. **282**  
**2**. *altera* Matth. **282**. *al-*
- terfolia* Lob. **108 b**.  
*Hispanica* Cluf. **281 b**.  
*myagrifolia* Gef. **109**  
*paronychia* Matth. **356**.  
*lacinia* **285**. *rutaceo folio* Lob. *ibid.*  
*parote Mexico.* **138**. **120 b**  
*parthenium ejusque species* **133**.  
*Trag.* **135**. *nobile* *Gef.* **135**  
*passerina* Trag. **259**. *minor laxatilis* **214 b**  
*passula Corinthiæ* **299**  
*pastellus herba* Lincf. **113 b**  
*pastinaca ejusque species* **151**.  
*aquatica* Lob. **154**. *latifolia* **155**. *latifolia fyl.* Dod. **155 b**. *marina* Lob. **288 b**. *nigra* fyl. *Cord.* **162 b**. *pratensis* Theoph. *Cord.* **162 b**. *Syriaca* Lugd. **155 b**  
*patecas* **311 b**  
*pater noster* Lugd. **14**  
*pavame Indorum* **33**  
*pavana* **393 b**  
*pavate* **392 b**  
*peffen veneris* Lob. **152**  
*pedicularis ejusque species* **163**. *Cord.* **324 b**. *fortida* *Trag.* **185**  
*pæderota Paulam.* **247**  
*pedua Guilam.* **133**  
*peganion* Narbō. *Ad.* **336 b**  
*pelecinus* Gef. **349**  
*pennasofou* **512**  
*pennachio marinus* **166**  
*penna marina* Rond. **369 b**.  
*Imper.* **363 b**  
*pentaphyllum ejusque species* **325**  
*pentorobon* Plinii **323**  
*pepaio* **434 b**  
*pepitas del Peru* **442**  
*peplos Quith* **480 b**  
*peplion* Dod. **282**  
*peplis ejusque species* **293**  
*peplus* Lob. **292**  
*pepo ejusque species* **311**. *latus* **312**. *Matth.* **310**  
*pepolina* Cæf. **219**  
*percheper* Lob. **152 b**  
*perdicū* **121**. *Theoph.* **130**  
*percebecene* **169**  
*periclymenum ejusque species* **302**  
*periclymenum* *Allobrog.* **451 b**. *rectum* **451**  
*periploca ejusque spec.* **303**.  
*prior* Dod. **294 b**. *altera* Dod. **303**. *minor* Lob. *ibid.* *serpens* Lob. *ib.* b.  
*peristerona* Crætz Ang. **250**  
*perfoliata ejusque spec.* **277**.
- altera* Lugd. **154 b**. *minor* Gef. **112 b**. *napifolia* Lob. *ib.* *filiquosa* Lob. *ibid.* *fyl.* *Brunf.* **37**  
*perfoliata Achillea* Gef. **278**  
*perlaro gramen* **2**. *Bellon.* **415 b**  
*permonaria* Ang. **360 b**  
*perpenfa* Dod. **197**  
*perlea* *Cluf.* **441**. *forte* *Plinii* **512**  
*perlica ejusque species* **440**.  
*nux* **417**. *minor* **442 b**  
*periscaria ejusque species* **101**  
*filiquosa* Lob. **307**  
*perfonata* *Plinii* **197**. **198**  
*Peruana Alois facie* **423 b**  
*pevinca* *Trag.* **101**  
*pes anferimus* *Fuch.* **119**.  
*afini* *Pandect.* **110**. *columbinus* **318 b**. *corvi* *Brunf.* **179 b**. *leonis* *Ad.* **264**. *leonis* **319**.  
*milvi* *Ang.* **336 b**  
*petalites ejusque species* **197**  
*petrocerafus* **457**  
*petromarula* *Belli* **93**  
*petroscorodon* Gef. **75 b**  
*petrofelinum* **153**. *fyl.* **163**  
*petrofelini vitii* *Trag.* **161**  
*petrum* *Thev.* **169**  
*peuce ejusque species* **491**  
*peucedanum ejusque species* **149**. *Lonic.* **158 b**.  
*aquatium* *Tab.* **141 b**  
*phaeoides* *Orisabi* **463 b**  
*phagus Græcorum* **420**  
*phalangites* *Cord.* **29**  
*phalangium ejusque species* *ibid.* *Cretæ* *ibid.*  
*phalaris ejusque species* **28**. *parva* Cæf. *pratensis* Lob. **2**. *fyl.* **8 b**  
*phallus Holandicus* **85**.  
**374 b**  
*phana* *Bellon.* **485**  
*phaeolus vulgaris ejusque species* **339**. *Æthiopicus* **340 b**. *Africanus* *Cluf.* **340**. *Brasilianus* **341 b**.  
*Guinenfis* *ibid.* *Nigritarum* *ibid.*  
*phalcolus Indicus ejusque species* *ibid.* *pereginus* *Cluf.* **338**. **340**. *Belli* **351**.  
*Peruanus* **338 b**. *primus* *Tragi* **342**  
*phalcolus fativus* Dod. **338**.  
*fyl.* Dod. *ib.* b. *fyl.* *Lugd.* **343**. *fylvarum* *Lugd.* **351**.  
*Turcius* Cæf. **339**  
*phafelus* Cæf. **339 b**  
*phafelus Romanus* **432**  
*phelodrys ejusque species* **425**. *cocciera* **425**
- phellandrium* Dod. **161 b**  
*phylantropus* *Plinii* **384**  
*philyca* *Theoph.* **476**  
*phillyra* *Gef.* **426 b**  
*phillyrea ejusque species* **476**. *Cæf.* **430 b**. *Dod.* **474**  
*phyllitis ejusque species* **131**.  
*lacustris* *Cord.* **191**  
*phyllon* *Lugd.* **284 b**. **285**.  
*Theoph.* *Cord.* **121**  
*phyllon spicatum & testiculatum* **122**  
*phyteuma* Cæf. **92**. *Matth.* **93**. *Belli*. **212**. *Monfep.* **100 b**. *Diof.* *Colum.* **270**  
**b.** *minus* *Col.* **271**  
*phylimilon* **507 b**  
*phlomis* Lob. **241**. *phlomos* **239**. **240**  
*phlos mas* *Lugd.* **194**.  
*foemina* *Lugd.* **15**  
*phlox* *Theoph.* **198**. **201 b**  
*phœnicobalanus* **441 b**  
*phœnix carduus* **379 b**  
*phœnix* **92 b**.  
*phorbion* *Galen.* **238**  
*phorel* **508**  
*phorealida* **97 b**  
*phothora* Lob. **184**  
*phitroctonon* **124**  
*phus ejusque species* **164**  
*picca ejusque species* **493**.  
*Dod.* **505**  
*pycnocomon* Ang. **100**.  
*Diof.* *Cortuso* **167**.  
*Brunf.* **155 b**. *Col.* **169 b**.  
*Cretæ* Lob. **379 b**  
*pioris* *Lugd.* **128**  
*pigamum* *Lugd.* **336**  
*pygus* *Theoph.* **434**  
*pila marina* Cæf. **363 b**  
*pilofella ejusque species* **262**.  
*major* **128 b**. *major* *Gale* *lor.* *Thal.* **129**. *minor* *Fuch.* **265**. *filiquata* *Cam.* **108 b**. *fyl.* *Trag.* **354**  
*pimento del rubo* **423 b**  
*pinipella ejusque species* **159**. *fol.* *Agrimoniz* **522 b**. *Romana* Cæf. **152**.  
*spinofa* *Cluf.* **331 b**  
*pinas* **384 b**. **433 b**  
*pina radix* **91 b**  
*pindo* **513 b**  
*pinca purgativa* **492 b**  
*pinguicula* Gef. **243 b**  
*pinioen* **495 b**  
*pinipitichi* **494 b**  
*pinalter ejusque species* **492**.  
*Austriaca* **491**. *Bell.* **492**  
*pinus ejusque species* **491**.  
*maritima* **492**. *rubra* *Plinii* **491 b**. *fyl.* *Cæf.* **493**

- Piper** 411. abortivū 412 b.  
*xethiopicum* ibid. cau-  
 darum ibid. longum ib.  
 Marth. 411 b. roundū 411  
**Piper Indicum** ejusq; spe-  
 cies 102  
**Piperis** radix Diosc. 36 b  
**Piperitis** Bruef. 97  
**Pyracantha** Lob. 454 b  
**Pyramidalis** Lugd. 93  
**Pyra infana** Czf. 167 b  
**Pirraza** Theoph. Guil. 486  
**Pyralter** 430. Idæus Gef. 452 b  
**Pyrethrum** ejusque species 148. Bruef. 98. syl. Dod. 98 b. alpinum Gef. 136 b  
**Pyrola** ejusq; species 191  
**Pyrum marinum** Ald. 369 b  
**Pyrus** ejusq; species 438  
**Pistana Magonis** Plinii Lob. 104  
**Pistlochla Fuchsi** 143 b. Dod. 307 b  
**Pisum** ejusque species 342. cordatū Lob. 143. Græcorum Trag. ibid. nigrum Cam. 318 b. Tab. 343. syl. Trag. 344  
**Pisum Americanum** Lugd. 343 b. Indicum ejusque species ibid.  
**Pisnuda Indica** 409 b  
**Pissclæon** 104 b  
**Pistacia** ejusq; species 401  
**Pistine** Theoph. Ang. 143 b  
**Pitrys** ejusq; species 423  
**Pityula** ejusq; species 292. major 291  
**Pix** 104. navalis ibid.  
**Pyxacantha** Dod. 478  
**Planta marina retiformis** Cluf. 166 b. sanguinem movens 412  
**Plantula peregr.** Cluf. 412  
**Platæra** ejusq; species 189.  
 albidā Dod. 190. mari-  
 na Lob. ibid. b  
**Plantago angustifol.** ejusq;  
 species 489 b. aquatica  
 ejusque species 190  
**Plantaginī similis** Lugd.  
 ibid. b  
**Planta leonis** Dod. gal. 186  
**Plantula cardamines emu-  
 lata** 105  
**Plantaria** Dod. 15  
**Platanus** Diosc. 411. aqua-  
 tica 456 b. Ovidi 508.  
 Lonic. 431 b. Trag. 439  
**Platryphyllos** 419  
**Plumbago** Cluf. 97 b. Plin-  
 ii quorundam 101. Plin-  
 ii fortē 192  
**Potamogeton** Lob. 188 b  
**Podagraria** Lob. 156  
**Podi farina** 158 b  
**Pœonia** ejusq; species 323.  
 fl. pleno 324. Indica 143  
 b. mascula Lon. 223 b  
**Polemonium** Tab. ibid.  
 petrum Gef. 205. alt.  
 Dod. 165. palustre 259 b  
**Polemoniū** Mosafel. Lob.  
 328 b  
**Polyacantha** Cordi 387.  
 Theoph. Lugd. 185 b  
**Polygonatum** Ang. 178.  
 palustre Dod. gal. 189  
**Polygonum** Lugd. 281  
**Polygonemon** Lugd. 229 b  
**Polygala** ejusq; species 215.  
 legumen ejusq; spec. 349  
**Polygala** Ang. 349 b. Gef.  
 350. Camer. 451. Cordi  
 351. Lugd. 350  
**Polygonatū** ejusq; species  
 303. Tragi 204 b. 205  
**Polygonum** ejusq; species  
 281. bacciferum 15. cœ-  
 ciferū Tab. ib. fœmina  
 Marth. ib. hederaceum  
 Colum. 291. masinum  
 Tab. 15 b  
**Polygonum masculū** fruti-  
 colū Thal. 284. quart-  
 tum Plinii Cluf. 15 b.  
 Plinii Balch. 212 b  
**Polypodium** ejusq; species  
 350. Ilvense Lugd. 159 b  
**Polypodii marinum** Imp.  
 103 b  
**Polypremon** Lugd. 165 b  
**Polyrhizos** Lugd. 322 b.  
 Plinii 186  
**Polypermon** Lob. 118  
**Polytricha** Bellon. 490 b  
**Polytrichū aureum** ejusq;  
 species 356. Apuleii albū  
 Lon. 357 b. officin. 356  
**Polium** ejusq; species 220.  
 Græcorum Col. 136 b.  
 maritimum 221  
**Pomum Adami** 437 b. pa-  
 radyfi 107 b. 508 b  
**Pomum amoris** Lob. 167 b.  
 Hiericoniticum Imp. 168.  
 spinosum ibid.  
**Poncires** 437 b  
**Pontica nux** 418  
**Populago** Tab. 276 b  
**Populus** ejusq; species 429.  
 albæ similes Caf. 427  
 Pori corallio affines 167  
**Porrum** ejusq; species 72  
**Postulaca** ejusque species  
 288. aquatica 251 b. ma-  
 jor 287. marina Dod.  
 320. tertia Bruef. 383  
**Potamogeton** ejusque spe-  
 cies 193. Castoris 441  
**Potates** 91  
**Poterium** ejusque species  
 388  
**Porhol Theveti** 459  
**Pothos** Theoph. 203 b.  
 cæruleus Lugd. 301.  
 Theoph. quorundā 295  
**Potantilla** herbariorū 321.  
 prima Anguī. 164. se-  
 cunda Ang. 163 b  
**Poutjou** 246 b  
**Praffum** Ang. 230 b  
**Priapeia** Gef. 170 b  
**Primula veris** ejusque spe-  
 cies 241. Czf. 261 b.  
 Bruef. 67  
**Præcocia** 442 b  
**Procura** 362  
**Proserpinaca** Apul. 281  
**Prunella** ejusque species  
 260  
**Prunus** ejusq; species 443.  
 Myrobalanus 444. syl.  
 ibid. b  
**Pruno** syl. affinis Cana-  
 denfis 521 b  
**Pruna infana** 444  
**Prenidactyla** 443  
**Pseudoacorus cæruleus**  
 Tragi Lugd. 32 b  
**Pseudoagnus** Dod. 451  
**Pseudoamomū** Gef. 455 b  
**Pseudoapios** Marth. 444 b  
**Pseudoapocynna** 307 b  
**Pseudoasphodelus** Cluf.  
 29 b  
**Pseudobunias** Dod. gal. 98  
**Pseudocapellum** Dod. 167  
**Pseudochamaebuxus** 471 b  
**Pseudochamaedrys** Gef. 249  
**Pseudocyperus** Lob. 6.  
 Thal. ibid. b  
**Pseudocytisus** Dod. 190  
**Pseudoclinopodiū** Marth.  
 225 (314)  
**Pseudocolocynthis** Eyll.  
**Pseudocoronopus** Dod.  
 gal. 190  
**Pseudocostus** Marth. 166 b  
**Pseudocrania** Cordi 447 b  
**Pseudodidamū** Mart. 222  
**Pseudocelleborus** Marth. 186  
**Pseudocupatorium** Dod.  
 gal. 320  
**Pseudoiris** Dod. 14 b  
**Pseudolentopodiū** Marth.  
 263 b  
**Pseudoligustrum** Dod. 451  
**Pseudolymachium** Dod.  
 245 b  
**Pseudolonthitis aspera**  
 Marth. 359 b  
**Pseudomelanthiū** Marth.  
 204 b  
**Pseudomelilotus** Cam. 312  
**Pseudo-myragrū** Marth. 109  
**Pseudomyrtus** Bell. 469 b  
**Pseudomoly** Lugd. 211  
**Pseudonardus** Marth. 216  
**Pseudonarcissus** ejusq; spec.  
 32 b. gramineo folio 11 b  
**Pseudoorchis** Cluf. 14 b.  
 Dod. 87  
**Pseudoscycomor** Matt. 415  
**Pseudostanthiū** Marth. 109  
**Pseudoturperum** 149 b  
**Psyllium** ejusq; species 191  
**Psipacia** Belli 313 b  
**Psiphelida** Belli 323 b  
**Pearmica** Marth. 98. alfe-  
 ra Marth. 272. montana  
 Lugd. 185  
**Pteridion** Cordi 358 b  
**Pteridion mafc.** Cordi 358  
**Pucho** Lincf. 16 b  
**Pulegiū** ejusq; species 222.  
 aquaticum Eyll. 227 b.  
 montanū Lon. 225. pet-  
 træ Gef. ibid. syl. Dod.  
 228 b  
**Pulicaria** herba Lugd. 191 b  
**Pulicaria** Gozz. 265  
**Pulmonaria** ejusq; species  
 259. Gallica Lob. 129.  
 Gef. 322. minor Lugd.  
 258 b. Romana Caf. 258.  
 Vegetii Gef. 185  
**Pulmonaria** Marth. 361 b  
**Pulmo marinum** Marth. 369  
**Pulsilla** ejusque species  
 177  
**Pumex quercinus** 422  
**Pummuckoner** 421  
**Q**  
**Madrisolum phæum**  
 Lob. 127 b  
**Quamoclit** 398 b  
**Quemolles** 401 b  
**Quercula** 248  
**Quercus** ejusque species  
 419. excrimenta 425.  
 gallifera 420. lapidea  
 421  
**Quercus marina**, Cluf. 166.  
 Lob. 364  
**Quinquifolium** ejusq; spe-  
 cies 325. album ibid. e-  
 rectum ibid. b. fragif-  
 erum Tab. 326. luteum  
 325. tuberosum 326 b  
**Quina** Cluf. 121  
**R**  
**Abaxit** 512  
**Radicula** Dod. 96.  
 Imper. 206 b. syl.  
 97  
**Radix** Caf. 96. china 296.  
 Carlo sancto 293 b. ca-  
 va Lob. 143 b. cava mi-  
 YY 2

- aima Ger. 178 b. contra  
 venena 14. S. Helenæ ib.  
 Idæa Col. 305. Ang. 470.  
 Quimbaia 298. Rhodia  
 286  
**Radices** quib. Indi vescunt  
 90. in Virginea 91  
**Ranunculus** ejusq; species  
 178. Aconiti folio 182. ar-  
 quaticus Fuch. 180. ar-  
 vaticum Lob. 79 b. Afia-  
 ticus Cluf. 181. Aphro-  
 deli radice ibid. b  
**Ranunc.** bulbosus Lob. 179  
 Creticus 181. echinatus  
 179 b. 180. flâmæus Lob.  
 ibid. b. fœniculaceus  
 Col. 141 b. fl. globoso  
 Dod. 182 b  
**Ran.** grumosa radice ejusq;  
 species 179. lanceolatus  
 Tab. 180 b. lanuginosus  
 181. latifol. Lugd. 309 b.  
 longifolius 180 b. Lufi-  
 tianicus 181 b.  
**Ran. montanus** 180 b. ejus-  
 que species 181 b. nemo-  
 rum 177-178. palustris  
 180. phragmitis 178. prae-  
 tensis 178. saxatilis 182 b.  
 tuberosus Dod. 179  
**Rapa** ejusq; species 89  
**Rapa** brassica 111  
**Raphanus** ejusq; species 96  
 aquaticus 97. major ib.  
 rutilicans 96 b. Lob. 97.  
 syl. Cord. 94. Lob. 97  
**Rapistrum** ejusq; species 97  
 aquaticum Tab. 97 b. fyl.  
 Irionis folio Col. 101 b  
**Rapum** Americanum 90.  
 Brasilianum ibid. geni-  
 itæ 87. fyl. Matth. 90 b  
**Rapunculus** ejusq; species  
 92. alopecuroides Cluf.  
 ibid. b. corniculatus Col.  
 ibid. b. hortensis Trag.  
 155. nemorosus 93. spi-  
 carus 92. umbellatus  
 Thal. ibid.  
**Rapuntium** umbellatum  
 Col. 287  
**Ratriak** 513 b  
**Regina prati** Dod. 64 b  
**Releda** ejusq; species 100.  
 lapidea ibid. b  
 Releda maritima 365 b  
**Resina** ejusq; species 100.  
 laricea ibid. b. sicca  
 104 b  
**Resita bovis** ejusque species  
 388  
**Retula** 366 b  
**Rha** ejusq; species 116  
**Rhiabarbarum** ibid. Indicū  
 297 b. monachorum  
 Triagi 115 b  
**Rhagadiolus** Cæf. 128  
**Rhamn** ejusq; species 477.  
 tertius Diof. Lob. 434 b  
**Rhaponticum** 116-117  
**Rhafut** Lugd. 307 b  
**Rhizotomus** Plinii 33  
**Rhodacina** 440  
**Rhododaphne** Cæf. 464  
**Rhododendron** Diof. 464.  
 alpinum Cæf. 468 b  
**Rhodora** Plinii 163  
**Rhumbotinus** 431 b  
**Rhus** ejusque species 474.  
 coriariorum Cæf. 429.  
 herba Plinii Cluf. 414 b  
**Rhus** myrtifol. Plin. 471 b.  
 Plinii minor 470 b. Vir-  
 ginianum 521 b  
**Ribes** ejusq; species 455.  
 Serap. Cæf. 454 b. Cam.  
 455 b  
**Ricinus** ejusq; species 432.  
 Americanus folio ficus  
 521 b  
**Rima maria** Ang. 110  
**Ritro** Theoph. Lob. 381 b  
**Robur** ejusq; species 420  
**Robus** 21 b  
**Roccella** Imper. 365 b.  
 Cardan. 455  
**Rogga** ejusq; species 23  
**Rola** ejusq; species 480.  
 alpina Gef. 466 b. 468 b.  
 Hiericonth. 484. Hieric.  
 Frago. 276 b. mofcata  
 482. pomifera 484. Sper-  
 mionia Plin. 483 b. lub-  
 viridis 482 b  
**Rofa** fyl. ejusq; species 482  
**Rofa** Indica Gef. 132. Ju-  
 nonis 76. mariana 203 b.  
 205  
**Rofa** græca Plinii 203 b  
**Ros** Libani 497  
**Rosmarinum** fyl. 415 b.  
 Matth. 467 b  
**Rosmarin** 217. ferulaceus  
 Ad. 158. Theoph. Ang. 157  
**Ros** Solis ejusq; species 357  
**Rostrium** porcum 126 b  
**Rota** 18 b  
**Rubella** tindorum 364 b  
**Rubeola** ejusque species  
 334 b  
**Rubea** ejusq; species 333.  
 marina Lob. 334. spicata  
 ibid. Virginea ibid. b  
**Rubus** ejusq; species 479.  
 canis rur. 483  
**Rubus** Idæus non spinosus  
 326  
**Rucula** marina Trag. 98  
**Rumex** ejusq; species n3  
**Rufcus** 470. fyl. 433 b  
**Rufco** affinis Cef. 303 b. 305  
**Ruta** baccifera Tab. 398 b.  
 canina Lob. 236 b  
**Ruta** capraria Tab. 312.  
 lunaria Tab. 354 b. mu-  
 raria Dod. 336 b  
**Ruta** ejusque species 336.  
 hypericoides 280 b  
**Ruta** pratensis ejusque spe-  
 cies 336  
**Ruta** fyl. Diof. 279 b. fyl.  
 Cæf. 336. alt. Cæf. 337 b  
**Ruthrualcerum** Lugd. 381  
 S.  
**Abdariffa** 317  
**Sabina** ejusque species  
 486  
**Sabaucæ** 109 b  
**Sabanhpure** 412  
**Saccharum** alhufar 106. de  
 Mambu 18  
**Sæccolæ** 413 b  
**Sacque** mimenor 480 b  
**Saffaf** Syrorum 474 b  
**Sagapenum** Gef. 156. la-  
 cyina 494 b  
**Sagetaniener** 421  
**Sagitta** ejusq; species 194  
**Saga** 108  
**Sahang** 411  
**Salicaria** Gef. 245  
**Salicaftrum** Plinii 297 b.  
 Plinii Cæf. 167  
**Salicaria** 289 b  
**Salinca** 165  
**Salix** ejusq; species 473. A-  
 merina Amat. 472 b.  
 Matth. 475. Plinii 473.  
 Helice Theoph. 474.  
 marina Lugd. 365 b. Sa-  
 bina Columel. 473 b  
**Salix** pumala ejusq; species  
 474 b  
**Sallaparrilla** 295  
**Sallola** Cæf. 289  
**Salvia** ejusq; species 237.  
 agrestis Dod. 248. fyl.  
 Cæf. 236. Trag. 242 b.  
 montana Gef. 248  
**Salvia** vitæ Lob. 356 b  
**Samaia** fructus 436  
**Sambac** 397-398 b  
**Sambaya** 36 b  
**Sambarane** 393 b  
**Sambucus** ejusque species  
 436  
**Samolus** Plinii 252 b. 471 b  
**Samparanton** 329 b  
**Sampluchus** ejusq; species  
 224  
**Sanamunda** 278 b. 321.  
 Cluf. 463 b  
**Sana** sancta 169  
**Sandal** fœmen Cæf. 343  
**Sandalida** Cretica 333 b  
**Sandaracha** Aristot. 300  
 ib.  
**Sandarax** ibid.  
**Sanguen** Cæf. 447 b  
**Sanguinalis** mas Cord. 28  
 formina Cord. 16  
**Sancunaria** Trag. 8  
**Sanguisorba** 150  
**Sanguis** draconis herba 115  
 officin. 499  
**Sanicula** alba Gef. 322. of-  
 ficina 319. formina  
 Fuch. 156  
**Sanicula** alpina ejusq; spe-  
 cies 242  
**Sanic.** rotundifolia ejusque  
 species 243 b  
**Santalum** ejusque species  
 392. cineridium 393. ru-  
 brum 397  
**Santolina** Dod. 156 b. 177  
**Santonium** Cord. 156 b  
**Sapinus** Bellon. 493  
**Saponaria** ejusque species  
 206. concava ibid. b.  
 minor Lugd. ibid.  
**Sapumener** 421  
**Sarco** collar. 458  
**Sarcophago** 97 b  
**Sargazo** Lugd. 365  
**Sari** Theoph. 19. Indorum  
 246 b  
**Saseni** 99 b  
**Sassificaltorum** 274 b  
**Sassifras** 438  
**Saxifraga** Indica ibid.  
**Satyrium** Cæf. 40 b. bali-  
 licum 84. callianum 76.  
 crithronium 46. cry-  
 thrion. Lob. 57  
**Satyrium** mas 81 b. 82. ni-  
 brum Lugd. 87 a. b. pri-  
 mum Brunf. 80. ostiari  
 Trag. 186 b. trifolium  
 Dod. 45 b. Diofot 57  
 Fuch. 87. Lugd. 77 b.  
 trifolium Matth. 57 b  
**Satyrii** utrunq; Maub. 85  
**Satureia** ejusq; species 218.  
 lutea Lugd. 234 b  
**Savina** fyl. Trag. 360 b  
**Saxifraga** tertia Matth. 10  
 b. tertia Cæf. 153 b. ma-  
 tia Col. 251 b. Anglica  
 281. antiquior 211. an-  
 rea 309 b  
**Saxifraga** alba rotundifo-  
 lia 309. Fuch. 356. prima  
 Matth. 218 b. magna  
 Matth. 211. tertia Brunf.  
 258. altera Cæf. 153 b  
**Saxifraga** montana Gef. 152  
 lutea Gef. 336. lutea  
 Fuch. 336  
 Saxif.



- Saxif. Pannonica 150. petraea Pong 284 b. pimpinella 159. Romanorum . Lug. 101. rubra Tab. 163 b. Brunf. 166. rubra Thal. 316
- Scabiosa ejusque species 269. alpina Lob. 270. arvensis 269. capitulo globoso 270 b. folio scilicet 269. mōtana 270. ovilla 92 b. praecis 269. plifera 270. stellata 271
- Scammonea ejusque species 294. minor Plinii Tab. 295 b. parva Cam. 294 b. Paravina. 295 b
- Scammoneum succus 295 b
- Scandix ejusque species 152. 153
- Scariola 125. fyl. Ang. 124
- Scelerata Apuleii 180
- Scheha Arabum 119 b
- Schenna Graec. 476
- Schoenopetalum 72 b
- Schwarzen 8
- Seilla ejusque species 73
- Scirpus Trag. 7. Indicus 12. major ibid. 238
- Scilarea Matth. 238
- Scolymus ejusque species 283. Diof. Lugd. 384 b. Theoph. Cluf. 384
- Scolopendria Trag. 324. leguminosa 349. major Ionic. 319. vulgar. 313
- Scoparia 212
- Scopa regia 98 b. Plinii Dalech. 112 b. 238
- Scordium ejusque species 247. alterum Plinii 238. majus Plin. Gef. 248
- Scordotis Plin. Belli 248 b
- Scorodonia Thal. 247 b
- Scorodoprafum 74
- Scrophularia ejusque species 235. major Trag. 287. minor Brunf. 309
- Scorpioides ejusque species 287. aquaticum Gef. 254. album Gef. 253. leguminosa Lob. 310 b
- Scorpius ejusque species 394. maritimus 15 b
- Scorzonera ejusque species 275. quarta Cluf. 129
- Scotanium 415 b
- Scutellaria 231 b
- Sebeften 446
- Secacul Arabum Lugd. 155 b. Ang. 228 b. quoniam male 303
- Secale ejusque species 23
- Secalis marit. 23 b
- Secamone Alpin. 303
- Securidaca ejusque species 348
- Sedum ejusque species 382. alpinū ejusque species 284
- Sedum aquatile 286 b. Madagascarium 283. palustre Cluf. 205 b
- Sedū foliis laciniatis ejusque species 284 b. minus ejusque species 283. petraeum Pon. 277 b
- Sedum serratum ejusque species 285
- Seiscifan 473
- Selago Plinii ejus species 360 b. Plinii Cæf. 284. quibudam 485. Guil. 486. Lugd. ibid.
- Selinum 153. montanum Cluf. 150
- Selterays 143
- Semē Canariense 28. Congianum 27. sanctū 139 b
- Sementina 139 b
- Sempervivum ejusque species 282
- Sempia 366 b
- Sena Ruellii 196. vera 397
- Senetio ejusque species 131
- Senetio carduus Col. 130 b
- Sentis 479. canis 483
- Serapitis Diof. 81. batrachitis 85 b. minus 86
- Serapinum officin. 106
- Seriphilla Frago. 431 b
- Seriphium Diof. Lob. 137 b. German. Trag. 103 b
- Seriola 125
- Setis Diof. 125. lōgifolia 110
- Ser niontanum Cæf. 162 b
- Serpentaria Fuch. 129. Brūf. 309. fœmina Fuch. 192. major Lugd. 194 b. minor 195 b
- Serpentina Dod. 100 b
- Serpyllum ejusque species 220. hortenfe 219
- Serpyllum acinarium 471 b
- Serratula 238
- Serula campana Matth. 311
- Sertolaria Imper. 364
- Sefamoides majus & minus Lugd. 463 b
- Sefamū verū 27. Trag. 109
- Sesban Alpin. 352
- Sesamoides magnam Lac. 100. Lob. 185. Salmanticum Cluf. 206
- Sefam. paivum 100 b. Cord. 186. Matth. 110 b
- Seteli ejusque species 161. athiopieum Matth. 177. Cæf. 277. Creticum 148. Multidentif. 151. Matth. 161 b. aliud 162
- Sefeli palustre Cam. 162. peloponnesiacum Lob. 148. Fuchii 150. Ang. 160. Marth. 161
- Seutomalache 115
- Seutolapathum ibid.
- Seutolostaphyllum 118
- Sferro cavallo Gef. 349
- Sycamine Theoph. 419
- Sycaminodes Theoph. 422
- Siciliana 280 b
- Sycomoruse ejusque species 459. Italic. 415. Ruell. 410 b
- Sideritis ejusque species 233. prima Matth. 230. secunda Matthioli Lugd. 232 b. 233 b. tertia Mart. 132 b. 136 b. Ang. 319
- Sideritis secunda Diofcor. Col. 160 b. Cæf. 236 b. tertia Diof. Col. 319
- Sideritis prima Thal. 136 b. cærulea Thal. 246 b. Heraclea Cluf. 233. Fracast. 238. montana Lob. 233 b
- Sideritis latissima Fuch. 98 b. latif. Plinii Gef. 129. Monfpel. 230 b. pratensis Lugd. 234 a. b
- Sigillum Mariæ Cæf. 187. Dod. 297
- Sigillum Salomonis ejusque species 303. Cefalp. 186 b
- Silaum Plinii Ang. 154. Cæf. 161. forte 162 b
- Silene Theoph. Aldroan. 205 b
- Siler montanum Lob. 162. officin. Ger. 161 b. Creticum Cam. 162 b. pratense Dod. 162 b
- Siler Plinii Cæf. 428 a. Lugdun. 428 b. arbor Ang. 474
- Silybum Lob. 381. Lugd. 382
- Siligo Lob. 21. Trag. 23. Turcia 22 b
- Siliqua Theoph. Trag. 319
- Siliqua arbor ejusque species 402. Indica 403
- Siliquastrum Bellon. 402
- Siliquastrum ejusque species 102
- Silybion Diof. 156
- Silphium succus 499
- Symphitum ejusque species 239. petraeum Thal. 211. Lob. 260 b. tertium Taber. 268 b
- Symphitum petraeum Matr. 280
- Synphyum maculosum ejusque species 259
- Symphonia Plinii 121 b
- Synachia Lugd. 313 b. 314
- Sinapi ejusque species 99. agreffe Trag. 95. album Lugd. 112 b. echinatum Lugd. 99 b. pumilum alpinum Cluf. 105. fyl. Fuch. 100 b
- Sinapi & Thlaspi media provincialis Platar 109 b
- Sion Crataev. 104 b. Fuch. 252 b. ejusque species 154
- Syphonium Tab. 9 b
- Sippo Brasilian. 293 b
- Syringa ejusque species 598. laciniatis foliis 476
- Syrinx L. ob. 17 b
- Sisfarum ejusque species 155
- Pevanum Tab. 91 b
- Sifer Matth. 151 b. palustre Lugd. 163
- Sifon Diof. 154. Lon. 161
- Sifymbrium Matth. 228. cardamine Lugd. 104. fyl. Cæf. 97 b
- Sifymbria mētha Lob. 227. Ger. 228
- Sifyrinchium ejusque species 40. Cordi 71
- Smilax aspera ejusque species 295
- Smilax arbor Lugd. 425. Cæf. 102 b
- Smilax hortenfe ejusque species 319
- Smilax lvaix ejusque species 294
- Smyrnium Matth. 154. Cord. 155. Fuch. 158 b
- Soda Lob. 289. Cam. 316 b
- Sodouaya 246 b
- Solaris herba Gazæ 253
- Sol Indianus Lon. 276 b
- Solanū ejusque species 166. bacciferū 166 b. Mexicanum 168 b. spinolium 167 b. 168. tuberosum 167
- Solan. pomiferum ejusque species 167. peregrinum Lac. 243. terraphyllum Lob. 167. triphyllum, ib.
- Soldanella ejusque species 295
- Solea equina Lugd. 349
- Solidago Bruc. 261. Ang. 268. Sarracena Lon. 235. alia Trag. 246. tertia Trag. 266 b
- Solfiora Thal. 357
- Sonehus ejusque species 123. arborefcens 123 b. alper 124. levis ibid.
- Sonehus montanus ejusque species 124 b

- Sonchus villosus* ejusque species 124 b  
*Sophora Alpini* 332  
*Sophia chururgorum* 109 b  
*Sora porus* 215  
*Sorbus ejusque species* 436  
*alpina* Gef. 432. *aculeata* 454 b. *terminalis* Gallor. 452. *termin.* Lob. 454  
*Sorgho* 26 b  
*Sparganium* Dod. 12 b. ejusque species 15. Ruel. 30. *Plac.* 69 b  
*Spartium* ejusque species 396. *Advers.* 395  
*Spartum* Plinii 1. *aphyllon* Lugd. 324 b  
*Spatha* 506  
*Spatula foetida* 10  
*Speculum Veneris* 215 b  
*Spelta* Czf. 21 b. *Trag.* 22  
*Spergula* ejusq. species 251  
*Spinacelus* Guil. 236. *quorundam* 238 b. *fyl.* 247 b. *Theoph.* 237  
*Sphaeritis* 273 b  
*Spagnus* Plinii 422 b  
*Sphaerulæ saponariz* 511  
*Sphondilium* ejusque species 157  
*Spica celtica* 165. *Indica* 13. *Italica* fyl. 216  
*Spicant vulgo* 360 b  
*Spica nardus* 216  
*Spina acacia* Lob. 392. *acida* 454. *alba* Czf. 382 b. *Fuch.* 381. *Dalech.* 386. *Lob.* 382. *Lon.* 478 b. *Matth.* 381  
*Spina Arabica* Czf. 382. *Dod.* 381 b. *Lugd.* 381. *cervina* 478 b. *Christi* Czf. 394. *hirci* 388  
*Spina appendix* Plinii 454 b  
*Spina infectoria* 478 b. *Judaica* 478. *Latinorum* 454 b. *Marruca* 478 b. *regia* *Theoph.* 387 b  
*Spina felicitis* *Theophrast.* Guil. 385. *foliolitralis* Lob. 387 b. *foliist.* altera 272  
*Spinachia* 114 b  
*Spinastella* Tab. 387 b  
*Spin merlo* Czf. 478 b  
*Spiræa* *Theoph.* 475. *Lugd.* 429  
*Spini vineta* 454  
*Split* Czf. 143  
*Spongia* ejusq. species 368. *in rosis* 483  
*Spongia Solis* Thal. 337  
*Spongia maris* Czf. 368 b  
*Squamata* 88 b  
*Squinanthum* 11
- Stachys* ejusq. species 236. *Spinosa* 236 b. *Ang.* 216 b. *Plinii* 238 b  
*Stacte* 502  
*Staphylinus* *Trag.* 151  
*Staphylodendrum* Plinii 401 b  
*Staphis agria* 324  
*Statice* *Lugd.* 211  
*Stelephorus* *Theoph.* 405  
*Stelis vilcum* 50  
*Stella leguminosa* Lob. 350 b  
*Stellaria* *Lugd.* 251. *aquatica* Lob. 141 b. *argentea* Cam. 326 b. *Brunf.* 334. *Matth.* 320  
*Sternutamentaria* Lob. 98  
*Stryax* ejusque species 429. *lacryma* 502. *liquida* 502 b  
*Stœbe* ejusque species 273. *capitata* 271. *Salmantica* 272. *Theoph.* *Lugd.* 194 b  
*Stœbe* *Diof.* *Bellon.* 388 b. *Theoph.* *Czf.* 387  
*Stœchas Arabica* 216. *citrina* 264  
*Storax* 502  
*Stramonia* 108  
*Stratiotes* 140. *potamios* *Dod.* *gfl.* 286 b  
*Stratiotes* *Diof.* *Alpin.* 362 b. *aquatica* Czf. 362 b  
*Styrchnodendron* *Lobel.* 166 b  
*Strumaria* Lob. 108 b  
*Struthium* *Lac.* 100. *Cord.* 116. *quorundam* 161. *Fuch.* 206  
*Struthiopteris* *Cordi* 359. *Tbal.* 358  
*Suber* ejusque species 424  
*Succia* *Matth.* 269. *tertia* *Trag.* 127 b  
*Succudus* *Avic.* 216 b  
*Succus Cyrenaicus* 499 b  
*Succi exotici* 497 b. *plantarum* 493  
*Sudar* *Serap.* 477  
*Sultan* *Zambach* 76  
*Sumach* 414  
*Suneg* *Ægypt.* 141 b  
*Superba* 209 b. 210  
*Surahan* 296 b  
*Sura liquor* 509  
*Surdæ* *nucis* 417
- T
- Abacum* *Monard.* 169  
*Taxarix* 168  
*Tac arbor* 488 b  
*Tacamaaca* 430 b. 501 b  
*Tacori* 506 b  
*Tagati radix* 91 b
- Tagetes* *Indica* *Fuch.* 133  
*Tal.* *Lugd.* 19  
*T. N. Asiatica* 438  
*Tallale* 106  
*Tallafar* *Avic.* 408  
*Tamaio* 478  
*Tamalabathrum* 410  
*Tamar* 509  
*Tamaraka* 461 b  
*Tamarindus* 401  
*Tamariscus* ejusq. species 484  
*Tamarum* *Czf.* 297  
*Tamus* *Gef.* *ibid.*  
*Tamazo* 479  
*Tanacetum* ejusq. species 332. *Africanum* 132. *Peruanum* *Cord.* 131. *album* *Trag.* 98. *agreste* *Brunf.* 123. *lanuginosum* *Lugd.* 141  
*Taraxacon* 126 b  
*Tarchon* 98  
*Tartonnraire* Lob. 463 b  
*Tarum* *Cordi* 393 b  
*Tarupara* 14 b  
*Tataria* 157  
*Tarula* *Guil.* 168  
*Taura* *Gef.* 314  
*Taxus* 505  
*Teda arbor* 491 b. *Tab.* 492 b  
*Tegname* 412  
*Telephium* ejusque species 287. *Lacum.* 110. *Diof.* 258. *maculolum* *Cam.* *ibid.* *Diof.* *Col.* 480 b  
*Telephyllô* *Cratæz* 287 b  
*Tembul* 410  
*Terebinthus* ejusq. species 490. *Indica* 401  
*Terebinthina* *Venetæ* *off.* 595  
*Ternibin* 406 b  
*Terra crepola* *Lugd.* 110 b  
*Czfalp.* 124 b  
*Tertia* *merita* 37  
*Tertiola* *Czf.* 236 b  
*Tertianaria* *Tab.* 246 b  
*Terræ glandes* Lob. 343 b  
*Tetliculus* *canis* 89 b. *hircinus* 82 b. *mulcaius* 83. *vulpinus* 82 b. 83  
*Tetragonaria* *Theoph.* 428  
*Tetrahit* Lob. 233  
*Tetrorchis* 82 b  
*Teucriū* ejusq. species 247. *alpinum* 248 b. *pratense* Lob. 249 b. *Tragi* 246. 247  
*Thalidrum* ejusq. species 336. *angustifolium* *Tab.* 105 b. (b)  
*Thamecnemô* *Cordi* 304  
*Thaphia* ejusq. species 148
- Thapsus* *babirus* 239  
*Thelipono affinis* *Czf.* 309  
*Theombrotum* *Plinii* 121 b  
*Thulicrapia* *Theoph.* 444 b  
*Thymelea* *Ang.* 462. *Matth.* 461. *Trag.* 462. *minor* *Cord.* 461  
*Thuya* 488. *quarta* *Lugd.* 487  
*Thlafpidiū* *cornutū* *Trag.* 110  
*Thlafpi* ejusq. species 104  
*Alexandrinum* 108 b. *alcerum* *Diof.* 96 b. *alt.* *Cratæz* 201. *alpinū* 107  
*Thlafpi* *Alyllon* ejusq. species 107. *amarum* 106. *arvense* *latis* *siliquis* 105  
*Thlafpi* *clypeatū* ejusq. species 109 b. *Cericiū* 105 b  
*Thlafpi* *fatum* 108. *hederaceum* Lob. 108 b. *incanum* Lob. 108 b  
*Thlafpi* *fruticos.* ejusq. species 108. *maius* 97. *minus* 101 b  
*Thlafpi* *montanū* 105. 106 b. *Gef.* 205. *perfoliatum* 106  
*Thlafpi* *faxatile* 107. *spinosum* 108. *vaccinæ* *foliis* 105 b. 106. *villosum* 106  
*Ve. onizæ* *folio* 108 b  
*Thlafpi* *umbellatū* ejusq. species 106  
*Thymbraejusq.* species 218  
*Thymus* ejusq. species 219. *latifolium* 220. *nigrum* 219 b  
*Tab.* 219 b  
*Thymū* *magnū* *Alp.* 223 b  
*Thysellinū* *Plinii* *Lob.* 113 b  
*Thridace* *Galen.* 121 b  
*Thus tetræ* 449  
*Thus* 501. *Judæorū* 452 b  
*Thuris arbor* 399  
*Tianco fructus* 407  
*Tibecadi* 41 b  
*Tigridis flos* Lob. 456  
*Tilia* ejusque species 426. *mas* *Matth.* 427  
*Tinctorius flos* *Tragi* 287  
*Tinus* 461  
*Typha* ejusque species 120. *Diof.* 4. b. *cereale* *Dod.* *gal.* 21 b. *Portæ* 21  
*Tiphium* *Theoph.* 197  
*Tit* *Linscoti* 220 b  
*Tidymalus* ejusq. species 290. *amygd.* *ibid.* *characias* *ib.* *cyprifol.* 291 b. *dendroides* 290 b. *heliocot.* 291 a. b. *latifolius* 291. *linifolius* 291  
*leptophyllus* 291 b. *lu* 2910



- nato flore 190 b. maritimus 291. fyl. Lonic. 307. verrucosus Lug. 291
- Tithy. tuberosus ejusque species 292
- Tocot Guebir 430
- Tokaun 329 b
- Tomates grana 101 b
- Tomonpute radix 37 b
- Tonitum Cord. 263
- Tora Gef. 184
- Tordylion Cord. 148. Lob. 161
- Tormentilla ejusque species 326
- Torna bona Cæf. 169 b
- Tota bona Lob. 115 b
- Toucon Brasileaf. 366 b
- Trachelium ejusque species 94. giganteum 95. petreum Ponæ 93 b. 94 b. theroideis Cæf. 254 b
- Tragacantha laciyma 498
- Tragui Gef. 15 b. Dod. 222 b. Bellon. 280 b. Diof. Col. 160. alterum Diof. Lugd. 216 b. Germaniuf. Dod. gal. 119 b
- Tragus ejusque species 289. vulgare Cluf. 98. cereale Trag. 22 b
- Tragus Lob. 15 b. herba Cord. 283
- Tragopogon ejusque species 274
- Tragorhis 82 b
- Tragoriganum ejusque species 223. Cluf. 224. nothum Lugd. 255 b. praefoides 233
- Tragofelinum Tab. 159. 160
- Tragotrophon Dod. gal. 27 b
- Tranfibibil 497
- Trati Matth. 14 b
- Traupalus Theoph. 456
- Tremula Latin. 429 b
- Tribulus aquaticus 194. minor Cluf. 193 b. marinus Lugd. 288 b. fyl. Lon. 152 b. terrestris Matth. 350. Lug. 329. 330
- Trichomanes ejusque species 316
- Trifolium ejusque species 327. acetosum 330. alpinum Ponæ 328. Americum 327 b. asphaltites 327. aureum 330 b. capitulo spumoso 329. ceruinum 320 b
- Triit. cochleatum ejusque species 329. cochleatum echinatum 329 b. corniculatum Dod. 331. 332
- Trifolium falcatum Cluf. 330. fibrinum Tab. 327. fragiferum Cluf. 329. globosum ibid. 197. alpina Cluf. 197 b. altera Plinii 238. alt. Matth. 276
- Turara 184 b
- Turbur album Mefius Cæf. 149. nigrum 291
- Turpetum ejusque species 149
- Turritis Lob. five Tarrita Cluf. 112 b
- V
- Vaccaria Tab. 112 b. Dod. 204 b
- Vaccinia nigra Lob. 470
- Vaccinium Plinii Lugdun. 451 b
- Valeriana ejusque species 164. Græca Dod. ibid. b. rubra Dod. 165
- Valerianella Cof. 165 b
- Vannanas 308 b
- Veelgutra Dod. 153 b
- Volla Galeni 104 b
- Veratrum nigrum 185
- Verbafcum ejusque species 239. digitale Cofteo 243 b. lychnitris 239 b. Matth. 240. 241. montanum Cordi 205 b. falvifolium 239. 240 b
- Verbafculi ejusque species 241. alpinum 242 b. Cyanoides 273. minimum Lugd. 131. quorundam Lugd. 253. Tragi 273
- Verbena ejusque species 269. formina Trag. 100. recta Diof. 248 b. recta Cordi 321. fupina Tragi ibid. genus alt. Cæf. 230
- Verbefina Gef. 321
- Verdemarcum Cæf. 335 b
- Verengena 167 b
- Veretrum Lugd. 422
- Vermicularis 283. infipida Thal. 284
- Vermiculata motana Col. 281 b
- Vermicularia arborefcens Cæf. 284
- Vermiculatus frutex Lugdun. ibid.
- Vernix 300 b
- Veronica ejusque species 246. foemina Matth. 252. petraea Ponæ 248 b. recta cærulea Eyst. 246. ferpillifolia 247 b. lupinal Lob. 249. tetragona Col. 249 b
- Vernucaria Gef. 130 b.
- Lugd. 233
- Veficaria Cæf. 166. nigra Tragi 343
- Uhebebafoe 512
- Viburnum 429. Gallorum 300
- Vicia ejusque species 344. Africana Cluf. 343. felamacea Col. 350. Tabgr. 344 b
- Victorialis rotunda 41. lon. ga 74 b
- Vinea pervinea 301
- Vincetoxicum Cæf. 187. & 188. Indicum 303 b. vulgare 303
- Vincibofcum 302 b
- Vingum Gazæ 90
- Vinum de palma 107 b. 109
- Viola alba Theoph. 55. alpina 199 b. agrestis Tragi 206. aquatilis Dod. 141. arborefcens Matth. 199 b. barbata Lugd. 208 b. 209. calathiana Gerard. 95 b. autumnalis Gef. 182 b. calathiana Plinii 244 b. canina 199
- Viola damafcena Iobcl. 202. dentaria Dod. 322. flammea Fuch. 133. 207. humida 243 b. lutea fyl. 109
- Viola lunaria ejusque species 203
- Viola martia ejusque species 199
- Viola matronalis ejusque species 202. Fuch. 209. mariana Lob. 94. pentagonia Tab. 215 b. Peruviana Tab. 168 b. petraea Tab. 202 b
- Vionia vulgi 300
- Viperaria Ger. 275
- Virga aurea ejusque species 267. regia Cæf. 243 b. 244
- Virga aurea Mexiocan. 521. fanguinea Plin. 447 b
- Vifa femen 293 b
- Vifcago Cæf. 206
- Vifcaria Tab. 205 b. 206
- Vifcum arborum 423. artificiale 425 b
- Vifnaga Matth. 151
- Vitalis major Cord. 283
- Vitalba Dod. 300
- Vitex 475
- Vitis alba 297. nigra 300. Marthiol. 297. fylv. Matth. 167. Trag. 300. fyl. Diof. 297. Septentrion. 298
- Vitis

# I N D E X.

|                                                                            |                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Vitis</i> Idæa ejusque species<br><u>470.</u> tertia Cluf. <u>432</u> b | <i>marina</i> Tab. 294 b. ter-<br>restis Lugd. 295 b                                    | <i>Uvularia</i> Trag. 94. Tab.<br>304          | Z                                                                                                                                                |
| <i>Vitis</i> Canadensis 521 b.                                             | Uppowroc <u>170</u>                                                                     | Uzeg Alpini <u>479</u>                         | <i>Z</i> Acintha Matth. <u>110</u>                                                                                                               |
| precia Plin. <u>455.</u> Virgi-<br>niana 521 b                             | <i>Ura kuciba</i> <u>424</u> b                                                          | <i>Uxidentraut</i> Lon. <u>204</u>             | Zaccon <u>444</u>                                                                                                                                |
| <i>Vitis</i> vinifera 298.                                                 | Urceolaris <u>121</u>                                                                   | Wape <u>184</u> b                              | Zadura <u>16</u>                                                                                                                                 |
| Viticella Caf. 300                                                         | Urinaria Ad. <u>126</u> b                                                               | Wassewowr <u>113</u> b                         | Zagu <u>508</u>                                                                                                                                  |
| Vitriola Ad. <u>121</u>                                                    | Urtica ejusque species 232                                                              | Wikonzowr <u>342</u> b                         | Zarneb Rhafis <u>474</u> b                                                                                                                       |
| Viurna Lob. <u>429</u>                                                     | Urtica mortua ejusque spe-<br>cies 230. Heraclea Lug.<br>231 b. lactea Matth. 231       | Winauck <u>431</u>                             | Zarzaparilla <u>391</u>                                                                                                                          |
| Ulex Plinii <u>394</u> b                                                   | Urticella Col. 225 b                                                                    | Wifanck five Vincetoxici<br>Indicum Ger. 303 b | Zatarendi Alpi. 223 b                                                                                                                            |
| Ulmaria <u>164</u> b. Cluf. ibid.                                          | Urtica 361                                                                              | X                                              | <i>Zea</i> ejusque species <u>21.</u> di-<br>coccos <u>22</u>                                                                                    |
| Ulmus 426. atinia Lugd.<br><u>427.</u> syl. Plin. <u>427</u>               | Ustilago <u>24</u>                                                                      | <i>X</i> Abrai Rauwolf. 293 b                  | Zedoaria ejusq; species 35                                                                                                                       |
| Ulvæ Ang. 20 b. palustris<br>Indica 11 b                                   | Ufuc, succus Americanus<br><u>497</u> b                                                 | Xagua Oviedi <u>434</u>                        | Zenfelacht <u>415</u> b                                                                                                                          |
| Umbilicus marinus Imper.<br><u>364.</u> Monspel. <u>367</u> b              | Uva crispa <u>455.</u> quercina<br><u>423</u> b                                         | Xanthium Lob. <u>198</u> b                     | Zeocryton <u>22</u> b                                                                                                                            |
| Umbilicus veneris Angu.<br>283. Matth. <u>285.</u> Lonic.<br>306 b         | Uva ex terra benedicta<br>Moyfi allata <u>508</u>                                       | Xyloaloes 393 b. syl. <u>394</u> b             | Zeopyrum Dod. <u>23</u> b                                                                                                                        |
| Unedo <u>460</u>                                                           | Uva marina Dod. 15 b.                                                                   | Xylobalsamum <u>400. 401</u>                   | Zerumbeth <u>36</u>                                                                                                                              |
| Unguentaria <u>137</u>                                                     | passa 299. taminea Pli-<br>nii 297 b                                                    | Xylocaflia Lob. <u>409</u> b                   | Zibeba 299                                                                                                                                       |
| Ungula caballina Tragi<br><u>197</u>                                       | Uva urfi Gal. Cluf. <u>470</u> b.<br><u>471.</u> Dod. <u>455.</u> Lugd.<br><u>454</u> b | Xylon <u>430</u>                               | Zygia Theoph. Ad. <u>431</u>                                                                                                                     |
| Unifolium Dod. 304. pa-<br>lustris Gef. 309                                | Vulgago Dod. <u>197</u>                                                                 | Xiphion Trag. 32 b. minus<br>Cluf. 41          | Zingiber ejusq; species 35                                                                                                                       |
| <i>Tegewiden</i> Lonic. <u>349</u> b                                       | Vulneraria Cast. <u>188.</u> rusti-<br>ca Gef. <u>332</u> b                             | Xiquimas radix Indica <u>91</u> b              | Zizania <u>9</u>                                                                                                                                 |
| Volubilis aspera Lon. 296.                                                 | Vulvaria <u>119</u> b                                                                   | Xyris ejusque species <u>30</u>                | Zizyphus ejusque species<br><u>446.</u> alba Colum. Bel-<br>lon. 472 b. candida Lob.<br><u>416.</u> Cappadoc. Plinii<br><u>472</u> b. <u>473</u> |
| lanuginosa Mef. 295 b.                                                     |                                                                                         | Y                                              | Zoophyta 364                                                                                                                                     |
|                                                                            |                                                                                         | Yuca <u>90</u> b                               | Zopiffa <u>504</u>                                                                                                                               |
|                                                                            |                                                                                         | Yura palma <u>507</u>                          | Zurumbeth Scrapionis<br><u>474</u> b                                                                                                             |
|                                                                            |                                                                                         | Yuucra <u>513</u> b                            |                                                                                                                                                  |



# ERRATA TYPOGRAPHICA.

P. paginam (1) lineam, (b) columnam secundam denotat.

In epist. dedicat. pag. 2. l. 13. pro vulnus, lege ulcus.  
l. 22. *aromat.* p. 6. l. 1. *India.* p. 8. l. 5. *auxis*, quod. p. 10. l. u. *versibus* expressis. b. l. 27. dein suo & quidem postremo an. 1546. cum 642. fig. Franc. fol. p. 11. b. l. 18. an. 1563. Prage fol. cufam. l. 19. *auxis*: an. 1586. Franc. fol. p. 12. l. 17. additis, ita ut sint circiter 2140. p. 13. b. l. 31. cum magnis 957. figuris an. l. 32. parvis 640 figuris. l. 35. edita cum fig. 921. p. 15. l. 3. Clutius Medicus Amstelrodamenfis. p. 19. versu 10. dignè, versu 21. solvent tibi.

In Textu P. l. 15. vomitu. p. 6. l. 15. Lon. quoad 2 fig. b. l. 19. Lon. quoad 1 fig. l. 42. & 43. quod. p. 9. l. 14. simili. p. u. l. 21. *aromat.* p. 6. l. 138. *aromat.* p. 17. l. 12. fig. 20. p. 18. l. 24. *Mambu.* p. 19. l. 38. utantur sequen- tia nominare. p. 21. b. l. 7. *Trincum lucidum.* Ger. p. 22. l. 19. *Far halicastrum.* p. 23. l. 22. *bist.* 7. p. 25. b. l. 39. *Dod.* gal. p. 27. l. 16. *Marcello.* p. 32. l. 12. *aliamentum.* p. 37. l. 17. *aromat.* l. 16. *radix* ut. p. 46. b. l. 14. *Poreti.* p. 47. l. u. *vernus pumilus.* p. 51. b. l. 32. *juncifolia.* p. 52. l. 6. *calice flavo.* b. l. 5. & est tubo. p. 55. l. 2. *Valentina.* Syver. l. 42. *Opition.* p. 57. b. l. 16. *punicum ve.* p. 60. b. l. 17. *dele* l. p. 65. l. 6. *aromat.* p. 70. l. 7. *medium.* p. 72. l. 12. *aromat.* b. l. 27. *minus vero.* p. 73. l. 8. *Squilla.* l. 9. *mutu.* l. 27. *aromat.* l. 29. *telicium.* p. 74. l. 40. *appellatur.* p. 80. b. l. post lin. 32. *Palma Christi* radice repete. Gerardo. p. 90. b. l. 28. & 23. p. 91. b. l. 43. *Coccuscav.* p. 92. l. 18. *locust.* *Avi-* *onna.* b. l. 24. *ferrato.* p. 94. l. 26. *laciniatus.* p. 95. b. l. 34. *dele* Matth. p. 100. l. 5. *Lac.* at. l. 36. *in ipso.* p. 103. b. l. 16. *Tomates.* pag. 105. b. lin. 17. *Thalictrum.* pag. 107. b. l. 41. *lege* *Tontblasti.* p. 108. l. 33. *curia.* p. 109. l. 6. *Plinio.* l. 27. c. 12. pag. 110. l. 19. *epit.* pag. 111. b. l. 29. *fit.* pag. 113. l. 32. *aromat.* p. 115. b. l. 5. *Rumicis.* l. 43. *Ang.* *Gesbor.* p. 116. l. 15. *Hydrolapatrum minus.* *dele* sativum. p. 119. l. 35. *Matthedit.* p. 120. l. 12. *Theopb.* p. 122. l. 32. *Lac-* *enicum.* p. 123. l. 15. *ligatu.* p. 125. b. l. 37. *Seris.* p. 126. b. l. 2. *folio.* p. 132. l. 24. *simbrui.* p. 144. l. 10. *illa flores.* p. 158. l. 25. *aromat.* p. 159. b. l. 35. *Ovidius.* p. 167. l. 34. *Picnocomis.* b. l. 46. *Bathlefcain.* p. 168. b. l. 19. *Marabillas.* p. 169. b. l. 41. *Perebencus.* p. 174. b. l. 12. *lanuginosus.* p. 175. b. l. 12. *cineraceo.* p. 189. l. pen. *Gareti.* p. 190. l. 16. *Clusibif.* p. 193. b. l. 6. *Tribulus.* l. 43. *prima.* p. 196. b. l. 32. *belle.* p. 203. l. 6. *Bolbanac.* b. l. 25. *aromat.* p. 205. l. ult. *petraem.* p. 207. l. 27. *Castap.* p. 209. l. 17. *pro* *Eli.* *pote* *Ger.* p. 222. l. 25. *Dislammus.* *Brunf.* p. 223. b. l. 28. *minus.* *Ad.* p. 225. b. l. 16. *feu.* l. 44. *Cam.* *ep.* p. 232. l. 3. *Cania.* p. 235. b. l. 27. *di-* *eintr.* *speciem.* p. 239. l. 16. *species quinta.* p. 251. l. 36. *fagi-*

*na.* b. l. 39. *minore.* p. 251. l. 41. *dele.* p. 252. l. 21. *bist.* & *bist.* p. 253. l. 26. *IV.* p. 255. l. 7. *suasor.* p. 258. l. 23. *rotundus.* *cujus.* p. 259. l. 43. *plumofa.* p. 263. l. ult. *Tragico.* alii. b. l. 12. *alte-* *ra.* p. 264. l. 42. *gal.* *Heliocbrysum.* *Cord.* in *Diof.* p. 265. l. 14. *Gesford.* p. 268. l. 17. *Pene.* p. 273. b. l. 26. *Clusibif.* p. 282. b. l. 26. *Chamaepitys prima* *Diof.* p. 284. l. 40. *dele* *hist.* p. 288. l. 12. *aromat.* p. 292. l. 34. at. l. 36. *Diofcoridi.* p. 293. l. 39. *pastillu.* p. 294. b. l. 41. *Ervanga.* p. 299. b. l. 30. *cre-* *fiere.* p. 304. b. l. 40. *Cast.* *Hippoglossum mas* & *femina.* *Ger.* *Uvularia mas.* five *Laurus Alexandrina.* *Tab.* *ico.* *Uvularia femina.* five *Hippoglossum.* *Tab.* *ico.* p. 308. l. 14. *palmaru.* p. 314. l. 24. *folii.* p. 318. b. l. 7. *dele* *Cam.* p. 322. b. l. 31. *alia.* p. 323. l. 7. *Cam.* b. l. 30. *Psiphedila.* p. 325. b. l. 27. *Tormentilla.* p. 328. b. l. 40. *Lac.* *Lon.* p. 331. l. 32. *coronata.* p. 338. l. 9. & 34. & 44. *Buna.* p. 345. l. 24. *aliquanto.* p. 347. b. l. 19. *dele.* p. 348. b. l. 29. *Polyceration.* p. 358. l. 7. *pin-* *nuliu.* l. 20. *pinnula.* p. 363. l. 15. *qua.* p. 365. l. 27. *Fucus.* b. l. 16. *pratium.* p. 366. l. 29. & 30. *dele.* p. 369. l. 11. & 12. *dele.* p. 370. l. 28. *Georgii.* p. 374. l. 23. *species* 7. b. l. 42. *ovatus.* l. 47. *dein.* p. 376. l. 40. *quidpiam* *fit.* p. 382. b. l. 20. *Leuca-* *cantha.* p. 392. l. 31. *rhodisium.* p. 400. b. l. 17. *qui.* p. 401. l. 18. *genus.* p. 402. b. l. 22. *Cercis.* p. 404. b. l. 15. *Virginica.* p. 408. l. 8. *Macin.* p. 410. l. 25. *Lud.* l. 34. *citer.* b. l. 29. *Betelle.* p. 411. l. 23. *quos.* b. l. 18. *folia.* l. 24. *Batavor.* p. 420. b. l. 11. *Folio.* p. 421. l. 23. & 24. *ligna.* p. 422. l. 3. *genus.* *Tab.* p. 428. l. 38. *Quadratoria.* b. l. 44. *Elkane.* p. 431. b. l. 5. *lob.* *Tab.* p. 434. b. l. 17. *Aboray.* l. 23. in *arbore.* l. 26. *deleatur.* l. 27. & *feratur* ad pag. 311. b. lin. ult. p. 435. l. 23. *huipom.* l. 24. & *rant.* p. 437. l. 25. *dele* 16. p. 440. b. l. 18. *Averrois.* *Ang.* p. 446. l. 2. *crustum.* p. 447. l. 1. *alii* *Mali.* p. 452. b. l. 18. *cogna-* *ta.* p. 457. b. l. 8. *Hispania.* l. 42. *Ignatio.* p. 458. l. 26. *Bello-* *nii.* *Cam.* p. 465. l. 18. *Cristhni.* p. 466. l. 14. & 15. *Helian-* *the.* p. 468. l. 34. *differentiam.* p. 472. b. l. 48. *Oleastru.* p. 477. b. l. 2. *Phyllis.* p. 478. l. 23. *Palmaru.* p. 479. l. 10. *deor-* *sum vergens.* p. 480. l. 27. *Ger.* *Eysf.* p. 481. l. 20. *oportet.* *ex* *Eysf.* *horto.* p. 491. l. 37. *alii.* p. 495. b. l. 28. *Scammonium.* p. 496. l. 21. *abimum.* p. 498. l. 6. *crepitat.* p. 499. l. 9. *LOC.* b. l. 27. *Lafer.* p. 500. l. 24. *addit.* p. 501. b. l. 24. *Melato.* p. 504. l. 10. *Diofcoride* *lib.* cap. 141. *momente.* *Olee* *Aethiopica.* *La-* *crima* *similis* *quodammodo* *Scammonio* (*ὀκρίψης*) *sub-* *va.* *ex* *parvis* *stiliis* *confata.* *mordax* *est.* *Resina.* p. 507. b. l. 42. *deleatur.* p. 508. b. l. 32. *supparum.* p. 509. l. 39. *ex* *bac.* p. 512. b. l. 28. *Malavansis.* p. 513. l. 46. *par.* 4. b. l. 14. *con-* *stant.* l. 21. *ramos* *ad* *jannus* *eduum* *suarum* *Brasiliani* *ad-* *ponunt.* p. 517. b. l. 12. l. penult. *luteum.* l. 31. *lege* p. 60. b. l. 7. p. 519. b. l. 28. *Lonicer.* *h.* *deleatur.*



Genera Dioscor. nigra femina, quæ Epithymia,  
& candida mas, μύριον quod mari quidem simile,  
sed omnibus partibus minus est: Plinio lib. 26. cap.

13. Mandragora alia candida mas, alia nigra femina. At Theophrasto 6. hist. 2: 9. hist. 9. & 6. caus.

4. Mandragora a prædictis diversa est.

I. Mandragora fructu rotundo.

Mandragora mas, Trag. fuch.  
Matthiol. Dod. Gal. Lac. Cord.  
in Diosc. Ad. Lob. Lugd. Cam.

masculus, Tur.

Mandragora, Ang. mandragoras,  
Gus. her. Ces.

mandragoras albus seu masculus,  
Cord. hist.

mandrag. mas vel alba, Cam.

II. mandragora fructu pyri.

Mandragoras femina, Trag. Mac-  
thiol. Cord. in Diosc. Lac. Ad.

Lib. Dod. Lug. Ces. Cam.

mandragoras niger seu femina,  
Cord. hist. Cam.

III. Mandragora flore sub-  
caeruleo purpurascens.

Mandragora femina, Cord. Clus.  
hisp. & hist. Cast. Eyst.

Mandragora, Lon. altera, Ces.

## Hyoscyamus.

Υόσχυλος Dioscorid. lib. 4. cap. 69. id est faba—  
Suilla, vel porcina, quod apri ejus paste resolvantur  
et convellantur præsentis mortis periculo, nisi  
aqua copiosa, statim se foris & intus polluerent,  
ut Aelianus prodidit. Dioscorid. Differentias tres  
proposuit: unam semine nigro, floribus penè pur-  
pureis: alteram semine subflavo, floribus luteis:  
tertiam mitissimam, candidi floris & seminis. At

Y

# Lib. V. Sect. I.

Plin. lib. 27. cap. 4. Apollinaris genera plura sunt: unum semine nigro, alterum candidius: tertium frionis semini simile: quartum candidi seminis in maritimis: item rufi seminis.

**I.** hyoscyamus vulgaris vel niger.

hyoscyamus, Brunf. Tur. Mat. th. Lac. Lugd. cas.

hyoscyamus vulgaris, Ges. hor. Tab. Eyst.

hyoscyamus 1. Ang. Tab. 2. Galen, Trag.

hyoscyamus niger, Dod. Lon. Ad. Lob. Cast. Ger.

hyoscyamus flavus, Fuch. niger vulg. Clus. hist.

Apollinaris Cord. in Diosc.

folia integra, dissecta in lacinias acutas divisa.

**II.** hyoscyamus albus major vel 3. Diosc. & 4. Plinii

hyoscyamus candidus, Trag.

hyoscyamus albus, Matth. Dod. Ges. hor. Tur. Lac. Ad. Lob. Lon. cast. Lugd. Cam. Ger. Eyst. secundus Tab.

hyoscyami alterum genus in-maritimis, Cas. apollinaris 3. Cord. in Diosc.

**III.** hyoscyamus albus minor. hyoscyamus attus, Ang.

hyoscyamus albus minor, Lob. ico.

albus vulgaris Clus. hist.

**IV.** hyoscyamus creticus luteus minor.

hyoscyamus 4. vel albus creticus, Clus. hist.

**V.** hyoscyamus creticus luteus major: hic sub 4. in phytopinae, in prod. etiam & Matthiolo descriptus & pictus.

hyoscyamus creticus alter Clus. hist.

**VI.** hyoscyamus rubello flor.

hyoscyamus peregrinus rubello-flor., Clus. pan.

hyoscyamus syriacus, Cam.

Altarium camerarius addit hyoscyami peculiaris nomine, qui solā foliorum latitudine a prædicto differt.

**VII.** hyoscyamus cauleculis spinosiss. egyptiacus.

hyoscyamus egyptiacus, Clus. hist.

# Nicotiana.

*Nicotiana* a Io. Nicotio Regis Galliae Consiliario dicta, cuius operâ, anno 1560 gal-  
lis innotuit, quam Vlissipona, dum legati mu-  
nere fungeretur, à Belga à florida insula  
allatam accepit.

**I.** *nicotiana* maior latifolia c. 13.

hyoscyami tertia Species, Ges.

hor.

Sanctæ sanctæ indorum, Ad. Lob.

Ger.

Tabacum (ab eius nominis insu-

lâ) monar. frag.

Tabacum latifol. Cam. Eyst.

Petum, Theu. latifolium, Clus.

ad monar.

hyoscyamus Peruvianus, Dod.

Cam. ep.

*Nicotiana*, Lon. Lug. maior,

Tab.

Peribecenne, Oviedo, Lugd.

Tornabona, quia a Tornaborio

missa, Casad.

herba S. Crucis famina, Cast.

Tubac & Tubacca: par. 5. jnd.

or. & par. 6. & 8.

Tabacum, Tabaco, & Tabacca

par. 8. & 9. jnd. occ.

Упповос, Virginæ indigenis;

dasc. Virgin.

Petum Brasilianis, stad. lib. 2.

Arbustum cuius folia exsiccant,

et accensorum fumo inebriantur,

Benzoen l. 1. c. 26.

Lerius asserit *Nicotianam*, licet

apud nos Petum nominetur, at

tamen verum petum brasiliario-

rum non esse, sequer nequidem

in hortis Gallie vidisse, et apud

nos ob calis inclementiam agere

adolescere posse credat.

Ex hujus herba fumo, octo

aut nomen dierum famem tole-

rare posse, in par. 3. amer. epist.

1. scribitur: att Lerius per triduum

aut quadriduum.

**II.** *Nicotiana* ma: angustifol.

& Eyst.

herba sancta sive Tabacum mi-

nus, Lob. ob.

Tabacum sive herba sancta mi-

nus, Lob. ico.

Petum angustifolium Clus. ad

monar.

hyoscyamus peruvianus alter, Dod.

herba S. Crucis mas, Cast.

## Lib. V. Sect. I.

Tabacum angustifolium, Cam.  
alterum minus, Lugd.

**III.** Nicotiana minor, et Eyst.  
hyoscyamus niger vel 3. Matth.  
Cast. Lugd.

hyoscyamus aluteus, Dod. Gesn.  
Lon. Cam. Ger. multum cum  
Diosc. convenit, Ang.

hyoscyamus dubius luteolus  
Solanifolius, Ad. Lob.

hyoscyamus Baruvianus, Tab.  
Priapeia a forma fructus, Ges.  
hor.

Petum 4. Clus. ad Monar.

Tornabona congener,  
Cas.

Nicotiana minor, seu hy-  
oscyamus luteus, Eyst.

Petum 4. Clus. ad Monar.

Tornabona congener, Cas.

Nicotiana minor seu hyosyam.  
luteus, Eyst.

**IV.** Nicotiana minima.

Tabacum sive Sana sana  
minima Lob. Lugd.

Tabacum minimum, Cam.

Petum 3. Clus. ad Monar.

**V.** an nicotianæ species in in-  
sula manbonit, pyrotea herbam  
quamdam comedunt, quâ in he-  
briati & dementati, omnia  
pericula postponunt. par. 7. ind. or. 20.

**VI.** Cassina herba è cujus  
succo potionem conficiunt in  
floridâ, quam bibunt, ubi in locum  
periculose se conferunt, quo fami-  
liariter sitim per horas 24. tollunt, par.  
2. Amer. navig. 4.

## Papaver.

**M**ΗΧΩΝ à μη χορεύ, non ministrando, quod vet-  
centes suis muniis fungi non possint, Latinis pap-  
ver, Dioscorid. lib. 4. cap. 64. 65. & 66. quinque genera  
proposuit: **I.** Μήσιον ποίαν, papaver erraticum, a flo-  
re protinus deciduo, qui purpureus, interdum albus. **II.**  
Μήσιον ἡμερος papaver sativum, quod semine can-  
dido, quod ῥυδαχίτις. **III.** Silvestre duplex, unum  
nigro semine, quod πιδίτις & quibusdam ποίαν,  
quod è scapo succus lacteus emanet: alterum



## Lib. V. Sect. I.

majus sylvestre et ad medicinas valentius. IV.  
 Μήχιον κερατītis οἷδ' ἔκπαλιαν papaver cornica-  
 latum, ἡὰ calyculo in corniculorum modum in-  
 flexo, aut marinum. V. Μήχιον ἀρρώδης pa-  
 paver spumeum, quia herbula tota est spumea,  
 quibusdam ἡράχλεια heracleum. Theophrastus -  
 lativi 1. hist. 14. & 9. hist. 8. meminit: silvestris ve-  
 ro genera 9. hist. 13. plura notavit: ut cornicu-  
 latum: nigrum: erraticum flore rufo: herculaneum  
 folio struthii. Plinius lib. 20. cap. 18. Sativum  
 album & nigrum proposuit, et ex hujus scapo =  
 incido, opium colligi monet: at cap. 19. inter sa-  
 tiva & sylvestria medium genus, Rheas sive  
 erraticum constituit. Silvestrium unus genus &  
 ceratītis, quod aliqui glaucion, alii paralion vocant  
 alterum est heracleon, ab aliis aphron: tertium  
 genus est Tithymalon, mecona vocant, alii pa-  
 ration.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <b>I.</b> Papaver hortense<br/>         semine albo: sativum Dio-<br/>         sc. album Plinio.<br/>         Papaver, Brunnf. Ang. Lon.<br/>         Papaver sativum Matth. -<br/>         Dod. Gal. Lugd. Tab.<br/>         Papaver sativum purpureum,<br/>         Tur.<br/>         Papaver album Trag. Dod. can-<br/>         didum, Ad. Cas.<br/>         Papaver album sativum,<br/>         Ges. hor. Lob. Cast. Ger.       </p> | <p>         papaver sat. semine candido,<br/>         Fuch.<br/>         flos candidus vel leviter<br/>         purpureus: aliquando flore<br/>         est cinereo, ungue purpureo:<br/>         vel candido, rubris maculis<br/>         infecto &amp; semine flavo, &amp; hoc<br/>         Papaver 3 et luteum est Trago.<br/> <b>II.</b> papaver hortense nigro<br/>         semine: syl. Dioscoridi: nigru<br/>         Plinio.       </p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Lib. V. sect. I.

papaver nigrum, Brunf. Cast. minus, Ges. hor.

Papaver sativum alt. vulg. nigrum, Cord. in Diosc.

Papaver sativum semine atro, Fuch.

Papaver nigrum sat. Dod. flore r. malva hortensis aut peonies, Ad. Lob. Lugd.

III. papaver Vulgare = cujus capitula foraminibus hiant, semine incano, ἄγρον, Dioscoridi.

papaver vulg. & 1. Trag.

papaver 3. Dod. des.

papaver patulum, Ad.

171 papaver spontaneum Syl. Lob.

IV. papaver flore rubro = semine fusco.

papaver rubrum, Trag. Ges. hor.

papaver Syl. Dod. gal. Lugd.

papaver nigrum vel 2 Dod.

V. papaver cristatum floribus & semine album.

papaver candidum alterum vel 6. Trag.

papaveris Sat. species foliis dissectis, Dod. gal.

papaveris albi alt. species florum foliis crenatis, Ges. hor.

papaver Menphiticum, floribus multifidis, Ges. ap.

papaver Sat. q. Dod.

papaver fimbriatum aut cristatum album, Ad. Lob. Lugd.

papaver flore fimbriato, Cas. flore niveo, Tab.

papaver Sat. nigrum, Ges.

VI. Papaver cristatum floribus rubris. Semine nigro.

papaver rubrum alterum, vel 7. Trag.

papaveris rubri species foliis florum crenatis, Ges. hor.

papaver sativum nigrum cristatum, Ad.

papaver fimbriatum aut cristatum nigrum, Lob.

papaver 2. foliis dissectis, Dod.

papaver sativum rubrum fimbriatum, Lugd.

haec duae species floris colore variant, subinde albus, frequentes rubens, quandoque ex utroque mixtus: & qui rubet, aliquando colore purpureo, aliquando dilutus rubet: hinc

papaver flore pleno rubrum.

papaver fl. multiplici incor. nato.

# Lib. V. Sect. I.

papaver fl. multiplici puris  
purascente.

papaver fl. miniato pleno.

papaver fl. pleno argenteo  
coloris.

papaver multiplex album -  
oris rubicundis ex hort. Eyst.

**VII.** papaver pleno flore  
album.

papaver fl. multiplici, Ges. her.  
Cam. ep.

papaver polyanthos, Tab.

papaver album polyanthon  
feu multifi. Lob. Ger.

papaver fl. multiplici nu-  
mero denso, Ces.

Est majus & minus: flo-  
ris colore purpureo rubro,  
rubeo saturato, albo, viola-  
ceo & mixto: hinc septem  
figurae apud Tabernanthe-  
tanum & Gerardum habentur.

**IIX.** papaver pleno flore  
nigrum.

papaver nigrum polyanthon  
Lob. Ger.

**IX.** papaver laciniatis flo-  
ribus.

papaver laciniatum rubrum,  
aliud unguibus purpureis,

aliud unguibus albis, Eyst.

**X.** papaver erraticum majus.  
Solas Discondi, Theoph. Plin.

**X.** papaver rubrum, Brunf. &  
erraticum, Eid.

papaver erraticum, Matth.  
Bot. in Diosc. Ges. her. Lac. Lon.  
Dod. Cast. Ces. Thal. Tab. ru-  
brum Eyst.

papaver erraticum primum  
Fuch.

papaver rhoeas, Lob. Ger. prius  
Lugd. alterum, Dod. Gal.

papaver rhoeas sive caduco  
flore puniceo, Ad. Lob. ico.  
flore est puniceo, rarissima  
albo.

**XI.** papaver erraticum ple-  
no flore.

Argemone multiplex Trag.

papaver rhoeas fl. pleno, Cam.

**XII.** papaver errat. pyre-  
naicum flore flavo: quod pro  
primo in prodromo descriptum.

**XIII.** papaver erraticum  
minus.

Argemone exigua & 2. Trag.  
Lugd.

Argemone, Lac. Lon.

papaver rhoeas, Dod. Gal. rhe-  
as minus, Lugd.

papaver err. alt. Fuch. Dod.

# Lib. V. Sect. I.

papaver err. minus, Tab.

**XIV.** papaver corniculatum  
luteum:  $\chi\epsilon\pi\alpha\tau\acute{\iota}\tau\eta\varsigma$  Diosc.  
Theoph. Syl. caratites, Plinio.

Papaver Syl. corniculatum,  
Trag.

papaver corniculatum, Matth.  
Lac. Ad. Lob. Cast. Cas.

papaver corniculatum prim.  
um, Tab. majus, Dod.

papaver corniculatum luteum,  
Juch. Tur. Eyst.

papaver corniculatum flavo  
flore, Clus. hist. Eyst.

papaver cornutum, Dod. gal.  
Cord. in Diosc. & hist. Ges. hor.  
Lon. Lugd. Cam.

**XV.** papaver corniculatum  
pheniceum hirsutum.

papaver cornut. rubro flore, Ges.  
hor. Ger. flore pheniceo, Ad. lob.  
Clus. hist.

papaver cornutum alterum  
floribus rubris, Cam.

papaver corniculat. rubrum,  
Dod.

papaver corniculat. alterum,  
Lugd. Tab.

flos interdum intense ru-  
bens, interdum languidus,  
aliquando pallidus.

**XVI.** papaver corniculatum

pheniceum glabrum.

papaver corniculat. phen. alt.  
Lob. ico. pheniceo pallescentem  
te flore, Clus. hist.

**XVII.** papaver spinosum.  
quod sub 15 in phytopynea,  
sub 2 in prodromo & in 17.  
matthiolo descriptum & pictum

quo etiam nomine postea  
Clus. in sua historia & =  
Eyst. proposuere.

ficus infernalis italorum.  
an glaucium Dioscoridis:

$\gamma\lambda\alpha\upsilon\chi\iota\omicron\nu$  succus est herba  
foliis ferè papaveris corni-  
culati, quæ crocei coloris suc-  
co copioso prædita sunt,

Diosc. l. 3 c. 100. Et hujus  
papaveris folia, succo fla-  
vescente, instar chelidonii  
majoris, abundant.

**XVII.** papaver corniculatum  
violaceum.

papaver cornut. flore viola-  
ceo, Ges. hort. Ger.

papaver corniculatum violaceum,  
Lob. Dod. Lugd. Cast. violaceo-  
flore, Clus. hist.

Anemone Narbonensis ma-  
jor corniculata, Ad.

Anemone maj: corniculata Ber-  
na, Lugd.

floribus caruleis, et nigra violæ  
emuli.

Lib. VI sect. I

*Hypocoon.*

**Υπνίσκοον** οἷον ὑπόγειον, papaveri Dioscorides  
lib. 4. cap. 68 subiicit, cum eadem ei sit na-  
tura, quæ succo papaveris. Et Plin. l. 27 c. 11.

**I. hypocoon.**

Cuminum syl. alterum, Mat.  
Cast. lugd. Tab. Cam.

*hypocoon*, Ges. hor. Dod. Clus.  
hist.

*hypocoon* legitimum, Eid. hist.

Cumino siliquoso persimilis, ad.

Cuminum syl. alt. Diosc. Ita-  
lorum, Lob. ob.

Cuminum syl. alt. Siliquosum,  
Eid. icon.

Cuminum corniculatum, Ges.

**II. hypocoi altera species.**

Cuminum alt. Diosc. Siliquosum,  
Ad.

Cuminum alterum Diosc.

syl. Siliquosum, Lob. icon.

Cuminum syl. Siliquosum  
Pena, lugd.

Cuminum syl. 3. et Siliquosum  
minus, Tab.

Cuminum Siliquosum, Ges.

A priore differt foliis an-  
gustioribus, longioribus glaucis,  
siliquis deorsum recurvis.

*Argemone.*

**Ἀργεμόνη** in totum papaveri syl. simile Diosc.  
l. 2. c. 208. radicem rotundam bibuendo, quod  
nostro non convenit. sic dicta, quod ἄργηρα  
oculorum & nubeulas expurget. Plinio l. 25 -  
c. 19. Argemonia: nostri tria genera faciunt, et  
idem probant, cujus radix Thus redolet.  
Sed videtur Plinius quatuor genera agnosce-  
re, ut l. 21. c. 23. Anemone, quam Argemone  
vocari dixit: 2. genus hoc est: 3. genus l. 29. c. 19.

Lib. VI. Sect. I.

*Lappam Canariam*, cujus radix juctendu  
odorem, thuri similem spirat, *Argemone*  
nuncupari tradit: 4 genus statui potest,  
inquinaria, quam L. 26. c. 9. etiam *Argemone*  
appellari testatur.

I. *Argemone capitulo*  
breviore.

*Argemone minor*, corian-  
dri folio, flore pulsatilla,  
capitulis hirsutis, Ad.

*Argemone capitulo torulis*  
canulato, Lob. Ger.

*Argemone minor capitulis*  
brevioribus, Lugo.

*Argemone*, Cast. prima, Tab.  
*Anemone minor* Bona, Lugo.

II. *Argemone capitulo*  
longiore.

an *Argemone*, Cord. hist.

*Anemone Norbonensis ma-*  
jor corniculata, Ad.

*Argemone capitulo longior*,  
Lob. Lugo. Ger.

*Bapaver erraticum* alterum,  
Ces.

*Argemone* 2 Tab.

III. *Argemone Alpina*  
foliis scandicis lutea: des-  
cripta in Brod.

IV. *Argemone alpina*  
Coriandri folio.

*Argemone lutea*, Bona Ital  
qui in Ballo collectam transi-  
sit

## Sectio Secunda.

Anemone; pulsatilla; Adonis.  
Anemone.

**ΑΝΕΜΩΝΗ** Dioscoridi l. 2. c. 207. Anemone, Plinio l. 21. c. 23. ἄνεμος ἔσ' ἀνέμῳ, à vento, quod flos tantum vento plantæ aperiatur, unde et herba venti quibusdam.  
Genera duo Dioscoridi & Plinio, Sylvestre & Sativum; hujus, inquit, multe species, phæniceo flore, altera candicante, aut lacteo, aut purpureo.

*Anemone latifolia* Anemone latifol. alt. Clus. hisp.  
*Simplici flore.* Anemone hort.-latifol. Simpl.

I. *Anemone cyclamini*, seu flore 3. Eid. hist.  
*malvæ folio lutea.* Anemone 1. Dod. Cas.  
*Anemone latifol. Clus. hisp.* Anemone tuberosa bulbo-  
*Lob. Lugd. Tab. Ger.* castani radice, Lob. Ger. I  
*Anemone hort. latifol. 1.* Anemone papaveracea, Tab.  
*simplex flavo flore, Clus. hist.* Ger.  
*flos 10. aut plurib. foliis com-* Anemone stellata purpurea  
*tans, externis flavus, internis* & alba, Eid.  
*aureus.* Geranium 1. quorundam Dalech.

II. *Anemone geranei* var. Lugd.  
*tundo flore folio purpureo-* flos ex 12 aut 15 foliis, foris  
*rens.* cineraceis hirsutis, internis

## Lib. VI Sect. II.

rubedine purpurea nitentibus componitur: quare in dilutione purpura rubra alias interius intensiore, - exterius remissione: varius totus albet.

**III.** Anemone Geranei rotundo folio dilute purpureas cens.

Anem. hort. latifol. 4. Simpl. flore. Clus. hist.

Flos externè exalbidus obsoleti coloris, interne ex purpurâ dilutione albicat.

**IV.** Anemone Geranei rotundo folio dilute rubens.

Anem. hort. latifol. 4. Simpl. flore. Clus. hist.

floris folia octona foris obsoleta rubent, lanugines pubescunt: interius dilutione rubore et ad carneum tendente nitent, unguibus albicantibus.

**V.** Anemone latifol. Simpl. carneo flore.

Anem. hort. latifol. 6. Simpl. flores Clus. hist.

flos 10 aut 12. foliorum - purpurei ferè coloris, unguibus albicantibus.

**VI.** Anemone latifolia

flore purpureo saturo.

Anemone hort. latif. 8. Simpl. pl. flore, Clus. hist.

flos 8. foliorum, coloris purpureo saturi, exterius - splendentis unguibus magnis ad pediculum purpureus.

**VII.** Anem. latifol. purpureo violaceo flore.

Anem. hort. latifol. 12. Simpl. pl. flore, Clus. hist.

flos 8. foliis constans, externè dilute purpureasens splendet, interne violaceus, unguibus magnis & argentei coloris.

**IX.** Anem. latifol. fl. = purpureo violaceo altera.

Anem. hort. latifol. 13. Simpl. flore, Clus. hist.

flos qui ex 12. foliis constat: foris ex purpureo albescit & splendet: int. interius ex violaceo purpureo splendet, interne <sup>interius</sup> violaceo, unguibus purpureo splendet, unguibus albis.

**IX.** Anemone latifol. violaceo flore.

Anemone hort. latifol. 9. Simpl. flore, Clus. hist.



## Lib. V. Sect. II.

flos 8. vel plurimum foliorum externe sub purpureus & splendens, interne ex purpura violaceus, unguibus rubescentibus, orbe albicante cinctis.

**X.** *Anemone latifolia* fl. violaceo saturo colore.  
*Anemone hort. latifol. 11. Simpl. fl. flore, Clus. hist.*

flos 6. foliis propositis, violacei saturationis coloris, unguibus majoribus, magis que candidis.

**XI.** *Anemone latifolia* fl. variegato.  
*Anem. hort. latifol. 7. Simpl. flore Clus. hist.*

flos qui octifolius, foris ex purpureo saturatius rubet, interius ad unguem usque albus sativa purpura & quasi Kermesina nitet: oris coccineis, in quae radii purpurascens sparguntur: unguem magis et albos habent.

**XII.** *Anem. latifol. punctato flore.*  
*Anem. hort. latifol. 10. Simpl. flore, Clus. hist.*  
flos octifolius violaceus, internè - nā parte maculis albis -

asperis.

**XIII.** *Anemone latifolia* fl. carneo.  
*Anem. hort. latif. 14. Simpl. fl. Clus. hist.*

flores modo majoris, modo minoris, octo folia extrinsecus non nihil purpurascunt, intrinsecus fere carnei, vel saturationis, vel dilutionis, unguibus albis.

**XIV.** *Anemone latifol. senicula folio.*  
*Anemone simplex latifol. diluti purpurascens.*

**XV.** *Anemone latif. flore 174*  
orangei coloris.  
*Anem. hort. latifol. 15. Simpl. flore Clus. hist.*

flores 8. vel 9. folia, externe carnei coloris, unguibus saturate purpurascens, interne carnei diluti: habet major & minor.

**XVI.** *Anemone latifol. fl. coccineo.*  
*Anem. latifol. coccineo fl. Clus. pan.*  
*Anem. hort. latif. 16. Simpl. fl. Clus. hist.*

flores 8. folia, internè - elegantissimo coccineo nitent, unguem orbis pallens amittit,

## Lib. V. Sect. II.

externae quadam lanugine  
pubescunt: huc pertinet

Anem. latif. fl. coccineo simpl.  
Eyst.

flos coccinei coloris, medium  
è fusco nigricans & capitulum  
multis foliis staminulis po-  
tè à viventibus septem

**XVII.** Anemone latifolia  
fl. magno coccineo.

Anem. hort. latif. 17. Simp-  
plici flore, Chus. hist.

floris 8. folia internè  
elegantissimo coccineo colore  
fulgent, nullis unguibus  
apparentibus, externè color  
dilutior, & lanuginosa.

**XIX.** Anemone latifolia  
fl. coccineo phoeniceo.

Anem. latif. Byzantina  
coccineo colore, Chus. pan.

Anem. hort. latif. 18. Simp-  
pli, Eid. hist.

flos amplius oitifolius, colo-  
ris ex coccineo phoeniceo, ut  
in Rheade, unguib. parvis  
subpattidis.

Anemone tenuifo-  
lia simplici flore.

**I.** Anemone Geranei Roper

tiani folio ceruleas an-  
Dioscoridis.

Anem. tenuifol. 3. Chus. hisp.  
Anem. hort. tenuifol. Simp.

fl. 1. Eid. hist.  
Anem. 2. Dod. Lugd.

Anem. tuberosa Gerani-  
lia, Lob.

Anem. montana, Cos.  
Anem. Ropertiana, Tab. ge-  
rani: folia, Ger.

flos ex 14. aut 15. foliolis  
mucronatis compositus, coloris  
est cerulei, vel rubri, vel  
ex utroque mixti, et exte-  
riore subcerulei, interna  
albi: sic flore nunc ceruleo,  
nunc rubro, nunc albo re-  
peritur: quare Taber. tres  
species, alba, cerulea, & ru-  
bra.

**II.** Anemone tenuifolia  
flore multifido dilute purpu-  
rascente.

Anem. hort. tenuifol. 9. Simp-  
plici flore, Chus. hist.

flos ex 14. et pluribus folio-  
lis dilute purpureis, et quasi  
carneis, nullis unguum ves-  
tigium constat.

**III.** Anemone anantho-  
folia flore violaceo hexaphyllo

## Lib. V. Sect. II.

Anem. tenuifol. altera, Clus. hist.  
his.

Anem. hort. tenuif. simpl. fl. Clus.  
Eid. hist.

Anem. 3. Dod. lig.

Anem. bulbosa radice, Ad.

Anemone, Cast. angustif. Tab.  
ern. tenuifol. Cam. at. 1. in ep.

an Anemone altera, Cas.

Anem. tenuifol. fl. purpureo  
violaceo, Eyst.

flos, qui ex 6. interdum 7.

& 8. foliis compositus est, com-  
muniter est purpureis seu  
violaceis, externa parte luc-

niginosus: est ruber seu pha-  
niceus, vel ex purpurea rubens:

est & albus: quare apud Tab.  
Anem. corallina violacea &  
alba: &

Anem. angustifol. & 4. & apud  
Gerard. fr. 2. es.

IV. Anemone tenuifol. fl.  
pallide. coccineo.

Anem. hort. tenuif. 16. simpl.  
fl. Clus. hist.

flos hexaphyllus, foris tenui  
lanugine pubescens, coloris  
dilute rubescantis, internis -  
coccinei vada diluti, unguib.  
amplis albis.

V. Anem. tenuifol. coccineo  
fl. hexaphyllo.

Anem. hort. tenuif. 3. simpl.

fl. Clus. hist.

an Anemone alterum genus,  
Cas.

flos floridi coccinei coloris,  
unguibus magnis, ex pallido,  
fusco & albo mixtis.

VI. Anem. tenuif. coccineo  
flore octophyllo.

flos Anem. hort. tenuif. 4.  
simpl. flore, Clus. hist.

flos interne coccineus, un-  
guibus albis, et externe coci-  
neus, tenui lanugine pubes-  
cens & splendens.

VII. Anem. tenuifol. flore  
magno coccineo hexaphyllo.

Anem. tenuifol. coccineo flore  
simpl. Clus. pan.

Anem. hort. tenuif. 5. simpl.  
fl. Eid. hist.

flos intus elegantiss. coccineo  
colore nitet, foris lanugine  
pubescit: unguis albi sunt.

IX. Anem. tenuif. fl. coci-  
neo sanguineo.

Anem. hort. tenuifol. 7. simpl.  
flore, Clus. hist.

flos 5. 6. interdum 7. foliorum  
coloris coccinei, ad sanguinea  
vargentis, unguibus magnis, ex-  
albidis, purpureis venis distinc-  
tis: aliquando flos ad cost. lateris

# Lib. V. Sect. II.

colorem accedit nec splendet.

**IX.** Anemone tenuifol. flor.

Sanguineo coccineo.

Anem. hort. tenuif. 8. Simpl.

flor. Clus. hist.

floris sex folia, externè la-  
magine obducta, coloris sunt  
Sanguinei saturatioris & splenden-  
tis, internè Sanguinei coccinei  
permixti.

175

**X.** Anem. tenuif. fl. Sanguineo coccineo alter.

Anem. hort. tenuif. 20. Simpl.

fl. Clus. hist.

Flor major hexaphyllus, Sanguineo colore, vel inter coccineum & conchinellem medio, unguibus minoribus & albicantibus.

**XI.** Anem. tenuifol. fl. ex Sanguineo & coccineo medio.

Anem. hort. tenuif. 19. Simpl.

fl. Clus. hist.

Flor hexaphyllus coloris ex Sanguineo at coccineo medio, dilutus, & propter similitudinem quam vulgus cochinellem appellat: unguibus magni, albi & quasi argentei.

**XII.** Anem. tenuifol. fl. ample Sanguineo hexaphyllo.

Anem. hort. tenuifol. Simpl. fl.

6. Clus. hist.

Flor coloris Sanguinei ele-

gantissimi, unguibus magnis albis.

**XIII.** Anem. tenuifol. fl. ample atro rubentes.

Anem. hort. tenuif. 17. Simpl.

fl. Clus. hist.

Flor hexaphyllus, coloris Sanguinei ex atro rubentis, at quasi sericei panni villosi: Kermesino colore præditi, cerulei.

**XIV.** Anem. tenuifol. flor rubro saturato.

Anem. hort. tenuifol. 16. Simpl.

flor. Clus. hist.

Flor hexaphyllus, ruber, seu potius Sanguineus, unguibus magis saturis, variis albicantibus distinctis.

**XV.** Anem. tenuifolia flor niveo.

Anem. hort. tenuif. 13. Simpl.

flor. Clus. hist.

Flor hexaphyllus niveus, cuius unguibus carnei quid aspersum: apicibus exobscure purpureo nigricantibus.

**XVI.** Anemone tenuif.

flor ample candido.

Anem. hort. tenuif. 12. Simpl.

flor. Clus. hist.

## Liber V. Sect. II.

Flos hexaphyllus prorsus candidus, unguibus externe viriscentibus, apicibus nigris.

**XVII.** Anemone tenuiflora. critica fl. magno albo: quae in proo. sub 1. descripta est.

**XIX.** Anem. tenuifolia fl. albicante. Anem. hort. tenuif. 14. Simp. flore, Clus. hist.

Flore est hexaphyllo can- dicante, staminibus albis, api- cibus subcaeruleis.

**XIX.** Anemone tenuifolia flore exalbido majore. Anem. hort. tenuif. 10. Simp. fl. Clus. hist.

Anem. tenuif. carneo fl. Clus. pen.

Flos magnus, hexaphyllus coloris primum ex albidis vi- rescentis, dein ad carneum tendentis, unguibus externe viriscentibus, interne albis, staminibus carnei coloris.

**XX.** Anemone tenuif. fl. exalbido minore. Anem. hort. tenuif. 11. Simp. flore, Clus. hist.

Flos minor ex 6. 8. et plu-

ribus foliolis compositus, co- loris extrinsecus carnei albo mixti; intrinsecus vero prorsus fere albi: unguibus & sanis ex albo paululum viriscentibus.

**XXI.** Anem. tenuifol. flore furvo albicante.

Anem. hort. tenuif. 21. Simp. flore, Clus. hist.

Flos ex Cinaceo sive furvo albicans, & tenui valuetuz bedine perfusus, ut fere est- Cappuccinorum pannus.

**XXII.** Anem. tenuifolia flore carneo striato. Anem. hort. tenuifol. 14. Simp. flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllos externe carneo, oris albicantibus. interne exalbidos, venis car- neis ad medium folium spar- sis, staminibus purpureis cen- tibus, apicibus nigricantibus.

**XXIII.** Anem. tenuifol. fl. magno suave rubente, unguib. albis. Anem. tenuif. fl. suave rubente Calcini: ad Clus. cur. post.

Has varietates, latius fieri cre- dibile est, cum aliis quibusdam plantis etiam contingere obser- vatum sit. Nam statuta in- florum Anemones coloribus,

# Lib. V. Sect. II.

non minus quam in Tulipis  
& Jridibus cadit: ita ut  
plusquam triginta discrimi-  
na in colore aut unguem  
varietate, aut foliorum nu-  
mero observata fuerint.

## Anemone Matthioli.

Omnes anemones singula-  
res caules, interdum duos aut  
tres, vel plures, nullis ramis  
praeditos proferre observatum  
fuit, nisi forte id natura  
lusu contingat, uno alterove  
ramulo inter superna folia  
summum caulem amplex-  
tantia, enato. quare, quid  
Matthiolus suis anemonibus  
quatuor propositis velit, non  
aequimus: omittere tamen  
nolumus.

I. Anemone 1.<sup>a</sup> Matth. Lugd.

II. Anemone 2.<sup>a</sup> Matth. Lugd.  
an Ranunculus flore globoso.

III. Anemone 4.<sup>a</sup> Matth. (at  
in edit. secunda, 1.) Cest. Lugd.  
Anemone, Lac. Anem. rama-  
sa purpurea, Tab.

IV. Anemone 5.<sup>a</sup> Matth. (at  
in Dit. secunda Anem. altera

Cast. Lugd.

Anemone altera, Lac  
Anem. ramosa lutea, Tab. 171

V. Anemone varia ra-  
dica fibrosa peragrina.

Anemones genera varia, flo-  
ris rosei, lutei, purpurei varia-  
tate distincta, aspectu pul-  
chra: vario floribus colore, a:  
liis rubro, alius purpureo,  
non nunquam luteo, obser-  
vavit Rauholfius in suo  
itinerario hierosolymen versu  
& obiter Lugd. herb. attigit.

## Anemone flore pleno.

I. Anemone latifolia  
maxima versicolor.

Anem. latifolia flore mul-  
tiplici, Elus. hisp. & pan-Lugd.

Anem. hort. latif. pleno flore  
1. Eid. hist.

Anem. max. polyanthos -  
Calcedonica, Lob. Ger.

Anemone Calcedonica major,  
Tab.

Folia florum externa & ma-  
jora dena aut duodena, vi-  
ridia sunt, eorum mucroni-  
bus coccineo colore leviter &  
virgatim infectis: interna

# Lib. V. Sect. II.

minora & angustiora, di-  
lutiora purpurea ex rubro  
nitent.

Aliquando, ex prædicto flo-  
re uncialis pedunculus, mino-  
rem florem ex octo latiorum  
foliorum partem viridiam,  
partem coccineorum compo-  
nitum, sustinet, quam pro qua-  
tâ posuimus.

**II.** *Anemone latifolia*  
flore coccineo.

*Anem. hort. latifol. pleno flo-*  
*re 2. Clus. hist.*

Differt a priora, quod in hæ  
floris umbilicum glomerata  
& reflexa folia non occupant

**III.** *Anemone latifolia*  
coccineo flore duplo vel tri-  
plo densiora & plano, quam pri-  
or sit, *Clus. cur. post.*

**IV.** *Anemone latifolia* pavo-  
dicta major. 1.

*Anem. hort. latifol. Pavo ma-*  
*jor 1. Clus. hist.*

Flos unicus 20. 30. aut plu-  
ribus foliis constans, elegan-  
ti, saturato, splendido q; cocci-  
neo colore positus, unguibus  
sanguineis, orbe pallido cincto

**V.** *Anemone latifolia* Ba-  
vo dicta major prolifera.

*Anem. pavota latifolia -*  
*multiplex flore miniato, Bry.*

**VI.** *Anem. latif. pavo -*  
*minus polyphylla.*

*Anem. hort. latif. Pavo major*  
*2. Clus. hist.*

*Anem. hort. flore pleno cocci-*  
*neo variegata latifolia, Eyst.*  
hæc flores minus plenos pro-  
fert, interdum simplici, & 9.  
aut 10. foliorum serie constan-  
tem.

**VII.** *Anem. latif. flava -*

*Anemone hort. latif. duplo flore*  
*flavo, Clus. hist. Eyst.*

an *Anemone multifido & la-*  
*nuginoso folio, quod in Apulia*  
*luteo flore reperietur, Ang.*

**IX.** *Anemone tenuifolia*  
*multiplex rubra.*

*Anem. multiplex rubra, Clus. hist.*

*Anem. flore polyphylla tenui-*  
*folia, Eid. pan.*

*Anemo hort. tenuif. pleno flore*  
*Eid. hist.*

*Anemone 4. Dod.*

*Anem. flore multiplicato cocci-*  
*neo, Lob. colore tenuifolia, Eyst.*

*Anem. coccinea multiplex, Ger.*  
Flore est rubro, cœrulea, albo.

**IX.** *Anemone tenuifolia*

# Lib. V. Sect. II.

multiplax purpurea.

Anem. tenuifol. pleno pur-  
pureo flore Caccini, Clus. cur hist.  
post.

Est etiam quæ purpureo-  
caeruleum florem, alia quæ  
lividæ rubentem & nitidum pro-  
fert.

**X.** Anem. tenuif. multiplax alba  
atro purpurascens.

Anem. tenuifol. pleno flore  
ex atro purpurascens, Clus. cur  
post.

**XI.** Anemone Jovancii ro-  
tundifolio plena.

Anem. latif. purpureo rubescens  
plena, Eyst. desc. ab Anemone  
hort. latifolia & Clusii sola mul-  
tiplici foliorum serie differt.

**Anemone Sylvestris.**

**I.** Anemone Sylvestris alba  
major.

Anem. 3. Matth. Cast. Lug.  
flore albo, Lob.

Anemone alpina, Ges. fræ.

Anemone pannonica, Dod.

Anem. Syl. 1. Clus. pan. & hist.  
Lob. ad. p. 2.

Anemone fl. Syl. flo. candido

Thal. Syl. fl. albo, Eyst.

Anem. major alba, Tab.

Ranunculi 11. species, Cord.

Aconito cognata videtur, Gel.  
hor.

**II.** Anem. Syl. alba minor.  
pro. 1. in prodomo descripta.

**III.** Anemone alpina -  
pro. 2. in prodomo.

**IV.** Anemone alpina -  
alba minor: quæ 3. in pro-  
domo.

**V.** Anem. nemorosa flo-  
re majore.

an anemone Desquæria-  
Theoph.

Sanicula minor quibusdam,  
Brunf.

Ranunculus candidus, Trag.

Ranunculi 4 species, Fluct.  
Cord. hist. Lug.

Ranunculus 6. Tur. 8. Lon.

Ranuncul. parvus, Dod. Gel.

Ranuncul. phragmitis Ges. hor.

Ranuncul. nemorosus, Ad. l. l. l.

Encephallon, Ang.

Ranuncul. Sylvæ, Clus. hist.

Anemone fl. Dod. Syl. vulgaris

Clus. pan. montana, Coss.

Anem. nemora alba purpu-  
rea, coccinea, Ger.

Ranunculi tertii











1669



~~1669~~



